



R. 13

4/3









INDEX.

artemisiae complexio	297	auellane	
artemisia quàm uim habet	297	auellana.	
arundinis radix ad qua utilis sit	270	auene syluest.	
arundo qualem terram deside- rat	270	auene satio	
arus quam temperiẽ habeat	328	auena bonum equi lum	
axeri usus	267	Aues quomodo iusco c. pag.	
asinus admissarius qualis esse de- beat	438	aves quomodo retibus cap- 506 & 507 & 508 & & 510 & 511	
asinos bonos habere quistudet, quid facere debeat	439	auenam in montib. crescere	73
asini genera duo	439	auena duplex	109
asini quomodo exercendi	439	auster nobilitat vinum in uiti- bus	143
asinorum egritudines	439	auster nocet granarijs	109
asinini stercoris bonitas	55	auticax equorum morbus	406
asparagi complexio	382	autumnales sationes	80
asphodelum quibus alijs nomi- nibus appelletur	298		
asphodeli uirtus in medicina	298		
asphodelorũ puluis utilis ad fistu- lam equorum.	430		
astures genus accipitrum	500		
atriplex quando seratur	294		
atriplex qualem locũ amet	294		
atriplex quem usum habeat in medicina	294		
atriplex temperamentum	294		
atriplex semen quàm uim habe- at	294		
auellane differentia	213		
		B	
		Arba iouis	328
		basilicon quod habeat tẽ- peramentum	301
		berberis	214
		betonica complexio	301
		betonica in morbis usus	301
		blitum qualẽ desideret terrã	299
		blitum quando seratur	299
		bobus multa accidunt egritudi- nes	444
		botrus quod cibi genus optimum pag.	444

INDEX

1	brancae ursinae temperamentum	
300	pag.	302
300	bubuli ad qucm rem idonei sint	
rentur in mor	pag.	446
a	445	bubulorum carnes melancholice
emi debeant	443	ca
is locis conueniunt		bubulci officium in bobus doman
446	dis	442
ni quomodo cognoscun-		buxus quomodo crescat
446		37
n discriminē numerosum	446	buxus quale lignum habeat
446		268
ues quando mutant dentes		buxus quomodo plantetur
pag.	444	269
boues liuosi redduntur	445	buxi ligni usus in medicina
boues febricitantes quomodo co-		269
gnoscantur	444	buxi lignum ad quas res utile sit
boues quādo domandi sint	442	pag.
boues cito pingues redduntur fa-		269
bis confectus	120	
boum aetatum gradus	439	
boum morborum causae	444	
boum pascua qualia esse debeant		
pag.	440	
boum stabula qualia esse oportet	440	
ant		
boum aetas quomodo cognosca-		
tur	443	
boum quorundam caro bona		
pag.	446	
boum corium bonum	447	
boum serum	447	
qualis		

carnes à quibus cōparandi	460	caseum quo pacto fieri oporteat	
canis utilitas	46	pag.	452
canibus que bestiae capiantur	518	casei utia quae sint	453
canabis natura	111	caseum saporem assumere queme	
canabis qualem desideret agrum		nis alicuium	453
pag.	112	caseus quale nutrimentum	447
canabis preparandi ratio	112	castanea ex semine melius quàm	
canneta quomodo fiant	270	ramis prouenit	83
cannae usus in medicina	270	castaneae utiles suum	457
canna	279	castaneae differentiae	216
capillos mundat sinapi	362	castanea quale coeli diligit	216
capillus ueneris quàm habeat uir		castaneae quomodo serantur	216
lucem	314	castaneae quādo colligendae	217
caprarum utilitas	456	castaneae quomodo uirides se- uentur	218
caprarum carnes durae sunt		castaneae lignum ad quae utile sit	
pag.	456	pag.	218
carduus quando seratur	311	castanearum temperies	218
carduus qualem terram amet	311	castanearum usus in medicina	
cardui syluestris usus in medicina		pag.	218
na	368	castaneae quale tribuant nutri- mentum	218
caprae unde dicta	456	castanea durabile lignum	26
caprae nunquam sanae	456	cataputia quam nim habeat	316
caprae quomodo eligendae	455	caules qualem terram desideret	305
caprae forma laudata quae sit		caules quomodo serantur	305
pag.	459	caulium semina quādiu durent	306
caprarum stercoris praestantia		caulium temperamentum	307
pag.	55	caulium nutrimentum	307
caprile quale esse debeat	455	caulium usus in cibo & medicina	
caprinū lac quale sit	456	pag.	307
caseus qui bonus, quiq; malus			
pag.	454		

INDEX.

cedrus in siccitate durabilis	26	cerasorum acrium usus	160
cedri odor fugat serpentes	451	certus in quo loco proueniat	375
centaurea quàm uim habeat	314	ceruus qualis arbor	262
centaurea duplex est	314	cerui cornu usum fugat serpen-	
centaurea est ex præstantioribus		tes	451
medicinis	314	chamomile complexio	312
cepa qualem desideret terram		chamomile usus in medicina	312
pag.	307	chelidoniæ temperamentum	317
cepe quando serantur	307	chelidoniæ uirtus	317
ceparum complexio	308	cheresolium quando seratur	
cepe comestæ quid faciant in bo-		quandiu duret	317
mine	308	ciceris diuersitates	110
cepe quale nutrimentum & qua-		cicer ubi utiliter seratur	210
lis medicina sit.	309	ciceris albi natura	110
ceparum succus nares purgat	300	cicer admissario pecori congru-	
ceparum naturam habent scalo-		it.	110
nia.	305	ciceris nigri facultas	111
cera quomodo fieri debeat	492	cicercula quale cælum & agrum	
cerasa ut sine ossibus nascantur		amet	111
pag.	387	cichoream alio nomine dici spon-	
cerasus quo loco seruielit	214	sam solis	359
cerasorum discrimen	214	cicute temperies	315
cerasus quod genus terre amet		cicuta uenenosa est	315
pag.	214	cicute usus in medicina	315
cerasi quo tempore anni seran-		cimona morbus equorum	414
tur	214	cineres quales ad agriculturam	
cerasus quomodo & quando in-		pag.	58
seratur	215	cipressus ad ædificia bona mate-	
cerasa quàm uim habeant in cibo		ries	26
& medicina	215	cisternæ quomodo fiant	533
cerasorum resine uirtus	216	cisternæ quales faciendæ sint	24
		cūri	

INDEX.

citri arbor que loca amet	221	coriandri virtus	318
citri arboris cultura	221	coriandri folia faciunt ad fru-	
citrulli qualem terram deside-		menta conſtruenda	109
rent	304	cornus omnem coeli ſtatum dilie-	
cipreſſus ex uno ſemine pullu-		git	223
lat	33	corni lignum ad multa utile	223
citonias qualem terram & aërem		cornus quomodo ſeratur	223
deſideret	218	corni fructus uſus in medicina	
citonias quando ſcenda	219	pag.	224
citonias quomodo curanda	219	conſolidæ maioris uſus in morbis	
citoniorum differentia	220	equorum	419
citonias ad que utilia	220	conſolidæ maioris cõplexio	318
clibanum lataminis quid nocent		cretani temperamentum	317
pag.	56	crepatias equorum morbum que	
columbina qualis herba	354	curent	418
colubaria quibus malis fiat	470	crocus duplex	310
columbarum nidi quomodo fa-		crocus quomodo ſeratur	310
ciendi	471	croco que maxime noceant	311
columbarum fecunditas	472	croci temperies	311
columba quomodo teneri opor-		croci uſus in medicina	311
teat	473	crocus reſiſtit ebrietati	311
columbarum cibus	474	cucumer agreſtis quem uſum ha-	
columbarum paſtoris officium		beat.	318
pag.	474	cucumeris temperies	304
columbarum pulli quomodo fa-		cucumer qualem deſideret ter-	
ginentur	474	ram	304
columbis que noceant	475	cucurbita ubi prompte creſcat	
columbarum utilitas	476	pag.	48
columbinum ſtercus ſeruidiſſi-		cucurbita qualem terram deſide-	
mum	58	ret	302
coriandri complexio	318	cucurbitas plantandi ratio	303

cucurbita temperamentum	303	ant	426
cucurbite semina quādiu seruen- tur	303	dysclannus q̄ uirtutē habeat	319
curie quales in rure faciendae sint	16	dominorū praesentia quantū eno- lumentū conferat agro	537
cuscuta quali sit tēperamento	313	domorum materies	25
cuscutae usus	313	dragantea qualis herba	364
cyminum quale uelit solum	309	E	
cymini complexio	309	Ebuli temperies	321
cymini usus in medicina	310	Ebuli radices quā uim ha- beant	322
cymini frequens usus discolorcm cutem efficit	310	ebullū ubi pronenit spōte sua, indi- cat terrā esse frumētis aptā	101
cyminum quā uim habeat	294	elephātes quomodo capiātur	521
cypressus quib. locis soleat plan- tari	269	endiuie temperies	320
cypressi lignum odoriferum	269	endiuia quem usum in medicina habeat	320
cypressi temperamentum	269	endiuie folia uiridia utilia sunt pag.	320
cypressi folia cuius naturae	269	enula quomodo seratur	320
cypressi nucē stipticā esse	269	enule complexio	320
D		enule radix quā diu duret in medicina	320
Dactyli quale tempera- mentū habeant	260	enule usus in medicina	320
dactylos fert palma	258	epatica temperamentum	321
dentium doloris remediū	269	epatica quo loco crescat	321
dentium mutatione quorundā ani- malium etas cognoscitur	390	equini letaminis bonitas	55
dentium inaequalitate cognosci- tur etas omnium	452	equarum bona forma	391
domus in rure quomodo debeat intrinseca esse disposita	19	equorum pedes quomodo curen- tur si spinis aut alia re tali le- sus fuerit	426
dysclanni radices ad quae ualea-		equus, si infusio ad ungulas de- scendit	

INDEX.

<i>falconum diuersitas</i>	501	<i>florum substantia unde</i>	41
<i>falconum nobilitas</i>	501	<i>foenum quomodo colligatur</i>	373
<i>falcones quomodo alende</i>	502	<i>foeniculum romanum quom uim</i>	
<i>falconibus que accidunt egritus</i>		<i>habeat</i>	294
<i>dices</i>	503	<i>foeniculus quando seratur</i>	322
<i>far quale genus frumenti</i>	121	<i>foeniculi complexio</i>	322
<i>far cuius complexionis sit</i>	121	<i>foeniculi semen quando colligat</i>	
<i>fascoli quales sint</i>	122	<i>tur</i>	322
<i>fascoli qualem terram deside-</i>		<i>foeniculi usus in medicina</i>	322
<i>rent</i>	122	<i>foenigræci complexio</i>	324
<i>febres quasdā curat scylla</i>	360	<i>foenumgræcum quom uim habeat</i>	
<i>febris tertiana remedium</i>	329	<i>in medicina</i>	324
<i>ferias seruare iubet Varro</i>	27	<i>foliorum generatio</i>	40
<i>figus morbus equorum</i>	436	<i>foliorum in plantis usus</i>	40
<i>fici morbi cura</i>	437	<i>fontes quales debeant esse in ru-</i>	
<i>figus multas habet species</i>	224	<i>re</i>	21
<i>figus ex uno semine crescit</i>	33	<i>formicas quid ex horto abigat</i>	
<i>figus ubi sit ferenda</i>	224	<i>pag.</i>	291
<i>figus quale exigit cælum</i>	224	<i>formice arboribus nocent</i>	105
<i>figus quando & quomodo & in</i>		<i>fossio quid conferat</i>	63
<i>quas arbores inferatur</i>	225	<i>foueis quomodo capiantur feræ</i>	
<i>figus quomodo colenda sit</i>	226	<i>pag.</i>	520
<i>figus quomodo siccetur</i>	226	<i>fraxinus qualis materies</i>	25
<i>figus qualis cibus</i>	227	<i>fraxinelle complexio</i>	319
<i>ficuum decoctio ad quàm rem uti</i>		<i>fraxinus quo genere loci gau-</i>	
<i>lis sit</i>	227	<i>deat</i>	271
<i>filix quomodo extirpanda</i>	78	<i>fraxini usus</i>	27
<i>fistula equorum morbus quomo-</i>		<i>fraxini folia utilia contra uene-</i>	
<i>do curetur</i>	429	<i>num</i>	271
<i>flamule herbe uirtus</i>	323	<i>fraxini natura contra serpentes</i>	
<i>fluminum defensionem</i>	107	<i>pag.</i>	271
		<i>fraxini</i>	

INDEX.

<i>fraxini foliorum & corticis usus</i>	in medicina	271	<i>frumenti natura</i>	155
<i>fraxini temperies</i>		271	<i>frumenti in medicina usus</i>	116
<i>fraxinagulus qualis arbor</i>		271	<i>fumi terræ natura</i>	323
<i>frigida loca gignunt audaces</i>		12	<i>fumi terræ usus</i>	323
<i>fructus colligendi sunt decrescen-</i>			<i>furma equorum morbus qualis</i>	431
<i>te luna</i>		292	<i>furma equorum quomodo curan-</i>	
<i>fructuum materia in plantis</i>		41	<i>dus</i>	431
<i>fructuum exterior pars quid se-</i>			<i>fungorum uarietas</i>	333
<i>nium conferat</i>		42	<i>fungi qui boni sint</i>	333
<i>fructuum odores & sapes un-</i>			<i>fungi mortiferi qui</i>	334
<i>de potissimum mutantur</i>		55	<i>fufanus ubi nascatur & quis eius</i>	
<i>fructuum syluestrium humor qua-</i>			<i>sit usus</i>	272
<i>lis</i>		97		
<i>frumentū felicius in uallibus pro-</i>			G	
<i>uenit</i>		73	<i>Gabusia caulium species</i>	
<i>frumentum quibusdam locis sub</i>			<i>Sunt</i>	324
<i>terram conditur</i>		109	<i>gabusia conduntur ut rapæ</i>	325
<i>frumentis idonea terra</i>		101	<i>galbani incensi odor fugat ser-</i>	
<i>frumentum quale præbeat nutri-</i>			<i>pentes</i>	451
<i>mentum</i>		116	<i>gallæ unde ueniant & quis</i>	427
<i>frumenta quomodo conseruen-</i>			<i>gallas equorum quomodo curêt</i>	
<i>tur</i>		109	<i>pag.</i>	427
<i>frumentum homini cõueniens est</i>			<i>gallarum usus</i>	195
<i>pag.</i>		112	<i>gallæ quam nim habeant</i>	263
<i>frumenti temperamentum</i>		112	<i>gallarum pituitæ quomodo me-</i>	
<i>frumentum nouum maioris nutri-</i>			<i>deantur</i>	470
<i>menti est</i>		113	<i>gallinæ optime quæ sint</i>	468
<i>frumenti diuersitas quam ex ter-</i>			<i>gallarum cibus</i>	468
<i>ra contrahit</i>		113	<i>gallarum pulli quomodo edu-</i>	
<i>frumentū quādo sarculandū</i>		114	<i>candi</i>	470
			<i>garganica uocata uuarum species</i>	
			<i>pag.</i>	140
			e	garo

gariophylatae herbae consideratio

pag. 523

garpae quomodo fiant equis 427

genesta frutex ubi nascatur 270

gentiana radix 325

gentiana quam utilitatem habeat
in medicina 325

gimus avis 505

gimeta avis nocturna 505

gingivis medetur plantago 329

git qualem usum habeat in medi-
cina 122

git quales flores habeat 122

git quale semen 122

gladiolus herba iris alio nomine
vocatur 328

glandium natura 263

glandes utiles suum 457

gramen pingue declarat terra fo-
cunditatem 102

graminis virtus qualis 325

gralegae herbae natura 325

granarijt quis locus aptus 109

grilla una 141

granata mala sepius faciendis i-
donea 18

grillus ubi nascatur 269

grilli usus 269

grues capiendi modus 506

gutta robora morbus bonum 444

gyrsaleus qualis avis 504

H

H odorum carnes bone sunt
pag. 456

herbarum satio diversis temporibus 289

herbae quo loco servanda sint 292

hircus quando habilis sit ad incun-

das feminas 455

hissopi complexio 327

hissopus quam vim habeat 327

hissopi virtutes in medicina 327

hordeum vallis amat 73

hordeum purgandum 129

hordeum quo loco feri velit 127

hordeum margolum quando sera-
tur 127

hordeum demessum gradescit 128

hordeum quam habeat temperi-
em pag. 128

hordei nutrimentum 128

hordei usus in medicina 128

horreorum situs 108

horreorum locus aptus 543

hortum bene dispositum delectam-
re pag. 387

horti remedia 291

horti irrigui utilitas 102

hortus qualum aerem desiderat
pag. 287

horto terre genus aptum 287

horto quae necessaria 287

hortus

INDEX.

hortus quomodo & quando co-	lactuce plures species	332	
lendus	288	lactuce temperamentum	332
humuli natura & uirtus	326	lactuca qualem generat sanguis	332
hydropicos inuat plantago	329	nem	332
hydropicos inuat sinapi	362	lapathi ad morbos usus	331
hydropicis opitulatur cicer	111	lapathum quam complexionem	331
hyoscyami natura	326	habeat	331
hyoscyami semini diuersitas	326	lapathum triplex	331
hyoscyami usus in medicina	326	lappa qualis sit herba	334
I		lappam scorpionum ictibus me-	334
Inclauitura species	435	deri	334
ictericis prodest cicer	111	lappæ usus in medicina	334
iliacæ passioni senectio prodest		laurus qualis arbor	228
pag.	364	lauri frondes	228
iliacæ passioni utile nasturtium		laurus qualem aërem amet	228
est pag.	342	lauri folia ad quæ sint utilia	228
infunditi morbus equorum	410	lauri fructus ad quæ utiles sint	228
infectati morbus equorum	411	pag.	228
infectionis species	87	lauri frondes uestics à tineis de-	229
infectio quæ melior sit	541	fendunt	229
iris herba quàm uim habeat	328	laureolæ natura	333
iridis pulvis quàm uim habeat		laureolæ usus in medicina	333
pag.	328	laureola cum quibus detur	334
ismerli accipitres	504	laureolæ semen quàm uim habe-	334
iuncus ubi crescit indicat terrâ		at pag.	334
bilem frumento	101	lentisci complexio	333
iruncij qualis herba	327	lentisci usus in medicina	333
L		lenticula quale amet solum	123
Ac quale nutrimentum	447	lenticulæ satio quando	123
lactuca quibus temporibus		lenticulæ temperies	123
feri possit	331	lenticulæ quib. proffit, qb. obfit	123

c 2 lepores

I N D E X.

leporis canibus quomodo capi- untur	518	liquiritiæ radix herbæ qualis sit pag.	329
leporarium quid sit	462	liquiritiæ usus in medicina	329
leporis fecunditas	462	lucris instructus debet esse ma- gister pecoris	462
leporum genera	463	lolium ubi nascatur	122
lepus unde dicatur	463	lolij uis	122
letam ne opus plantis est	53	lolium inebriat	122
lethargi medicina acetū est	196	lumbricos occidit absynthiā	296
lethargicos excitat sinapi	362	lumbricos expellit allium	293
libyfici temperamentum	334	lumbricos occidit succus lapathi pag.	331
libyfici usus in medicina	334	lumbricos expellit git	122
lilij oleum	33	lunæ uirtus	79
linum quando plantetur	329	lunæ nomina uaria	79
lilij natura	330	lupini satio in uincis pro sterco- re est	166
lilium facit aduersus apostema- ta	330	lupinus loco stercoreis est	59
linguæ arietis herbæ natura	329	lupinus quo genere terre gau- deat	124
lingua auis quàm habeat comple- xionem	330	lupini natura	124
lingua auis quàm uirtutem habe- at	330	lupini farina aduersatur lumbris cis	124
linguæ auis usus in medicina	330	lupini usus in medicina	124
linum ubi rectè seratur	60	lupinus quale præbeat nutrimen- tum	124
lini semen exiccat agrum	71	lupinus cuius rei causa seratur pag.	123
lini quo loco feri debeat	125	lupinus impinguat agrum	123
linum exhausti agrum	125	lupinus quando & cum quibus se- ratur	124
linum debet mundari & ligenter ab omnibus herbis	126		
lini præparandi modus	126		
linum quando maturum sit	126		
lini complexio	127		

M	pag.	234
M aiorane temperamen- tum 340	malorum granatorū utilitas 235	
maiorana quomodo seruetur pag. 340	malgranati liquor qualis 236	
maiales se defendunt 460	malus in quod genus arborum in- seratur 386	
maluæ complexio 336	malferuti morbus 419	
maluæ differentia 336	malpitio equorum morbus 430	
maluæ usus in medicina 336	malua letum indicat solum 102	
mali arboris differentia pluri- me 229	malixia uua 139	
malorum species meliores eligen- de 229	mādragore temperamentū 338	
malus quomodo seratur 229	mandragore species 338	
malus in quas arbores inseratur pag. 230	mādragore usus in medicina 338	
malus arbor quomodo colenda pag. 230	mandragora uim habet somnum inducendi 338	
malapunica uaria sunt sapore pag. 233	marrubij temperies 340	
malagranata multiplicia sunt pag. 233	marrubij uirtus 340	
malapunica quale solum & cœ- lum desiderant 233	matricis remedium hysopus est pag. 327	
malapunica quomodo planten- tur 233	matrici medetur rosmarinus. pag. 378	
malagranata quomodo colantur pag. 224	melones qualem terram deside- rent 334	
malapunica quomodo seruentur illaesa 224	melonum temperies 335	
malapunica quando colligantur	melones quibus conueniant 335	
	meliloti uirtus 335	
	mel purum reddit uinum 186	
	mel rosatum uinū clarificat 188	
	melancholicis pass.ionibus pro- dest thymus 367	
	mercurialis complexio 336	
	mercurialis quos humores ducat c 3 pag.	

pag.	336	meu temperiē quam habeat	339
mercurialis succus qualis	336	milium duplex	130
mellis mēsis quando & quomo- do fiat	491	milium quale deſyderet ſolum pag.	130
melle quomodo fiat	492	milium quo tempore ſerendum pag.	131
menſtrua prouocat ſambuci cor- ticis ſuccus	281	milij ſeminis quātum ſufficiat ſui ingero	131
menſtrua prouocat artemiſia pag.	297	milium quo paſto ſeructur	131
melilotum quān habeat qualita- tum temperiem	335	milij complexio	131
meliloti ſemen	335	milij nutrimentum	131
melancholiā purgat laurcola	333	milica differentia	129
meſpilus arbor	239	milica qualem amet terram	129
meſpilus qualem deſideret locum pag.	239	morbī ex uentis prouenientes & pag.	386
meſpilus quomodo ſeratur	239	morus in ulmum inferi poteſt pag.	237
meſpilus quo paſto inferatur pag.	240	morus arbor quando ſeratur pag.	237
meſpili fructus quando legen- dus	240	mori cultura	237
meſpila ad quē utilia ſint	240	mori fructus qualis	238
meridionales loci inſalubres	13	mori radicis medicina	238
menſtrua prouocat capillus ue- neris	315	muſſa uini uitiū	191
mentis temperamentum	337	muli etas quomodo cognoſca- tur	438
mentis ſpecies	337	mulorum genus qui ſtudet habe- re	438
menta quā uirtutē habeat	337	muliebris capilli odor fugat ſer- pentes	451
menta quid ualeat in morbis pag.	337	munitiones & ſepes quomodo fa- cienda	543
meu quā uim habeat	339		omniacus

I N D E X.

<i>muniacus arbor qualis sit</i>	239	<i>nebulis quid medeatur</i>	291
<i>muniacus quale locum desideret</i>		<i>nemora quomodo proueniant</i>	
pag.	239	pag.	374
<i>muniaci fructus ad quæ utilis est</i>		<i>nemora quæ hominum industria</i>	
<i>quando maturus</i>	239	<i>fiunt</i>	375
<i>myrtus quando faciendus</i>	25	<i>nenuphar duplex</i>	342
<i>mustele anseribus nocent</i>	467	<i>nenupharis complexio</i>	342
<i>muscatellus uuarum species</i>	140	<i>neruis utilis nux cypressi</i>	269
<i>mustum quomodo cito purgetur</i>		<i>nigelle temperies</i>	343
pag.	188	<i>nigella semen diu durat</i>	343
<i>mustum quomodo bonū fiat</i>	175	<i>nucem cortex ad quæ utilis</i>	245
<i>mustum qua ratione diu maneat</i>		<i>nucis arboris umbra nocet</i>	245
<i>mustum</i>	178	<i>nutrimentorum natura</i>	54
<i>myrtus frutex qualis sit</i>	241	<i>nux ex semine bene prouenit</i>	83
<i>myrtus qualem terram desideret</i>		<i>nux arbor</i>	242
pag.	241	<i>nux nullū locū ferē recusat</i>	742
<i>myrti ad quæ utiles sint</i>	241	<i>nux qua ratione seratur</i>	242
<i>myrti fructus magnæ utilitatis in</i>		<i>nucis fructus quando et quomo</i>	
<i>medicina</i>	241	<i>do colligendus</i>	243
<i>myrti folia quā uim habeant</i>		<i>nuces quomodo seruari possint</i>	
pag.	242	pag.	244
N		<i>nucum differentia</i>	244
N <i>Apus quo loco uelit feri</i>		<i>nucum cibus qualis</i>	245
pag.	341	O	
<i>napus in rapam mutatur</i>	341	O <i>Cimi complexio</i>	301
<i>napis quæ fieri possint</i>	341	<i>ocimi usus in medicina</i>	
<i>naporum usus in medicina et ci-</i>		pag.	301
<i>bo</i>	341	<i>olei us</i>	250
<i>napelli complexio</i>	343	<i>oleæ multa esse genera</i>	246
<i>nastrutij utilitas</i>	342	<i>olearum uirtus</i>	250
<i>nastrutij seminis utilitas</i>	342	<i>oleū quomodo condendū sit</i>	250
		<i>oleum</i>	

I N D E X.

oleum rosati quomodo fiat	275	ouis forma optima quæ	448
oleæ quo pacto curande	248	ouium sanitas quomodo cognoscatur	448
oleæ ferende modi	246	ouibus centenis unū arietem sufficit	448
olea quomodo inferatur	247	cere ad procreandum	451
oleis unde nocumentum accidat pag.	248	oues quando debeant tondi	451
olea qualem possulet locum	246	oues quandiu ualeant & uiuant pag.	452
oleæ steriles qua ratione feraces fiant	248	oues quādo debeant mulgi	452
oleum quomodo ex oliuis fieri debeat	249	oues dum mulgētur silendum est pag.	452
oliuetum quomodo constituendum	247	oues hyeme ad pascua nō debent ire nisi priuā & gelicidijs solutis	449
oliueta comedantur	102	oues calidæ non debent includi in ouilia	449
oliueta diligenter custodienda pag.	248	oues ut semper moueantur oportuna danda	450
opum unde fiat	346	oues quibusdam mensibus continende ne nū comedāt	450
origani temperies	343	oues debiles autumnō mutande pag.	450
origanum duplex est	343	oues indigent cane custode	460
origani uirtus	344	oues tōse quomodo curandæ	451
oues si foemellas aut masculos creari uelis quid facere debeas	450	ouum sterus	55
oues ubi cōceperint arietes amouendi sunt	450	ouum pellium utilitas	455
oues bimæ nec minores submitte de sunt	450	oues quomodo pascende	448
ouis quādiu prægnans sit	450	oui stabulum quale esse debeat pag.	448
oues bonæ quomodo cognoscantur	447	ouum stabulum quā cœli plangam speculare debeat	449
ouium melior ætas	447		449

INDEX.

onile debet esse stratum	448	papaucris in medicina usus	346
oninum utilitas magna	454	papyrus herba ubi nascatur	351
onibus quæ pascua accommo-		papyri herbae usus in medicina	
da pag.	448	pag.	351
ouis formella quamdiu generare		paralisi prodest ruta	357
possit	451	pastinaca quando seratur	349
ouis vulnerata tendendo quomo-		pastinaca duplex	349
do curetur	455	pastinace sylvestris uis	349
ouilla caro qualis	455	pastores quales esse oporteat	
P		pastores quibus rebus in-	(461
Pabuli loco vitia potest esse		structi debeant esse	462
pag.	134	pastorum numerus quantus esse	
palma arbor qualem locum desi-		debeat	462
deret	258	pascua palustria noxia	448
palma quomodo ex semine cre-		pasti conficiendi modus	177
scat	33	patris familias officium in uilla	28
palme quæ ratione curetur	260	pauimentum cisternarum	24
palma quomodo seratur	259	pauimentorum materia	24
palma utrumque sexum habet	259	pauones facile est nutrire	464
panis differentia quæ est ex ma-		pauones masculi oua feminarum	
gnitudine	117	suarum persequuntur	465
panis uarijs modis coquitur	117	panonum oua excidunt gallinæ	
panis facilis digestiois qui sit	117	pag.	465
panis difficilis concoctu	118	panones quibus pascendi sint	466
panicum quale cœlum & terram		panonum utilitas	466
amet	131	persicorum nucleis purum uinum	
panicum genus quod citò crescit		reddunt	187
pag.	131	perdices quomodo saginande	
panicum quo pacto coquatur	132	sint	477
papaucr quando & quo loco se-		persicus quo pacto seratur	256
ralur	346	persicus in quo loco optime pro-	
		d ueniat	

ueniat	256	pinum putatio inuat	261
persica sicca quàm uim habeant		pinus qualè locum amet	260
pag.	258	pinus quo pacto seratur	260
persicus in prunū inscribitur	257	pini in alpebus nascuntur	374
persicorum diuersitas	258	piper qualis arbor	262
persica quale corpori tribuēt nu-		piper arbor ubi crescat	262
trimentum	258	piperis usus quibus noceat	262
persici folia quem usum habeant		piperis uirtus & natura	262
pag.	258	piri diuersitates infinite	251
persicus arbor quomodo cure-		pirus syluestris fecunda indicat	
tur	257	uitibus at tam terram	144
pes uituli herba que sit	328	pirus in siccitate durat	26
petroselini satio quando & quo		pira sistunt uetrem	254
modo	347	pira quando legenda	253
petroselini usus in medicina	347	pirus quomodo debeat plā. 252	
peucedani uirtus	347	pirus quomodo inferi debeat	252
phages in alpebus nasci	374	pirus qualem locū desideret	251
phasiani quales ad fortificandū		pirorū liquor non fiat	253
parandi	466	pirorū frondes & folia quàm na-	
phasiani quibus pascantur	466	turam habeant	254
phlegma purgat latercola	333	piscinis locus aptus	463
pice græce usus in morbis equo-		piscinarum differentie	463
rum	420	pisces quales in aqua seruari pos-	
πικρατον ἄγριον	357	sint	464
plumbeis fistulis reddūtur aque		piscium utilitas	464
noxie	24	piscium fecunditas	464
pini fructus quādo legēdus	261	pythagoras præfert sinapi omni-	
pini fructus quàm uirtutem habe-		bus herbis	361
at pag.	261	pituitam gallinis nocere	470
pinus nisi in siccitate non durat		pix græca facit ad ungulas equo-	
pag.	26	rum pag.	433
		plant a	

INDEX.

plantarum generatio	33	plantæ quæ promptè crescant,	
plantæ quo pacto attrahant ali-		quæq; non	37
mentum	33	plantarum generationi quæ con-	
plantas augere	34	ueniant	30
plantarū partes uegetales	34	plantarum diuersitas pro fructu	
plantarū radices quem usum ha-		um diuersitate	50
beant	36	plantæ cum transferuntur quo-	
planta omnis quibus indigeat	51	modo pōnende sint	85
plantas quæ immutent	536	plantæ quo pacto sint colligen-	
plantæ quomodo attrahunt ali-		de	146
mentum	539	planiandi modi multe	87
plāt. plātatio et generatio	540	et sequentibus aliquot	
plātæ transmutatio in aliam	45	plantago uocatur alio nomine	
planta syluestris quomodo dome-		lingua arietis	329
stica fiat	45	pluuia ne uinū corrumpat	178
plantarum uie nutrimenti	37	pluuie plantis utiles	31
plantarum medulla quem usum		pluuioso cælo quid in uilla fieri	
præstet	38	doceat	29
plantarum principia	538	podagra lini herba quā uim	
plantæ quibus locis feliciter, qui-		habeat	313
bus non. proueniant	98	podagræ medetur cicute radix	
planta in salsis et aridis locis nō		pag.	315
bene g'gnitur	100	polipodij natura	348
plantarum sim ludo	87	polipodium quem habeat usum in	
plantarū surculi inferendi quales		medicina	348
esse debeant	88	pomorum uarietas	231
plantarū syluest. ū fructus	96	poma qualia sint stomacho	232
plantarū p' differētias diu sio	32	pomorum unum quæle	232
plantarum alimētum	53	poma pontica ad quæ utilia sint	
plantarum infusio	4	pag.	232
plantarum nutrimentum	50	populus qualis sit arbor	272

INDEX.

populus quibus letetur locis	272	agrum frumentarium facien-	
populus uincis & agris frumen-		dum	102
tarijs nocet	272	pruni foliorum utilitas	156
porci hyeme nati caules fieri		prunorum usus in sepibus	105
pag.	458	prunus arbor multas habet spe-	
porcinum stercus quale	58	cies	254
porci gregatim non sunt clauden-		prunus indicat terram aptam ui-	
di	457	tibus	144
porrum quo loco seratur	344	pisces quomodo capiuntur	524
porrum quomodo seratur	344	& 525 et 526 & 527 et 528	
porri usus in medicina & cibo		psyllij temperamentum	347
pag.	345	psyllij utilitas in medicina	347
porrum crudum comestum ualet		pulcini morbus equorum	411
contra ebrietatem	346	pulegij complexio	351
porri semen seruat uinum ne fiat		pulegij usus in medicina	352
acetum	194	pulli gallinarum ad cibum opti-	
portulacæ satio quando	350	mi	470
portulacæ species due	350	pulmonis morbus equorum	417
portulaca quàm uim habeat	350	pruna quo pacto fiant sine ossi-	
prædium empturus quid facere		bus	46
debeat	28	pruna cuius temperamenti sint	
prata quomodo primo sint for-		pag.	156
mata	370	pruni resina	156
prata qualem locum desiderent		pruni arboris utilitas	155
pag.	370	prunus quomodo seratur	254
prata ex agro quo pacto fiant		putei dum fodimur est pericu-	
pag.	371	lum	22
prata quâdo debeant rigari	372	puteus quomodo fiat	533
pratorum utilitas	102	puteus in uilla	14
pruna qualis cubus sit	155	ptisana quo pacto fiat	128
pruna syluestria ubi crescunt,		ptisane usus	128
		ptisana	

pitisciaclarum generat sanguinem	128	rapæ sarculandæ sunt	352
pitiscia sanis & infirmis bonum nutrimentum	128	rapis quæ ex eis fieri possint	353
		rapæ temperies	353
		rapa qualis cibus sit	354
		rigandi tempus	84
		rifi satio quâdo & ubi bona	132
		rotis humor plantis necessarius	
		pag.	31
		rotis natura	62
		rosæ ex aceto contra vomitum faciunt	195
		rosaccum oleum qua ratione fiat	
		pag.	275
		rosarum succi usus	274
		rosaria diuersa esse	273
		rosaria quomodo debeant colari	
		pag.	273
		rosarum utilitas	273
		rosaceū mel quo pacto fiat	273
		rosarum decoctio ad quæ utilis sit	276
		rosæ flos interior quem usum habeat	277
		rosarū succus quandiu duret	278
		rosmarinus unde dicatur	277
		rosmarini usus	277
		rouer qualis arbor sit	262
		rouer in quali terra proueniat	
		pag.	375
		turis cultus quid requirat	3
		turis exercitia quo pacto uariet	

I N D E X.

tur	30	salix quomodo, quibusq; locis pla-	
tubi pingues terræ bonitatem		tetur	278
ostendunt	102	salix terræ quando semina com-	
rubula qualem locum desideret		mittenda	82
pag.	357	salvia quomodo seratur	363
rubus quomodo plantetur	278	salviæ complexio	363
tubi temperies	278	salviæ usus in medicina	363
rubus ubi nascitur, indicat solum		salviæ vis in medicina	363
habile vitibus	144	sambucus quomodo plantetur	
rustica res non patitur cessatio-		pag.	280
nem	27	sambuci ligni ad quid utile	280
rute vis adversus Basiliscum	357	sambuci temperamentum	280
ruta fugat serpentes & omnia		sambuci succus	281
venenosa	357	sambuci medulla	38
rute succus adversus scorpiones		sanguis qualis sit planta	281
pag.	357	sanguis draconis utilis ad mor-	
ruta quo mense seratur	356	bum equorum	420
ruta quomodo seratur	356	sapa quomodo fiat	177
rute temperamentum	356	sarculatio quando opus horto sit	
ruta quam vim habet in medici-		pag.	290
na	356	satio quo tēpore fieri debeat	79
S		sativus ager	66
Saccharum violaceum quo-		sativiæ temperamentum	365
modo fiat	367	satyrion hoc est apium sylvestre	
saccharum rosatum quomodo fi-		pag.	359
at	274	satyrion species est testiculus vul-	
salicis ligni usus	279	pis	366
salicis folia & flores quem usum		satyrionis natura	359
in medicina habeant	280	sauina qualis sit frutex	280
salicis incrementum	37	sauina quo loco bene proveniat	
salix unde dicta	278	pag.	380
		sauina	

sauiina natura	280	nerent	82
sauiinae foliorum usus	280	seminum preparatio antequam	
sauiina quo pacto crescat	37	serantur	291
saxifragiae temperies	360	semina quando legenda	292
scabiosae complexio	363	seminum plantarum natura	23
scabiosa quantum in medicina ua-		et 459	
leat	363	semen malum non producit bo-	
scabiem succus lapathi inuat	331	nam plantam	334
scalamenti morbus equorum	420	semina quo loco seruanda	292
scalamenti morbus equorum	412	seminis natura et partes	78
scellonae ubi plantentur	365	semperuiuae herbae temperies	358
scille natura et uis	360	semperuiua quam uim habeat	
scilana uua	138	pag.	358
sclearea quo mense seratur	365	senectutis temperies	364
scordion allium agreste esse	362	sepes ex quibus fiant	105
scordium quam temperiem ha-		serere oportet crescente luna	
beat	362	pag.	290
scordij usum in medicina magnū		serpentes quibus rebus expellan-	
esse	362	tur	451
scortilati morbus equorum	425	serpentaria alio nomine colum-	
scrophae quot foetus nutrizi de-		bina uocatur	364
beat	457	serpentariae usus	364
scrophae fecunditas quomodo in-		serpilli temperamentum	364
telligatur	458	serpilli species	364
scrophae se defendunt	460	serpilli usus in medicina	364
scrophis centum decem uerres		sgvxxv	358
satis esse	459	ficomorus qualis planta sit	281
scrophas quales eligere debe-		silermontani natura	360
mus	457	silermontanum quam habeat na-	
scutij temperamentum	362	turam et uirtutem	360
semina quibus locis citius dege-		siligo amat uallera	73
		siligini	

<i>filigini quæ terra apta sit, quicq̃</i>	133	<i>spelta qualem aërem & terram</i>	133
<i>aër</i>		<i>amet</i>	
<i>filigo maturatur antequam reli-</i>	134	<i>spelta nutrimentū quale quibusq̃</i>	133
<i>quum frumentum</i>		<i>animalibus conveniat</i>	
<i>filiginis natura</i>	134	<i>spelta ad panem apta</i>	133
<i>filiginis usus in medicina</i>	134	<i>spelta quomodo paretur</i>	133
<i>filigo fit ex trunco in solo uligi-</i>	76	<i>spina alba quale habeat lignum</i>	281
<i>noso</i>		<i>pag.</i>	
<i>sinapi quando seratur</i>	361	<i>spine albe temperies</i>	291
<i>sinapi qualem terram desideret</i>	361	<i>spine albe usus in medicina</i>	281
<i>pag.</i>		<i>spine albe lignū cui rei utile</i>	281
<i>sinapi quem usum habeat in mor-</i>	362	<i>spinarum semina quomodo sint</i>	281
<i>bis</i>		<i>preparanda ad sepes facien-</i>	
<i>sifaga una</i>	141	<i>das</i>	106
<i>sifymbrij natura</i>	363	<i>spinachia quando serenda</i>	258
<i>sifymbrium duplex</i>	363	<i>spinachie natura</i>	358
<i>sitim sedant citionia</i>	221	<i>splenis duritiem qua re curetur</i>	
<i>sitim nimium quid iuuet</i>	10	<i>pag.</i>	330
<i>sorba quàm uim habeat</i>	265	<i>spōsa solis quàm uim habeat</i>	359
<i>solatri natura</i>	358	<i>stabula caprarū quam cœli par-</i>	
<i>sorba quomodo seruentur</i>	264	<i>tem spectare debeant</i>	455
<i>sorbi fructus duplex</i>	264	<i>stercus utiat uini saporem</i>	59
<i>sorbi lignum ad quæ utile</i>	265	<i>stercorandi quando sint agri</i>	59
<i>sorbus arbor quo loco letetur</i>	264	<i>stercorandi ratio in mōtibus</i>	72
<i>pag.</i>		<i>stercorationis usus in plantis</i>	53
<i>spallatici morbus equorum</i>	417	<i>sterquilinū debet esse in loco um-</i>	
<i>spina iudæa sepibus aptissima</i>	282	<i>broso</i>	59
<i>materies</i>		<i>sterquilinium in quo loco uille de-</i>	
<i>spina ceruina quem usum præ-</i>	282	<i>beat esse.</i>	20
<i>beat</i>		<i>stramenti loco frondē illigneam</i>	
<i>spelte differentia</i>	133	<i>iubent substernere</i>	27
		<i>strangula</i>	

passa quomodo curentur	193.	uina mellora proueniunt in mona-	
ueneno resistit ruta	357.	nibus	73
uenti orientales quales sint	6.	uinaceæ usus in plantandis uine-	
uentorum mutatio	6	is pag.	149
uentorum cognitio	530	uulicus ad rationem operum re-	
uentorum cognitio	3.	uocandus	28
uentus à meridie	5	uinea nouella quando debeat fo-	
uermis equorum morbus	404.	di pag.	166
uerres quando castrentur	459	uinea quomodo fodi debeat	
uerres quales optimi	457.	pag.	166
uerres se defendunt	460	uinea conferenda quomodo sit	
uertris etas ad implendum suffi-		terra præparanda	145
cicus	458	uinea quomodo plantetur	145
uicia usus	134.	uinea quomodo formentur	162.
uilla quo ponenda loco	11	uinearum renouatio	151.
uilla in quam cæli partem specta-		uinea in quo terre genere opti-	
re debeat	28	mè respondeat	145.
uillæ edificande ratio	14	uinearum uarietas	544
uilla quibus partibus opus habe-		uinearum plantandarum tempus	
at pag.	15	et modus	148
uulici officium	27	uinea ponendi uarij modi	138
uincus eius dem cum salice natu-		uinearum diuersitas	136
ra pag.	283	uinea sine admiculis non sunt	
uinci arboris usus	283	permittendæ, nisi necesse sit	
uindectus qualis arbor	283	pag.	137
uindemia debet fieri decrescen-		uinearum situs	143
te luna	173	uinetæ ubi possunt esse, ager est	
uindemie apparatus	173	optimus	102
uindemie tempus	173	uinetæ delictare	383
uindemiandum quomodo sit		uinetæ quo pacto pulchra fiant	
pag.	174	pag.	383
		uincis	

vineis uitilem terram quomodo co-	102	uinum ne acetum fiat quomodo	194
gnoscere possimus		fiat	
uinea uetusta ubi fuerunt, ager		uinum an aquam habeat quomo-	
non est idoneus ad nouas ui-		do cognoscendum	179
tis ferendas	144	uino aquam habente, quomodo	
uineis pinguis ager & rarus cō-		separantur	179
uenit	68	uinum ad digestionem facit	196
uini uirtus	196	uinum cito mutatur in sanguinē	
uini sapor quomodo mutetur		pag.	197
pag.	196	uinum clarificat sanguinem	197
uinum mutandi ratio de sapore		uinum medetur etiam animæ mor-	
in saporem	121	bis	197
uinum quomodo liberetur à mis-		uinum senibus medicina est	197
sa pag.	191	uinum quale quibus anni tempo-	
uinum quomodo in acetum muta-		ribus conueniat	197
tur	194	uini diuersitas	198
uinum lapides parui albi clarum		uini ueteris natura	198
reddunt	187	uini recentis uis	198
uinum bonum ex quo inuicem ge-		uini uarietas in calore	199
neret	140	uinum ponticum	200
uinum quomodo infundendū sit		uinum odoriferum quale sit	201
in dolia	178	uinum ne ebulliat	180
uinum quomodo odoriferum fiat		uinum quo loco debeat seruari	
pag.	188	pag.	180
uino quibus rationibus color mu-		uinaria cella ad quam coeli par-	
teatur	189	tem spectare debeat	180
uinum quo tempore bonū ex u-		uini transuasio	180
uas fiat	174	uinum qua tempestate debeat de	
uinum quo pacto tingatur	176	uase in uas transferri	180
uinum uersatum quomodo clari-		uinum quando gustari debeat	
ficetur	186	pag.	182

vinum gustaturus utrum ieiunus debet esse	181	uites quando releuande sunt	164
vinum durabile nec ne sit quomo- do cognosci possit	182	uitibus quando letamen affuen- dendum	165
uino que nocumenta accidunt	83	uites ablaqueanda	165
vinum quibus anni temporibus maximè corrumpatur	183	uites aquilo fecundat	143
vinum ne corrumpatur cura	184	uites putando custos relinquen- dus	160
vinum purgari elleboro	185	uitis nouella quomodo primis an- nis formanda	161
uina condiendi rationes	185	uitis quomodo ad arbores produ- cenda	161
uiolet temperies	367	uitia quando ferenda	134
violaceus syrupus	367	uitia quo pacto terram aut impin- guet aut exhauriat	134
violaceum oleum	367	uitis definitio	135
uirgæ pastoris temperies	368	uitis folia magni in medicina uti- sus	135
uirgæ pastoris usus in medicina pag.	368	uitis lachryma calculos frangit pag.	135
uiridaria ex quibus fiant	377	uitis quo pacto prematurū fru- ctum ferat	146
uiridario locus qui sit appositus pag.	377	uitis insitio quo tēpore anni	156
uiridario que herbe conueniant pag.	378	uitis quando putanda	157
uiridaria mediocritas	379	uitis folia capitis dolori medem- tur	135
uiridaria regum	379	uitis cortex sanguinem sistit	136
uites quibus rebus feraces fiant pag.	42	uitis folia arida sanguinem fluen- tem sistunt	136
uites quo pacto inferantur	153	uitis corticis cinis pilos restan- tat	136
uitis quomodo in arbores infera- tur	155	uitis magnū habet medullam	38
uites Bononiæ quod gemis una possim inferant	139	uitis	
uites quo tempore ligande	164		

nitris plantae taleoli uocatae quan-	nitium cinis mutat colorem. uini
do colligendae 146	pag. 189
nitris foecunda debent esse plan-	nitium ponens quae obseruare de
tae 147	beat 149
nitium fertilem quae declarant	nitium propagationes quomodo
pag. 147	fiat 151
nitris fertilitas uno anno explora	nitibus quae nocumenta accidunt
ri non potest 147	pag. 166
nitris plantae quomodo seruande	nitris luxuriando pereunt 168
pag. 148	nitiferae arbores quando putan-
nitris rare est substantiae 57	de 157
nitris genera multa 137	nitris putandi ratio 157
nitris uetus meliores producit u-	nitriolum quam temperiem ha-
uas quam noua 51	beat 369
nitibus conueniens aer 143	nitrum ex cinere sagi fit 271
nitibus ponendis scrobes quo pa-	ulmi usus 282
cto fiant 145	ulmus quomodo plantetur 282
nitium uaria genera plantanda	ulmus siccata rigescunt 26
pag. 149	ulmus arbor infusione recipit ui-
nitium genera apud Britanni	tem 155
pag. 139	ulmorum usus in sepibus 105
nitium uarietas in foecunditate et	ungula cadentis cura 434
tolerantia tempestatum 137	ungulas si humor infestauerit
nitium genera quo pacto eligen-	quomodo curentur 433
da 143	uolubilis quam uim habeat 368
nitibus apta terra quae sit 144	uomitui cholericici cura 236
nitibus quod lapidum genus pro-	uue mature signum 173
fit 144	uue quomodo debeant calcari
nitibus utilem terram quibus ar-	pag. 175
gumentis cognoscere possu-	uue quomodo seruande 169
mus 144	uua passa graeca quo pacto fiat
	e 3 pag.

I N D E X

pag.	170	urtice natura	369
urae pae mults modis fieri		Z	
pag.	170		
ura alba qualis	171	Z Aniprus quale cœlum so-	
ura nigra natura	171	lumq; amet	265
urarum varie species	138 & 140	Zaniprus quomodo seratur	266
		Zanpri due species	265
urarum varie nomina	139	Zanpri fructus	266
urarum multiplex usus	176	Zanpri lignum	266
vulnerum putrefactorum medi-		zezula quando colligantur	265
cina	296	zezula qualis cibus sit	265
vularum morbus e quorū	407	zezulus quo loco gaudeat	265
urfi quomodo capiantur	511		
urtice vis in medicina	369	P I N I S.	





A V T O R I S

A D L E C T O R E M P R A E .

F A T I O .



V M ex uirtute prudētie, quæ inter bonum
 & malum caute discernit, humanus informetur
 animus, ad utilis & delectabilis cogniti-
 onem: & in terrenis rebus pacificus & tran-
 quillus status imprimis utilis, dulcis & dele-
 ctabilis reperiatur: merito hic totis uiribus
 querendus est, & inuentus tanquam thesaurus inextimabilis cum
 multa humilitate & patientia conseruandus: per eum nanq; facile
 benigna dei dilectio prouocatur, uita hominis illa salute seruatur,
 & rerum abundans copia utiliter procuratur. Hunc tamen im-
 piij uiri non querunt, & inuentum superbia seu alio detestabili
 uitio cæcati lacerant: quare licet eorum fortuna prospera sepe
 uideatur ad tempus, perit tandē, nec dimidiat dies suos. Viri autem
 pacifici & humiles, licet quandoq; lesi fuerint, tamen uiuunt, & apud
 deum & homines gratiam inuenientes tandem impiorum hæ-
 reditant terram. Ego itaq; Petrus ex Crescentia natus ciuis Bononæ
 niensis, qui tempus adolescentiæ in logica, medicina, & scientia na-
 turali totum consumpsi, & demum nobili legum scientiæ insudauī,
 pacifici status anxius post flendum schisma illius egregiæ urbis, quæ
 uero & sibi proprio nomine Bononia, id est, bona per omnia,
 in omnibus mundi finibus dicebat r. cognoui quod mutata unitate,
 ac statu pacifico, in dissensionem odium & luorem, non erat iustū
 ipsius peruersæ diuisionis immisceri negocijs. Idcoq; annis tr. ginta
 diuersas per prouincias cum earum rectoribus circūui, subiectis li-
 benter iusticiam tribuens, rectoribus fidele consiliū, & ciuitates
 in suo iure ac statu pacifice pro posse conseruans, multosq; libros

A antiquorum

antiquorum & nonorum prudentiam perlegi, & diuersas ac uariâs operationes colentium rura uidi. Denum ciuitate diuina gratia quodammodo reformatâ, radio late circuitiōis & lesc libertatis affectus ad propria redij, ac cernens, quod omnî rerum ex quibus aliquid acgritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homini libero dignius: ut ait Tullius. Et cognoscēs, qđ in cultu ruris status facile inuenitur trāquillus, excitatur de ignauia, & proximorum lesio euitatur, amplius, quod cultu ruris exquisitaq; doctrina perquam facilius & abundantius utilitas percipiatur, & delectatio procuratur, quomā si negligenter & sine certa industria singula consueto more colantur, uiris bonis (qui de suarum possessionum redditibus sine cuiuscunq; lesione iuste uiuere uelint) merito appetenda est, ad cultum ruris mentem animiq; conuerti. Et implorato dei omnipotentis auxilio, altus & cōmoda eius & cuiuslibet generis agrorum & plantarum atq; animalium doctrinā obscure & imperfecte ab antiquis traditam & modernis satis incognitam, de sola Christi liberalitate confisus, dilucide tam secundum prudētium naturalis philosophiæ sententias ac rationes apertas, quā ex approbatis experientijs tradere in scriptis proposui. Opusculum hoc porro duodecim continet libros. Primus quidem est de locis habitabilibus eligendis, & de curijs, domibus, et his qui habitationi sunt necessaria faciendis. Secundus de natura plantarum & rerum cōmunium cultui cuiuslibet generis agrorum. Tertius de campestribus agris. Quartus de uineis & uino. Quintus de arboribus. Sextus de hortis. Septimus de pratis & nemoribus. Octauus de uiridarijs & rebus delectabilibus ex arboribus, herbis, & fructu ipsarum artificiose agendis. Nonus de omnibus animalibus quæ nutriuntur in uillis. Decimus de diuersis modis artibusq; capiendi animalia fera. Undecimus de regulis operationum ruris. In duodecimo compendiosa fit commemoratio de his omnibus quæ singulis mensibus in rure sunt agenda.

De cognitione

De cognitione bonitatis loci habitabilis
quidē empturo agrum primo spe
ctandum sit, Cap. I.



QVONIAM cultus ruris, propter continuos eius labores, præcipue fortitudinem habitantium requirit, idcirco conueniens mihi uisum est in hoc primo libro doctrinam tradere de his quæ ad cognitionem salutis locorum habitabilium spectant, & de quibusdam habitationi necessarijs. Nam corpora hominum quibuscunque commodis pecuniarijs debent præferri. Dicam itaq; in primis de cognitione bonitatis loci habitabilis in communi, quæ quidem attenditur circa quinque, uidelicet penes aeris puritatem, uentorum impetuositatem, aquæ salubritatem, situs qualitatem, & terræ fecunditatem, quorum quatuor in hoc primo libro tractantur, quintum uero traditur in secundo, quæ omnia diligenter consideranda sunt antequam in emptionem prædiorum & fabricam domorum pecunia collata, ne lox postmodum cum personarum detrimento aut rei familiaris damno, poenitentia non sperata sequatur.

De aëre & cognitione bonitatis & malitiz eius, Cap. II.



AER medicis & philosophis testibus, est unum ex elementis generatorum, cuius naturalis locus est circumdans aquam, & ab elemento ignis circumdatus, & est eius natura calida & humida, si nulla extrinseca causa eam conuerterit, cuius quidem esse in generatis inuat, ut aluescentur & rarificentur & ad superiora eleuentur. Circa cognitionem bonitatis aeris animaduertendum est, ne sit putrefactus, & nimis calidus, nō distemperate humidus, nec etiam nimis ficus. Nam

A 1 aer putrefa

aër putrefactus putrefacit humores, & incipit humorē putrefacen-
 te qui cor di circumdatus est, quoniā ad ipsum propinquius accedit,
 & aër fortiter calefactus iuncturas laxat, & humores resoluit, &
 insus augmentū præstat, & resoluit spiritū, & deiecit virtutes, &
 prohibet digestionē, propterea quod calorē innatū resoluit, qui est
 instrumentū naturale, & calorē citrinū efficit, propter quod humo-
 res resoluit sanguineos colorē rubificātes, et quia facit cholera alios
 superare humores, & cor calefacit calore extraneo, & facit humo-
 res fluere, & ipsos putrefacit, & desert eos ad cōcuntates, & mē-
 bra debilia, & corporibus sanis nō est bonus, cōfert tamen hydropi-
 cis & paralyticis, & sp̄ismo humido. Aër nero frigidus calorē in-
 natū ad interiora redire facit, & facit catarrhū, & debilitat ner-
 uos, & trachēā arteriā magnolēdū impedimēto, et digestionē effi-
 cit fortē, & omnes occultas operationes efficit fortiores, et exiccat
 appetitū, & ad ultimū, sanis cōuenientior est quā aër multæ calidi-
 tatis. Aër nero humidus plurū cōplexioni est bonus, & colorē effi-
 cit bonū & cutē, & reddit eā mollē, & poros dimittit apertos, sed
 ad putrefactionē preparat. Et siccus quidē existit huic contrarius.
 Predictis itaq; diligēter cōsideratis, cōstat aëris temperatā mediocri-
 tate & claritatē quantū possibile est requirendā esse. Aër namq;
 si bonus est tēperatus & clarus, nec substātia extranea tēperamēto
 sp̄itus cōtraria ei admiscetur, est salutē efficiens habitātium, & cō-
 seruās, & plantæ (ut ait Albertus) ab eo proportionabiliter cōuale-
 scunt, & fructificāt. Si nero malus est, & ei misceantur vapores la-
 cum & stagnorū gbus turbatur, cōtrarium operatur et tristificat
 animā & cōmiscet humores, & plantas corrūpit, & ideo uetū uenē-
 tes, & pruinæ mortificātes ledunt & destrūūt plātas, & in summa
 secundū Auicē. Omnis aër qui cito infrigidatur, cum sol occidit, et
 cito calefit, cum ipse oritur, est subtilis: qui nero huic est contrarius,
 existit ecōtrario, deinde deterior est omnibus ille aër qui cor con-
 stringit, & aëris angustat attractionē, præter hæc uero dicit Palla-
 dius,

dius, quod aeris salubritatē declarāt loca ab infimis uallibus libera, & nebularū noctibus absoluta, & habitātium corpora cōsiderata, si enim eis color sanus inest, capitis firma synceritas, inoffensum lumen oculorum, purus auditus, si fauces liquidae uocis com meatum exercent: his signis benignitas aeris comprobatur, contraria uero noxium illius cœli spiritum confitentur.

De uentis & bonitatis & malitiæ ipsorum
cognitione, Cap. III.



Ermo de uentis, & de eo quod uentorū causa generatur, duobus existit modis, scilicet uniuersalis & absolutus, & sermo secundū illū qui unicuique ciuitati proprius existit. Vniuersalis uero sermo est, quod meridionalis secundū sitū plurimū ciuitatū & locorū calidus est & humidus, scilicet calidus propterea quod à parte solis uenit, & humidus propter mare meridionale, quod pertranseunt: quare operatur in eo sol fortiter, et euaporāt ex eo uapores qui uentis admiscētur. Et ideo uēti meridionales debilitāt & laxāt uires, & aperiunt poros, & turbāt humores, & mouent eos ab interioribus ad exteriora, & in senibus efficiunt grauitatē, & exituras corrūpunt, & reciduationes ægritudinū efficiunt: febres putridas efficiunt & debilitāt, & mouent epilepsiā, & afferunt somnū, sed nō exasperāt guttur. Septentrionales uero uenti sunt frigidi, eo quod trāseunt super montes & terras frigidas multarū niuū: & sunt sicci, propter quod eis nō multi associātur uapores, quoniā resolutio à parte septētrionis fit minus, & trāseunt uapores secundū plurimū super aquas cōgelatas, aut super deserta, quare uentus iste corroborat & indurat, & quæ maxime fecerunt prohibet, & claudit poros, & digestiua uirtutē fortē efficit, & cōstringit uentrē & indurat, & promoucat urinā, & aerē putridū & pestilentialē sanat. Cum uero meridionalis septētrionalē præcedit, & sequitur cum septentrionalis, accidit à meridionali fluxus, & à septentrionali expressio, ideōq; multiplicātur tunc fluxus

ius materierū et capitis pectorisq; aegritudines. Et orientales quidem inter caliditatē et frigiditatē sunt tēperati. Sed sunt occidentalibus sicciores. Septentrionales quidē orientis minus habent maria quā septentrionales occidentis. Venti orientales si in postremo noctis et in principio diei flauerint, uenient ab aëre quā iam tēperatus est, propter solē et subtiliatus ab eo: et eius humiditas iam fuit imminuta: ideoq; sunt sicciores et subtiliores, quod si in fine diei et principio noctis flauerint, erit res cōtraria. Orientales tamen occidentalibus uniuersaliter semp existunt meliores. occidentales uero parum plus sunt humidi quā orientales, quoniā super maria trāsunt: quod si flauerint in fine noctis et in principio diei, uenient ab aëre in quo sol operatus nō fuit, spissiores igitur et grossiores erunt, quod si in fine diei, et principio noctis flauerint, erit res cōtraria. Prædictorū autē uentorū iudicia propter alias res quādoq; mutātur, est enim in quibusdā ciuitatibus et locis cōueniens, ut uenti meridionales sint frigidiores cum eis dē fuerint mōtes nivosi à parte meridiei, et cōuerserint se uenti meridionales ad frigiditatem, eo quod super eos trās eant, et est cum septentrionales meridionalibus calidiores existūt, cum circa deserta fuerint aduēta.

De aqua, quæ animalibus cōuenit, & cognitiōe bonitatis uel malitiæ eius, Cap. IIII.



Qua est alterū ex elementis generatorū, et eius quidē locus naturalis est, ut sit circumdās terrā, et circumdata ab aëre cum in suis sitibus naturalibus permāserit, quæ frigida est et humida, si nulla causa extrinseca ei cōtraria fuerit. Et ipsa quidē in generatis inuamentū præstat ad figurādas formas, humidū enim licet ad formas figuratas cito amittat, cito tamen eas recipit, sicut siccū terrestrē, licet difficulter eas recipiat, duriter tamen retinet eas. Cūq; humidū aquū et siccū terrū ad se inuicē tēperauerint adipsce: ut siccū ab humido ut cito suscipiat et facile figuram: et hu-
midū

midum aquæ acquireret à sicco ut retineat fortiter, quod in eo accidit ex ratificatione & equatione & figurationibus, & propter humidum prohibetur siccum à sua separatione, et propter siccum prohibetur humidum à sua fluxibilitate. Duplex est aquæ consideratio in hac scientia, alia enim aqua conuenit incolis, alia uero plantis. Et primo quidem de ea quæ hominibus est salubris sermonem faciam utile. Aquæ igitur secundum medicos quæ sunt alijs meliores sunt aquæ fontium terræ liberæ, in quibus nulla dispositionum et qualitatum extranearum superat, aut aquæ quæ sunt petrosæ quæ sunt digniores, ne terrestri putrefactione putrescât, illa tamē aqua quæ est terræ liberæ melior est petrosæ, dum tamen sit currens & soli & uentis discoopta: ex his enim nobilitatem acquirit, neque omnis discurrens, sed illa quæ super lutum liberum non factidum nec lacuosum incedit, nam hæc melior est ea quæ supra petras fluit, lutum enim mudat aquam ac extrahit & aufert ab ea res extraneas sibi admixtas, & colat ipsam: sed lapides non faciunt illud quod si hæc aqua fuerit multa & forti currens motu, quæ propter sui multitudinem illud quod ei admiscetur in suam conuertit naturam, & quæ suo cursu ad orientem tendit, erit melior alijs aquis, & quanto magis à suo multum elongabitur principio, & post hanc quæ ad septentrionem uadit. Illa namque quæ ad occidentem tendit & meridicam est mala, & proprie cum meridionales sufflauerint uenti, & illa quidem quæ à locis descendit altis cum alijs bonitatibus est melior, & talis est ferè semper dulcis: & est in potere leuis & cito infrigidatur & cito calefit, propterea quod est resoluta, frigida in hyeme & calida in æstate: in qua nullo modo sapor aliquis superat, nec ullus odor, & quod in ea coquitur, cito coquitur, & cito dissoluitur. Debes autem scire, quod pondus est ex experimentis ad uariantibus ad cognoscendum aquæ dispositionem: aqua enim quæ est leuior in plurimis dispositione est melior. Pondus autem per mensuram cognoscitur, cognoscitur etiā si in duabus aquis diuersis duo panni unius ponderis madefiunt, & postea

postea uehementer siccentur, deinde ponderentur: nam aqua cuius pondus fuerit leuior, est melior. Sublimatio quidem & distillatio aquas rectificant malas, & similiter decoctio: aqua enim cocta (ut testantur sapientes) minoris est inflationis & uelocioris descensionis, nā decoctio substantia acquirit subtilitatē, & ideo clarificatur de super, & grossum terrestre descendit ad munus, nam commixtiones terrestres leuiter à substantia subtili descendunt: sed à spisso & uiscoso non facile descendunt. Ex aquis quoque laudabilibus sunt aquae pluuiae, & praecipue illae quae cum tonitruis in aestate descendunt, sed tamen aquae pluuiali cito aduenit putrefactio, licet sit aqua melior: propterea quod est ualde subtilis, & sit eius putredo causa computrescendi humores, & impedit peccus & uocem, nā omnis subtilis substantia promptius recipit passionem. Si aqua pluuialis plus ebullierit eius putrefactionis receptio minuetur. Accitosa quoque cum comeduntur putrefactioni opponuntur, & ab impedimento eius securitatem faciunt. Aquae uero puteorum & aquae ductuum sunt male, cōparatione aquarum fontium. Sunt enim aquae constrictae terrestritates longo recipientes tempore. Ex eis tamen illae deteriores sunt quibus ex plumbo uia factae fuerint, quoniam ex eius uirtute aliquid adsumunt, unde frequenter ad dysenteriam inducunt. Aqua autem paludis deterior est aqua putei, quia manatio aquae putei acuitur, propter illud quod de ipsa extrahitur, unde perdat eius motus & non multum moratur in constrictione, nec manet in locis unde manat longo tempore. Aqua uero paludis, propterea quod longo tempore moratur in foraminibus terre putrefacientis, & eius motus in manando & egrediendo est tardus, & non est nisi in terra corrupta & putrida, mala est. Aquae uero lacuales, stantes, praecipue dīscopae male sunt & graues, quia in hyeme non infrigidantur nisi per nives: ideoque generant phlegma. Et quia calefiunt, in aestate propter solem, & putrefactionem generant cholera. Et propter spissitudinem quidem ipsarum & commixtio-

nem terrestrium cum eis. & propter resolutionem subtilis earum, generantur in eis qui eas bibunt splenis mali affectus, & interiora ipsorum ingrossantur, & eorum extrema macrescunt, & humeri & colla, & comedendi desiderium in eis superat sitis, & constriunguntur eorum uentres, & difficile uerere possunt. & quandoque perueniunt ad hydropisim, propterea quod aquositas in eis retinetur, & quandoque ad postemata pulmonis & splenis & ad dysenteriam, & ipsorum epar debile redditur, & in eis multa alie egritudines generantur, & mulieres raro impregnantur, & cum difficultate pariunt, & pariunt pueros apostemosos, & frequenter fit in eis mola & impregnatio mendosa, & eorum pueri saepe patiuntur varices & crurum insanabilia ulcera, & quartanis abundant, & multas alias egritudines patiuntur, & in senibus febres fiunt adurentes, propter siccitatem naturarum ipsarum. Aquae praeterea quibus admiscetur metallica qualitas, aut eius simile, & aquae sanguifugales omnes male sunt uniuersaliter, licet in quibusdam egritudinibus afferant iuuamentum: aqua enim in qua superat uirtus ferri, iuuamentum praestat in hoc ut interioribus fortitudo tribuatur, & ut dysenteria prohibeatur, & ut uirtutes desideratiue omnes procedant. Aquae niuosa & glaciales sunt grossae: nix uero & aqua glacialis cum munda fuerit, non commixta alteri rei uirtutem habenti malam, siue soluatur & fiat ex ea aqua, siue mittatur ipsa in aqua erit bona, nocet tamen dolores habentibus nervorum: sed cum conuenitur ad bonitatem redit. Quod si aqua glacialis ex aquis malis fuerit, aut nix uirtutem contrahens malam & extraneam à locis in quibus ceciderit, erit mala. Aqua praeterea temperate frigida sanis melior est aquis omnibus, licet nervos impediatur, & apostemata in interioribus habentibus ledat: ipsa enim appetitum excitat, & stomachum fortem efficit. Aqua enim calida digestionem corrumpit, & facit natare cibum in stomacho, & ad hydropisim adducit & helicam & consumit corpus. Aqua calefacta epida efficit nauseam,

Et cum fuerit calidior quam haec, & in ieiunio bibita multoties, stomachum lauat, & ventrem soluet, eam tamen frequenter bibere est malum, quia stomachi virtutem debilitat. Illa uero quae multum est calida, colicam resoluit & splenis ventositates frangit. Aqua uero salsa marescere facit & exoccat, & primo mouet ventrem propter uim radenda quae in ea existit, postea stringit cum in fine propter siccitatem naturae eius, et corrumpit sanguinem, ideoque pruritum generat. Aqua uero turbida lapidem generat et opilationes, ideo post ipsam res comedenda est provocatina, licet solum uentrem habenti plerumque conferat ipsa, et omnes aquae grossae et graues, propterea quod in uentre morantur nec cito descendant. Eius uero iberiacae existunt res unctuosae & dulces. Aqua uero aluminosa mulierum superfluitatem currere non permittunt, neque spuerre sanguinem, & prohibent illud quod de haemorrhoidibus egreditur, sed corpora quae febribus sunt apta fortiter ad eas perducunt, & ferè quidem splenem resolunt, & non coire ualentes adiuant. Acræ uero corruptioni complexionis utiles existunt. Emendatur autem aqua si uehementer coletur, & coquere quidem aquam eam, quandoque colat, ut dictum est, & inter puræ aquae substantiam & id quod ei admiscetur separationem facit, et maius hoc toto est ipsam sublimando stillare. Aquam uero cum uino bibere utile est, ex eo quod eius remouet maliciam, cum ipsius malicia fuerit ex genere paucae penetrationis. Aqua etiam cum pauca fuerit & non inuenitur temperata cum aceto erit bibenda, & proprie in aestate, quoniam hoc à multo excusat potu. Aqua propterea salsa cum aceto bibenda est, & syrupo acetoso, in quam siliqua & mirthi grana sunt proficienda, & sorbe, & post aluminosam quidem aquam & potiticam bibendum est totum id quod naturam soluit, uinum quoque est ex eo quod post ipsum potatum confert. Super amaram quoque exhibenda sunt dulcia & unctiosa. Ante aquam stantem & palustrem, in qua existit putrefactio, non sunt gustanda nutrientia calida.

Et, super quam stiptica sunt exhibenda ex fructibus frigidis, sicut titonia, & mariana, & cotula. Super aquas quoque grossas & turbidas utendum est allio: & ex eo etiam quod eas clarificat est alumen, & ex eis quoque quae diuersarum aquarum remouent malitiam sunt cepae, quoniam sunt ut theriaca, & proprie cepe cum aceto & alio etiam: & ex frigidis rebus sunt lactuce. Solet autem quandoque (ut Palladius ait) occultiore noxam teclior inferre aquarum natura, quae praefatis rationibus discerni non potest. Ideoque ipsas ex incolarum salubritate noscimus, si fauces bibentium pure sint, si sanum caput, si in pulmonibus aut thorace, aut raris, aut nulla est causatio, si uenter, aut uiscera, aut latera siue renes nullo dolore, aut inflatione uexantur, si uicia nulla uescice sint. Haec & similia si apud incolas pro maiori parte constare uidebis, nec de aere aliquid nec de fontibus sufficeris.

De situ loci habitabilis, & de cognitione bonitatis & malitiae eius, Caput v.



Habitationum seu terrarum situs duplex consideratio est, una quidem ratione salutis habitatorum, altera ratione fecunditatis agrorum, et primo de primi situs natura dicetur. Sciendum est itaque, ut ait Auicenna, quod locorum habitabilium dispositiones in corporibus diuersificantur causa altitudinum et profunditatum in ipsis, et causa dispositionis ipsius terrae, si est lutosae, aut humefactae, aut cretosa, aut si est in ea uirtus minere, & dispositio multitudinis aquarum, aut paucitatis earum, et dispositio eorum quae in eis uicinantur, sicut arborum, et uinearum, aut fouearum, aut cadauerum, aut horum similiarum, et ex montium et marium uicinitate. Loca habitabilia calida nigrescunt capillos et increscant, et cum in eis maxima fuerit resolutio,

et minuetur humiditas aduenietq; senium cito sicut in terra nigro-
rum, illis namque qui ibi morantur aduenit senium in annis triginta
et eorum corda sunt timida, propterea quod spiritus multum resolu-
niture. In locis habitabilibus frigidis sunt corda audacie maioris, et
melius digerentes: que si fuerint humida, erunt ibi morantes grossi
et carnosissimi, et multa abundantes adipe: quorum uene erunt profun-
de et occulte, et ipsi erunt teneri et albi. In locis habitabilibus hu-
midis morantes pulchrarum sunt facierum, quorum cutes sunt lenes,
& cum exercitantur cito aduenit lassitudo, & eorum aestas non
multum calefit, nec hyems ualde infrigidatur, & eis aduenient se-
bres multe in ore & uentre, & sanguinis multus exitus ex men-
struis & hemorrhoidibus, et multiplicatur epilepsia. In locis ha-
bitabilibus siccis morantium exsiccantur complexionibus, et ipsorum
obsuscantur cutes et exsiccantur, et eorum cerebris cito aduenit sic-
citas, et eorum aestas est ualde calida, et hyems multum frigida.
In locis habitabilibus altis morantes sunt sani et fortes, laboris nul-
tum patientes, et uiuunt diu. In locis habitabilibus profundis mor-
antes, in uaporositate multa existunt et epalis debilitate, et aquis
abundant non frigidis, et proprie si fuerint stantes, ut aque lacuum
aut stagnorum, et eorum aer est malus. De locis habitabilibus petra-
sis et discoopertis, bonum aerem in aestate sunt ualde calidi, et in hy-
eme multum frigidi, et eorum corpora sunt dura, solida, et multo-
rum capillorum, fortia, et iunctura manifeste, et uincit in eis sicci-
tas, et sunt multum uigilantes, et sunt malorum morum, inobedi-
tes, et est in eis bellorum fortitudo, et solertia in artibus et acuitas.
In locis montuosis niuosis morantium, iudicium est sicut iudicium
aliarum terrarum frigidarum, et eorum terre uentose, et dum nix
moratur generantur in eis boni uenti, sed cum nix resoluitur, si
montes habeant qui uentos prohibeant, fiunt uaporosa. In locis
habitabilibus marinis temperatur caliditas et frigiditas, propter
sue humiditatis ad passionem inobedientiam. Habitantium in locis

Septentrionalibus, iudicium est sicut iudicium ciuitatum & temporum frigidorum, in quibus multiplicantur constringendi & comprimendi ægitudines, & multiplicantur in eis humores in occulto corporis congregati, & solet in eis esse digestiua bonitas, & uitæ longitudo. In corporibus propterea eorum ulcera sanantur, propter eorum fortitudinem, & sanguinis eorum bonitatem, & propterea quod exterius non est causa quæ ea laxat, aut quæ ea detegat, sed propter multam caliditatem cordium eorum, sunt in eis mores lupini. Habitantium in locis meridionalibus iudicia sunt iudicia terrarum & temporum calidorum, plurimum autem aquarum quæ sunt in eis est salsum & sulphureum, & capita morantium in ipsis sunt plena humidis materijs, quoniam meridies hoc operatur. Et eorum uentres sunt soluti, propter illud quod ab eorum capitibus ad stomachos descendit, membra quoque eorum sunt lassa & debilia, & sensus ipsorum graues, & desideria etiam comedendi & bibendi debilia, & quolibet uino grauiatur, & propterea quod capita eorum & stomachi debilia existunt, ulcera quoque eorum duriter sanantur & molliciantur, mulieribus quoque accidit mul-tus sanguinis menstrui exitus, nec constringitur nisi cum magna difficultate, & frequenter abortiunt, propter multitudinem ægitudinum earum, uiris quoque accidit à uentre sanguinis exitus & hæ-morrhoides, & ophtalmia humida, quæ cito sanantur. senibus uero in prima senectute cum transeunt quinquaginta annos, accidit paralisis propter eorum catarrhos, & accidit frequenter eis, propterea quod sunt eorum capita plena, asma & epilepsia, & accidunt eis febres, in quibus caliditas & frigiditas coniunguntur, & febres lōgæ hyemales & nocturnæ. Acute uero febres parui accidunt eis, propterea quod eorum uentres multum resoluuntur, & dissoluitur subtile quod est in ipsorum humoribus. De locis habitabilibus orientalibus: ciuitas quæ est ab oriente aperta, & in oppositione posita, est sana & boni aëris, sol enim in principio diei super

eam cōtuetur, & aërem eius clarificat, postea recedit ab ea, aërem
 iam clarificato, & exsufflanti super eam uenti subtile quos permittit
 eis sol, deinde ipsemet eos sequitur, & conueniunt eorum motus.
 De locis habitabilibus occidentalibus in ciuitate quæ ab occi-
 dente est discooperta, & est ab oriente cooperta non uenit ad eam
 sol nisi tarde, & illico cum uenit ad ipsam incipit elongari ab ea,
 quia non ei appropinquando incedit, non ergo eius subleuat aërem
 nec caueat, sed dimittit ipsum humidum, grossum, & si uentos ei
 mittit, mittit eos ab occidente & in nocte, iudicia ergo ipsarum sunt
 iudicia ciuitatum humidarum complexionum, caliditatem habentium
 temperatam, grossam, & nisi esset propter illud quod exsuffla-
 titudine prouenit aëris earum natura ueris natura similis existeret,
 sanitas uero in eis minus existit quam in terris orientalibus, cum
 diminutione multa. Quare qui loca eligit habitabilia cognoscere
 debet terræ ciuitatis, uel loci alterius habitandi, & quomodo eius
 existit dispositio secundum altitudinem & profunditatem, & dis-
 cooperturam, aut cooperturam & eius aquam & substantiam a
 quæ ipsius, & quomodo existit secundum sui propagationem eius
 & discooperturam, aut secundum sui occultationem & ipsius pro-
 funditatem, & si sit uentis exposita, aut in terra profunda, & de-
 bet cognoscere uentos ibi flantes, si sint sani frigidi, & quid ei sit ui-
 cum ex maribus, & pelagis, & motibus & mineris. Et debet scire
 qualis sit terra secundum sanitatem & aegritudinem, & quæ aegritu-
 dines illic commorantibus cūnere solent, & debet cognoscere illic
 commorantium fortitudines, & eorum desideria & digestiuam, et
 nutrimentorum eorum bonitatem. Et quomodo eius existit structu-
 ra, & si sit ampla & spaciōsa, aut sit introitus angustus, post hoc op-
 portet ut fenestræ & portæ sint orientales & septentrionales, singu-
 illud unde magis sollicitari debet, ut uenti orientales structuras ingre-
 di ualeant, & ut sol ad unūquēq; locū intrare queat qui ibi existit,
 quoniam ipse est qui aërem rectificat, uicinitas quoque aquarū dulcium

populorum

nobilium currentium multarum & mundarum, & que in hyeme ca-
 lescent & aestate infrigidantur & diuerse ab eis que occultantur, est
 res conueniens & adiutorium præbens. De situ uillæ id est domus,
 tam ratione habitatorum quam fructuum scribit egregie Varro. Vil-
 lam ædificandam potissimum intra septa uillæ habeat aquam si non
 quâproxime, quæ ibi sit nata uel perennis influatur: Si uero aqua nō
 est uiua, cisternæ faciendæ sub telluris, & lacus sub diuino ex altero lo-
 co, ut homines ex altero ut pecus uti possint. Dandæ operæ ut potissimū
 sub radice montis syluestris uilla ponatur, ubi pastiones sunt latæ, aut
 ubi uenti saluberrimi flabunt, quæ posita est ad exortus ægnotiæ
 les apertissima, quod æstate habet umbram, hyeme solcm. Si cogas
 ris prope flumen ædificare, curandum est ne aduersus eum ponas,
 hyeme enim fit uehementer frigida, & aestate non salubris. Ania
 maduertendum est si iuxta erunt loca palustria, & propter easdē
 causas, & quia cum arescant crescunt animalia quædam minuta, quæ
 non possunt oculi consequi, & per aëra intus in corpus per os &
 nares perueniunt, & efficiunt difficiles morbos. Item Scrophæ, uie-
 tandum est inquit ne in eam partem spectet uilla ex qua uentus gra-
 uior afflare solet, ne in conualle caua, sed potius in sublimi loco ædi-
 fices, eo quod cum perflatur, si quod est ibi aduersarium facilius dis-
 scutitur. Propterea locus qui à sole tota die illustratur salubrior est,
 quia & bestiole si quæ prope nascuntur & inferuntur aut flatu aut
 aritudine cito pereunt. Nimbi repentini ac torrentis fluminis periculo
 sunt si illis qui in humilibus ac cauis locis ædificia habent. Ob hoc &
 propter prædonum manus superiora loca tutiora. In uilla faciendâ
 stabula bubula quæ in hyeme possint esse calidiora. Item cellas in lo-
 co plano ubi uasa uinaria & olearia esse possint. Item ubi condantur
 fructus aridi, ut granum & scennū in tabulatis. Item ubi uersetur fa-
 milia prouidendum, ut fessi opere aut frigore aut calore possint cō-
 modissime se in quietem recipere. Villæ prope ianuam cellam esse
 oportet, cumque scire quis introeat aut exeat noctu, quid ne ferant,
 præsertim.

preferim si hostiarius est nemo. Cato scribit, villam urbanam pro copia edificato in bono prædio: si bene edificaueris, libentius et sepius uenies, fundus melior erit et fructus plus capies, si te uicinitas libenter uidebit, opa facilius locabis, oparios facilius cōduces.

Decurijs siue tumbis in diuersis locis diuer-

simode faciendis Cap. VI



Villæ siue tumbæ faciendæ in rure occasione habitationis domum et rusticorum et ad eam fructuum portandorum, et an malum nutriendorum, quadruplex est consideratio: aut enim locus ubi curiam facere cōstitimus situs est inter alias domos uillæ, aut est ab eisdem remotus: iterum aut in plano aut in montibus, rursus aut est in loco tuto, aut periculoso positus si quidem inter alias domos uillæ situs est, curia nō tanta eget fortitudine et munitione clausuræ quam in insidijs expositus locus talis: et quia proximum habet uicinorum auxilium, si fuerit necessitas quepiā. Si uero est ab alijs domibus in loco solitario segregatus, conuenientibus foueis, ripis et sepibus undique cingendus est propter oppositas rationes. Quod si est in plano, si quidem nimis depresso per totam curiam terra cumulata est ac liunde, et pluuie in eam cadentes inde possint facile derivari. Si uero in montibus fuerit, ubi mons foueis aquis muniri non potest, et ligatur locus cui nisi per ordinatam introitum sit esset accessus, ut quæ fossarum circuitu muniri non potest, severitate rupis et altitudine munatur. Si autem locus est ab impietate inimicorum tutus, tunc si sufficit si talibus solimodo ualletur munitionibus quibus a furibus, qui etiam plerumque pacis insidiantur tempore, securus existat. Et cum in parte periculosa fuerit, si quidem ualde potentibus inimicis expositus, tutus erit locus in desertum ad tempus relinquere, quàm incaute si et sua mortuicili aut naturali exponere, nisi forte patre nesciantibus ad fabricam innoxiam et ignobilis castris uel arcis, diuitiarum more at multitudine. Si uero berenarij aut debiles inimici partes illas quandoque

deq; intrent & spolient, curia muris aut congruo palangato cingatur. Ad quæ si domini facultas non sufficit, in uno angulo curiæ fiat riparum ac foveæ munitio fortis, & super eam ad ficitur turris, in qua cum rebus suis se paterfamilias cum colonis tempore opportuno recipere possit. Præmissis itaq; iam dictis, considerationibus eligendus est locus curiæ in magis idonea parte agrorum, cuius magnitudo talis esse debebit, quæ proportionabiliter colendarum terrarum mensuræ respondeat. Et in toto circuitu fossarum latitudine designata, tantum infra tumbam quantum est dimidiæ foveæ latitudo undiq; notetur, ibiq; ordine tempore congruo, videlicet octobris vel novæbris, februaryi vel martij, salicum vel populorū, aut ulmorum plantæ quinq; pedibus, vel etiam minus subinuicem æquæ distantes ponantur, deinde foveas persequantur fossores ad interius tumbæ terram universam ponentes, & terram solidam per unum pedem iuncta fossatam uacua & discooperiam relinquentes, ubi postmodū aliquot ex dictis temporibus spinarum plantæ iacentes ponantur, & superducta iterum dicta terra cum uangis & accaronibus, cum secundum formā riparum unū pedem sursum excreverit, iterū spinarum plantis oppositis super eas terra iterum cumuletur, sicq; agendum est donec ad summitatē ripæ fuerit peruentū. Si uero timeatur de ruina riparum, loco spinarū vel inter ipsas plantas graminis uiridis ponantur radices, sint autem spinarū plantæ tales, quales sunt plantæ spinarum. Inde si haberi possunt, ipsæ enim sunt mirabiles ad pungendum, vel sint spinæ albæ, aut pruni sylvestres, aut plātērosarū syluestriū, vel domesticarū albarum, rubus uero licet satis fortē faciat sepe, tamen omnes alias suffocat plātas, cum non magnæ existunt, & ideo mihi non multū placet, si possunt aliæ ex prædictis haberi. Plurimum autem cauendum est ne inter prædictas spinarū acies, arborum fructiferarum, aliquæ plantæ ponantur, quia de seruo fructuum homines sepes destruunt, & fossatæ, ita ut talis curia nūquam poterit clausa teneri. Plantæ similiter infructuose ar-

C boris

bonis ibidem nate non procuretur augmentum, quia eis crescenti-
 bus, spinarum dilecta custodia, ex ipsarum arborum umbris & rē-
 dicibus, aut omnino periret, aut magnam lesionem sentiret. Præterea
 circa primo & secundo anno eadem spinarum plante singulis æsti-
 tis mensibus herbis ibidem natis mudentur, ne ab ipsorum radicia-
 bus humore uolenter attractæ plântulæ arefcere defectu nutriti-
 mentum cogantur. Plante uero salicum, populi uel ulmorum quibus prius
 dixi esse plantandas, sine dubio in summitate ripe proueniunt, quæ
 cum circa se terræ nouæ multitudinem habeant, & per earum radi-
 ces transeant aquæ curiæ defluentes ad foueas mirabiliter conuale-
 scent. Inter quas fieri poterit seps ficta, uel quod melius est starm cu-
 mulata ripe, inter eas multitudo spissa plantularum dictarum arbo-
 rum infigatur. Hæc autem cum conualeant, & incisione atq; plica-
 tura & spissata fuerint fortem constituent sepem, seu quasi planga-
 tum quoddam, quod longissimo tempore perdurabit. Stipites uero
 dictarum arborum primitus palangatarum inter decem pedes in altum
 eleuare nō patiaris, quia ultra modum priuaret curiā, quæ propter sa-
 lutem habitatum aërem salubrem requirit, solis beneficio et uentorum.
 Eo excepto quod super quolibet tumbæ angulo arborem unum quan-
 tum ascendere poterit permittas in altum extolli, quoniam hoc curi-
 am plurimum decorabit, nec præfatam propter earum paruum nume-
 rum inferre poterunt lesionem. Præterea & duæ similiter supra por-
 tas dimittantur augeri, ad quarum umbras quiescant homines tempore
 magni æstus. His igitur diligenter obseruatis sine magnis expensis
 curia fossatis spinarum sepihus & arborum forti munitione præcincta
 cum laudabili formâ & cōmoda habitaculo cum a manebit in cacu-
 mine motis. Circa domos fiant sepes ex plântis maiorum granatorum,
 hæc enim plântæ loca aspera nō formidabunt, quia hæc arbutula mo-
 dico nutrimento cōtenta est, & sepe cōstet uel spissâ & fortem cu-
 mulata pullulatione radicum ipsius. Et uolentibus per eam ingredi pū-
 gentibus spinis eius uiriliter se opponit. Et nihilominus fructu utile

& decor

Et decorē singul'is annis possessoribus suis præstat. Magnæ autem arbores in talibus non cōualescant locis, quia plurimo indigent nutrimento, quod ibi sufficienter haberi non potest ubi terra nimium est saxosa. Veruntamen in locis decliuis montium, ubi est lætum solis, possunt prædictæ plantationes et maxime spinarū et ulmorum satis cōuenienter fieri, sed salix et populus in talibus locis non nifi uos et sabulum, et terrā ualde solutā habeant, non cōualescant ad uotum. Si uero locus tantæ frigiditatis existat quod in eo punica arbor uidere non possit, ex eis claudatur arbutulis aut spinis quæ in regione illa et loco simili experientia indice melius defendantur. De clausura et munitione curiarū quæ supra dicta sunt utiliter dixisse sufficiat, de nobilibus autem et mirabilibus munitionibus et tumbis circa curias ex arboribus artificiose faciendis ad librū referuam octauū.

De intrinseca dispositione curiæ, Cap. vii.



Via prædicta intrinsecus disponatur hoc modo: In medio faciei anterioris fiat ingressus in eam, latitudinis in opposita parte decem pedū ad minus, et eiusdē latitudinis in opposita parte fiat egressus, per quem ad aream, uineā, uel agros posteriores eatur. Nam latitudo præfata sufficit ad currus introitum fœno uel palleis inferendis. In locis eiusdem portæ fiant nobiles uel ignobiles, secundū placitum domini, dum tamen ferreis uellibus et clauibus possint in nocte firmari, supra eis uero fiat coopertura uel domus, ut mūdior et sicciōr seruetur introitus, et ne portæ pluuijs et ratione tēporis breuī putrescāt. Pars dimidiæ curiæ, quæ est una parte portarū pro domino disponatur, hoc modo uidelicet, quod iuxta uiam quæ curiā diuidit fiat domus, quæ longā faciem teneat, et ad posterius parum tendat: et quod domus non capit, suppleat sepi alta uel murus. Sit autē domus magna uel parua, mirata uel tegulis cooperta uel cānis, secundū domini uoluntatē. Et in ea parte iuxta ripas tumbæ et ergularū et uuarum genera nobiliora placentur, quæ

tandem octo uel decē pedibus eleuare in altū poterunt , decorumq;
 facere pergulariū super ripas, adherēs arboribus ante dictas, dein
 de 5 uel 6 pedibus infractuā circūqua; buniles plātentur arbori-
 stula , ueluti ficus & malagranata , si aëris illius qualitas patitur,
 & mizele, & ciconiorū plāte, per mediū uero illius loci plātentur
 aliqua plāte, pitorum & malorum 20. pedibus ad minus distātes,
 quę procedente tēpore diuersis pitorū & malorū generibus singu-
 lis æstatis & autūni mēsisbus maturādorū cum diligenti industria
 inserantur, horū enim uitium & arborū fructus domino specialiter
 reseruandi, propter sortes clausuras erunt à rusticorū uoraci impro-
 bitate securi. In eo etiā loco ancenū formabitur uiridarium, et domi-
 nicus hortulus, & apium dilecta societas illesa seruabitur: & turti-
 res, cricij & lepussculi secundū modos quos in locis suis dicā. In alia
 uero parte dimidiā fiat domus & tuguria iuxta ripas circūqua;
 uel duas partes aut unā tantū occupantia, secundū exigentiā fami-
 liæ colonorū & animalium nutriendorū, curiæ remanente in media
 expedita. Domus meliores in una parte deputentur habitationi co-
 loni, & alie animalibus ea in parte nutriendis. Iuxta domos rustico-
 rū sit puteus. Si fons desit, in parte cōuenientiōri fiat secundū modos
 & formā cōsueti modo cōseruatas, dum tamen puteus et fossata cu-
 ria à palude letaminis quātum poterit elōgetur, ne fossarū aut leta-
 minis humor putridus p occultos terre ingrediatur meatus . In alio
 uero curiæ capite iuxta tuguria bestiarū, palus formetur letaminis
 maturādi, dominica quamū poterit domo remota. Et si ita sit domo-
 rū nobilitas & potentia, quod dedignetur in eadē curiā cū suis ha-
 bitare colonus, poterit cōmode in prædicto loco si dispositio patitur
 morari castos, qui uulgo castaldio nominatur, et seorsum in alia par-
 te facere suum locū palacijs & turribus ac uiridarijs decoratum, se-
 cundū quod eorum nobilitati & potētiæ crediderit cōuenire. Do-
 ctinā autē arce, horreorū, & celle uinariae ac columbariæ pallarij
 stabulorum & tuguriorū scēni seruādi suis locis tradenda reseruo.

Deputeis

De puteis & fontibus faciendis, & quomodo
aqua reperiatur & probetur, Cap. viii.



Icet puteus optime moretur in curia, ut prædictum est, tum quâdoq; propter cōmunem plurimæ aquæ utilitatē, & aliquâdo propter cōmoditatem colonorū. Et quia plurimū aqua non inuenitur in curia uel in partibus et locis propinquis, aut inuenitur, sed letaminis liquore inficitur, in cāpis extra curias fieri optatur, quod cum acciderit, providendū est hoc modo, uti aqua in superficie aut nō multum p̄funde existit. Itaq; de mense augusti septēbris aut octobris fodiendus est puteus, quia ubi aqua his nō decrit mēsis, nullū alio tēpore habebit defectum. Igitur secundū Palladiū ante solis ortū his locis quibus aqua querē dum est, æqualiter pronus, mento ad solū depresso spectabis orientem, & in quo loco subtili nebula crispū ærem surgere uideris, & uelut rore sp̄rgere, scias in siccis locis ibi aquā latere. Sed terrarū genus cōsiderabis, ut possis de tenuitate & abundātia iudicare. Creta namq; tenues nec optimi saporis uenas creabit. Sabulo solutus, exiles, insuauēs, limosas et spacio altiori submersas. Nigra terra humores & stillicidia nō magna ex imbribus et liquore collecta, sed saporis egregij. Glareæ mediocres & uenas incertas sed suauitate præcipuas. Sabulo masculus arena & carbūculus certas & ubertate copiosas. In saxo rubeo bonæ & abundātes sunt. Sed providendū est ne inter ruinas inuētæ refugiant. Sub radicibus mōnū & in silicibus uberes frigide et salubres: locis cāpestribus, salsæ, graues, tepidæ & insuauēs plerunq; quarū sapor si optimus fuerit, noueris eam sub terris exordī de mōte sumpsisse. Sed in medijs cāpis mōtanorū fontū suauitatē frequenter æquat, si umbrantibus tegatur arbutis. Sunt & hæc signa inuestigandæ aquæ, quibus tunc credimus si nec lacuna est, nec aliquis ibi humor ex cōsuetudine infidet, lūcus tenuis, salix syluatica, alnus, arundo, hædera, cæteraq; quæ humore multū aquosa gignuntur. Locis ergo ubi prædicta reperi signa, pedibus

tribus latitudine altitudine pedū quinq; fodiatur, & p̄xime solis oc-
casum uas purū æreum uel plūbeum, interius unctū ponatur, immet-
sum solo fossionis ipsius, tunc super fossā crates facta de uirgulis &
frōtibus addita terra spaciū omne operiatur, sequenti die apto loco, si
in codē uase sudores inueniatur, aut stille, aquā ibi esse non dubites.
Itē si uas figuli siccum, nec coctum eadē ratione ponatur, ac similiter
operiatur, altero die si aquarū uena p̄xima fuerit, uas humore cōco-
pto soluetur. Itē uellus lanæ aque positi & cooperiti, si tantum collin-
git humoris, ut alia die sudet expressū, copiā ibi esse testabitur. Item
lucerna oleo plena & incensa ibi similiter testā ponatur, & si secū-
do die reperiatur extincta, aquas locus idem habebit. Item si in co-
lo focum feceris, et terra uaporata humidū fumū nebulosū m̄q; iacta
uerit, aquas ibi fore cognoscas. His ergo repertis, certa signorū fir-
māte noticia, puteū fodias, & caput aque requiras, uel si plura sunt,
in unum colligas, tamen sub radicibus mōtium in septentrionali par-
te querendæ sunt aque, quia in his locis magis abundant utilioresq;
nascuntur. Sed in fodiendis puteis est cauendum fossorū pericu-
lum, quoniam terra plerūq; allumen, sulphur, & bitumen adducit,
quæ spiritum pestis exhalāt, & occupatis statim naribus animas tor-
quent, n. si sibi quis sugere uelocitate succurrat. Prius ergo quam de-
scendatur ad infima, in eis locis lucernam ponas accensam, quæ si
extincta non fuerit, periculum non timebis. Si uero extinguetur, lo-
cus mortifer est cauendus. Fodiendus est ergo puteus latitudine pe-
dum octo uel septem quaq; uersum, ut binos pedes structura conclu-
dat, fieri etiam potest latior seu strictior secundum quod plures aut
pauciores aquam ex eo haurire intendunt, & secundum multitudi-
nem & paruitatem uenarum. Si aqua limosa sit, salis admixtione
corrigitur, sed dum foditur puteus, si terra non stabit, uitro gene-
ris disjuncta, aut humore laxabitur, tabulas obijcies undiq; directas,
et eas transuersis uestibus sustinēbis, ne fodientes ruina concludat.

Potes

Poteſt etiam in talibus locis melius ſine foſſorum periculo fieri, uia
 delictet quod fiat ex aſſidibus rota duplex & fortis ad putei latitudi-
 nem ſup aquam fiat murus altitudine unius puncti, anteq̃ puteus
 fod aui, deinde ipſius foſſor cum inſtrumentis ferreis in medio exi-
 ſtens ſub muro fodiat, & ipſum uſq; ad terre equalitatem faciat a-
 lias aſcendere, & iterum tandem murat & fodiat terram & tan-
 dem aqua extrahat, donec puteus ſit pſectus. Sed qui in alto ſunt pu-
 tei, perforatis uſq; ad inſimam partem terris, ad loca inferiora poſ-
 ſint uia fontis exire, ſi uallis ſubieſte natura pmittat. Aquam uero
 nouam putei ſic probabis in aereo uaſe nitido ſparges, & ſi macu-
 lam non fecerit, probabilis indicabitur. Item decocta in eo uaſculo,
 ſi arenā uel limū non relinquit in fundo, utilis erit. Item, ſi legumina
 cito ualebit excoquere, uel ſi colore placido carens muſto & omni
 labe pollutionis alienæ.

De aqua ductu faciendo, Cap. ix.



Vm uero ducenda eſt aqua, ait Palladius, ducatur aut
 forma ſtructurili, aut plumbeis fiſtulis, aut cannaibus,
 aut fiſtilibus tubis. Si per formam ſtructurale ſolidā
 dus eſt cānalis, ne primas aqua poſſit elabi, cuius ma-
 gnitudo pro aquæ menſura facienda eſt. Si per planum ueniet, in-
 tra centenos uel ſexagenos pedes ſenſim reclinetur ſtructura ſex-
 quipede, ut nim poſſit habere currendi, ſi quis mons interieſtus oc-
 currerit, aut per latera eius aquam ducemus obliquā, aut ad aquæ
 caput ſpeluncas librabimus, p quas ſtructura pueniat. Sed ſi ſe ual-
 lis interſerat, erectas pilas uel arcus uſq; ad aquæ iuſta neſtigia cō-
 ſtruemus, aut plūbeis fiſtulis clauſam deiſci patiemur, & explicita
 ualle conſurgere. Sed quod eſt ſalubrius & utiliſ, fiſtilibus tubis
 conſtituitur, ut duobus digitis groſſi ex parte una reddatur acuti, ut
 palmi unius ſpatio in alterum poſſit intrare, quas iuncturas uia
 calce oleo ſubacta debemus illungere. Sed antequam his curſus aquæ
 admittatur, ſanilla mixta exiguo liquore decurrat, ut glutinare poſ-
 ſit ſic

fit, siqua sunt vitia tabularum. Vltima ratio est plumbis fistulis ducere quæ noxias reddūt aquas. Nam cerussa plumbo creatur, quæ plurimum corporibus noceat humanis. Diligenter præterea debemus aquarū receptacula fabricari, ut copiam inops vena procuret.

De Cisternis faciendis, Cap. x.



Vm aqua deest, cisterna, secundum Palladiū, fiat, magnitudine qua dominus delectatur, et quæ sufficit ad quam omnium conduci possit aqua testorū, testacū pavimentū superfusione lenigetur. Hoc pavimentum omni cura terendū est ad nitore, et lardo pingui costio assidue perfricandum, ne deducto humore riuus in aliqua parte fundatur, et ita post diuturnam siccitatem aquæ præbeatur hospitū, in eius medio formetur puteus, deinde circa eum omnis cōcauitas repleatur in fundo de grossis lapidibus fluminū, in medio et de minutis et de sabulo in supremo. ubi autem desunt fluminū lapides, loco eorū formacis petreæ ponantur. In quibusdam autem locis sit pavimentum de quadam creta, quæ cum mediocriter est infusa, cōprimitur et calcatur, quod aquā in se positam vel puluerem optime recipit et cōseruat. Anguillas sane piscisq; flumiales in hanc mitti pascūq; conuenit, ubi eorū natatu aqua stans agilitatē currentis mittetur. Rimas et lacunas cisternarum, piscinas, vel puteos sarciemus hoc modo, picis siquidem liquidæ quātum volueris et tantundē sumes laxungie vel seui tūc in olla utrūq; miscabis et coques donec spumet, dein de remouebis ab igne, cum autē fuerit refrigerata cōmixtio, calcem superadijces minutatim, et ad unum corpus omnia mixta reuocabis, cumq; velut stigmatum feceris, inferes locis corruptis ac manantibus, et pressum summa densitate calcabis. In locis præterea in quibus aquis fluminum utimur, fiant cisternule, cum quibus clarificentur et limpide fiant hoc modo, habeatur arceus terre magnus in loco frigido sub sabulo obrutus, supra quē sit uas ligneū vel

terreum coopertum, latitudinem quandā habens quod foramē paruum cum cāna in medio fundi habeat, per unū digitum in fundo eleuata, supra q̄ ponatur ciathus deinde usq; ad mediū sabulo impleatur, in quo postea quotiens uolueris fluminis aqua ponatur, quæ in sabulo distillata, per cannulam guttatim descendit inferius in urceo in quo utenda seruatur. Quod si maiorem cisternulam habere uolueris, poteris tam inferius quā superius receptaculum de marmoribus uel lapidibus, & cemento, aut testaceo pavimento facere secundum formam & magnitudinem tibi gratam.

De materijs domorum, Cap. xi.



Vm supra de domibus & edificijs mentionem fecerim fabricandis, quæ ex materia murorum & lignorum sunt, dicamq; ligna quæ competunt edificijs, & quæ bona cementa, & quæ cōsideratio in fundamentis habenda est. Fundamenta igitur (ut ait Palladius) stabilia & diu durabiliora latiora sint, ex utraq; parte semperdis spacio quā parietis corpus excreseat. Si solida & conficta inuenietur argilla, quinta uel sexta pars altitudinis eius quæ supra terram futura est fundamentis deputetur. Quod si terra laxior fuerit, maioris altitudinis obruantur, donec munda sine ruderum suspitione occurrat argilla, quæ si omnino desit, quartam meruisse sufficiat. Arena quæ cōprehensa manu adit stridores erit utilis fabricanti. Item si panno uel linteo candido uestis inspersa & excussa nihil macule relinquit, aut sordis egregia est. Sed si fosibilis arena non fuerit, de fluminibus aut glareis, aut littore colligatur. Marina arena tardius succatur, & idco non continue, sed intermissis temporibus construenda est, ne opus corrumpt, camerarum quoque tectoria salso humore dissoluit, nam fosiles tectorijs & cameris ex celeri siccitate utiles sunt, melioresq; si statim cum effossæ fuerint misceantur: sed
D si neesse

si necesse sit maris arena erit commoda si prius lacuna humoris dulcis immergatur, ut utrumque salis aquis suavis elata deponat. Calcem quoque albo saxo uel tibiertino, aut columbino fluminali coquemus, in duabus arena partibus calcis una miscenda est, in fluminali quoque arena sitertia parte testæ cretæ addideris operum soliditas mira præstabitur. Iterum si calx & arena æquali mensura miscentur erit fortissimum cementum, exinde commixtum. Non est præterea murus faciendus tempore magni algoris, quia congelatus dissolueretur postmodum adueniente calore. Tempore mensis nouembris aut decembris fabricarum materia est cedenda, cum luna decrescat, quia tunc humor corruptibilis corrumpens consumptus est, per præcedentem autumnum & lune ætatem, & propter præsens frigus aeris fugit cum calore naturali arboris ad radices ad calidum uentre terre. Sed arbores quæ caduntur usque ad medullam securibus recisas stare aliquandiu patiaris, ut per eas partes humor siquis in uenis continetur excurrat. Vtiles autem hæc sunt, maxime abies uidelicet, est enim leuis rigida, & in operibus siccis perfecte durabilis. Salix uel latex secundum Palladium utilisissima, ex qua si tabulas suffigas in fronte atque extremitate tectorum, præsidia contra incendia confert, nec enim flammæ recipiunt, aut carbones creant, ut idem ait: Quercus durabilis, si terrenis operibus obruatur.

Rouer optima tam sub terris quam etiam supra terras. Castanea in re solidata durat in agris tectis & operibus internis. Fagus in sicco utilis, humore corrumpitur. Populus alba & utraque salix & tilia in sculpturis necessaria. Alnus fabricis inutilis, sed necessaria si humidus locus fundamentis planandus est. Vlmus & fraxinus si siccentur nesciunt ante cernabiles. Cipressus egregia. Pinus uel pirus si in siccitate non durat. Cedrus durabilis, nisi tangatur humore. Quæcumque autem ex parte meridiana exdunt uiliores sunt, quæ uero ex septentrione proceriores, sed facile utiuntur.

De officio

De officio uillici, Cap. XII.



Villicus disciplina utatur, secundum Varronem, serua
seruetur, ab aliens manus abstinereat, sua diligentissi-
me seruet, litibus familiae si praesideat, si quis deliquerit
bono modo iudicet, familia ne sit mala, ne algeat, ne
exuriat, opera exerceat, facilius a malo prohibebit, pro beneficio
gratiam reserat, ut alijs recte facere libeat. Villicus non sit ambu-
lator, sobrius sit semper. Ad coenam ne quo eat, familiam exerceat,
procuret ut quae dominus imperat fiant. Ne plus censeat sapere
se quam dominum. Amicos domini habeat sibi amicos. Quod
dominus crediderit, exigat, mutuum nemini det, ne quid insciente
domino emat, ne quid dominum celauisse uelit, opus rusticum om-
nino ut sciat facere curet, et id faciat saepe, dum ne lassus sit, si fen-
cerit prouocabit familiam exemplo, et illi animo aequiore facient.
Si hoc faciet manus libebit ambulare, et ualebit melius, et dormi-
tabit libentius: primus mane surgat, postremus cubitum eat, prius uil-
lam uideat, ut clausa sit, ut quisque suo loco cubet, et ut iumenta pabulum
habeant, boues maxima diligentia curatos habeat. Bubulcis impri-
mus beneuolus sit, quo libentius boues curent. Aratra uomerisque fa-
ciat, ut boues habeant, pecori et bobus diligenter substernatur, ung-
ulae curentur, scabiem pecori et iumentis caueat, id ex fame et si im-
pluit fieri solet, opera omnia maturae conficiat. Nam res rustica sic
est, si unam rem sero feceris, opera omnia sero facies, stramenta si
desint frondem ligneam legat, eam substernat ouibus bobusque. Ster-
quilinum magnum habere studeat, et per autumnum euehat, et cir-
cum oleas ablaqueat, ac fenum addat, frondem populineam uimeam,
querneamque per tempus cedat, eam condat, non per aridam pro pa-
bulo ouium. Item faenum aridum de prato recondat, post imbrem,
et autumnalia opera pabulum lupinumque serat.

D 2 Qualiter

Qualiter paterfamilias debet agrum &
mere, ac uillici operam &
rationem inquirere,
Cap. XIII.



*C*ato scribit, prædium cum comparare cogitabis, sic in animo habeto, uti ne cupide emas, ne ut opera tua parcas, ne satis habeas semel circuire, quotiens ibis totiens magis placebit, quod bonum erit, uicini quo pacto niteant id animaduertito, & uti cum introeas, circumspicias uti inde exire possis, uti bonum conlum habeat, ne calamitosum, & si solo bono sua uirtute ualeat. Si poteris sub radice montis, si & in meridiem spectet, in loco frigido, loco salubri, operariorum sit copia, si & bonum aquarium, opidum ualidum prope sit. In his agris qui non sepe dominos mutant, qui in his agris prædia uendiderunt quos pigeat uendidisse, uti bene edificatum sit. Caneto ne alienam disciplinam temere contemnes, à domino bono colono bonoq; edificatore melius emetur. Ad uillam cum uenies uideto uasa & torcularia, & dolia, si multa sint, ubi non erunt scito pro ratione fructuum esse instrumenta, multa uel pauca sint, uideto sumptuosius que ager nescit. Paterfamilias cum ad uillam uenit fundum ex die si potest circumeat uel die sequenti, ut cognoscat quomodo fundus cultus sit operaq; facta infecta que sunt. Postea uillicum uocet ac interroget, quid operis factum sit, & quid restat, satis ne tempestiue opera sint confecta, positisq; que reliqua sint conficere, & quid factum uini sit, frumenti, aliarumq; omnium, ubi ea cognouerit rationem inire oportet operarum, ductum si opus non appareat. Dicit uillicus se dolo caruisse, se non ualuisse, tempestates malas fuisse, seruos aufugisse, ubi eas multas causas dixit, ad rationem operum operarumq; uillicum reuoca. Cum tempestates & pluuie fuerint, que opera per imbrem fieri

fieri poterint, dolia lauari, picari, uillam purgari, frumentum transferri, stercus foras efferri, sterquilinum fieri, semen purgari, funes sarciri, nouas fieri, centones, cuculiones familiam sibi potuisse sarcire, per ferias potuisse fossas ueteres tergeri, uiam publicam muniri, ne pres recidi, hortum fo di, pratum purgari, uirgas uinciri, spinas truncari, cum serui agrotauerint, cibaria tanta dari non potuisse: quæ opera reliqua sint curent, ut perficiantur, si quid desit in annum, ut paretur, quæ supersint, ut ueneant, quæ opus sint locari, ut locentur, & quæ opera fieri, & quæ locari, ut imperet, & ea scripta relinquat, pecus omne consideret, oleum, uinum, frumentum & quicquid supersit uendat, boues, uitulos, armenta, oues, lanam, pelles, plaustrum uetus, seruum senem & morbosum uendat, patrem enim familias uendacem non emacem esse oportet. Item quæ pertinent ad sationem suo quoque tempore promenda, id est, mani-
festanda sunt, quæ uendenda uidendum, ea enim quæ seruari non possunt tunc uendat cum caritas est, antequam se commu-
cent celeriter promat, & uendat. Sæpe etiam diu-
tius seruata non modo usuram adiciunt sed
etiam fructum duplicant, si expe-
rato congruo tempore
promat.

LIBER SE

CVNDVS DE NATVRA PLANTA

rum, & de rebus communibus cultui
cuiuslibet generis agrorum.



*V*N in superiori libro de his quæ necessaria sunt
saluti habitantium rura, quædam utilia scripse-
ram, consequenter de ipsorum operationibus in
illis agendis dicendum est. Verum quia raris
exercitiis variantur secundum uarietatem planta-
rum, locorum & temporum, quorum diuersitas sine noticia nature
plantarum partiumq; ipsarum, eorum etiam quæ plantis necessaria
sunt, perfecte cognosci non potest, de his in hoc loco secundo agen-
dum est. Et quia quædam sunt communia cultui cuiuslibet generis
agrorum, de his etiam in eodem libro dicetur: dicam itaq; de his in-
primis quæ omni plantæ cōueniunt secundū generationis principia.

De his quæ omni plantæ conueniunt secun- dum generationis principia, Caput I.



*I*N plantarum generatione sunt septem, sine quibus
nulla omnino nascitur planta, calor uidelicet cœles-
tis circuli, qui est primum & uisum principium
plantarum, secundum est autem conueniens calor lo-
ci, quia si in loco non sit uirtus frigoris mortificatiua, suscipiet uirtu-
tem caloris cœlestis circuli. Similiter autem si locus sit uehementer
adustus, erit heremus aridarum & eius quod uocatur mortuum sa-
buiū, eo quod non est talis locus susceptiuus cœlestis uirtutis plan-
tificatiue

minificantis. Tertium autem est calor, qui materie seminali, quæcūq;
illa sit, inheret: quia sine illo aut nō est receptiua caloris immixti, aut
receptum euanesceat: & nūquam formaretur ex ipsa plantarum as-
liqua secundum euaporationem. Probant autē hec oparustificatio-
nis, quoniam in quibusdam plantis cum primo formantur & sunt te-
nellæ, umbracula oportet fieri, ut calore solis nō euaneſcāt, sicut quā-
do ex feminibus pullulant cipressi uel ficus. Tria autem sunt munda-
strantia substantialem materiā, quorum primū est humor naturalis
inherens ei quod formatur in plantæ speciem, qui primū spirando
pullulat sursum & erumpit ad terræ superficiē, qui cum pullulat ex-
macuat ab inferiori materiā humoris, totā substantiam humoris for-
mans in instrumenta plantulæ, & inferius ad radicē in radicē: De-
est ita autem uirtus caloris subiecto, attrahit humorē locis, & iste
est secundus humor ministrans cōceptæ plantæ nutrimentum, sicut
ministrat matrix sanguinem menstruum in conceptione & forma-
tione animalium. Tertius est autem humor pluriarū & roris & ni-
uum desuper uenientium, qui se habet ad plantas, sicut humidum nu-
trimentale ex cibis sumptū in animalibus: & ideo humidū hoc de-
sideratur à plantis iam formatis, & ad speciem iam deductis sicut
cibus desideratur ab anima natis animalibus. Septimū autem quod
exigitur est aer cōueniens extrinsecus, ille enim conseruat si bonus
est, aut corrūpit, si malus est, plantas: & ideo uenti urentes, & plu-
uie mortificantes, ledunt & destruiunt plantas, ab aere autē tem-
perato proportionabiliter cōualescunt & fructificant. Amplius au-
tem arbor in genere suo est calida & humida, & calor quidē ap-
perit meatum & impellit humidū, humidum autē abundans sufficiē-
ter ministrat materiā ei, ideo statim exurgit in stipitē
& auget illam & roborat, & emittit ramos multos &
in ramos plurimas uargas.

De

De diuersitate generis plantarū, Cap. II.



Considerandū est principaliter de diuersitate generationis plantarū, ex diuersitate generationis eius fere sciatur tota natura plantarum. Et de hac quidem diuersitate ab antiquis fere nihil amplius inuenitur, q̃ quod dixit Aristot. quod arborum sci-
 licet & plantarum quedam generantur plātate, quedam ex semine, & quedam per seipsas, ex ipsorum elemētorum cōmixtione & uirtute cōlesti, que tali cōmixtioni uitam influit uegetabilē, & ea que plantatis aut à radice nata euellitur, aut à stipite aut à ramis aut à semine nata transfertur de loco ad locum, sed hoc proprie nō est plantatio, sed transplantatio dicitur: & ista que sic transplan-
 tantur quedam propter duriciem sue substantie aliquantulum cō-
 tunduntur & scindantur inferius ubi insigūtur terre, ut facilius &
 citius trahant nutrimentum. Atq; etiam que secundū partem aliquā
 plantantur, quedam plantantur in terra, sicut fit de uite salice, &
 buxo: frequentius quedam plantantur in aliam arborem, & hac plā-
 tatio uocatur insitio. Quod autem in generatione planta ualde no-
 bis occurrit, est quod plantarū quedam ex semine habent genera-
 tionem, que nec productū semen simile illi semini ex quo habent ge-
 nationem: quedam faciunt semē melius, & quedā peius: aliquādo
 enim quibusdam malis seminibus bonæ arbores proueniūt, ut ab a-
 mygdalis amaris & acerbis aliquando fiunt dulcia, & aliquando
 contra. & similiter à malis granatis siue punicis accidit, aliquando
 fiunt dulcia & aliquandō econuerso. Quarundā autem plantarum
 semen cum debile fuerit aut ex loco aut ex aere tempore incōueni-
 enti deficit. Et illarum generatio in tali loco non est ex semine: sed
 ex aliqua alia planta, siue ramorū siue radice, & hoc precipue est
 in pineis & palmis, ficibus & malis granatis, & similiter in omni
 abietum natura, nulla enim illarum semen facit tanta efficacia per
 quod pullulare faciat, nisi raro: nam ex semine palma quādā g. pul-
 lulat

pullat & cipressus, & maxime palmasi plura semina simul coniunguntur, ex uno enim simplici semine raro pullulat: sed cipressus & maxime ficus pullulat ex uno grano seminato ad modum herbe primum conualescens paulatim. Non autem defacili fit quod ex semine malo proveniant bona planta, nec econverso, licet aliquando hoc fiat: sed in animali hoc contingit multotiens, propter diuersitatem enim habitationum aeris, & uentorum, & nutrimenti, cum animal sit facilis alterationis frequenter fit quod semen male complexionati animalis alteratur, & fit melius, & bene complexionati alteratur, & fit peius, & animal generatum fit secundum seminis ex quo generatur dispositionem, uel peius uel melius, cuius signum est quod omnia domestica animalia uidemus ualde differentia inter quantitatem & colorem, quod non accidit eis, nisi propter sui nutrimenti multam diuersitatem, & stabulorum, & aliorum locorum in quibus couersantur, propter quod etiam carnes earum in sapore diuersificantur à carnibus animalium syluestrium. Talis enim diuersitas in plantis non est, aut tanta non est, quia radices terræ affixæ sunt, & neq; loca mutant neq; nutrimenta.

De substantia & origine & generatione plantarum, Cap. III.

Locus in quo oritur planta est sicut matrix in animalibus, & succus siue humor in tali loco preparatus & attractus est sicut sanguis menstruus in matricibus animalium, uis autem coelestis in eis est, sicut uires in disticta & non determinata ad speciem, quæ quantum ad plantæ naturam sufficienter determinatur & distinguitur, per qualitatem elementorum & modum commixtionis eorum in materia seminis plantæ. Opera autem plantæ secundum quod planta est sunt tria, scilicet uti alimento, & augere & generare. Utitur alimento siue trahunt ipsum tantum purum conueniens & simile sibi, & hoc totum est
B conuertibile

conuertibile in substantiam membrorum, & ideo non habet uentri-
 & uenas, sed tantum poros, & terra est eis pro uentre, & in qua
 dimittunt utranque impuritatem siccam uidelicet & humidam, &
 hec est causa quod radices infigat ori suo similes in terram, ex qua
 sicut ex stomacho sugunt nutrimentum, & dirigunt radices deorsum
 maiores plate omnes ubi terre calor melius comiscet et dirigit nutri-
 mentum: et si aliqua plate magna in superficie spargat radices & non in
 profundum dirigat, cito arescat, quia nutrimentum quod est in super-
 ficie terre euanesce it ab eis in fenum per calorem solis; & non co-
 getur spirare in radicibus eorum per loci continentiam. Pugere au-
 tem ipsarum plantarum, dicunt quidam esse in infinitum, asserentes
 plantam augeri quando radicitus terre adheret, quibus non est co-
 sentiendum, quia certum est, omnium natura constantium esse quan-
 titate determinatam inter duos terminos maximi in suo genere &
 minimi. Habent enim sicut egregie dicit Aristot. omnia rationem
 magnitudinis & augmenti: licet enim ex nutrimentali formetur &
 augeantur humida plante, tamen parti cui facienda est additio tan-
 tum adduratur processu temporis ut extendi non possit, & tunc con-
 stat augmentum in longum, et tandem ex eadem causa stabit etiam
 ad alios duos diametros, qui sunt in latum & profundum. De ope-
 ratione autem generationis plantarum hic solum dicitur, quod su-
 gendo per poros habent nutrimentum, & de eo quod extrinsecus
 in gemmis elcuiatur à spiritu egradiante formant omne quod gi-
 gnunt.

De diuisione plantarum per suas par- tes, Caput IIII.



Consequenter autem de partibus vegetabilibus plantarum
 determinandum est, & de his que accidunt eis à natura,
 & non ex cultu, de fructibus enim & cultu dicitur poste-
 rius. Oportet autē scire, quod sicut in animalibus ita in plantis, quod
 dam

Idem est quod est potentia. Et ea pars plantæ vocatur succus, et quoddam est quod est pars plantæ actus, sicut radix, stipex, ramus et huiusmodi. Est autem succus humor per poros radice attractus, et ad nutriendam totam plantam quæ per partes plantæ à virtute nutritiua distribuitur, necesse est igitur, quod ad plantæ similitudinem calore digestio, per digestionem ad similitudinem complexionis eius membri vel partis quæ nutritur alteratum est, ex his autem necessario relinquatur, quod humor cibalis plantæ magis sit insipidus in radice, secundum quod magis et magis à radice procedit, sic plus et plus accipit saporem plantæ conuenientem, sicut autem accipit saporem, ita etiam accipit inspersionem, subtiliationem, et acumen. Ex actione enim caloris in ipsum necesse est hæc omnia euenire circa ipsum, nisi per accidens impediatur, ut infra docebitur. Et in quibusdam quidem plantis calore exhalante plurimum humidum remanet, terrestre, viscosum, lucidum, propter multam eius materie naturam in ipso, et est odoriferum propter actionem caloris in ipso, eo quidem quod conuenienter digestum est aromaticum est: quod autem corruptum est fetidum et humidum. Quando calore aperiente parum stillat, frigiditate aeris exiccatur, et vocatur gummi: aliquando etiam distillat per vulnus factum ferro in plantam, et tunc etiam gummi vocatur sed non est tantæ virtutis, ut prædictum. Partes autem quæ actu sunt partes plantæ diuiduntur in duo genera, quedam enim sunt ad membra sicut officialia in animalibus, quedam autem sunt similia, modi enim et iunctura et uia per modum uenarum extense et radices sunt, sicut membra officialia, et nutritiui officio deservientia sed lignum in habentibus lignum est caro cibalis: in non habentibus lignum est sicut membrum simile in animalibus, cortex autem sicut pellis in animalibus, et ad hunc modum est de cæteris partibus plantæ sed non ille quocatur malleolus est factus à natura ut in ipso stet succus, et ampliorem accipiat digestionem: cuius signum est, quia si in ramo syluestris arboris fiat incisio ultra medium, ita quod medulla

¶ 2 sit abscessa

sit abscissa, & postea ligatus consolidetur, temperabitur malitia fructuum, & melior reddatur sapor eorum. Causa autem est, quod ibidem retortum porum inueniēs nutrimentum ascendens per triacū, fiat & diutius digestum in meliores digeritur, & transformatur fructus. Huiusmodi autem nodos habent precipue in plātis ee quae rara sunt substantie, & habent magnas medullas, aut in toto sunt concave, & cum hoc sunt valde longae sicut est vitis & viticella, & cucurbita, & arundo, & genera frugum, triticum & siligo, hordeum & auena, & alia huiusmodi. Radices tamen habent plantae ori similes, quantum ad tractum nutrimenti, habent tamen quantum ad alium modum similitudinem & effectum cordis radices plantarū, quoniam cor nutrimento attracto primum infundit calorem utiificū, per quem ad membra moueri incipit, & hoc facit radix in plantis, quoniam ex radice datur eis calor & forma uitae potentialis, per quam ad omnes partes plantae naturali motu mouetur. Sunt plantae uoraces distae, & abstinentes distae, & propter suarum radicum dispositiones contrarias, raras enim & porosas, & calidas habentes radices multum trahūt de nutrimento, plus autem quam conuerti possit & terminari à natura arboris, et tunc arbor generabit fructus uermiculosos, & putrescentes si non exudet, uel aliter emittat superfluum humidum. In iuuentute autem plantarū hoc maxime accidit propter calorem iuuentutis earum. Aliquando autem curantur ex hoc quod perforantur iuxta radicem, ibi enim exit superfluum humidū, sicut per phlebotomiam. Si autem plantae calidae & rae radices sint in terra sicca in qua pluit raro, & in qua cadit cum impetu multa pluuia, sicut est terra climatis secundi & tertij, & sorte quarti, pro aliqua sui parte trahitur radix plātae multis uicibus interpolatis ex abundantia pluuiae multum nutrimentum, quod antequam alia pluuia superueniat trahitur ad partes superiores, & completa digestionem perficitur, & ideo tales in talibus locis plantae sepius forte florent, & fructus emittunt. Et hoc est causa, quare in terra Mau-

rerum sepe fiorescent arbores in uno anno, fit autem hoc in nostris climatibus, licet non producant plantæ nostræ nisi paucos flores, quando post æstatem humidam sequitur autumnus ualde calidus & siccus. Sunt autem quædam plantæ humide, aquosæ, molles, & quocunque modo infiguntur terræ de facili radices emittunt & conualescunt. Hoc autem faciunt & quædam duræ propter similitudinem ligni radices plantæ corporis, sicut buxus, cuius ramus in terram infixus de facili conualescit, in quibus autem hoc non fit, causa est quod destituitur lignum nutrimento, antequam ex se formare possit radices, eo quod aut porosum non est, aut non habet calorem sufficienter trabentem, & ideo arescit antequam ex se emittere possit radices, & ideo quæcunque calide sunt ramis infixis in terra conualescunt, sicut buxus, & sauina, & multe aliæ. Et iterum si molles sunt tactu, ab humore terræ nutriuntur, & implentur, & conualescunt sicut salix, & tilia, quæcunque autem neutram habent dispositionem harum, frequenter arescunt, quando rami earum terræ infiguntur. Vena autem in planta proprie loquendo non est, sed nec secundum multam manifestam similitudinem habent, sed uia nutrimenti dicuntur uenæ eius, quæ aliquando sunt directe ascendentes, & tunc crescit planta quasi per quasdam tunicas herbales uel ligneas, quarum una supponitur alteri: quæ aliquando sunt tortuosæ, & tunc efficitur planta nodosa, aliquando autem diffunduntur articulatim in plantam, & per uias directas nutrimentum trahitur, & per transuersas detinetur, & reprimitur in partes plantæ nutrimentum ueniunt autem uia istæ aliquando à radice ascendentes, aliquando ex medulla ad exteriora plantæ, sicut linæ multe productæ ab eodẽ cẽtro, talis est igitur dispositio uenarum in planta. Medullæ autem plantarum uidentur esse sicut nucha in animalibus, & per medullam arboris decurrit, et pulsat plus de spiritu plantæ quàm per aliquam aliarum uiarum, & in ea est uigor spiritalis plantæ, quia aliter partes stantes à radice non bene uinificarentur ad formam speciei plantæ, &

et ideo plāte habēt oriū et principiū ramorū q̄ oriūtur à corporibū plantarū à medulla, quasi ex uicario radicis, sed quādo ligna scandūtur p̄ ariditatē p̄fundatur frequēter scissura cōtinue usq; ad medullā & ultra, & non inuenitur profunditati scissura nisi raro. Plāte autem quę nutriuntur ex medulla per poros transversales habent medullas maiores, & quę nutriuntur per poros directē ascendentes habent medullas minores, quandoq; non videntur medullas habere quando magnę efficiuntur: propter hoc q̄ ligna & tunica arctante per alias circumuēctientes cōprimunt & quasi insensibilem faciunt niam medullarū. Et probabile est quod hoc sit una causa corruptionis magnarū plantarū interius, suffocatio uidelicet spiritus uitalis in medulla inclusi, per hoc quod constringitur per circumflans induratum & constrictum lignū. ipsa autem substantia medulle uidetur esse sicut purgamentum quoddā cholericum, quod projicitur de naribus animalium, & hoc fit propter calorem spiritus & motum qui pulsāt in medulla, cuius signum est quod ferē omnes medulle plantarum p̄fectarum inueniuntur à principio inuentus plāte eorum albę, humide, & in processu etatis declināt ad acuitatem & siccitatem. Sunt autem plantę quędam ferē totā substantiā habentes medullosas sicut sambucus, ebulus & huiusmodi, & oēs ille nodos habent multos, & nutriūtur ex medulla, & ideo est multum de medulla in eis: & in hoc genere est uitis, sed minus est medullosa q̄ sambucus uel ebulus, Alias autē experimur plantas in toto concavas, sicut fistulas quasdam & calamos: & hoc fit idco, quia ille multū indiget spiritu sumoso libero, qui eleuatur in concavo plantarum illo ex nutrimento quod ascendit per directos poros laterū plantę, sicut arundo & calamorum genus & huiusmodi. Hęc igitur est dispositio medullarum. Cortices in plantis sunt sicut coria in animalibus, n̄ si quod adco non coherent plantis quemadmodū coria in animalibus & sicut in animalibus pars corij cum est excoriata seu abscissa nō recrescit sine magna animalis cicatrice, sed si a

per longū & latum pellis cito cōsolidatur, ita est in corticibus plātarum: propter quod exsicantur plantę frequenter quādo in stipitibus in circuitu cortices ab eis abradantur usq; ad carnem plāte ligneam uel herbalem: non est autem cortex ex contextione uenarū, sicut cornu animalis. sed substantia corticis generatur ex terre strī plantę expulso ad superficiem ipsius. Est autem cortex duorū modorum, scilicet interior & exterior, interior mollior, exterior durior & asperior.

De diuersitate naturalīū & simpliciū partiū plātz & de causa augmentī eius.



Sicut autem in animalibus interreticulationes uenarū & neruorum sunt supplementa ptiū simpliciū, quę sunt carnes, uel ea quę sunt in loco carnū non habētibus carnes, ita sunt in plantis lignę partes uel hercales, quę simplices sunt & materiales, eo quod influunt per nutrimentum, & effluunt per exiccationem plantarum ad modum lane longę candidę, & quibus auctis augeatur planta, & quibus deficcatis & diminutis planta uidetur exiccari & diminui. Et talia proprie dicuntur partes simplices in plantis, & naturales eo q. influūt per nutrimentum & effluūt per exiccationē plantarum: aut materialia supplementa sicut materia in animalibus. Hoc autem quędā cōmuni & usitata anatomia cognoscitur in urtica maiore, canapo & lino, & multis alijs quę uias uenales habent multū sortes & uiscosās & directas: & quando aqua cōputruit in eis & caro materialis & postea exiccatur & cōminuitur & conficitur & recedit, & remanent uenę illarum plantarum ad modum longę lane candidę, & molles propter uiscosum substantiale quod est in eis, & fiunt ex eis panni. Et hoc est modus quē habebant antiqui philosophi in corporibus hominum & aliorum animalīū, quos ligabant cōtra instum aque uehementis, & tunc abluta carne naturali & molliori, remanet reticulatum ex neruis & uenis, demonstratur modus diuisionis

omnis earum in corporibus animalium. Sicut autem est in urtica, edo-
napo & lino, ita etiam est absq; dubio in alijs plantis, licet materia
ale non possit ita ab officialibus ptibus separari in eis. Pars autem
non simplex in planta dicitur esse quæ ex pluribus simplicibus est
cõposita, sicut radix, ramus, & huiusmodi. Planta dicitur, à Platon-
ne esse figura omnis uniuersi, radices enim habet subius ori simi-
les, sed dilatantur undiq; ut nutrimentum accipiant, & ideo dilata-
tur planta inferius, superius uero dilatatur propter ramorum infu-
sionem, qui multiplicantur ex duabus causis, quatum una est mate-
rialis, scilicet nutrimenti abundantia, altera autem efficiens quæ est
calor solis undiq; exterius tangens arborem, & ebullire faciens suc-
cum & euocans ad exterius, & ideo crumpit in ramorum multitu-
dinem, in superioribus ubi magis constringitur, & per digestionẽ
enplius subtiliatur. Huiusmodi signum est, quod plante quæ circũ
septe sunt multis alijs plantis, sicut arbores in nemoribus spissis &
umbrosis crescunt in altum & non multiplicantur in eis rami nec
non multum ingrossantur eorum stipites, & carentia quadam ra-
morum est, eo quod per calorem solis non potest in eis euocari &
ebullire succus ad superficiem, sed potius frigus umbræ concludit
calorem interius, qui intus multiplicatus ex fuga cõtrarij eleuat to-
tum nutrimentum in altũ. Et cum motus frigoris sit ad centrũ, quo-
tiens motus solis à cẽtro nutrimentũ expellit ad circumferentiam ut
impinguetur & dilatetur stipites, potius reflectitur à frigore loci um-
broso in se nutrimentũ, et impedit stipitis in grossationem fieri.

Degeneratione & natura foliorum, florum & fructus, Cap. v



Ico itaq; quod folij in omnibus plantis materia est, hu-
mor aquosus, nõ bene à fece terrestritatis digestus et
purgatus, aliquantulum passus & cõmixtus. Finalis au-
tem intentio foliorum est ad fructuum cooperimentũ,
eo quod natura purgatione indigeat à superfluitate humidi aquo-
si, &

fit, & cum sit sagax & ingeniosa eodem purgamento utitur ad fructuum defensionem. Materia autem tam foliorum quàm fructuum est, quoniam duo vapores sunt in genere, tam in uentre plantæ quàm in alijs vaporibus omnibus, vapor scilicet humidus & aquosus, & vapor siccus & uentosus: vapor humidus est materia fructuum, propter quod etiam fructus secundum genus suum uentosi esse iudicantur, licet autem folium per umbram temperatam restringat solis arsuram, tamen quia fructus indiget multa ui solis, producit folium aliquantulum distans, ut non obstet digestionì quæ fit per solem. Florum autem substantia generaliter est facta ex humido subtiliori, quod calore primo ebullit, & propter abundantiam quæ est in ipso dilatatur ad modum folij, deo tamen quia humidum habet magis digestum, flos naturaliter est odoris boni, quod nullo modo esset nisi humidum optime digestum & subtile haberet, sicut & terrestre, & quod in ipso est subtilissimum est & ualde commixtum cum humido. Cum enim ex uapore terrestri uentoso creatio sit fructuum, est in ipso uapore subtilius aliquid, & humidius, & minoris terrestritatis quod non de facili constat: & inspessatur calido digestiue, & hoc tamen fit magis uaporabile quàm residuum eiusdem quod est in substantia plantæ in loco gemmæ in quo erumpit fructus, primo calore statim erumpit & formatur in florem. Propter quod adheret floribus, qui mel producit & ceram, & hoc inuenimus in interioribus florum profundo, quia natura format subtile humidum, quod passum est à subtili & bene commixto sicco fluit ex ipso subtile & bene coctum quoddam humidum, aut per modum quandoque dulcis phlegmatis in creatione humorum in animalibus constat. Ergo quod florum substantia fit ex subtili aquoso terreoque subtilitate sua potius formabile est in figuram florum quàm in grossitiem fructuum: & ideo primo calore ueris flores erumpunt propter subtilitatem substantiæ suæ materialis, & facilius læduntur à frigore quàm folia & fructus propter eandem causam, & sunt multum redolentes propter subtile humidum quod

à siccò conuenienter passum est, & quasi spirituatiter ita resolutus in ipsorum substantia. Et humidum foliorum magis grossa aqua indigesta est, & humidum fructum in principio sui magis est simplicium & terreste, indigens multa digestionem, propter quod ultimo completur post folia & flores, amplius cum fructus cadunt & germinant non trahunt augmentum vel nutrimentum à carne illa, sed à terra, cuius signum est, quod cum auferitur tota caro circumposita melius germinant semina quam quando eis remanet. Præterea nutrimentum fructuum putrescit facile, eo quod natura non excogitant illud, nisi ut putrescat, completo semine, & cadens in loco seminis simet, & infundat lutum, in quo semen facilius conualescat, cuius signum est opus rusticorum, cum enim uites feraces uolunt facere, simant eas ex pampinis & acinis, quæ colligunt ex eis eadem uinea cuius uites feraces esse cupiunt. Hæc etiam considerantur in operibus nature, si enim caro fructus ad fecunditatem seminis non confert, cum natura nonnunquam deficiat necessarijs, proculdubio separaret semina per cesseram & aperturam à carne fructuum cadentium: & huius contrarium uidemus in nature opere, oportet enim quod simatio terre quæ fit per putridam carnem fructus ad fecunditatem seminis eiusdem operetur, contingit autem frequentius deperire fructum quam florē ex aliquatrum causarum: aliquando enim magnæ sunt planta, & humidum ponunt ad nutrimentum ex quo formandus erat fructus, sed subtile quod transit in florem non est incorporabile plantæ, & tunc perit fructus & non flos, aliquando autem non ita cito potest moueri grossum & uinci, sicut subtile humidum, & tunc secundo, tertio, uel quarto anno fructificam, licet omni anno floreat, aliquando autem non potest ita tantum attrahere propter duriciem suarum radicum, & tunc forte non attrahunt sufficiens nutrimentum fructibus, nisi per duos annos, uel tres, & quando congregatum fuerit in planta sufficiens nutrimentum tunc fructificat & non in alijs annis. In oleis igitur pinguibus tale est iudicium: sicut diximus

vicinus: sed oleæ saepe priuantur fructu, eo quod ad fructum eius multus humor & pinguis exigitur, & multus calor digerens, & ideo ex dictis causis frequenter impeditur.

• De unitione & diuisione plantarum,

Caput VI.

Item unus modus unitionis qui fit per insitionem, in qua planta unitur plantæ, sicut stipites radici, & sicut ramus stipiti, & continuatur cum ipsa, ita quod per omnia efficiantur eiusdem ligni & nutrimenti, cum tamen sint eiusdem speciei, aut forte eiusdem generis quando fit insitio. Et planta que inseritur tantum trahit nutrimentum ab ea cui inserta est, quod inferius cui fit insitio natura sua nihil producit nisi radices, superius autem neque ramos emittit, neque surculos nisi raro, digeritur tamen succus ad naturam & modum insite, & non eius cui inseritur. Et ex hoc scimus in arbore duas esse digestiones, licet ad inuicem sint satis similes, quarum una est in radice, & altera in stipite & ramis, quia probabile est meliorem esse insitionem inferiorem quam superiorem, et quanto magis fiat inferius tanto magis fructum & saporem eius immutari e. domesticari, quanto uero fiat altius tanto minus, quia maior est immutationis uirtus in toto quam in parte, et maior in maiore parte corporis quam in minori: & quod his mirabilius est, caro fructus est secundum naturam & uirtutem digestionis stipitis, & sapor nuclei & uigor est secundum naturam et uirtutem radices: cuius causa est quod pulpa carnis fructuum est de proximo fluens, substantia autem nuclei non potest de proximo fluere, sed de ea parte que est loco cordis plantæ, ex cuius uirtute tota arbor informatur, & hæc est radix. Similiter est autem in seminibus animalium, que ex maxima parte abscinduntur de cerebris animalium & attrahuntur, ut distillantia per totum corpus uirtutem corporis totius accipiant: sicut enim & nuclei trahunt à primo membro arboris, ut accipiant uirtutem totius, & maxime radices que est uirtutis tribuens toti corpori plan

tarium. Dubitatur quare in animalibus diuisa non conualescunt, diuisorum autem in plantis utrumq; conualescit solutio, quod uidelicet planta propter similitudinē suarum partū undiq; sicut per os quod sugit nutrimentum & in se quasi in uentre & uenis digeritur, ideo conualescere potest, sed in animalibus quamuis habeant in multis si nullia corpora, & ideo diuisa in utraq; parte retineāt sensum & motum, tamē quedam organa diuisa à reliquo corpore habent formā sicut os, & ideo quæcunq; partes illis destituuntur conualescere non possunt, eo quod nec nutrimentum possunt sugere, nec ad congruitatem sui corporis digerere sine illis. In diuisione autem ista magis laceratu conualescunt, nisi sint ualde rare substantiæ, sicut uitis & salix, quia cum laceratur ad inferius ramusculis, retinet meatus apertos & uias integras uersus nutrimentum, & ideo statim ut uia illæ ad nutrimentum attingunt incipiunt suggere, et cōualescit planta, cum autem secatur uel inscinditur, tunc pori diriguntur, ut punctum unum ad nutrimentum et non per longitudinem aliam nutrimentū infigunt, & in ipsa sectione totum corpus plante concutitur, & ipsi pori artantur per collisionem & compressionem impetus secantis, & ideo frequenter ardescunt incisi, præter uitem et salicem quæ sunt rare substantiæ, sed tamen magis cōualescit ex transuerso aliquārum lōgo uulnere abscisus ramus, quā directe abscisus circulariter, & hoc contingit ut dixi, quia poros plures tūc apertos habebit uersus nutrimentū, quando ex transuerso secatur, quam quando ex directo. Cuius signū est quod quando diuiduntur radices antiquorū arborum secundū longitudinem melius fructificāt, eo quod per totam longitudinis diuisionem per poros sit attractus nutrimenti, si autem ex directo secetur in profundū nihil omnino confert, & potius nocet, tantū quod ardescunt arbores illæ. Atq; & huius alia ratio est, quod longitudo diuisa non impedit cursum nutrimenti, sed latitudo diuisa statim cursum & uiam nutrimenti intercipit & impedit, & ideo scissura in arboribus per longitudinē facta, nihil omnino in sa-
pore

pore, & figura uariat fructus, quādo fuerit sanata. Si autē diuidatur ultra medullam quæ in medio est ramusculorū & consolidetur, statim uariabuntur fructus & sapor eorum propter diuisionē quæ contingit propter impedimentū nutrimenti, quod fit in nodositate quæ nascitur ex hoc secundū latitudinem diuisa planta, & ideo diuisio secundū latitudinem est quidam nodus insitionis, & non diuisio in longū, sicut ostendemus in sequentibus. Præterea plantis per abscissionem & restitutionem partium organicū redditur cōtinue inuentus, contingit autem aliquam partem amittere radicem & pullulabit ex stipite alia radix, & nutriet ramos, aut omnes, aut aliquos, & pullulabit ex radicibus stipitis & rami: & similiter contingit amittere & recuperare ramos, aut omnes, aut aliquos.

De transmutatione unius plantæ in
aliam, Caput VII.



Nus modus transmutationis est, quod raro potest præscidi sylua quercina completorum lignorum & magnorū, quod recrescat in eadem specie, nam præscisis arboribus prædictis recrescunt arbores quæ tremulæ dicuntur, & arbores quæ dicuntur miricæ in partibus Germaniæ, quæ sunt maioris ignobilitatis quam primæ fuerint. Causa autem huius est quod radices uetustarum arborum solidæ & duræ sunt, & clausorū pororum, nec ualent ultra pullulare, postquam stipites arborum stantiū super eas præscise fuerint: putrescunt igitur, & calor exhalans ex ipsis & secū trahēs humidū, efficitur maturus plantæ alterius speciei: & quia destitutus est à uigore arboris anterioris, pullulabit in arbore ignobilem, & aliquando non pullulabit omnino, aliquando non generatur, inde nisi fungus uel gramen, uel aliqua alia herba. Est & alius modus ualde multiplex, sicut certissime probare poterit omnis qui experitur in talibus, ferè enim quotienscūq; una & eadem arbor fructifera in stipite absciditur, & relinquitur inferior pars in terra, sicut fit insitione, & ipsi eiusdem arboris fragū in eodem trunco

inferitur, sunt inde plantæ quarum fructus nec in figura, nec in sapore cum precedentibus conueniunt. Cum autem inferuntur fraga prunorum & cinorum, uel aliorum fructuum ossa habentia in truncum salicis, efficiuntur fructus sine ossibus. Similiter autem si inferitur uitis in cerasum, uel pirum in malum, inueniuntur uine matura, quædo cerasa sunt matura, uel pira uel mala. Et tales mutationes ualde mirabiles ostendunt se his qui diuersas studiose faciunt insitiones. Item exceptum est, quod cum inferuntur fraga perfici in pruni & cuni truncum siue stipitem, quod mutantur ambarum arborum nature, & sunt escula maiora & meliora quam sint alia escula. Et uideatur hoc fieri sicut in animalibus ex permixtione uicinatorum seminum in complexione, sicut asini & equi, ex quibus generantur muli, uel burdones. Non enim longe est perfcus à pruno uel cino, et ideo cum utraq; arbor rare substantia sit, utraq; uirtutem suam communicat alteri: & sic ex permixtis uirtutibus in loco insitionis fit succus permixtarum uirtutum, & ideo tunc illud quod per locum insitionis excolitur, permutatur paulatim in speciem aliam quæ est esculus arbor, quia per figuram foliorum agnoscitur, quod illa uicinitatis aliquid habet ad cinum & prunum, & ossa quæ sunt in esculis etiam hanc indicant uicinitatem. Est autem præter dictas mutationes illa quæ de syluestri fit domestica: & domestica fit syluestris, cuius modum & causam oportet cognoscere, est enim de exploratis, quod omnis planta domestica subtractione cultu fit syluestris: & omnis syluestris domesticatur, quando cultus adhibetur, syluestres autem habent plures fructus quam domestica, sed habent eos minores & aciores, sed domestica habent dulciores & pauciores, uel minus acros, uel maiores fructus quam syluestres. Modus autem quomodo domestica fit syluestris, est per subtractionem cultus, & loci indurationem & arefactionem, & præcipue si ad sabulositatem & arenositatem conuertatur; tunc enim durities non per-

mittit ad plantas distillare uel euaporare nutrimentum sufficiens. Arefactio autem priuabit nutrimentum, sed sabulositas & arenositas undiq; facit euaporare, & non constabit uapor circa radices plantarum, & tunc macra & spinosae & plurimorum fructuum efficiuntur. Multitudo autem fructus earum ex siccitate prouenit, quia siccitas est causa diuisionis in multa & parua. Undiq; enim intercipitur nutrimentale humidum sicco, & ideo in multa parua diuiditur. Efficiuntur autem fructus acerbis uel amaris, propter hoc quod tale nutrimentum non obedit digestionis, & plantae, sicut facit humidum domesticationis. Modus autem quo syluestres conuertuntur in domesticas ualde est multiplex, & uersatur circa tria in genere, hoc est circa naturam plantarum, & circa umbras & soles ipsarum quoniam oportet fundum ipsum conuerti & impinguare & solidum & continuu facere, & tamen non depresso, ita ut superius distillantes bonitates recipere non possit, & inferius ex terra uaporantes circa radices plantarum continere, & oportet coagere cum ex tali terra que cum stillicidijs in se fluentibus infundatur, & cum uaporatione moueatur apte, & congrue contemperetur ad coactionem plantarum. Circa plantas autem est consideratio, putando eas per abscissionem spinarum superfluarum, et per insitionem, & aliam quando per unguenta & emolitione eius, & per diuisionem corticis eius, ut ingrossari possit planta, & sit insitio si debeat syluestris domesticari. Oportet quod frugum eiusdem inseratur stipite suo, aut frugum alterius, quae etiam est syluestris, aut fragra eiusdem in stipite suo manentia ultra medullam ex transuerso incidatur & reliquantur, quia talis modus incisionis uel insitione generatus ex soliditate sua magis retinet calorem naturalem, sicut lacis calefactus magis & maiorem diuturnum habet calorem quam lignum. Humor etiam diutius stat in tali nodo propter tortuositatem & etiam propter soliditatem ipsius, & ideo melius ibi digeritur, & fructus fiunt tunc dulciores & conuenientiores, & iste est precipuus modus domesticationis.

sticationis. Considerationem autem diligentissimā oportet habere in umbris & solibus talium locorum: quoniam quedam non bene conualescunt, nisi in umbra, ut cucurbita: & quedam non nisi in sole calido uehementer sicut uitis & ita est de alijs multis, et ideo ista sunt ualde attendēda. Quod autē maiores & pauciores sunt fructus domesticarum quam syluestrium plantarum, causa est humidi nutrimenti abundantia, quod non est tot diuisionam, eo quod non in tantū habet in siccis & acutis ptibus sic ut nutrimentū syluestriū. & ideo cum sit abundans non facile diuisibilē in pauciora diuiditur, sed in ea in qua diuiditur abundantius fluit, & ideo magis crescunt & ingrossantur fructus earum.

De alterationis diuersitate quæ fit in planta. Cap. viii.

Secundum autem generationis diuersitatem, notanda etiā occurrit alterationis diuersitas in plantis, eo quod ipsa frequenter causat generationis diuersitatem. Hoc traditum est ab antiquis, eo quod arbor ipsa loci frigidityte & antiquitate nimis induratur, & cōpatum habet corticem, qui concludit poros & radices per quas nutrimentum trahere debet, & si scindatur radix eius, præcipue in ramis maioribus, ipsius radices & scissuræ illi lapis immittatur, ne iterato concludatur et consolidetur, incipit trahere nutrimentum per poros partium scissuræ & iterato uegetari & fructificare, & sic de sterili arbore fit aliquando fertilis. Amplius, quedam arbores dicuntur masculi & quedam femine, & discernuntur in hoc quia prius pullulat masculus propter calidum fortius mouens, quod folia plantæ strictiora & minora sunt propter siccitatem masculi, & hoc habet in plantis pluribus locum, sed maxime in palmis, in quibus rami uel puluis masculi positus super ramos femine confert ad generationem & maturationem fructuū. Idem est si plantetur masculus iuxta feminam, & odor masculi, beneficio uenti, deferatur ad feminam. Similiter si arbores maiorum

punico=

punicorum plantentur iuxta oliuas, ut uapor paulatim ad oliuas feratur conseruiat. Et per oppositum, quedam plantarum conlocatae ad alias impediunt generationem & fructificationem earum, sicut corulus impedit uitam, & nux impedit omnes alias plantas, propter pernobilem amaritudinem quam habet. Ex alteratione etiam aliquando contingit, quod tantum aliquando ex frigiditate, uel alia causa alteratur planta, quod mutatur omnino in aliam speciem, aut secundum totum, aut secundum partem, & hoc modo dicitur calamentum mutari in mentam. Aliquando similiter triticum in siliginem mutatur, & e converso siligo in triticum aliquando mutatur. Causa autem maxima alterationum istarum est per cultum, nutrimentum, & locum. Amygdala enim & malagranata, & quedam aliae plantae à sua malicia mutantur per culturam. Malagranata etiam stercore porcino simata, & dulci aqua frigida irrigata meliora redduntur. Amygdalae autem praecipue quando humidum superabundat, si clavis infigatur, uel etiam perforentur in aliquot locis, ut distillet superfluum humidum cum gummi, quod multum tempore emittunt post confixionem & perforationem & emundationem. Sic etiam plantae quae uermiculosos faciunt fructus curantur, sed rustici non faciunt nisi unum foramen per quod distillat superfluum, quod cum emittitur, aliud melius digeritur à calore naturali. Hoc etiam artificio plantae syluestres in hortenses quandoque conuertuntur, educitur enim ex ipsis humidum in cultum, & per cultum alterantur corpora eorum, sicut per medicinam, & tunc ad aliam complexionem conuertuntur, sicut medicus ducit humorem in alium, & postea praebet nutrimentum bonum & alterantibus studet ad generationem sanguinis boni. Locus tamen & labor industrius in cultu multum conferunt, maxime ad tales alterationes, & praecipue tempore anni in quo fuerint huiusmodi plantationes & alterationes. Quedam enim plantarum non emendantur nisi transplantentur, tempus autem in quo praecipue plantantur est in principio ueris, cum tota adhuc uirtus est in planta, tunc enim transplan-

G tate con=

tata conualefcit, quia iam in fe attraxit humorē & calorem, ex quibus pullulat, & adhuc frigore inuatur, ne humidum et calidum eū euaneſcat per euaporationem. Plantæ autem plantantur in hyeme & melius conualeſcunt quam ea quæ facta ſunt in uere. In hyeme enim calidum naturale clauſum eſt in ſeminibus plantæ, & calidum quod eſt in uisceribus terre concluſum, facit euaporare ſubtile humidum ad radicem, quæ in locum calidum terræ inſigitur, & ex his planta conualeſcit. Nam uiscera terræ magis ſunt calida in hyeme, quàm in aliquo alio tempore anni. Cum autem uiscera plantæ ſic humido uaporante implentur, impinguantur ſole appropinquante, emittunt & conualeſcunt. Et hæc eſt cauſa, quod plantatio quæ ſi profunde in uiscera terræ optime conualeſcit in hyeme. In autumno autem pauſſime plantantur, quia tunc humor euaporauit, & calor, & terra redacta eſt in cinerem frigidum per calorem æſtatis, & ſic nec ex parte terræ, nec ex parte plantæ conualeſcere poteſt. In æſtate autem generaliter mala eſt plātatio, propter calidum & ſiccum, quod euaneſcere facit uigores plantarum, præcipue tamen in canero & leone, poſtquam oritur ſtella quæ dicitur canicula, quia tunc tempus calidiſſimum et ſicciſſimū eſt, & ſunt corpora plantarum erida, & uirtutes earum debiles, & terra priuata humido nutrimentali. In paucis tamen locis, quæ tanto ſeruore temperantur, ſi plātatio in tempore dicto, ſicut locus qui eſt totus ad ſepiētriones frigidiffimus ualde & humidus.

De diuerſitate plantarum ſumpta iuxta diuerſam fructuum productionem,
Caput IX.



Vadam arbores uno anno fructificant, in alio reſciuntur, & tales ſunt multe, præcipue magne arbores, ſicut olue & piri ficulneæ, quæ licet ramos producant quibus

bus cooperiuntur & dilatantur, tamen in ramis illis non est abundans fructus, nisi alterius fructus anni, eo quod multitudo ramorum trahit succum ad sui nutrimentum, & non permittit pallulare fructum nisi in tertio anno cum redundat humor in arborcm. Sicut etiam magna animalia non sunt tam fecunda ut parua. Atque etiam quaedam iuuentute steriliores sunt quam in perfecta etate, quod ideo contingit quod succus totus transit in nutrimentum ipsorum, cum autem ieterit nutrimentum tunc melius fructificant, sicut uitis que uetula est meliores & utiliores producit uuas quam iuuenis, dummodo ad extremam & decrepitam non peruenit senectutem. Illa enim in omnibus fit sterilis, propter siccum & frigidum quod abundat in ea, quaedam autem e contrario melius fructificant in iuuentute quam in senectute, sicut amygdali, piri. Harum autem plantarum natura perfecta est calida & humida in iuuentute, ex quibus qualitatibus post iuuentutem mutantur in frigidum & siccum, & ideo primum tunc steriles efficiuntur, deinde in totum arida, & hoc plus patiuntur amygdali, quam piri.

De his quibus indiget omnis planta, Caput x.



Q^uoniam omnis planta tota in omnibus partibus quatuor indiget præcipue, sicut & animal, seminali scilicet humido terminato, loco conuenienti, & aqua siue humore temperato nutriente, & aëre sibi consimili & proportionali. Cum quatuor perfecta & cōuenientia fuerint, optime nascetur planta & crescit. Si autem hæc uel aliquid eorum defuerit ab ea, debilitatur, generatio & incrementum plantæ proportionaliter illi quod deest.

De his

De his quæ faciunt ad plantæ generationem & augmentum, Caput XI.

Plante autem & quicquid vegetatur & crescit radicibus infixum terræ, indiget uno uel pluribus de quinq; rebus, hæc autem sunt scilicet semen, putredo, humor, aqua, plantatio, quæ est plantæ super plantam nasci aliam. Horum autem quinq; primum est quod in se uirtutem habet formatiuam plantæ, & est in ipso materia & efficiens simul. Secundum autem uirtutem informatiuam accipit à uirtute stellarum. Humor autem qui cōmixtus est ex elementis, cibus est & materia tñi generationis quā generate plantæ, habet enim planta digestionem depuratam quā trahit de terræ. Aqua autem sicut in communibus nutrimentis non deseruit, nisi in hoc quod est alimenti uehiculū, nec fluxum haberet ad partes cibus, nisi per modum aque, innutribilis enim existens in se ipsa nutriri facit cibum ad membrum, & ad partes illas quæ nutriuntur. Plantatio autem super plantam alia, est quæ fit per infusionem, & cōualescit, propter res quod planta interius habens humorem putridum, uirtute solis exhalat illum. Et sic planta infixa aliæ plantæ in figura differens ab ipsa. Sunt igitur tria istorum generationi plantæ deferuentia, duo autem cōferunt, semen & putredo, & plantatio in planta alia, quod enim generationi confert, oportet quod habeat formans in se aliquid, & ad speciem plantæ deducens, hoc autem est formatiuum à uirtute inferiori, sicut semen à uirtute uniuersali superioriori, sicut putredo. Et hæc quidem duo simpliciter conferunt ad plantæ generationem. Tertium autem est, quod est plantatio plantæ in planta alia, confert similiter ad generationem & transmutationem ipsius in figura. Similiter autem quæ conferunt ad cibū plantæ diuersitate habent duplicem, quoniam huiusmodi est ut cibi substantia, aqua autem confert proprium alium motum ad partes nutritas. Sunt autem quædam adhuc quæ uidentur conferre plantarū generationem

generationi & incremento, de quibus etiam supra est facta mentio, sicut locus conueniens, & aer connaturalis, sed hæc faciunt aliquid ad esse plantæ, sed ad bene esse non conferunt, nisi ratione seminis, aut putredinis, aut humoris, quæ sunt temperata ex loco & aëre plantæ connaturalibus & conuenientibus. Idem autem aer qui uenit in plantæ constitutionem, inuiscatur humore seminis & putredinis & plantæ, sicut fit etiam in animalibus. Plantæ etiam uegetantur in calido tempore in umbra noctis, & lignescunt ad solis feruorem, eoq; calore & humore per euaporationem destituuntur, in hyeme etiam quando constringuntur plantæ exterius, inueniuntur intus succosæ ualde magis quam in æstate. Accidens autem quod multum uariat & mutat naturam plantarum, est cultus hominis. Et hoc est ideo quod plantæ in genere arborum, iuxta elementa sunt, & elementorum uires & materię multum habentes: ideo quod mutat qualitatem terre & humoris in qua sita est planta, multum mutat naturam plantæ.

De putredine siue letamine, & stercoratione & cibo plantarum, Caput XII.

Icet natura sola sit principium rerum naturalium, tamen in omnibus his quorum substantia transmutabilis, multum inuatur arte & cultu, ut in melius uel peius transmutetur. Hac igitur consideratione loquamur de agris & eorum cultu, & hortis, & pomarijs, & ceteris per quæ fit cultus plantarum, & remouentur à syluestri natura, ad, ut sit dicam, domesticationem. Sunt autem maxime quatuor quæ circa hæc consideranda sunt, cibus uidelicet, & aratio siue fossa, seminatio & insitio. Circa hæc student omnes agricultores præcipue. Cibus autem non est aliquid simplex elementum, oportet igitur cibum plantarum compositum esse, si enim simplici planta nutrire, ex illo constaret, quod omnino irrationabile esset.

Atq; cibus non est aliquis qui ad mēbra plantæ perducitur per se possit, propter quod indiget planta rigato cibo, ut hoc conferatur rigatione, quod animalibus confertur per potum, qui vehiculum est cibi decurrentis ad membrū. Cibus igitur proprius plantarum est aliquod cōmixtum humidum, res autem cōmixta humida integritate & salute consistens, non est in via mutationis ad aliquid, sed saluatur in se ipsa, propter quod nihil nutritur à nutrimento in sua specie & in sua natura constituto, sed potius ab eo quod iam ante corruptum est, & desinit ab esse proprio, aut est in via ad aliquid. Propter quod animalibus creatus est uenter, in quo cibus corrumpitur & extrahitur ab eo id quod nutrit animalis humidum nutrimentale ipsa enim extractio humidū ipsius quod attrahitur in cibum, corruptio est eius quod nutrit quod in ventrem ingestum est per masticationem, omnis enim corruptio quæ est secundum naturam sic fit, quod extrahitur humidū, & remanet siccum decidens in cinerē, sicut cito incineratur omne stercus animalium. Cum igitur ventrē non habeant plantæ, sed terra pro ventre utantur, oportet in terra circa plantas esse putrescentem cibum plantæ, & tunc attrahit à radicibus eius humidum cibum. Hæc autem probant opera rusticorum, qui stercore, quod letamen uocant, prope omnium plantarum fumant genera, quod non ad radices distillant, nisi rigatione pluvij aut aquæ desuper fusæ. Hoc autem letamen in genere duos habet humores, unum quidem supenatantem et æreum, qui non facile est incorporabilis plantæ, sed potius attrahitur & inciditur à sole. Alterum autem habet adiutivū & immixtum subtili sicco quod est in ipso, & hoc est uere cibus plantarū. Plantæ generaliter corpus siccus & durus est quā corpus animalium, & tali indigent cibo qui in terræ stitute indurabilis & siccabilis sit. Ultimus enim cibus nutrens similis est nutrito. Iudicatur autem & hoc ab accidente plantarum, quæ enim nimis purgæ & humido nutriuntur, letamen plantis adferri putredines, ex letamine autem quod coadunata

etiam suo terrestri habet humiditatem & bonam permutationem cō-
 ualescunt & roborantur & fructus proferunt cognitos & utiles. fru-
 ctus enim eorum saporem ex letamine & substantia eorum contrahunt.
 Atque si nimis humidum & pingue sit letamen à quo iam planta attra-
 hit humiditatem plurimam, & luxuriabit in folijs & mollibus ramu-
 sculis infocundis, & non sufficienter profert fructum, & ille quē
 profert erit aquosus & inconueniens, hoc ostendunt omnes sylue-
 stres plantę, quę nutrimentum siccum habent & terrestre, fructus
 enim omnium illarum calidiores & sicciores sunt & fortiores odoris quā
 hortensium, quę cibantur letamine aquoso. Ad hoc autem in philoso-
 phicis dictum est, fructus creari ex humido uentoso, hoc autem non
 est nisi quod terrestritati fortissime commixtum est. Hoc igitur est
 maxime quod cibatur & mutat sapores & modos fructuum. Propter
 quod sterces animi non aquaticarum, & precipue columbarum præ-
 cipit Palladius permisceri cum letamine, sterces enim hoc est feruens
 ualde, & suo calore in letamine superfluum consumit humiditatem,
 & tunc magis conuenit plantarum cibo, ideo etiam asinum, equi-
 num uel ouium & caprarum sterces à rusticis sumitur. Hęc enim diuersa
 siccitas habet egestionem, & per inductas rationes magis congruit
 letamini plantarum, hac de causa precipitur caueri à stercore por-
 cino, quod tam ex specie quā ex accidente quia siccum non est, plan-
 tis affert magnū nocumentum. Sic igitur in cōmuni tractatione letami-
 num oportet quod ipsum letamen sit in uia corruptionis, potius quā
 sit iam incineratum et ad terrestritatem deductum, & calore naturali de-
 stitutum. Nā optime cōgruit, quū iam per putrefactionem resudat ad su-
 perficiem suam naturale humidum, cum enim hoc humidum nutriat quod diu
 hoc ad radices plantarum resudat, tādum debitum plantis præbet nu-
 trimentum, quia propter nec recens letamen omnino queritur, nec quod
 iam uetustate incineratum existit, quod est anni uel tres partes an-
 ni habens optimum esse pronuntiatur à cultoribus plantarum, recens
 enim adhuc in se claudit uaporem, uetustum aut in toto amisit in ad-

minia

ministrando humorē suum in nutrimentū, propter q̄ etiam peritior
 res medicorum, consumptorū habitacula præcipiūt sub tali letamine
 fieri, fomentum enim huius letaminis à fumigatione sua aliquid car
 nibus eorum p̄ poros præbet humectationis. Hoc etiā ostendūt in
 dustræ alchimorū, qui optimas quasq; maturaciones in clibano leta
 minis præcipiūt fieri, vocantes clibanū letaminis calorē q̄ cum tali
 de quo dictū est humido expirat ad summi superficiem. Atq; etiam sicco
 letamine posito, & non bene corrupto videmus ardescere multas
 plantarum, nisi multo prohibeātur humido aqueo p̄ cōtinuationem
 irrigationis, q̄ siccus calor qui ex tali fimo generatur circa radices
 intendit in tales radices plantæ, & exiccat & in ariditatem con
 uertit totam plantam. Propter quod ex omnibus his colligitur le
 tamen, quod inuitat plantæ habitudinē esse, debere in d̄positioni
 bus inductis. Sic igitur administratū letamen mutat plātæ naturā,
 plusq̄ cibus mutat animal quod cibatur ex illo: animal enim magis
 diuersum est & longius à se attrahit cibū quā plantæ, ideo cum le
 tamen hoc sit cibus plātæ, & uicinior & similior sit cibus q̄ animali,
 citius mutabitur de cibo quam aliquod animalū. Iam quoq; sæpius
 habitum est q̄ plantæ terram habet pro uētre, & in terra primū ci
 bus plantæ recipit assimilationē, p̄pter quod attrahit ad se plātārū
 mutationem: uirtutes enim terræ præcipue sunt uirtutes plantarū,
 & secundum terræ mutationē erit & plātārum mutatio. Nec est al
 liquis modus ita cōueniens ad mutandum plātæ naturam sicut per
 letamen & letaminis cōtemperationem. Iam enim ostēdimus quod
 in planta non sunt tot numero digestionēs sicut in animali. Scimus
 autem quod similem in corpore facilius est mutatio, q̄ heterogeni
 orum, & ideo uidemus quasdā plantarum ex cibo non solum mutari
 ad alter. m̄ modum saporis fructuum suorum, sed etiam frequenter
 transcurrunt in alias species, ex tenuitate cibi & letaminis, sicut sup̄ius
 de tritico & siligine dictum est. Hoc autē ostendit artis industria,
 quoniam si quis in arbore p̄foratis ramis qui sunt iuxta ramifculos
 à quibus

à quibus dependent fructus, impleat pulueribus optime contritis foramina, ita quod pulueres ipse sint ex speciebus multum aromaticis, & obstruatur ab utraq; parte optime cum cera forti & spissa, fructus erunt in sapore aromatico sapore pulueris obtinentes, qui tamen ad fructuum substantiam non perueniunt, nisi per euaporationem. Oportet igitur quod multo magis letamen cuius humor ingreditur per substantiam corporis plantæ & fructuum, mutet naturalem humiditatem ipsius, oportet enim diligenter cauere ne letamē congestum super terram sumet ad flores & fructus, aut etiam ad gemmas plantarum, fumus enim ille siccus intensus & foetidus est, & per poros ad interiora plantarum ingreditur, & plus corrumpit quàm malus cibus, sicut & animalium corpora corrumpunt huius fumi & odores. Hoc autem iam experti sumus in uitis super quibus sarmenta & paleæ, & onorum testæ fumabāt ad gemmas, flores & fructus, & multe ex his perierunt omnino, postea aruit & exiccatum est, talis enim fumus maxime nocet his quæ rare substantiæ sunt plantis, sicut est uitis: sic etiam plus nocet uiris quàm foeminis, propter raritatem corporis uirilis, fumus enim hic indigestus non alteratus pertingit intra corpus, & ideo corrumpit naturas tam plantarum quàm animalium, propter quod id quod ex herbis plantarum eradicatum est longius proijci ab ipsis debet, ne corruptionis foetore plantis afferat nocumentū. Oportet etiam nos non latere ex eadem causa paludes ab agricultoribus fieri debere, sicca enim palea, sarmenta & stercora non aperte maturantur, sed potius corrumpuntur & corrumpunt per fumum suum quem emittunt, humefacta autem laxius resolvuntur in superficiebus, & efficiuntur molliora, per quorum spiritus giositatem exudet ad superficiē naturale humidum, & maturetur in plantarum conueniens nutrimentum. Huius autem indicium est quod plantæ etiam sicut & animalia attrahunt humidum, & cibi sui uehiculum, & tamen non potent sicut & animalia, paludalis enim potus earum permiscetur letamini, qui fecit
H ipsum

ipsum in plantis undiq; florere, & ipsarū partes infundendo nutrī
re et mutare. Nec obstat qd' uidemus quosdā rusticorum præparare
loca cultū suorum per intensos stipites & ligna, & tunc terram
melius fructificare in plantis, hoc enim non fit propter plantas sed
ad temperandum duplicem terre maliciam, friget enim terra &
ex frigida sterilitate, hoc modo aliquid caloris accipit, quo semina
in ea iactata melius conualescant. Similiter autem & humida nimis,
& ex hoc fecunda intentione & immixto cinere, in cuius poris a
qua non tenetur, & contrahit siccitatem temperatam, per quam ma
gis habilis efficitur ad fructificandum. Ex omnibus igitur prædictis
constat letamen unum esse eorum quæ præcipue plantam mutant à
sylvestritate, ut ita loquar, in domesticationem. Sylvestritas enim
plante nihil aliud est nisi neglectus cultus eius, & sapor fructus e
ius, qui usibus humanis non competit. Et domestica dicitur, quando
per cultum eius sapor ad delectationem & utilitatem hominum re
digitur hoc autem fieri per letamē probatur, & ea quæ in animali
bus accidunt, quæcumq; enim animalia sunt domestica plurimū sunt
cana propter nutrimenti abundantiam, & multarum sunt qualitātū,
& diversorum colorum, propter nutrimenti diversitatem, & sapor
carnium earum alius quā sylvestrium. Oportet igitur proportiona
biliter hoc etiam in plātis accidere ex nutrimenti administratione,
Palladius autem refert, quod stercoreum congestio locum suum tene
re debet, qui abundet humore, & propter odoris horrēda à pra
torij conuertatur aspectu. Humor abundans hic præstabit stercorei
ut si qua insunt spinarū semina putrescant. Stercus asinorum primū
est maxime hortis, deinde ovium & caprinū, & iumentorum, por
cinum uero pessimum, cineres optimi, sed columbinum ferui dissimū,
cæterarumq; annuum satis utile, excepto palustr. ū. Cassius uero scri
bū, ut refert Varro, columbinum esse præcipuum, post ipsum ster
cus hominis, tertio caprinum, ovium, & asininū, equinū nō bonū
nisi prati. Stercus quod anno requiescit satis est utile, nec herbas

creat, si uetusius est minus proderit, pratis uero recentia stercorea proderunt ad ubertatem herbarum. Et maris purgamenta si aquis dulcibus eluantur mixta uicem stercoreis adhibebunt. Varro scripsit, quod prope uillam duo debent esse sterquilinia, uidelicet bifariam diuisa, & quod in uno nouum est debet dimitti donec maturescat, alterum uetus in agrum tolli. Necnon illud sterquilinium est melius, cuius latera & summum uirgis ac frondibus à sole est defensum, non enim succus quem querit terra per solem exugi oportet. Itaque periti procurant, ut aqua in sterquilinium fluat, quæ maxime retinet succus. Stercorandi sunt agri spissius in colle, in campo rarior, cum luna minuitur, quæ res herbis si seruetur proficiet. Vni iugero asserit Columella 24. stercoreis carpenta sufficere, in plano uero 18. Rustici tamen nostri duplum ponunt & ultra, sed Tusci non tantum. Item cumuli tot dissipandi sunt quot ea die poterunt exari, ne stercorea exiccata nil profint. Eljciuntur quidem letamina quæ libet parte hyemis, sed si tempore suo ejci non possunt, antequam seras more seminis per agros puluerem stercoreis sparge uel caprinum manu projice, & terram sarculis misce. Nec proderit nimium stercoreare uno tempore, sed frequenter & modice. & ger aquosus plus stercoreis querit, siccus minus, sed si letaminis copia desit, hoc pro stercore optime cedit, ut sabulosis locis cretam & argillam spargas, cretosis & nimium spissis sabulum, hoc etiam & fetigetibus proficit, & uineas pulcherrimas reddit. Nam letamen in uineis uini consuevit uitare saporem. Vel seminantur lupini in agris cultis & uineis in mense Augusti, & in mense Aprilis uel Maij, & cum ad debitum quasi augmentum peruenerint euertantur, sic enim loco letaminis uineam & terram impinguant. Et duobus annis ad plus ipsorum durat in eis pinguedo. In partibus autem Tusciæ cultores experti, lupinos serunt tempore quo seminantur rapæ in terris cultis uel stipulis bis arat, uidelicet circa tres corbes in iugero, et terra operitur, deinde tempore octobris ligonibus incidit, &

in sulcis ponunt, & ibidem seminantes frumentum aratur semenz operiunt, & deinde bonum frumentum colligunt estate sequenti. Mediolan. uero semināt rancias spissas, & cum creuerint eas euerunt. Alij autem serunt gralegam & euertunt cum ad substantie uenerit complementū. Alij uero terras quæ sua macritudine parū aut nihil fructificant, ad multam fertilitatem cum irrigatione hoc modo reducunt, scilicet quod extracta de campis segete, inducūt in agros aquam per sulcos uel riuiolos ordinatos, est autem melius si aqua est turbida de torrente, quæ super faciem agri terram nouam inducat, & replendo sulcos agrum aquat, & præcipue si fuerit ager cretosus, nam si solutus fuerit sufficit aqua clara. Prodest autem maxime talis irrigatio in estate cum aqua in agris steterit sub radijs solis feruentis, hoc enim modo talis ager plurimum impingnatur. Item dicunt Mediolan. & omnes communiter hoc obseruant, quod ubi linum feri debet, lupinos quos ibi seminauerant euertunt, non solum si iam magni sunt, sed etiam si tunc nati sunt, & ualde terram fecundant, & plus dicunt si aliquibus diebus mollificetur in aqua, ita quod bonum gramen emittant & manu serant, & terram arant, eam ualde fecundant. Item dicunt de cineribus, & ideo finum comburunt & manu seminant, & euertunt cum lini, uel cuius uis alterius semine. Ponendum est autem letamen in campis, uincis, hortis, & arboribus, præcipue à Calend. septembris per omnes menses sequentes usq; ad mensem maij subsequenter, & in tempore magni gelus super iam natis segetibus potest congrue spargi, poterit etiam sequentibus mensibus in terra spargi, si eodem de terra operiatur & uincis, & arboribus si fuerit ualde maturum. Et est sciendum quod ex uno currupalearum quinq; & sex currus letaminis fiunt, & pro sex annis optime una stercoreis sparsio terram fecundat. Item notandum est quod letamen absq; animalibus fit hoc modo, ut scilicet quod in hyeme paleæ uel alia stramenta projiciuntur in uis lutosis, curijs uel fossatis, & quibuscumq; foueis, & cum ibi per quindecim

decim dies uel circa iacuerint, & fuerint conculcata sepeq; pluuijs madescente coaceruantur, & ad magnum letaminis montem latum, ut pluuiarum aquas recipiat post dies aliquot deferuntur, & cum sic per totam aestatem steterit, spargantur in agris.

De aqua quæ conuenit maturitati letaminis, & nutrimento plantarum,
Caput XIII.



Qua paludalis conuenienter letamen, quod est nutrimentum plantarum, maturat, & plantas irrigat, aqua enim fluente non bene maturatur, nec irrigatur planta, quoniam illa quidem frigiditate sua constringit poros letaminis ne expiret in eo calidum aut humidum naturale ad superficiem, similiter autem eadem frigiditate constringit poros radicum, & non sinit eos aperiri in tractum nutrimenti, & quod est circa radices leuat & ducit, et ideo fortiter syluestribus aquis paucas, aut nullas uidemus nasci plantas. Terrestritas enim fundi leuat & e ducitur, nec remanet nisi lapis durus & frigidus in quo planta nasci uel nutriri non potest. Aqua autem stans fixum in se recipit solis radium, & calefit illo calore quo adiuvat ad letaminis maturationem & radicum apertionem, & ad pullulationem seminum, & maxime aqua quæ descendit in pluuijs & roribus ex nubibus super terram. Hæc est enim calida & uaporabilis, & ideo palus ex illa conuenientissime fit iuxta letamen, quia calore maturat, & uaporabilitate commiscet subtili commixtione, confert ei lenitatem & motum quibus eleuari possit in uenas & poros organicos plantarum. Si autem aqua lacunalis uel fontium adhibetur in loco paludis, oportet quod stet sub radio solis priusquam letamen iniiciatur, & commisceatur cum ea fortiter, & moueatur ita quod ex motu spumam faciat, & uaporabilis fiat, propter dictam causam. Aqua autem grandinam & niuem nisi diu stet antequam fluat ad plantas, plurimum sui frigiditate

plantis nocumentum aufert, est enim in ea frigiditas radices morā
 tificans, & humidum letaminis congelans, & hoc nocumētum non
 de facili aufertur. Cuius signum est quod terræ nimis & parum pro-
 ferunt germinis, & quod proferunt est immaturum, & licet calce-
 fiat aliquando aqua per solem, tamen nocumentum quod intulit pri-
 ma frigiditate non aufertur, quia hoc fuit mortificatiuum, hoc autē
 uidemus in terris grandinatis & agris, quoniam infra tres annos
 uix postea reducuntur ad cultum. Sed aqua pluuia licet sit frigida,
 tamen excellentiam frigoris non habet, & habet caliditatem ex
 nube ex qua descendit & uaporabilitatem. Ros autem est calidus
 & humidus, & dulcis, qui facile mouetur ad membra plantarum.
 Palus de qua dictum est, non erit sita iuxta plantas prope, quonia-
 am nimis fusā planta impeditur à fructu conuenienti, sed mediocri-
 ter infusa conualefcit. Propter quod letamen conuenienter in altio-
 ri parte horti uel agri tenetur, ut ipsius nutrimentum & uirtus cum
 pluuia descendente ad plantarum deducatur radices, ubi calor ter-
 re fumat in radices arborum & aliarum plantarum, & sugitur hu-
 mor eius naturali calore radicum. Et hæc est causa, quod aquæ pu-
 re cum impetu fluentes steriles efficiant terras quas influunt. A-
 quæ autem lacunose & paludose faciunt eas pingues, & præcipue
 quando ex pluuijs accipiunt incrementum. Propter quod exeunt
 ab aluo in agros, sicut Nilus qui crescit in pluuijs sub æquinoctiali
 descendenti bus, quæ sunt calidæ & humide, & ideo optime irrigat
 fata Aegyptiorum. Alia autem aqua grauis est potius descendens à
 partibus letaminis & à radicibus plantarum qua uaporetur in
 ipsas, & ideo non est adeò conueniens in lacunis in quibus stetit.
 Aqua medicamen accipit ex continuo radio solis, & ideo putrea
 scentes in eius fundo herbe quasi in naturā conuertuntur letaminis.
 Propter quod etiam lutum de fundo talium lacunarū paludaliū acce-
 ptū pingue agrū & fecundū facit, habēs effectū letaminis in ipso.

Omni. m.

Om̃ino autē conuenientissimū plantarū nutrimentum est letamen in plauide temperata humiditate putrefactū, & ex cōuenienti stercore commixtū, propter causas inductas. Sed aqua salsa præ omnibus cauēda est, ne adñsccatur letamini aut plātis, quoniā illa exiccata est & adustius & omnino cōtraria plantarū pullulatiōi. Licet enim acredo salis fracta sit in humido aqueo, cū terrore tamē solis conuertitur in acredinē & amaritudinem, & tale nutrimentum omnino plātē refugit, & aliā habet in se similiter siccitatē potentialē ex combusta salis terreſtreitate, et ex hoc cōtrahit poros plantarum & obturat & exicat letamen ita quod suū humidū non ualet exudare in plantarum cibatione. Adhuc autem aque metallo- rum quæ p̃ mineras decurrunt aut fistulas metallinas diu aut longe fluxerunt sunt inconueniētes, quoniā ex natura metalli corrodunt potius q̃ infundant interiora letaminis & plantarū. Aqua aut matu- rans letamen est aqua paludalis ex pluuijs & roribus congrega- ta, si illa non habetur, sit aqua lacunalis sub sole diu calefacta, et for- titer mota, si autem nec illa parata est, sit aqua de fontibus aut flu- minibus aut puteis hausta, fortiter cōmixta, & sub sole calefacta.

De utilitatibus arationum & fossio- num, Cap. XIII.

A Rationes autem & fossiones in genere quatuor conscri-
uitates, quarū una est terræ apertio, secunda est eius-
dem adæquatio, tertia est agri commixtio, quarta eius dē
comminutio. Terram autem aperiri necesse est, quia aliter nec se-
mina in se iacta recipit, nec ea quæ in se habet sufficienter expirās
amittit & ideo aperiri oportet terrā in omni mutatione plantarum
quādo de syluestreitate ut ita loquamur, in domesticationē mutantur
soliditas quippe sufficiei per pondus ipsum terræ & conculcationē
hominum & bestiarum, adhuc aut per imbrum ictus & fluxum
facta

facta impedit, ne aliquid in se ab exteriori recipiat, aut etiā aliquid ab interioribus suis emittat, unde plāta in ea fixa aut germinet aut mutetur à dīspōsitione una in aliam, propter quod proscindī terrā oportet, aut aratro aut fossorio. Similiter autem nisi fuerit adaequata non bene mutabit plantā, sed potius cōtrarie in ea dīspōsitiones forte corrumpunt: cum enim id quod est cōtinne in superficie terre suo pondere & fluxu humoris tendat ad inferius in terrae viscera, est terra inferius ad duos uel ad tres pedes magis pinguis quam in superficie, & ideo inferiorem superius eleuari, & superiorem deprimi per arationem & fossionē oportet, ut adaequata uirtus sua in una uirtute unita moueat plantarū radices & fecundet. Nec non beneficium radiorum solis tangit primitus superficiē, sed cum non sit retinēs aliquid euanesceat, & propter redundantia cōseruatur in inferiori parte terre. Et ad hoc q̄ adaequatur quando inferius superius ponitur & ecduerso, & multae aliæ adeptiones terre uirtutum fiūt per fossionem terre & arationem. Commixtio etiam necessaria est quoniā nisi partes qualibet sibi pmixtae sint, non erit ipsa proprius locus generatiōis plantarum, plantae autē quae sunt cōmixtarū uirtutum locū suae generatiōis querūt esse cōmixtum, nec potest fieri quod ager sit equaliter humidus, & equaliter siccus, & equaliter frigidus, & equaliter calidus, nisi fiat hoc beneficio fossionē & arationū. Comminutio etiam est necessaria propter subtilitatē ipsius, nisi enim comminuetur non subtiliabitur, & nisi subtilietur nō erit conueniens cibus & materia plantarū. Propter q̄ praecipit agriculator Palladius quod non aretur tempore quo terra lufosa est, q̄a tunc in puluerem non reducitur, nec est tempus congruū arationum tēpus eximie siccitatis, quia tunc glebae magnae nō diuiduntur, sed potius tempore quo parum mollita est terra, nec tantum habet humoris quod contineant se partes ipsius, tunc enim proprie comminuitur, subtiliatur & aptatur seminibus & plantis, propter causas inductas. Hac de causa periti uiri & agriculatores ter uel quater crudum

agrum arare præcipiunt, dicentes quod habet de tribus uel quatuor arationibus addere fructibus proportionabiliter sui numeri quantitatem, ut quod secunda aratio addat alteram fructuum partem, & tertia tertiam, & quarta quartam, & ultra non progreditur, quia sufficit quod per quatuor arationes est terra subtiliata ad cibum præparatum. Hac de causa præcipiunt periti in rusticatione globas magnas malleis magnis comminui, quia aliter ut diximus non conuenit generationi plantæ. Quod autem diximus de tribus uel quatuor arationibus uariatur secundum qualitatem agri qui colitur, fortis enim & glutinosus, & adulterinis herbis repletus, non excolitur ad emendationem & subtiliationem nisi quatuor arationibus, porosam autem subtilem & mundam terram habenti forte sufficit una aratio uel due, aut, ut multum, tres, aut plus. Propter quod etiam præcipit Palladius, terram considerari, quoniam si labor fructus excellat utilitatem, relinquenda est, si autem fructus excedit laboris meritum insistendum dicit esse cultui. Sunt autem agri, qui non arando sed foradando temperantur, & hij sunt quorum multa est pinguedo in profundo quod uomere aratri perungere non potest, ad hos enim oportet adhiberi fossorium, quod profundius terram sulcat quam uomere aratri, compertum est enim experientia rusticorum isque ad decem pedes pluuie humorem pinguedinem superficiem terre semen deferre, cum in profundum distillat. Atque etiam sicut uidemus animalia aquatica quæ sub terra profunde generantur in lacubus subterraneis uenena esse, eo quod lucis expertia sunt, & uaporibus spissis nutrita, ita etiam & pingue quod in profundo terræ latet incongruum est & grossum, & frigidum, nisi ad superficiem aliquando tollatur, & luce solis lustratum subleuetur & dissoluatur, & spirituale fiat, quoniam uaporabili spiritu ad radices & semina perungere & penetrare possit, & uisibus laborantium adaptari, non enim omnis ager colitur uel aratur. Cum enim antiqui Aegyptij primo agrum mensuris Geometricis distinxerunt, quæ

tuor genera agrorum esse dixerunt in quibus plantæ domesticantur per cultum, sativum videlicet, consitum, compascuum, & novalem, ex his autem duos tantum arando & fodiendo coluerunt, sativum videlicet & novalem, vocantes sativum qui seritur continue singulis annis, vel in eodem anno pluries, novalem autem qui alteratis annis, aut tertio intermissio, aut quarto, vel quinto, aut sexto, aut forte septimo anno quiescit. Et hos fodere & arare præcipiunt propter causas quas dicimus. Compascuum autem & consitum non fodiendos esse præceperunt. Compascuum autem vocabant eum qui prata ferebat in pastum animalium. Consitum autem eum qui arboribus erat consitus, quæ portabant fructus salubres usui hominum. Et compascuum nullo modo, consitum vero non fodiebant nisi forte parum circa radices, & non ubiq., cuius nos inferius rationem dicemus, sic hic dicere sufficit quod sativus & novalis ager fodiendi & arandi sunt, quia aliter semina in eis non bene commoveantur, propter causas quas diximus.

De agro sativo, Cap. xv.

Diversificantur autem in arando & cultu sativus & novalis ager, quoniam sativus virtutem habet magnam & feracem fructificandi, in tantum quod si continue non maceretur in partu, pinguedine nimia luxuriabit in spuria diversarum plantarum, quod postea sine magno labore emendari non poterit, aut forte in humore, ita quod ipse humor abundans submerget seminum virtutem. Et si quidem adeo ferax est quod timeatur luxuria adulterinarum plantarum, continue seritur omni anno, aut forte in anno pluries, eo quod calidus & humidus est talis ager, & soli calido expositus, qui etiam sol ab æquinoctiali descendens calorem terre ad pullulationem seminum sufficienter immittit. Nam calor solis commoveat inferiora superioribus ad generationem eorum
quæ

Quæ in terra nascuntur, & ideo quando solis calor inferiorem terræ humorem eleuat in superficiem agri siccā, efficitur ager continuè calidus & humidus, & est ille ager semper porosæ terræ, etiam bonæ commixtionis, & facilis cultus, & paruo labore multam profert fructuum ubertatem, & ille proprie uocatur satius, quando autem uicino calore solis eleuatum de profundo humidum non commiscet agrum & mollificat eum, sed consumitur & plus consumit sol de humiditate uel humore quàm eleuet, efficitur ager puluerulentus & sabulosus, salsus & pessimus, qui non recipit bonitatem per cultum, sed potius siccitate redigitur in heremi solitudinem. In qua nulla plantarum recipere potest ad bonum usum mutationem. Adhuc autem si tanta sit solis debilitas, ut nihil de profundo terræ eleuare possit ad superficiem, sed potius comprimitur continuè ager loci frigiditate mortificante, quantumcūq; ille colatur non reddit fructum plantarum, nisi forte sylvarum, eo quod sylvarum arbores ualde in magnam profunditatem dirigunt radices, ubi est calor fumans ex superiore terræ constrictione, ad tantam autem profunditatem nec fossio perungere potest, nec aratio, nec seminatio. Et ideo tales agri nec arabiles, nec satui dicuntur. Omnia hæc quæ in superficie terræ nascuntur ex uaporibus de substantijs ad superficiem pertingentibus oriuntur. Satius igitur ager optimus est, qui uaporibus pertingente & non consumpto superius est calidus & humidus, mollem habens superficiem & porosam, qui & cultus facilis est & ferax feminibus in eum iactis. Est autem hoc imaginari per similitudinem balneorum, in his enim si quis calore moderate mouente quidem humidum, sed non consumente usus fuerit, diffundetur humidum naturale in mixtum cibale humido per corpus suum extendit carnes suas, & impinguabit eas. Si autem calore immoderato & diu utatur, expirat humidum eius, & destruetur & materabitur corpus. Propter quod dixit Palladius, maxime eligendum esse pinguem & rarium agrum, qui calore

rarificatus non dissolutus sit, & humido multo spiritali ad superiorem flexus, impingatus sit. Secundi autem meriti dicit esse pinguem & densum, hic enim & si densus sit, aratione est sublimabilis & rarefactibilis, & tunc efficitur conueniens pingui & denso, hic enim labor cultus cum cultoribus non negligentibus ad uota respondebit. Cum autem istæ duæ dispositiones magis inueniantur in agro culto, pinguis & rarus magis uincis congruit, eo quod uites rari ligni sint, & ex denso non ita sugere possunt. Atque plurimo indigent calore & humore uince, propter quod non conuenit ad uites terra densa, quæ & calorem impedit ad radices perungere & humorem: pinguis autem & densa frugibus magis congruit, quæ solidum exigunt fundum & cibum propter granificitatem & soliditatem, solum autem nimis macrum, & melancholica quadam ariditate, nec frugibus conuenit, nec uincis, hoc enim reprebensam in uicina sui profunditate habet humiditatem, & hæc humiditas parum spirat, nisi forte ad arborum ex profundo generationem, & harum fructus aut nulli sunt propter frigus, aut immaturi, & inconuenientes. Et ideo plantæ in tali terra non domesticantur. Ea autem quæ nimio calore siccitatem patitur præ omnibus peior est, illa enim & in profundo & superficie constituta est humido, & ideo heremus uocatur, eo quod redacta sit in solitudinem, nec aliquid profert propter adustionem & salsedinem sabuli, nisi forte herbas ualde minutas & siccas ex alio

quo modico uapore alicuius temperati temporis generatas. Propter quod optimus agricul-

torum Palladius dicit, id de terris

num terre genus esse quod

est siccum simul &

spissum, macrum

& frigidum.



De medicis

De medicamine agri ut fiat satiuus,
Caput XVI.

Vm autem quidam agri in se quidem frigidityte steriles, aut humore, qui culti primo accipiunt medicinam, & postea in eis optime plantæ præcipue fruges proueniunt.

In talibus enim terris argilla fossa terre frigida ministratur, ex argilla enim terra frigida accipit fecunditatem, eo quod argilla calida est & sicca, proprietatem habens masculi. Terra autem frigida est & humida, eo quod frigus inducit humidum, & cum calidum siccum permiscetur frigido & humido fit temperamentum, & tunc terra illa ferax ita diu efficitur, donec per illuuiem imbrum non distillatur ab ea argilla, & tunc plantæ in talibus terris ad meritum ueniunt, mutantes syluestriū proprietates in domesticarū qualitates, tam in quantitate fructuum quam in qualitate. Si terra sicca est & amara nūquam recipit medicinam, quicquid enim ingeri potest tali terræ totum in adustionem & salsedinem & siccitatem conuertitur. Propter quod etiā terra ad Iouem exclamans, se in fabulis poetarū legitur conquestum de incendio Phaëtonis, & non cōquesta de gelicidio Saturni, sciens quod malicia quæ ex frigore est potest temperari nō autē adustio quæ est ex siccitate saluginis. Similiter autē si terra humore infœcunda est, aliquod recipit temperamentū, fonditur enim fossatis per transversum, ad quæ primo descendit humor superfluous, ut postea defluat ab agro, tunc recipit temperamentum. Propter quod omnes fossas agrorum ad unam maiorem & declinorem deriuari facias per transversales arationes & fossas, ut per declinorem ager à superfluo mundetur humore. Eo modo quo etiam immutationes & euacuationes corpora curant animalium ex humore, & non qualitate tantum infirmata. Sicut duplex causa est agritudinis in animalis corpore, quod uidelicet aut qualitate aut humore infirmantur, ita etiam est in agro. Et ideo cum terra frigidityte sola uincibili est sterilis, studeat agriculator in

infundere alteram argillā, si autem ex humore solo eius infecta
 ditas est, studet euacuantibus eam redigere ad cultum, per modum
 fossarum qui dictus est. Sed terra quæ iam sic destituta cōbusta est,
 desperata est, sicut animalis corpus mortuū & incineratum. His igitur
 modis ager satius iuuatur ad domesticationē plantarum, præ-
 cipue in frugum cultu, quoniam de uincis sermo erit posterius, cum
 de agro consilio tractabimus, in talibus enim non optimis agris, qui
 medicina plurima & continua indigent, diligenter obseruanda sunt
 tempora cultus & sationis, in terris autem frigidis autumnalem tem-
 pestiue optet fieri sationē, ut plāta aliquid roboris ante hyemis ad-
 uentiū accipiat, nā si debilis nimis ad hyemis peruenit frigiditatē,
 ipsa gelāte glacie mortificabitur, et à fructu optato destituetur, hoc
 autem maxime est in eo agro qui cum frigiditate etiā est siccus, ni-
 si enim tunc tempestiue præueniatur satio, non habebit robur con-
 tra hyemē mētrā & tenella plantatio. In agro autē calido & pin-
 gui differenda est satio quantum commode potest, quod si præueni-
 atur in tali agro luxuriabit in herba, & cum totum in herba posue-
 rit humidū substantiale, non habebit uerno tēpore unde pducatur se-
 mina utilia, nā eius satio nō accipit ab hyemis frigore aliquod no-
 cumentū, eo quod locatum sit semel in agro calido & pingui, & sic
 etiā à frigore hyemis ledi nō potest, sed plātula potius impinguatur
 & retinetur à frigore hyemis, ne luxuriet, & tunc uerno superue-
 niente calore multiplicia ex se formabit semina, & fructus in ma-
 xima ubertate producit. Similiter autem considerandū est in agris
 multum frigidis & humidis, qui circūpositi sunt maribus & palu-
 dibus multis, hos enim non cōuenit seminare in autumnno nimium au-
 tem laborant humore frigido, & seminum forma abluuntur & perit,
 ita quod euanescent in uere, & à fructu destituantur sed uerno tē-
 pore sata multipliciter habent humidam, & cum calor solis conue-
 luerit, cito crescunt & fructificant. Et huius signum est, quod uide-
 mus tales in siccitate temporū, quæ alios agros impedit, optime fru-
 ctifica-

Asficare, temporis enim siccitas nimio agri humori coniuncta facit temperamentum, & fructuum reddit ubertatem. Propter quod etiam dicimus tales agros per sationem fabæ uel lini, si aliquando infœcunda sunt, redire ad ubertatem, eo quod talia radicibus euulsa superfluam ipsius temperant humiditatem. Propter quod studium cultura sit circa huiusmodi agros, ut per congestos aggeres affluentem redundantiam impediant aquarum, ne agri impediant superficiem, & per fossata in extremitate agrorum aperta, ea quæ iam influxit aut per pluuias uenit educant aquæ humiditatem. Nullo autem ingenio, ut dictum est, curari ualet terra ex adustione longa & siccitate sterilis effecta, raritas enim eius humorem inductum non retinet. Siccitas autem letamen absurnit appositum, & amaritudo innata impedit seminum aut plantarum nutrimentum. Frequenter tamen super huius salsugine superficiem quandam terræ lenis & pinguis, quæ alluione maris adducta est, inuenimus quæ longa putredine herbarum ibi est generata flumina enim in mare intrantia plurimam secum trahunt terram, quæ eradunt de terris optimis, quæ dum ad mare peruenerit reflexu projicitur super salsuginem littoris, & dum hoc fit continue tempore longo superficies talis terræ feracissima est in fructibus, quæ non in profundum figunt radices, eas uero plantas quæ in profundum figunt radices nutrire non possunt, & ideo talis terra frugum quidem fert copiam, sed arbores aut nullæ aut paruæ nascuntur in ea, huius autem signum est, quod uidemus maria quæ bis in die naturali insiliunt & refluant, & iuxta littora sua tales habere agros, maria autem statim omnino iuxta littora sua sunt sterilia.

De cultu agri motuosi et ualliculosi. Cap. XVII.



Agri autem in conuexitatibus motium siti frequenter patiuntur siccitatem & macredinem, quoniam pingue quod est in ipsis disfluit ad ualles, & ideo ualles quidem pinguis simi conuexa autem montium sunt arida, propter quod plantæ in eis non bene

bene domesticantur per cultum, propter quod etiam in talibus locis precipiuntur etiam ab agricolis per transversum sulcarum, ut in sulcis stet retenta pinguedo, quæ decurrit in præceps si ex directo sulcus descendit. Propter quod etiam fiunt retinacula per materias ex transverso ante agrum, ne humus defluat postquam fuerit exarata, quæ autem subtiliori ingenio humum hanc serunt non exarata sed durâ, et postquam seminata est humus evertit eam super semina, aut aratro aut ligone aut alio fessorio, et non arant eam nisi semel, nec in ea comminunt glebas magnas, quoniam si araretur sæpius comminueretur cum pluvia quæ cum impetu descendit, ex concussu montis tota portaretur ad uallem, et periret quod seminatum est. Semen igitur in tali agro tenue et non bonum debet esse, tum propter cultus defectum, tum propter impossibilitatem retinendi pinguedinem et humorem ex quibus semina conualescunt, et ideo etiam simus letaminis sub terra in montibus non ponitur, sed potius in superficie, ne terra in intimis mota per humorem et impetum descendat in uallem, nec letamen equaliter spargitur in montibus per totum, sed altius plus letaminis ponitur ubi plus de humore abluitur, secundum quod declinat convexitas de letamine ponitur quantitas. Inferiora enim per se descensu humorum pinguescunt, superiora autem pinguedine per alluvionem restituantur, dum autem plus letaminis ponitur ubi plus de humore abluitur, et minus in loco ad quem plus letaminis per alluvionem imbrum apportatur, fit quedam temperamenti equalitas. Fructus autem conuenientiores sunt montium quam uallium, quoniam reuerberatio solis ad montem maior est, et humor moderatus citius obedit digestionem, et loca ipsa montium sunt uaporesa, quia uapor maturantem adiuvat calorem. Ex his ergo ad notandum est, quod quæcumque plantæ aromaticæ et calidos et siccos habent fructus, hos magis congruit in montibus plantarum. et seminari, propter loci calorem et siccitatem, quæcumque autem frigidos et humidos habent fructus, his magis competit in uallibus seminare.

seminari quàm in montibus. Propter quod uina & aromatica meliora sunt in montibus, & in genere frugum auena melius quàm triticum, uel siligo in montibus prouenit. Frumentum autem hordeum & siligo melius in uallibus proueniunt, propter suorum granorum soliditatem. In ualliculoso autem agro necessario est fieri fossatum in medio uallis magnum & multa parua ad ipsum descendia, per quæ humoris impetus defluat, ne uenientes de monte torrentes submergant semina quæ iacta sunt in ualle. Sic autem agro culto domesticæ seminibus & radicibus plantæ ingerit nutrimentum: & ideo planta domestica tunc efficitur cum ager satius, ut dictum est reperitur, cum enim uenter & mater sint uergetæ bilium, oportet ut ipsa ad cultum redacta semina secundum agros suas mutant dispositiones. Digerunt autem cibum & faciunt eum cholericum, aut phlegmaticum, aut sanguineum, & postea per dispositiones ubi alterantur corpus & substantia plantarum, nam sicut arte medici dispositiones laudabiles acquirit uenter, & tunc ad laudabiles dispositiones mutat cibum & corpus, sic sapiens agricola laudabiles dispositiones mutat agrum per cultum, quo laudabiliter dispositio etiam plantæ laudabiles acquirunt dispositiones. Eadẽ autem operatio est inter partum & matricem, & agrum, & plantam, quoniam licet operatur sicut sperma masculi, qui sicut artifex mouet & format partum, tamen quia sanguis mensstruus trahitur in nutrimentum partus in muliere sequitur matris & matris dispositionem, in agris autem & plantis, hoc est, plusquam in matrice & partu, quia in plantis sicut in ante habius est ossemum, non est proprie masculus et femina, sed permixtae sunt hæ uirtutes in eodem, propter quod terre dispositio tota est quæ alterat plantam ad domesticæ uel syluestris dispositionem.

K Decultu

De cultu agrinoualis, Cap. XVIII.



Ager autem qui noualis ab antiquis sapientibus uocatur est duplex, unus quidem qui primum ad cultum redactus est, alter autem ad quem interpositis quibusdam quietibus, necesse est suam redire nouitatem, sicut est ager qui duobus annis seminat, in tertio quiescit, aut in quarto, aut in quinto, aut in sexto, aut in septimo, usque ad hunc enim inuenimus diuersitatem quietis agrorum. Noualis autem qui uno anno seminatur, pluribus annis quiescere uult, omnino malus est, & cultui & cultori ad uota non respondens laboris. Studium autem quod habetur in agro noualium, qui nunc primum ad cultum sunt redacti, est extirpatio soluturum, quarum radices nisi extirpentur omnem sugunt agri humorem, & non permittunt semina nutrir, & ad debitum uegetari, propter quod etiam precipitur, agrum non feri diuersis seminibus, ne humidum adurat, aut exerceat alterum, attrahendo ad se nutrimentum. Extirpatis autem illis, feritur ager, & primo quidem propter non aduersam uirtutem terre quam contraxit longo in ipsa putrefactio- ne herbarum ac stirpium diuersarum diu serax est, aut sine aut cum paruo letamine, deinde oportet adhiberi letamen si serax debet permanere, & nisi sit pinguisimus ager oportet aliquam mittere qui- etem. Praesertim quando cum substantia herbarum uel palearum plantae seminate, aut metuntur, aut radicibus euelluntur: extractis enim agri pingue dicitur & uirtute, necesse est ut nudus ager soli exponatur ter- tio uel alio anno cuius calore et lumine uirtutem accipiat germinan- di sicut habuit in prima seminatione, spiritus enim uniuscuius plantae dum per semina & plantas attrahitur humore & spiritu uiuifico terra destituitur. Et terminato tempore quiescit, ad agrum iterum reuocatur, sicut reuocatur ad uterum uirtus concipiendi per quietem inter partum & partum. Ad unum autem agrum redit citius, & ad alium tardius secundum quod ager magis & minus fecundus cali-

us, & humidus, & porosus, & siccus, & pinguis, & subtilis intue-
ritur Hoc autem ostēdit & ipsum nomen, quoniam nouale est quod
red-it ad uirtutem pristina per quietem innouatam, omnium enim o-
perum physicorū testatur opera, quæ enim cum labore & expressa
uirtute perficiuntur, nisi quiete interposita uim & restorationem
accipiant, & dissoluantur & corrumpuntur. Quicunq; igitur agri
continuatis sat omnibus fructificent, continue ex cælo & humore suo
rum principiorum accipiunt innouationem, qui instaurati semper
possunt accipere pullulationem, & ideo continue seminantur. Qui-
cunq; autem ager continuo humore non modo infusus est, sed etiam
coopertus illo in maiore parte anni, quod ita intelligas in hyeme
scilicet & in uere, quando debent pullulare semina, & in autumno
quando serendum est, coopertus est nimio humore frigido, & gros-
so infusus. Ab Aegyptijs qui primitus agros distinxerunt uocatur
hic ager subteneus, aut temulentus, & ille nec noualis nec satiuus,
quia in æstate quando in superficie siccantur scinditur magnis scis-
suris lutum, quod est in superficie ipsius ex aqua frigida grossa
quæ cooperuerat eum in superiori parte luti eius, & hoc impedit
pullulationem bonarum plantarum. Si quæ etiam nascantur plana-
te in tali agro syluestres remanent, quia acide uel amare sunt in
sapore propter grossitiem & frigiditatem & copiam humoris,
& in semine, & in fructu destituuntur propter defectum humi-
di, ex quo nascantur semina & fructus. Atque igitur quia
tempus æstatis non est ad pullulationem fructuum, sed ad matu-
ritatem & exiccationem, & ideo pronunciant de hoc agriculto-
res, quod deserendus est, quia nulla utilis planta in ea mutari po-
test ex syluestri in conuenientes domesticis plantis proprietates,
ut supra. Alium autem agrum uliginosum esse dixerunt antiqui
cultiores, de quo ratiocinati dixerunt ipsum ad cultum redigi non
posse. Et hoc est qui heremi habet naturam, cum enim par-
tes in superficie non habeant solidatas & continuas non radi-

cabit in eo, & florebit, aut fructificabit aliqua perfecta plantarum. Nam planta querit locum solide continuitatis in quo radicetur & floreat & fructum ferat. In uliginoso enim tota superficies est porus, & quod est subtilis humoris in fundo totum euaporat, nec retinetur aliquid in superficie quod reflexum contineatur & consistet, & planta perfecte formetur ex ipsa, & ideo quida talis ager plantam non suscipit, non potest etiam per arationes aut fossas ad hoc redigi, ut in eo fiat aliqua domesticatio plantarum, & ideo relinquendus esse censetur, & in piscinas & lacunas redigendus. Alij tamen dicunt quod terra uliginosa in qua semper inseparata manet humiditas, dicentes, quod uligo est naturalis humor terre, ab ea nunquam recedens, ut in separabile accidens, & in hac opinione videtur esse Palladius, qui ait, quod omne triticum solo uliginoso post tertiam sationem in genus siliginis commutatur. Nam talis transmutatio ex superflua humiditate procedit. Et in multis alijs locis idem Palladius sentit, & cum eo concordat Varro & alij multi qui de hac materia tractauerunt.

De tempore & modo arandi & dissipandi herbas malas, Cap. XI.

Pingues & siccī agri in locis aridis mense Februario & Ianuario possunt proscindi & arari, in locis vero temperatis & humidis mense Maij & Aprilis, uidelicet quando in eis superflua humiditas est consumpta, & terra iam ad equalitatem inter humiditatem & siccitatem peruenit. Eodem mense Aprilis & Maio pingues agri, qui diu aquam tenent, proscindantur, cum omnes herbas protulerint, & eorum semina nodum sunt maturitate firmata. Et siccī de quibus primo diximus, possunt secunda uice arari mense Iunio et Iulio, secunda uice arantur agri humidi, quos diximus mense Martio & Aprilis, uel Maij esse sulcandos. Mense Augusto humidi agri tertia, siccī uero secunda uice arentur. Mense Septembri

Septembri pinguis ager & qui diu consuevit habere humorem ter-
 tia siccitate arabitur, quamvis humido anno possit & ante tertiarum. Nunc
 ager humidus, planus, exilis scribitur & aratur. Cluii graciles nunc
 primū arandi sunt & serendi. Boves melius collo quam capite iun-
 guntur, quos ubi ad uersuram uenerint arator retineat, & iugum
 propellat, ut eorum colla refrigerentur. Sulcus autem in aratio-
 nibus secundum Palladium longior quam centum viginti pedum
 esse non debet, sed ex consuetudine cultorum Lombardiæ & Ro-
 manniolæ usque ad ducentos pedes & ultra sulcus extenditur. Cre-
 tosa terra profundius, soluta uero minus profunde aretur. Seruan-
 dum est etiam ne inter sulcos terra non mota relinquantur. Glabre
 omnes sunt dolabris uel malleis, aut ligonibus dissipandæ. Sed æ-
 qualiter totam terram motam esse agnoscis, si transversum per sulcos
 particam mittes, quæ res sæpius facta bubulcos ab hac negligentia
 submouebit. Observandum est ne lutosus ager aretur, aut qui sit
 post longas siccitates imbre leui perfusus. Nam terra quæ lutosa
 tractatur in principio, toto fertur anno tractari non posse, quæ uero
 leniter superinfusa est, & subtus sicca, si tunc aretur, asseritur per
 triennium fieri sterilis, & ideo mediocriter ager infusus, ut nec lu-
 tosus sit, nec aridas debet proscindi. Si collis est transversus sulca-
 tur per latera, quæ forma tunc cum semen accipit est seruanda. Si
 agros incultos aperire uolueris, considerabis an sit humidus, ager
 an siccus, syluis, aut germine, filice uel fruticis uestitus. Si humi-
 dus erit, fossarum ductibus ex omni parte siccetur, sed apertæ fos-
 se notæ sunt, ceteræ hoc genere fiunt, imprimuntur sulci per æ-
 grum ex transversa altitudine pedum trium, postea usque ad men-
 ditatem lapidibus repletur aut glarea, & desuper terra æquatur,
 sed fossarum capita unam patentem fossam petant, ad quam de-
 clinet recurrant, ita & humor deducetur, & agri spacia non peri-
 bunt. Si defuerint lapides sarmentis uel stramine cooperiuntur, uel

quibuscunque uirgultis. Hæc autem mense Maio fiunt, et etiam alijs mensibus secundum qualitatem humiditatis terre consumptæ. Si nemorosus est, extirpatis aut rare relictis arboribus colatur. Si lapidosus per multas partes saxorum terra collecta purgari poterit, et nutriri uel muniri. Iuncus gramen et filices frequenti aratione uincuntur. Sed filicem si sæpe fabam conseras uel lupinos, et subinde nascentem mucrone facis recidas, inter exiguum tempus absumes. Mense Iulio utiliter uel ante caniculares dies filicem extirpabis et caricem hoc mense cum sol cancri tenebit hospitium, luna sexta in capricorni signo posita, gramen ablatum Greci afferunt nihil de radicibus reditorum.

De seminatione in communi, Caput XX.

DE seminis autem natura et uirtute in præcedentibus dictume est, sed hic attendendum est, quod semen duo continet, quorum unum est uirtus formatiua, quam habet de cælo, cum calore et spiritu qui instrumentaliter formatiua deseruiant, calor quidem digerendo, segregando et subtiliando. Spiritus autem uehendo uirtutem. Alium autem quod habet semen est substantia formalis, quæ inmixto sibi humido suscipit formationem et figurationem in planta et plantæ organa. Attendendum est igitur in omni seminatione, ut seratur semen quando adiutorium maius habet de cælo, hoc autem est quando uenatur calido humido et uiuifico lumine solis temperato, quod in ipso aliquantulum temperatum est aduistiuum humidi, in sole enim est coniunctus sicco, et ideo est aliquantulum aduistiuum humidi seminis, et ideo nouella semina et plantas teneras aliquando obumbrant à ferore solis ij qui bortes prudenter excolūt, sed in lumine lunæ est lumen eiusdē solis coniunctum

*Coniunctū frigido temperato & humido, ut ex lumine solis habeat caliditatem mouentem, & ex frigido temperato recipiat temperamentū, & ex humido moueatur siccitas i suis. Incēso igitur primo lumine in luna, cum ipsa est calida tēperata & humida acida sunt semina, quia tunc conuenientius inuatur uirtus corū à luna, propter rationes iam inductas, mouebit enim tunc uirtutem formatiua, calor enim eius & spiritus adinuatur à temperato calore lune, & ab humido lune inuatur materia formalis que formanda est. Nec oportet attendere ad stellas alias, quoniam uirtus illarum cōmunicatur lumini solis & lune p applicationē lune ad eas, que in omnibus applicatur respectibus corū quolibet mense per recessum & accessum & ideo antiqui sapientes lunam cōlestis militie reginā uocabāt, & utram Dianē lampadem. Ratio prioris nominis est, quia uicina nobis existens plus influit sup inferiora q̄ alia cōlestis uirtus, & applicans se in spacio mensis quolibet mense pficit mutato lumine, quod omnia pficiunt in spacio multorum annorum. Propter quod egregius philosophus Aristoteles dixit, quod luna facit in mense, q̄ sol facit in anno, hoc est per hyemem & æstatem uer & autumnū. Quoniā à prima accessione usq; ad diminutionē luminis eius est calida & humida sicut uer, & à diminutione luminis eius usq; ad plenitudinem est calida & sicca, sicut æstas. Et à plenitudine usq; ad diminutionem secundam, est frigida & sicca. Et à diminutione secunda usque ad effectum, est frigida & humida, corrupto semini humore pblegmatico. Propter q̄ si satio est, & fiet tēpore quo est calida & sicca, exiccabitur humidum substantiale seminum, q̄ formari debet in organa plantæ, & nō proueniet plantæ perfectio. Si autem tempore illo fiet satio quo est frigida & sicca, non mouebitur calor seminum, nec inuabitur humidum. Et ideo satio non erit conueniens. Si autem tempore quo est corruptæ senectutis frigida & humida existens, putrescent forte semina, & non
 pra*

proueniet utilitas sationis. In prima autē satione omnia iuuatur & proueniūt utiliter, & ideo dicitur uitrea lampas Dianæ à frigida luce succensa. Diana enim lumen aëris esse fabulatur poëte, q̄ aër sp̄s ritualiter existit in corporibus animatorū. Lampas enim huius sp̄s ritus corpus lunare est, quod per lucem concepta & temperata à sole formata profundit, & sp̄itus animatorum, & mouet eos, ut moniti proferant uirtutes ad naturales opatiōes, quas sol si p se moueret, dissolueret, propter nimiam sui intemperantiā & siccitatem ideo enim frigus lunæ poptime obsequitur, q̄ cōtinens extrinsecus & accidēs intrinsecus tempore, & mouet interius sp̄itus ad naturales opatiōes, & non sinit eosdem dissolui per euaporationē, q̄a frigus temperatū circundans intrinsecus reprimet & reflectit sp̄itus ut interioribus confortentur maxime autē hoc est in plantis, quæ non agunt nisi naturales operationes, & non sunt sensibiles sensus enim magis confortantur extra, & naturalia magis uigent in interioribus. Attendendum igitur est, ut in accensione lunæ seminetur istis rationibus. Oportet autem considerare quartam circuli declinationem, in qua mouentur lumina uisifica, cum in circulo declinui sit generatio & corruptio inuegetabilium. Non est tamen in omnibus partibus causā generationis, sed in quarta quæ est ab ariete in cancerū. Omnis ergo satio est perfecta, antequam sol accipiat arietem, quid tunc semina in matricibus suis non inuenies, sed in matrice terræ de norabit ea, & uisifico lumine mouebit. Et autumnales quidem sationes nunc radicate mouentur in debitam suæ substantiæ quantitatem, & flores & seminum formationem. Vernales autem seminationes etiam in matrice terræ iacentes tunc pullulant, & adiuuante sole temperato florēbunt, & generabunt ante tempus ex mæ siccitatis. Nec oportet quod multum obseruentur uenti, quoniam licet auister euocet terram, & pullulare facit plantas, tamen aquilo quando non est mortificans frigiditatis continet semen, ne euaporans dissoluiatur. Sed plerumq̄ cauendum est, quod ager non seruetur deo

aut diuerso simul semine, sepe enim contigit quod unū semen magis contrahit quā alterum, & tunc unum adurit alterum, & aliquando per appositum tractum utrunque impeditur à germine. Videmus enim quod planta iuxta helleborum uel scāmoneam posita contrahit proprietates eius, & rizia iuxta triticum posita ipsum adurit, similiter facit corilus, uel caulis circa uitem, & sic est de multis alijs, & sic etiam absque dubio diuersitas seminis subtile humidum, quod est in agro, contrarijs uirtutibus corrumpit, quod non bene proficit ad fructum domesticum, sic etiam diuersitas seminum animalium, quando unum coit cum femina alterius speciei, corrumpit utrumque, ita quod neutrum perficit foecunditatē. Propter quod cauendum est ab huius diuersitate in pluribus. Quaedam autem semina per experientiam inueniuntur seinuicem non ledere, sed simul sata conualescere, & fructus ubertatem successiue afferre, ueluti cum seruntur tempore congruo in pastinato solo semina atriplicum, spinachiae, sceniculorum, lactucarum, petrosilini, satueriae, bliti & caulium, ex quibus primo euelluntur atriplices, secundo spinachia, & ex caulibus quidam ut transplantentur, uel omnes, uel nimis spissa rarificentur & sarculantur, & successiue colliguntur remanentibus ex quolibet genere quibusdam seminibus propter semina. Item seruntur congrue simul triticum & spelta, milium & panicum, & phaseoli, & similiter bordcum & frumentum. Amplius autem si ultra menuram iaciantur semina in agro, macilencia & non proficientia erunt. Sed si seratur ager secundum proportionem cibalis humidi quod est in ipso, ita quod radices dilatari & confortari possint, tunc etiam planta exurgens fortis erit, & proferens fructum, quem querit ex labore culturae. Haec igitur diligenter esse attendenda & naturalis suadet ratio & experientia cultus. Oportet etiam attendere ne forte uel ipsa semina iacta sint corrupta, & ideo praecipitur à Palladio, ne semina iacta uetustiora sint quā annua, si enim uetustatē habent ultra annū, nimis exiccata sunt, & ut

L tus for

tus formativa proprio subiecto destituta, humoris radicalis substantia destituta evanuit, & ideo talia raro proficiunt. Præterea frumentum & talia semina eligantur, præcipue in ea regione quam colimus, vel probemus aduecta. Nam omnium surculorum vel frugum genera præclara terris tamen tuis experta committere debes, in no-
no enim genere seminum ante experimentum non est spes tota ponenda. Et nota quod semina locis humidis citius quàm siccis degenerant. Omnia legumina à Græcis autoribus seri iubentur in terra sicca, faba tamen in humidaterra iubetur spargi, licet tēperatis agris ferendum sit, tamen si siccitas longa sit semina magis in agris quàm in horreis servabuntur. Si necessitas cogit de salsa terra serere aliquid, post autumnum plantanda vel conferenda est, ut malicia eius uberius imbris eluetur, aliquid etiam terræ dulcis vel fluviæ arenæ subijciendum est, si illi virgulata committimus locis uliginosis, aut exilibus, aut frigidis, aut opacis. Mense Septembri circa æquinocium triticum & alia semina quæ ante hyemem feruntur, dū sermitas constat congrue seminantur, ut eorum radices ante hyemem conualecant. Siccis vero, aut pinguibus, aut calidis, aut soli expositis locis post dicta tempora seminantur, dummodo usq; ad hyemis gelicidium nulla'enus differantur. Præterea fiunt seminaria in quibus nutriuntur tam semina quàm surculi, & cum adoleverint in alium transferuntur locum. Hoc seminarium talem terram & taliter preparatam desiderat, ut in tractatu proximo scriptum est. Sed ut scribit Varro quæ in seminario nata sunt: Si loca erant frigidiora, quæ mollis natura sunt, per brumalia tempora tegere oportet fronde, aut stramentis. Si erant imbres secui, videndum ne alicubi aqua cōsistat, venenum est propter gelu radices tenellis sub terris & supra virgultis, ne eodem tempore aquæ crescant, quia ratione terre tempore propagantur supra terram aëre frigidiore cinguntur. Quod ita esse docent sylvestria, ad quæ sator non accessit. Nam prius radices nasci solent, nec longius procedūt nisi quo tempore venit sol,

fol, duplex causa radicum. Nam quædam arbores naturaliter longius produciunt radices quàm aliæ, & quia alia terra facilius uiam radicibus quàm alia dat. Si autem seminarium surculus confitum est, cacumina quæ molliora erunt natura, ut oleæ, aut ficus integenda sunt binis tabellis dextra aut sinistra ligatis. Præterea scribit Cato quod terra seminarij talis esse debet qualem desiderant semina & surculi in casata. Item dicit quod surculi non debent eminere nisi quatuor digitis suprà terrâ, & cacumina debent simo bubalo obliniri.

De plantatione & modis plantandi, &
de electione plantarum,
Caput XXI.

ARborum quædam fructum faciunt & semen, in fructus carne reclusa: quædam uero nullum fructum ferunt in quo semen aliquod inuenitur, ex quo possit planta similis generari. Quæ fructum & semen faciunt, quædam illud debile faciunt, quædam grossum & potens in dura testa reclusum. Quæ semen paruum & debile faciunt, uirtutem generatiuam habent tam in semine quàm in ramis diffusam, & ideo ex utroq; plantari & conualescere possunt, licet plantatio ex semine tali sit periculosior, & quandoq; in longam spectetur ætatem, & ex eo non domestica sed syluestris planta nascatur. Ex ramis uero plantatio citius & facilius cõualefcit, & inde domestica planta prouenit non syluestris, si ex planta domestica ramus fuerit talis acceptus, & in hoc genere est uitis, malagranata & ficus, & multe aliæ. Quæ uero semen forte faciunt, uirtutem generatiuam habent, maxime in ipso semine collectam. Ideoq; ex ipso semine melius quàm in ramis proueniunt, & huius generis sunt nux, castanea, amygdalus, & aliæ similes. Arbores uero quæ multum ferunt fructum, uirtutem generatiuam diffusam necessario habent in ramis, cum natura eis specialem non deputauerit locum, ubi eorum

Sperma seu semen colligerent, ideoque ex ipsis ramis cum suis gemmis, aut ex plantis cum radicibus uel sine radicum matre culls, optime conualescunt, & maxime quæ poros habent apertos, per quos facile transeat nutrimentum. Sine autem ex semine, sine ex radicibus plantas aliunde diuulsas plantare desideras, considera unum locum in quo plantare intendis si insidijs bestiarum expositus, aut clausus, aut tutus à nocumento corrosione earum, si est insidijs expositus, melius est quod in aliquo loco clauso, umbris tamen libero, cuius terra sit soluta, dulcis & aliquantulum stercorata, & optime subacta ligonibus, & maxime noua sit, & desubtus eleuata. Omnia semina, rami aut plantula duobus distantes pedibus aut uno in seminario plantentur, uidelicet si sint fortia semina, ut nuxes, amygdala, & similia. Si uero sint debilia, ut uitis, malagranati, plantæ, & pini, & similia, tria uel quatuor coniunctim ponantur, ut debilis uirtus unius alterius auxilio sustentetur, & assidue seu frequenti fossione dissipentur herbe nascentes, nec ibi aliæ quæ domestice seminentur. Plant etiam irrigationes tempore magni æstus, cum celestis diu negatur infusio. Sit autem aqua irrigans non frigida, mortificans, nuper de puteis hausta, sed de piscinis seu paludibus letaminis aut foueis corruptis accepta, uel sit puteorum uel fontium postquam eam exhaustam & in aliquo loco positam reificauerit calor solis, cui nullum proderit si in eam modicum fini ponas, eamque sæpe moueas & impingues, & cum earum summitas iniuriam corrosione bestiarum duobus uel tribus annis elapsis euaserit cum uniuersis radicibus transferantur ad scrobes, in loco uidelicet ubi eas postmodum stare disponis, iuxta quas palos figas ex spinis si oportunum esse uidebitur inimicis. Si uero locus clausus ab iniurijs bestiarum tutus existat, statim semina, ramos uel plantas in loco ubi perpetuo stare debent considerenter pone, et eis eadem tribue auxilia quæ super his in seminario nutriendis relata sunt. Spacia uero inter arbores seu uites seruentur

Secundum

secundum multitudinem arborum & terrarum consuetudinem approbatam, & præcipue secundum quod de singulis plantis aridis suo loco dicitur. Scrobes autem fiant latæ ac profundæ secundum magnitudinem plantæ & radicum, dum tamen in solo arido uel de cliui profundius, & in humido aut depresso nimis profunde plantentur, & in mediocri mediocriter insigantur. Si nimis cretosa est, letamen & sabulum miscetur, & si nimium sabulosa letamen cum creta ponatur, ita tamen quod in macra terra plus, & in pingui minus letaminis apponatur. Sit autem simus qui huic apponitur non porcinus, sed aliorum animalium, bene maturus. Cum autem planta transfertur domestica uel sylvestris, pars ad meridiem uersa rubrica signetur, uel aliter, ut translata eiusdem cæli quibus ante steterat cardinibus apponatur. Cum uero plantas in scrobe deponis, quod de radicibus lesum inueneris amputabis. Obseruandum est tamen ne terra in qua plantatur sit nimis mollis, incoegre enim radicibus adaptatur, quæ uero nimis sicca est sua superflua siccitate radicem plantule naturalem humiditatem consumit, sed inter utrunque prædictorum tenens medium, puluerisabilis seu dissolubilis sit, & conuenienter aptetur radicibus, aut ramis sine radice plantatis, & pedibus mediocriter concutetur. Quod si necessitas te coegerit in terra nimis sicca uel molli plantare, de locis alijs conueniens apportetur usque ad omnem coopertionem radicem, & etiam usque, ferè scrobis repletionem, si habueris abundantiam eius. Fiant autem plantationes prædictæ mense Octobri, aut Nouembri in locis aridis & montuosis & calidis, ut eiusdem terræ superflua siccitas circa plantas humiditatem hyemis temperet. In humidis autem & ualliculosis locis & frigidis conuenientius in Februario & Martio mense plantatur ne superflua hyemis & loci humiditas debilis plantæ, calorem extinguat, in temperatis autem locis utroque tempore satis congrue plantantur uel etiam transplantantur. Hæc quidem dicta in his quæ cum radicibus plan-

iantur propriæ locum habent, quæ uero plantantur semine mense
ianuario ponenda sunt, non amplius quam ternis digitis sub terra
posita, ut semine mense sequenti februario tumefacto, statim cum
primo ueris & solis calorem senserit aperiatur cortex, & pullulet
nova planta. Quod si locus sit calidus & siccus, conueniētius octo-
bri uel nouembri mense ponuntur. Et rami qui sine radicibus plā-
tantur mense martio infigantur, ab arbore nuper abscisi, cum uiridis
succus sit cortici iam infixus. Quorum quidem plantatio sa-
tis etiam aperte fieri poterit mense octobri post humidum autum-
nam, cum nondum humor & spiritus uisifus plantæ fugam ita-
buit ad radicem. Nam tempore maximi frigoris calore naturali ar-
boris ad terræ uiscera calida fugiente, secumq; humorem spiritum
trahente, situnc rami aut palmites plantandi reciduntur à matre,
plantati debiliter conualescunt. Ramusculus qui plantatur torquen-
dus non est, nec aliquo modo uexandus, & pars ea de qua radix spe-
ratur, iniuriæ nulle subiciatur, & maxime in his quæ amplos po-
ros & ligni raram compositionē habuerint, aut medullas magnas,
ut est salix & uitis & similia, hæc seruabis. Sed in his plantis quæ
solidam & spissum lignū habent, ut buxus & sauina uel similes for-
san proderit si rami pars scindatur inferior, & in scissura mittatur
lapillus, ut per longitudinē pororū plantæ facile humor terrestris
ingrediens plantam nutriet & cōualescere faciat. Caput inferius
in terram figendum non rotundo, sed longo uinere transversum,
ferramentis incidatur acutis, aut ab arbore laceratus plantetur, sic
enim poros quibus attrahit nutrimentū apertiores habebit. In o-
mni plantatione quæ post hyemem in locis calidis & siccis faciendā
est utile puto, si scrobes modico maturo letamine iuxta repleto succo,
aut lauatura letaminis aspergatur leniter, ne terra condenset,
& fossa modicū uacua relinquatur, ut æstatis tēpore imbre colla-
gat facilius, q̄ eius supflua tēperet siccitatem. In his aut plantati-
onibus quæ ante hyemē fiunt, erit melius terrā circa plantas exag-

gera-

gerare, ipsamq; fortius cōprimere, ne ad plātas supflua humiditas digestionē impediēs colligatur, & rami q; plātandi, sint potius biennales, quā anni unius tantūmodo existent, exceptis vitibus & qbusdā alijs in qbus unius anni tantūmodo esse debēt. Atq; tales eligātur q; sint leti, succosi, nitidi, gēmis grossis & pluribus oculati, & ad uenam tantā materiā reducti, in pluribus autē amputatur cōgrue summas, & in determinata lōgitudine relinquātur, ut in salice, uite, oulua & uilmo placet, & in quibusdam alijs his similibus.

De insitionibus & per quas plantæ syluestres domesticantur, Cap. XXII.

Insitio fit multis modis, sed ea que maxime proficit, ut per eam rudis syluestrium dispositio mutetur in domesticā, & usui cōuenientem dispositionem, est quod similitum fiat insitio in similia, secundū genus, & nō secundū speciem, sicut piri in pirum, & mali in malū, & sic de alijs, si enim diuersa genere in diuersa inserantur, nutrimentū taliū ad alteram dispositionem alteratū uix bene nūriet, & forte corrūpit plātam insitam, prationē quā diuimus de corruptione seminis animalium & agrorum, quando diuersa seminum genera permiscuntur. Est autem plantarum ad inuicem inter omnia animata plurima similitudo, licet enim arbores speciebus suis differant, tamen lignū unius speciei non multū distat a specie alterius, & hoc contingit ideo quod forma formalis plantarum inter animata plus est immersa materiæ, & quasi in nullo, uel in modica eleuata supra eam, propter quod etiam uita eius occultata est, hac igitur de causa fit q; arbor unius nutrimentū digestionē habet sufficientē, prima ut nutriat aliā, & secūda digestio adhibita per aliam conuertit succum in saporem & figuram fructus, secundum quod uenit secundæ. Et ideo etiam quando dissimiles sibi plantæ inseruntur conualescunt & fructificant, optima tamen insitio est, ut diximus, similis quantū potest in similia, præcipue in trūcum aut ramos omnes incisos, ut sæpe probauimus. Item aut Varro quod melior

*melior est infusio in arborē domesticam, quā sylvāstem, quia meli-
 ores fructus producit. Itē melior sit immutatio in toto quā in par-
 te, quia aut omnis infusio fit per infixionem unius in aliam, & p̄ fortē
 alligationem, ita quod infusa quasi uenas radicales spargit in eam
 cui inferitur, fit quod illa, cuius mollicies tanta est quod citius conte-
 ritur q̄ infigi & colligari ualeat, nō posset inferi alicui plantæ, &
 ideo herbe molles habētes stipites, ut olera & nimis tenelli surculi
 nulli plantæ q̄diu tales sunt inferi possunt, quoniā inserta nō cito ra-
 dicatur in ea cui inferitur sed oportet quod processu temporis con-
 fortetur & continuetur cum ea cui inserta est. Hec igitur est causa
 quod mollis planta, nec in mollem nec in duram, nec in similem nec
 in dissimilem inferi potest. Nec etiam in eam quæ multum dura est
 conuenienter inferitur, multum enim dura non de facili in se uenas
 radicales recipit, propter ariditatem & difficultatem duræ perfo-
 rationis, & ideo tales infusiones plerumq; male pueniunt sed infe-
 rentes querere debent parua fraga & recentia, in quibus sit multa
 succositas, & parua durities, quæ quidem sustinere possit colliga-
 tionem, & facile aperiat̄ a calore naturali. Hec enim cū inferitur
 cito aperit se uersus eam cui inferitur, & emittit in eam uenas radi-
 cales, p̄ quas fugit melius nutrimentum quam sugeret ex terra, &
 ideo tunc conualescit infusa melius q̄ si in terra esset fixa. Hec est rā-
 tio in surculi infusione. Item sunt surculi inferendi steriles, q̄a qui se-
 rentes fructum tantum ponunt, non facile ad debitū uenire possunt
 argumētum. Item de nouo nati, propter rationes prædictas gēmis
 grossis, sp̄siis & pluribus oculati, quia ibi abundantia generatur
 uirtutis, quæ maximè in humore digesto & spisso & optime cōmi-
 xto, in gemmis coadunato consistit. Item ab orientali arboris par-
 te decisi, quia in ea magis quā in alia parte in ramis propter il-
 lustrationem temperati caloris solis est caliditas & humiditas, quæ
 omnibus an malibus sunt causa uitæ sed etiam ex alijs p̄tibus acce-
 pte conualescant. Oportet autem scire quod infusionum multi sunt
 modi,*

modi, quò optime proueniūt, & à sylueſtirate ad domeſticationem plantam tranſmutant. Primus quidem eſt, quod fraga eiſdem arboris omnia ultra mediū medullæ ex tranſuerſo incidantur, & tunc alligetur quod incifum eſt, ſicut uulnera ligari conſueuerunt, & circumponatur cera uel lutum ad pluuiæ & extrinſecorum nocummentorum deſenſionem, & ne rumpi aut eorum plagæ aperiri agitatione uentorum poſſint, conuenientibus perticis muniantur. ſtatim enim conſolidato uulnere ſuperior pars emundatum in ſapore proſcri fructū, propter digeſtionem ſucci in nodo factam, & hoc proprie dicitur incifio, quo quidem plantam in alteram non tranſmutat ſpeciem ſeu genus, ſed eam de ſylueſtri domeſticam facit. Secundus autem modus eſt, quod una & eadē arbor abſcindatur in trunco, & fragum ſuperius in eadem arbore acceptum trunco ſuo infeſtatur, tunc enim conualeſcens inſita proſcri fructum alterius generis in ſapore, & quantitate, & figura, quam prius protulerat, & iſte modus fecit diuerſitatem omnem, quæ eſt in malis & piris, & cæteris fructibus, tanta enim eſt uis nodi & conuerſionis pororum qui prius aſcenderunt, quod ſuccum ex nodis retentum dirigunt ad aliam formam plantalem, quæ forma monſtratur in quantitate & ſapore fructus. Tertius modus inuentus eſt in uite, & quibuſdam alijs quæ ex medulla creſcūt, uidelicet quod gēma unius uitis excidatur uſq; ad medullam proſunde iadnere tranſuerſo & obliquo, & tantundem de gemma uitis alterius eruitur, & loco alterius ponitur, & fit colligatio ſicut in alijs, & tunc cōualeſcit & fructificat, & ſicet forte in alijs arboribus, ſed in uite expertum eſt. Quartus uero modus inſitionis eſt, quo fragum unius arboris in aliam infeſtatur arborem conualeſcit & fructificat in ea per modum qui ſepe dictus eſt. Et iſte modus regulariter cum fuerit magis ſimilium erit melior, & citius conualeſcens, & fit proprie in illis arboribus quæ rectos habent poros, & per tunicas ligatas à radice accipiunt nutrimentum. Sed iſte modus & ſimiliter ſecundus in plures ſub diui-

duuntur modos, & unus quidem est, quo furculus inferendus inter corticem & lignum nouæ matris imprimitur, secundus est, cum furculus scisso infigatur ligno: tertius qui fit more emplastri, quartus qui dicitur ad buccellum, quintus uero salicis pertica perforata. De omnibus per ordinem dicendū est. Primus quidem modus quo furculus inter corticem lignumq; deponitur, fit hoc modo, truncum feruere decidamus acuta, in loco nitido et succoso, ipsumq; cum fascia corticis desuper poliamus, deinde uimine salicis aut ulmi ligamus, ubiq; inter corticem & lignum cuneum ferream, uel ossium in acutū tendens ab una parte latum & ab alia quasi rotundum tribus prope digitis considerandum deponimus, ne corticis fascia scindatur, & in eum locū subducto cuneo statim furculum mergimus ab una parte decisum, salua medulla & cortice partis alterius, pellicula exteriori remota, ita quod optime trunco adhæreat furculi incisura, qui super truncum quatuor aut sex digitis emineat, uel usq; ad os, duos uel tres, uel plures furculos pro trunci constitutumus qualitate, quatermis digitis, uel amplius ad minus inter eos spaciū reinquinamus, & latum desuper conuenienter ponimus & disponimus peciam uel ligamus. Hic autem modus optime comprehendit & conualescit, sed fieri non potest nisi mense Martio uel Aprili, cum iam potest lignum à cortice separari. Sed nec fieri potest nisi in trunco grosso uel mediocri, & in his arboribus quæ grossam habent corticem & pinguem, ut ficus, pirus, malus, & similes. Conualescit autem maxime iuxta terram huiusmodi facta incisio, & etiam in quacumq; parte stipitis, & grossorum ramorum satis congrue prouenit, sed duobus ad minus omnis furculus propter uentorum rabiem aduinculis eget. Modus autem secundus qui scisso fit stipite, hoc modo agendus est, resecetur truncus & desuper polietur, ut dictum est in modo prædicto, deinde scindatur in ea parte quæ magis succosa uidetur, & quæ corticem ibidem planum & adæquationi furculi cōgruum cernatur habere, quod maxime in uenis ubi magis

est spaciū

est spaciū inter corticem & medullam propter abundantiam nutri-
menti quod ad partem illam accessit, quod si antequam scindas
vinculum prope summum stipitis ligaueris truncū cum minima scissa-
fura longitudinis defendet, deinde cuneum duobus digitis uel mo-
dicum minus longum formabis in furculo ab utraq; parte decissum sal-
ua medulla, & aperta scissura cum aliquo cuneo, & de ipsius scissu-
re labijs sublata omni lanugine, si affuerit cum punica parui culiculi
acuti, furculum immerges, tamen quod cortex cortici adhaeret
in parte exteriori, & lignum ligno interius, ut succus inter cortices
& ligna possit liberius pertransire. In scissura etiam furculi optime
trunco nouae matris adhaereat, deinde subducto cuneo, & in trunco
furculus sponte constringatur immixtus, super riuulas & cortices
coniungendas aliquid corticis eius arboris, uel panni l. uci cerati po-
natur, & cum uincto stricte ligetur, deinde, ut ait Cato subtili pulue-
re in superiorem scissuram immisso, creta plurimum comprehensa
cū pauca arena & fimo bubalo, ut idem ait, uel cum cera super trun-
cum & ligaturam ad defensionem caloris uenti & pluuiae congrue
disponatur, & pecia fasciatur. Ego autem plusquam millesies pro-
baui & semper inueni sufficere solam cretam bene com. cessam si-
ne fimo & arena, uel cera & puluere, in scissura haec etiam prode-
runt, si uapor à radice ascendens ad nouum alendum furculum fo-
ras egrediens denegetur. Notandum est tamen quod istiusmodi &
actus, & operatio diuersificatur secundum diuersitatem grossitudi-
nis & tenuitatis stipitis inferendi, & cunei furculi incidendi. Nam
inferendus stipex est ualde grossior furculo aut modicum aut n. h. l.
Si quidem stipex est ualde grossior, duobus potest scind. modis, uno
modo ut ab una parte stipitis usq; ad medullam in tantum cum con-
gruo ad hoc si. alpro scindatur, ubi unus tantum furculus infigatur,
alio modo ut ab una parte stipitis ad aliam scissurā petraſcat, ubiq;
duo furculi scilicet unus à qualibet parte ponatur, uel unus tantum si
placuerit ab una parte altera uacua remanente. Si uero stipex est

modicum grossior furculo, necessario per medium scinditur, & in
 unum solum recipit furculum. Vbiunque autem unus tantummodo
 furculus ponendus est, debet cuneus eius formari ut in scissura ex
 utraque parte facta, tertia cum cortice conuenienti remaneat, in
 quarta uero quæ intra stipitem stare debet nihil corticis & latitudo
 denis uideatur, aut modicum eo modo melius quo furculus in cortice,
 quàm in ligni stipite exterius & interius adæquetur. Vbi autem
 duo furculi sunt ponendi fit in scissura cunei à duabus partibus pro-
 pe medullam, quæ etiam ad medullam & acumen accedat, ab alijs
 duabus partibus fit quasi eiusdem latitudinis, ita quod pars parum
 latior cum omni cortice permanens extra cum cortice matris æque-
 tur, pars uero strictior remota exteriori corticula uersus medullam
 stipitis interius disponatur. Si autem stipex est æqualis furculo quæ
 inseritur formetur cuneus, ut ab utraque parte sit cortex, & utra-
 runque fiat æquatio, & cortice, & peciola super rimas posita, sub-
 tili uinculo scisso uel cordula cummodò ea structura ligetur, & post
 modum cum creta seu terra & peciola fascietur. Et hic modus iun-
 cta terram & in altum & in summis latibus optime conualescit, &
 omnes istæ formæ quæ sunt scisso trunco possunt fieri conuenien-
 ter mense Februario & Martio, etiam mense Aprili, si furculus o-
 mni tenera parte priuetur, & melius si colligantur antequam pul-
 lulent, & diu sub terra in loco frigido umbroso seruentur summi-
 tatibus non subuersis. Et etiam mense Ianuario cum calefactione
 ignis facta insitio, comprehendit cum eius auxilio conglutnans cur-
 rat succus, sed tunc temporis erit insitio cæteris melior, & melius
 conualescens, cum iam cortici se uiridis succus intulerit, & gema-
 mæ incipiunt esse suspectæ. Ego etiam malorum insitiones feci cir-
 ca principium Augusti de furculis illa æstate maturatis, & satis
 congrue prouenerunt, ueruntamen talis insitio faciendæ est sub ter-
 ra, uel modicum supra eam, ut tumulatione terræ à tanto æstu in-
 sita defensetur, uel supra caminus aliquid stilans suspendatur, &
 hoc

Hoc auxilio poterit hoc tempore etiam in altum fieri. Fit etiam, ut ait Varro, hæc insitio commodè in solsticio æstiuo & caniculæ signo, & præcipue in fico, ut in tractatu insitionis fici scripsi. Potest etiam prædicta insitio fieri sub terra & circa terram seu modicum supra terram, ubi sine dubio insiti ramusculi proueniunt omnibus alijs locis ad incrementa maiora, quia ibi lignum & cortex maxime beneficio soli adherentis humescit, cuius insitio loci magis conuenit plantis parulis in quibus insitio celebratur. Si uero planta mediocriter magna fuerit commodius erit eandem in locis altioribus inferere, ubi cortex sit uiridis & succosus quàm ipsam circa terram inferere, quia sic fructus ex ea pluribus annis tardius haberetur, ueruntamen quantomagis inferius fiat tanto magis domesticatur fructus, ut supra probatum fuit. Si uero fuerit arbor magna, plurimos habens ramos, nil erit utilius quàm ramos in locis nitidis rescare, ibique quotcumque uolueris surculos inferere. Quod si adeo uetusta est arbor quod ramorum cortices nimium sint rugosi, ac humore consumpti, arbor eadem incidatur & relinquatur incisa usque ad annum sequentem, & tunc inferantur surculi qui in ea nati fuerint liuiores, & in commodiore parte locati, circuncisis cæteris & abiectis qui tot numero esse poterunt, quot inferenti placebit, quia omnem numerum surculorum sufficienter nutriet talis arbor. Modus quidem inferendi quem Palladius emplastrationem uocat, sic ab eodem fieri affirmatur, ex nouellis ramis incisis & fœtibus gemma quæ bene apparebit sine dubio processura, duobus digitis quadratis circumsignetur, ut ipsa statuatur in medio, & ita subtiliter cortex leuetur acutissimo scalpello, ne gemma lædatur. Item ex ea arbore cui gestimus inferere similiter cum gemma toletur emplastrum, nitido tamen atque uberi loco, tunc ibi conuenienter impressione circa gemmam uinculis cogitur sine læsione germinis coherere, ut ea quæ apposite redditur loco gemmæ prioris includat, tunc luto superlinis & liberam gemmam relinquit, cui

multum proderit si peciola cum cera super iuncturam & rimulæ corticum apponatur, ad extrinsecorum nocumentorum defensionem. & nutrientis succi et uaporis uiuifici retentionem, ramos deinde superiores eius arboris refecabis, ne mater proprios uolens nutrire ramos, alienum filium sibi propter utilitatem radicum per eundem relinquat: deinde uero uiginti diebus extrahis aut pluribus, resolutis uinculis reperiēs externi seminis gemmam nire in arboris alienæ membra transfixam, hic autem modus mense Iunio fieri posse aseritur, licet & ante & post modicū cōprehēdat, dummodo gemma conueniens habeatur. Et modus igitur qui uulgariter dicitur ad buccellum qui huic proximo plurimum est affinis, fiat hoc modo, buccellum paruum grossitudine pollicis longum, cum gemma in medio de nouo furculo eleuetur, in nouo furculo eiusdem grossitudinis suo cortice intres uel quatuor partes scisso & denudato ponatur, & tamen ad inferius consideranter comprimatur, quod ligno stipitis mediocriter stricte adharecat, & cortex appositus furculi non scindatur, & siue gemma posita super locum gemmæ sublatae ponatur siue non, nihilominus siue aliquo ligaturæ uel alterius rei auxilio conualescit. Abscindenda est tamen omnis circumdāns soboles furculorum, ne insitæ surrīpīant nutrimentum, ei tamen magnum adminiculum præstabit, si cortex pendens taliter rescindatur, quod remanenti appositus buccellas subtiliter adaequetur, & propter dictam causam peciola, deinde creta super iuncturam & totum buccellum ponatur, libera gemma relicta, deinde ne cera relicta cadat, linea pecia fascietur. Fiat autem hic modus mense Martio, postquam cortex separatur à ligno, & mense Aprili, & Maio, si furculi antequam gemmæ collecti seruentur, ne pullulenti in loco frigido & umbroso, sub terra pro parte submersi. Item expertum est in mense Iunio circa finem & Iulio buccellum paruum cum gemma de nouissimo furculo ele-

natum, & in nouissimo furculo positum eiusdem grossitudinis si-
ue gemmæ adæquantur siue non, sine aliquo auxilio ligature uel
alterius rei optime conualere. Et tam hic modus quam supe-
rior proximus qui emplastratio dicitur, locum habet in his solis
arboribus, quibus succus pinguis est in cortice, ut ficus, oleis, casta-
neis & similibus. Potest etiam sine abscissione inferendi furculi ea-
leuari buccellum, & domesticum eiusdem grossitudinis ab una pte
fissum, ibidem apponi, & cum filo ligari, & præparari, ut dictum
est supra, & cum comprehendisse uidetur supra buccellum abscide,
relicta enim summitas succum ad buccellum fortius attrahit quam
abscisa, & hoc modo possunt plures eiusdem speciei & diuersarum
in una uirga formari. Modus uero qui fit in salicis, pertica, fit hoc
modo, pertica uel baculus dictorum lignorum perforetur subtili te-
rebra & acuta, ita quod inter unum foramen & alterum sit spaciū
semipedis, & furculus modicum raso cortice intromissus iacenter
iungatur in scrobe furculis eleuatis, ita tamen quod pertice saltem
salicis summitas aliquid remaneat supra terram, hinc uero post an-
num materia totaliter eleuata, & inter furculos incisa, plantam quæ
libet radicibus plurimis decoratam in ordinata scrobe depone, cui
forsan proderit si creta uel cera foramina & corticis fissuræ undique
optime obturentur. Quidam autem mihi asseruisse expertum fuisse
hanc infitionem in palo salicis uiridi perforato usque ad medullam so-
lummodo & infixisse furculos æqualis grossitudinis remoto cortice,
ecce, quatenus intrarent in foramen, ut cortex furculi æquaretur cor-
tici pali, & cum cera omnem riuulam obturasse, & posuisse palum
sub terra quatuor digitis iacentem in loco aquoso, ita quod de palo
nihil apparuit, sed solum furculi supra terram, & comprehendisse optime omnes, & resecato inter furculos trunco placuisse & bene co-
ualuisse. Alium autem modum inferendi retulit, Columella dicens: gal-
lica terebra usque ad medullam arborem perforandam, plaga inte-
rius leniter inclinata, ubi deducto omni fragmine, uitem uel ramum
admo-

ad modum foraminis deliberatū succidū tamē & humidū strictū
imprimi, una uel duabus gemmis foris relictis, & tunc argilla &
musco locum diligenter operiri, & ita uides in ulmo inseri posse di-
xit. Prædicti autem duo modi fieri possunt congrue in mense martij
& in principio aprilis ac februarij, siue cum uiridis & nouus suc-
cus calore aëris dissolutus mouetur in cortice. Item scribit Varro an-
tium modum inserendi suo tempore inuentum in propinquis arbori-
bus hoc modo, ex arbore qua uult habere surculum in eam quam
inserere uult ramulum traducat, & in eius ramo præciso ac defixo,
implicare in locum, quod contingit ex utraq; pte, quod intus est sal-
ce extenuatū, ita quod ex una pte quo cælum iuxta est corticem cū
cortice æquatum habeat eius ramuli quē inseret, cacumē ut directū
sit ad cælum postero curet anno, cum cōprehenderit unū propaga-
tum ab altera arbore pcedit. Ex prædictis igitur patet q̄ licet insa-
tio in familia sit melior, tamen in dissimilia plurimū cōualefcit, & in-
finita mirabilia facit, quæ apparent in his qui experiri desiderant
& in talibus exercitantur.

Ex quibus dispositionibus & in quas transmu-
tentur plantæ syluestres in dome-
sticationē, Cap. XXIII.

IX his quæ supra determinata sunt, scimus plantas sylue-
stres esse spinosas & scabiosas in corticis substantia, & pa-
uorum & multorum foliorū, plurimorū fructuum, & in
quantitate minorū, & acutiorum succorū, & hæc omnia non dubi-
tamus accidere plantæ propter suū nutrimentū, & ideo plantæ in
omnibus his dispositionibus mutatur p nutrimentū cultoris agri in
oppositas dispositiones, spinositas enim venit ex humido nutrimen-
tali intenso, quod cogitur ad superficiē perungere ad medullā ipsa sua
intensione, & hæc in domestica mutatur per abundantia humidū,
quæ non patitur calorem acui, sed frangit eum, & nō sinit terrestre
congregari, sed infundit & currere ipsum facit in poros plantæ.

Simi-

Similiter autem eiusdem humidi abundantia fuit in maiorem foliorum diuisionem, hæc etiam facit ut maiores sint fructus domesticarum, & quia humor syluestrium tenuis & subtilis est propter paruum earum nutrimentum, erit humor domesticarum spissus & uiscosus ad phlegmatis naturam accedens propter eius abundantiam, & letaminis administrati commixtionem, tenue autem & subtile facile dispergitur à calore, & diuiditur in plurima, & ideo in numero sunt plurimi fructus arborum syluestrium, & non uermiculati, sed integri in arboribus diu perscuerantes, quoniam subtile & tenue non facile putrescit, nec de facili claudit poros sue uergetationis, per quam fugit ex arbore, præcipue cum in eodem humido sicut in proximo subiecto sit calor acutus: abundans autem & spissum, & uiscosum humidum per magnas partes fuit in unum, & non est facilis diuisionis, eo quod calidum eius est hebes, & ideo fiunt ex eo maiores quidem & non tot numero fructus, sicut ex tenui & subtile & acuti caloris existente, & cito hebes eius calor permittit claudere eius porum, per quem fugit arbore, ita quod multi talium fructuum cadunt ante tempus maturationis, & de facili attrahunt uermes. Quod autem emundat succum & digerit in domesticis, nodi præcipue sunt insitionum, qui tenent in corticibus suis & transversalibus poris humidum, donec ad suauem mutaretur saporem, & talis quidem est transmutatio earum per insitionem domesticarum arborum. Illæ autem plantæ quæ sunt de genere granorum & olerum ex solo cultu & cibo domesticantur, in hoc quod substantiæ & molliores, & maiores efficiuntur, & sui saporis, & humores minus efficiuntur acuti, propter causam quam supra diximus, subtilitas enim corticis quæ est in domesticis & planicies absq; dubio ex bonitate & abundantia provenit nutrimenti.

N Delocis

De locis utilibus & inutilibus genera- tionis plantarū, Cap. XXIIII.



Lanta in generatione sua duobus indiget, quorum unum est materia ex qua fit, & alterum est locus suae generationis, quemadmodum est pater. Et materiam quidem impedit loci salsugo, eo quod exiecit humidum radicale plantarū, cuius signum est quod terra salsae uel commixtae, uel sale seminata steriles efficiuntur. Loca autem perpetuis niuibz cooperta omnino non competunt generationi plantarum, quia experimento comperimus niuem à temperamento esse remotissimam, propter frigus glaciale quod est mortificatiuum. Oportet autem scire quod si aliquis locus in se temperatus in hyeme frequenter sit nix cooperatus, iste eximie tribus ex causis fecunditatem accipit, quarum una est, quod uis terrae euaporans reflectitur saepius ad terram, propter niuis cooperimentum, alia autem causa, quia niuis repressa caliditas ad terram illam expirans, conueniens generationi praebet nutrimentum humidum, quod paulatim per uices distillans superioribus partibus terrae vigorem natuum plantarum continue infundit. Tertia est causa, quia nix frigiditate sua locum circumstantem & vigorem principiorum generantium plantarum continet ne euaporetur, & continet terrae superficiem ne emitat intus in uisceribus terrae uapores generatos, qui congregati ad superficiem ingrediuntur radices plantarum, & praestant ei nutrimentum & fomentationem, & generationem materiae, quae ingreditur plantarum commixtioni. Sicut autem diximus, quod locus perpetuus in frigore propter inuositatem non conuenit generationi plantarum, ita eodem modo in locis salis & siccis non apparet multum generatio plantarum propter remotionem locorum à temperamento. Haec eadem in loca multam salsuginem habentia multae sunt siccitatis, & per consequens multae frigiditatis, eo quod calor coëplexionalis non conualescit & retriactur nisi in humido temperato, & si alius calor alius
quando

quando fit in talibus locis est adurens talis calor, non remanet, sed evolat adustus frigidus, & mortificans ea quæ forte nasci debuissent, & signum huius terre est quod minoratur & contrahitur, & ex siccitate & frigiditate, quia elongatur à calido & humido, quæ eleuant & faciunt crescere loca & exaltare. Propter quod terra dulcis quæ abundat in calido dissolvente & humido vaporante frequentius eleuatur in colles & montes, & terra salsuginis multe deprimitur. In locis autem calidis per convenientiam mater. & plantarum & loci apte & bene nate proveniunt, in talibus enim locis est aqua subtilis, & bene digesta, eo quod à calore loci talis ex profundo attrahitur terre & bene commiscetur, & bene digeritur à calore loci terminante, à calore enim multo non adurente provenit humidi decoctio. Calor enim in talibus locis abundat ex duabus causis, quarum una est calor loci retinens calorem, secunda causa est calor solis, qui ex aliqua reuerberatione multiplicatur super locum illum, & loci quidem calor est sicut instrumentalis, calor autem solis sicut terminans & formalis, & quasi vivificans, & ideo formatur continue humidum in plantis, aer etiam immixtus est humido locorum talium, & iuvat ad hoc ut humidum sursum spirando educatur in plantæ figuram, montes autem qui sunt subius concavi & vaporosi attrahunt à suis concavitatibus humorem, & adiuuat ad hoc caliditas multa, quæ est radiorum solis & stellarum, & multa ad annexum montis reuerberatio, & ideo festinat in his humidi decoctio, præcipue in latere conuerso circa calidum solis, hoc est, circa meridiem, propter quod plantæ multæ & bene decoctæ proveniunt in montibus præcipue, nimum humidum enim attractum ad montis superficiem ex figura deuectatis continue defluit, & ideo superius vinum remanens optime decoquitur, quia melius unctur à calore, quando non est superfluum, nec omnino siccatur, quia continue attrahitur, & ex gibbo montis crescunt una odorifera & plantæ aromaticæ, & sunt plantæ & uina magis sicciore aliquantulum. Ad pe

des autem eorundem montium sunt planta & uina magis humida, & minus digesta, & planta spissiores propter multum humidum annexo montibus, cōtinue ad calida loca defluens. Quædam tamen loca siue plana, siue montuosa, perpetue sunt sterilitatis, & hæc nō cantur heremi, & hæc sunt arenosa & salsa, & hæc sunt uincētem in se habentia salse dinem & siccitatem, & inter arenulas locorum talium sunt raritates, eo quod partes arenarum sunt contiguae non continuæ sibi compositae. Planta autem non potest generari ex uapore continuo qui diffidūtur ex circuitu loci, in multis partibus loci continuis à uirtute solis euaporantibus. In talibus igitur locis aut non generatur planta omnino, aut rara, aut debilis essentie, sicut est saxifraga, & quædam alia gramina parua. Partibus enim loci non coherentibus propter aduersionem, impossibile est partes uaporis solide essentie & coherentis esse, propter quod etiam expirat, inter arenas per diuersas partes, & non formantur in plantam. Lutum autem nobile quod ingenuum est & liberum à grossa terrestritate propter nullam uositatē suam, cito producit plātam unctuosam, esibilem. Planta autem quæ super solidos lapides nascitur propter carentiam humoris uix longo contingit & crescit tempore: planta enim remanens & crescens indiget terra, & aqua, & aëre, & raro hoc habet planta quæ in lapidum soliditate erumpit. Est & alia plante consideratio ex loco plante proueniens, quoniam si fuerit in loco qui est prope solem, hoc est, ad directum solis respectū uersus orientem & meridiem, citius nascitur & crescit, eo quod calor solis directius & diutius manens super eam, cōuenientius & fortius mouet humidum eius: & quando fuerit ad aquilonē & occidentem, ita quod sol cito declinat ab ea, tardabitur generatio eius, & incrementū diminuitur. Ait autē hoc dupliciter, naturaliter scilicet aut per accidens, quando locus aliquis ex montibus uel alijs causis proprietatē accipit orientis uel occidentis. Similiter autem si in loco planta sit aqua frigida grossa in se concludens aërem siue uaporem

aërem

æreum, qui sua frigidityte & spissitudine ascendere, siue uaporare non permittit, ille uero permittit plantas nutriri ad magnum incrementum. Eodem autē modo impedit siccitas retenta in loco aliquo in incrementum plantarū, propter defectum humidi nutrimenti. Tunc enim calor naturalis diffunditur ad extrema loci, & agit nullos cōburendo & construendo poros uiarum, sicut obstruuntur terrestri adusto, & tunc aqua nutriens etiam si adesset, non haberet meatus per quos in plantæ nutrimentum euaporaret, & remanet destituta nutrimento, & ideo non crescit in magna quantitate.

De terra & cognitione fecunditatis & sterilitatis eius, Cap. XXV.

Terra est unum ex elementis generatorum, cuius natura-
lis locus est in medio totius in quo naturaliter manet quie-
ta, et ad ipsum cum ab eo separata fuerit, naturaliter mo-
uetur, est autem frigida & sicca naturaliter, sed accidentaliter re-
bus intrinsecis immutatur, eius uero esse in generatis iuuamentum
prestat ad retentionem faciendam & fixationem, & ad seruandas
figuras & formas. In terris uero secundum Palladium fecunditas
querenda est, ne alba & nuda gleba sit, ne macer sabulo sine admi-
xtione terreni, ne creta sola, ne arena squalentes, ne ieiuna glareæ,
ne arenosi pulueris lapidosa macies, ne salsa uel amara, ne uligino-
sa terra, nec mons arenosus atq; ieiunus, ne uallis nimis opaca &
squalida, sed sit gleba putris, & ferè nigra, & ad tegendum segra-
minis sui crate sufficiens, aut mixti coloris, quæ & si rara sit, tamen
pinguis & cretosi soli adiunctione glutinetur: quæ protulerit nec
scabra sint, nec retorta, nec succi naturalis egentia. Verū quoniam
alia terra dādis frumētis utilis est, quæ naturaliter cōuenit, & alia
magis uincis amica est. Sciendum est autem quod frumentis dā-
dis utilis est, quæ naturaliter & sua sponte producit ebulū, iuncum,

gramen pingue, trifolium, calamum, rubos pingues, pruina sylvestria, lappas, maluam, et ceteras huiusmodi herbas que latitudine et pinguitate foliorum latum solum et secundum demonstrant. Color tamen terre non magno tempore desideretur, sed pinguedo atque dulcedo, in qua sic cognoscis terram, glebam parum dulci aqua conaspergi, et subigis, si glutinosa est et adhaeret, constat ibi esse pingue diuinem. Item scrobe effossa et repleta, si superauerit terra pinguis, si defuerit exilis, si conuenerit aequata, mediocris. Dulcedo autem cognoscitur, si ea parte agri quae magis displicet, si eiusdem qualitatis totus ager uidetur, fictili uase dulci aquam madefactam indicio sanporis explores. V. uicis quoque, utilem per haec signa cognoscet, si corporis aliquatenus rari atque resoluti, m est, uirgultaque, profertur lini nitida, procera, fecunda sunt, ut prunus sylvestris, prunus, rubus, ceteraque huiusmodi, neque intorta, nec debilia, neque macra, exilitate languentia. Et haec in communibus in modum absoluta qualitercunque sufficiat de terra agri siue congrua uicinis, quia plenus dicitur de ipsa in libro uenarum. Sed cum sint genera terrarum plurima, pinguis autem et macra et spissa uel rara, sicca uel humida, lapidiosa, uel non lapidiosa, montuosa uel plana, et ex his pleraque uinosa, tamen propter seminum et plantarum differentiam saepe necessaria, maxime tamen et absolute eligendus est pinguis et resolutus ager ubicunque situs, quia hoc minimum laborem petit, et fructum maximum reddit. Secundum meritum est spissus et pinguis, quia licet laborem maximum petat, tamen ad uota respondet. Illud uero deterrimum genus est, quod erit siccum et spissum, durum et frigidum, qui ager more est infertili, frugibus gignendis est. Veruntamen quod agri simi uariis utilitatibus deputati Varro recitat Catonem in nouem genera diuisisse, ac graduum utilitatem scripsisse, ait enim meliorem esse agrum illum, ubi uineta posita sunt esse bono uino ac multo, secundo ubi ortus irriguus, tertio ubi saliceta, quarto ubi oliueta, quinto ubi pratum, sexto ubi capus frummetarius, septimo ubi ceduae syluae, octauo ubi arbuta, nono ubi gladiaria.

daria sylua aliqui dāt prima cū bonis pratis, q̄a modi cas aut nullas requirunt expensas, contra in uincis habere, eo quod fructum saepe sumptus deuorat.

De situ qui congruit agris ratione fecunditatis eorum, Cap. xxvi.

Situs terrarū nō sit adeo planus, ut stagnet, nec præruptus, ut defluat, nec obrutus ut in imū d̄ recta ualle subsidat, nec arduus, ut tēpestates immodice sentiat & calores. Sed ex his oībus nilis semper & æquata mediocritas regatur, n̄ delictet ut campus aptior sit, & humorē pluuiarū eliuo fallēte subducens, uel collis molliter platera inclinata deductus, uel uallis cum quadā moderatōe & aeris claritate submissa, uel mōs alterius cacuminis defensus, & liber à molestioribus uētis aliquo auxilio, uel sublimis, asper sed nemorosus & herbidus. Præterea positio agri q̄ eligēdus est, si sit in frigidis paucijs orientali uel meridionali lateri ager debet esse oppositus, ne alicuius magni mōtis obiectu his duabus ptiabus exclusus algore rigeat. In calidis paucijs ps potius septētrionalis optāda est, quæ utilitati, uoluptati & saluti et æquē bonitati respōdeat. Ut ait Varro, q̄ quatuor extra fundū considerāda sunt q̄bus fundus utilior uel minus utilis redditur. Primū est, si regio proxima est infesta, quā fertilis sit fūdus inutilis tamē est ppter latrocinia. Secundū est, si in regiōe p̄p̄inqua sunt hoīes qui emant, quæ in fūcio sunt uenalia, uel ne care uēdant quæ fundo sunt oportuna, fructuosior enim fundus est. Tertū si nimis lōgiqua est, ut ex ea difficile necessaria portētur ad fundū, minus fructuosior cēctur. Quarto, eūdē fundū fructuosiorē faciūt necluræ, si uic sunt q̄bus plaustra uel naues portare ac exportare necessaria possūt. Refert etiā ad fūdū fructus spectātū quēadmodum uicinus in cōfinio cōsitum agrū habeat, si enī ad līmina queri ū habeat, nō possis recte sub eā quēdā serere, olcā; usq; eo est contrariū natura, ut arbores nō so. ū minus ferant sed et āfuziāt, ut inuicem in fundū se reclinēt, et in confinia utē & fundum faciunt sterilem.

De munitionibus vinearum, hortorum
& agrorū, Cap. XXVII,

Minearum hortorum & agrorū munitiones multis modis
fiunt, quidam enim fossatis cingunt, quidā sepibus ex pa-
lis & viminibus factis, qdam spinarum aut aliarū arborū
plantis. Et fossarū qdem munitiones plurimū defendūt ab ingressu
hominū & animalū rapacī, & ab iniuria uicinarū aquarū ad loca
defensa fluentiū, & maxime si ripas habent ualde sufficientes ag-
geres eleuatas. Multum etiam cōserunt agris & uinceis nimium hu-
midis & aquosis, ut ad eas fluat superflus humor aquosus, segetes ne
cans, & in lolīū & auenā conuertens, & completam digestionem
impediens. Et hæc quidem fossata magna uel parua sunt, secundum
quod magis & minus aquosa sunt loca, & secundūq; magis & mi-
nus hominum & animalium intrare uolentiū timeant noxiam. Fiunt
autem optime toto æstatis tempore si aqua subterranea uel in fossa-
tis reperandis collecta nō impediāt, in quibus locis facienda sunt
mense augusti, septembri & octobri. Quibus mensibus aqua fossa-
rum & superficiē terre maxime consumpta est. Qualiter autem
fiunt noua fossata notum est, quod ab utraq; parte latitudinis filiū
seu funis extenditur & signatur, deinde uangis in terra & ligonia-
bus in sabulo fodiuntur, & badilibus extra remanens contrita terra
proijcitur, & ripæ cū xapis seu uangis poliuntur. Vetera uero fossa-
ta reparantur hoc modo, primo quidem omnia fossorem impedi-
entia cum radicibus extirpantur, deinde cum ligone fundus radac-
tur, & terra cum herba rasa proijciatur ad uiam, deinde cum ligo-
nibus adequantur & formentur ripæ, secundum quod stare debe-
bunt, & post libere fossatum quantum placuerit fodiatur. Notan-
dum est tamen quod in terra cretosa non debent fieri ripæ nimis de-
pendentes, quia post gelidam hyemem adueniente ueris calore dis-
soluerētur & ruerent. Sed in lapidosa & soluta terra facile ruit
ripæ. Munitiones sepium quædam palis & uiminibus fiunt, præ-
cipue

etque locum habent, ubi materie ipsarum habetur copia, & ubi arborum multitudo spinarum plantationem & conualescentiam impederent. Quæ quidem qualiter fiant notum est, quod affixis palis acutis semipede distantibus, texentur uimine & spinis, et desuper muniantur, & possunt fieri cum paucioribus palis & uiminibus. Debiliores tamen fiant affixis palis duobus uel tribus pedibus inuicem remotis: tres uel quatuor particæ distantes æqualiter ex transuerso ligantur, deinde sursum rectis uiminibus positis contexantur. Munitiones autem quæ de plantis spinarum & arborum fiunt, hoc modo faciendæ sunt, uidelicet quod fiat in loco munitionis sulcus uel uno pede concavus & tantundem latus, in quo plantæ aliunde radicatae uno palmo aut duobus distantes ponantur, & terra quæ inde remota fuerat optime trita operiantur radices, deinde fodatur fossatum, & terra supra dictas plantulas eleuatur, & cum tota sursum eleuata fuerit in summitate si placuerit alius fiat sulcus, et similis plantatio fiat. Poterunt etiam multe plantationes fieri propter fortiorem munitionem, si placuerit, secundum modum in primo libro traditum, cum de tumbis et curijs loquerer. Notandum est tamen quod ubi multum necessaria est clausura, ex spinis tantum faciendæ sunt plantationes, ubi uero non tanta est necessitas, et lignorum habetur penuria propter ignem, possunt congrue fieri plantationes, et præcipue ex plantis ulmorum et prunorum, et similibus, quæ omnes plantationes tertio anno cum conualuerint placentur, ut fortes fiant & spissæ, & ubi perditæ fuerint reparentur, deinde cum spissæ creuerint rarius disponantur, & ligentur ubi opus fuerit, & non iuxta terram, sed uno pede supra eam inciduntur tempore Octobris uel Nouembris, & melius Februarij & Martij, usque quo incipiunt turgescere gemmæ: hoc enim modo loca semper clausa erunt, & seps inpassabitur pullulans, in summo stipite, in medio & radice. Ex his tamen quæ in superiori acie sunt plantata, poterunt aliquæ quibusdam pedibus distantes sine

incisione relinqui, ut fructum ferant, aut pro igne seruantur, vel edificijs deputentur. Et plantæ quidem spinarum quæ in acie inferri ponende sunt, aut arborum, aut prunorum, aut rosarum sylvestriarum spinas acutas habentium, quæ uero in suprema ponende sunt, arbores sicut prunæ domesticæ, quæ spinis suis descendunt, et spissa eorum pullulatione claudunt. igni tertio vel quarto anno serunt, et plurimum fructum ferunt, vel sicut plantæ ulmorum vel salicum, vel populorum, et citoniorum, vel malorum granatorum in calido aëre vel temperato, et similia arborum, et præcipue facile pullulantium à radice. Notandum est tamen quod si terra sit adeo frigida et dura, quod in ea plantulæ difficile comprehendant, plantulæ solummodo citoniorum cum radicibus vel sine ponantur ibidem, quæ non refugiant talem terram, quod si est campus uimus est utilior omnibus à ijs plantis, quod et sepe sufficit et attollit uuas, et frondem uicandissimam ministrat ouibus et bubus, ac sepius præbet uirgas ac foco et furno, et est multis operibus optimus. Si uero plantulæ desint in partibus illis, aut aliunde portentur radicibus coopertis, et optime preparatis, ut à calore defendantur et uento, aut maturitatis fructuum tempore colligantur, et sole siccemur semina, et in seminario mense Ianuarij et Februarij sata ut planta nutriantur, ut sequenti vel tertio anno ipsorum copia facile habeatur. Palladius tamen præcipit maturare colligi semina, rubi et spinæ, quæ rubus caninus uocatur, et cum farina crui ex aqua macerata misceri, funes deinde sparteos meteres maxioni sic induci, ut inter funes semina recepta seruantur, usque ad uerni temporis initia, tunc nobis sepius futura est, duo sulci tribus pedibus à se separati sexquipedes altitudine fiant, et per uetrosque cum seminibus obruantur funes in leni terra, uatrigesima de procedunt sentes, quos teneros ad mœculis opus est adiuuare, qui inter se per spina relictâ uia uia uidentur.

De flumini

De fluminum defensionibus,
Caput XXVIII.

Lumina suo impetu sepe ripas possessionum fodiunt, & in eis operantur ruinas, & quandoque suo incremento & depressione uicinorum locorum inundant & operiunt terrarum superficiem. Vbi igitur sua rabie scruunt rupes modicum superius penaculi fortes fiant, secundum impetum amnis, aut ibidem mergantur cistæ cum magnis cornibus ligneis admodum crassatis ab utroque capite factis, & uiminibus contextis, & lapidibus plenis, quæ bergullæ dicuntur. Vbi uero aquarum abundantia superficiem operit & segetes necat, fiant aggeres fortes & magni talesque eorum potentia aquarum iniuriæ contraducant, quod si in aliquo locato debilitabitur ager, antequam deficiat alius conueniens post ipsum fiat, & debilitatus in quibusdam incidatur locis, & currus & bestie ac homines nouum aggerem percurrere & concutere cogantur.

Secundi libri finis.

O 2 CRESCENTIA

CRESCENTII

LIBER TERTIVS DE CAMPE

stribus agris colendis, & de natura &
utilitate fructuum qui ex eis
percipiuntur.



Ampestrium agrorum cultus in libro secundo generaliter traditus est. Nunc autem in hoc tertio libro dicam singulariter de cultu & utilitate cuiuslibet seminis & fructus qui seminatur in eis, & ex eisdem percipiuntur, secundum ordinem alphabeti, & primo quidem dicam de area & horreis, quæ unicuique semini communia necessaria & utilia sint.

De Area.



Area longe à ulla esse non debet, propter deportandi facilitatem, & ut fraus non timeatur domini vel procuratoris in civitate suspecta. Sit autem ut Palladius ait, vel strata silice, vel saxo montis excisa, vel sub ipso tritura tempore unguis pecorum vel porcorum, & aque admixtione solidata. Sit circa hanc locus altus, planus & purus, in quem frumenta transfusa res frigerentur, & horreis inferantur, quæ res in eorum durabilitate proficiet. Fiat deinde proximum tellus: vel habeantur sextaria vel similia, ut tempore imbris subito munda, vel semitrita transferantur vel operiantur. Sit autem loco sublimi & perstabili undecunque. Longe tamen ab hortis & vineis atque pomerijs. Nam sicut radicibus virgultorum prosunt letamen & paleæ, ita insidiantes frondibus perforant & corrumpunt.

De horreis.



Itus horreorum superior longe ab omni olere & letamine, & stabulis ponendus est, frigidus ventosus & siccus. Sed facies

Sed factis granarijs, ut Palladius ait, amurca luto mixta parietes linuntur, cum aridi oleastri folia uel oliue pro paleis adijciuntur. Quæ ut siccata fuerint frumenta cõdentur, hæc res gurgulionibus ac muribus & ceteris noxijs animalibus inimica est. Aliqui coriandri folia frumentis miscunt, ad seruandum profutura: hæc ait Palladius. Nihil tamen cõmodius erit diu custodiendis frumentis, quâsi ex horreis in alterum locum uicinum transfusa refrigerentur aliquot diebus atq; ita horreis inferantur. Negat Columela uentilanda esse frumenta, quia magis miscuntur animalia totis acervis, quæ si non moueantur in summitate intra mensuram palmi subsident, & hoc corrupto uelut corio illæsa durabunt. Ab horreis tamen debet auster esse aduersus. Adhuc cauendum est ne pauimentum super quo ponitur humidum sit aut rarum, sed solidũ & bene planum, ne muribus præbeat habitaculum per foramen. Insuper etiam diligenter attendendum est, ne sit locus excedens in frigore uel calore, quia utrunq; scgetes corrumpit & perdit in eis uirtutem naturalem. Aliqui puteos faciunt, horum solum & latera paleis substernunt, & curant ne humor aut aer tangere possit, nisi cum promittitur ad usum, quo enim spiritus non peruenit, ibi non oritur gurgulio. Sic conditũ triticũ manet annis quinquaginta multũ uero plus annis centũ, ut Varro scribit.

De Avena.

Avena duplex est, syluestris & domestica, syluestris nascitur in frumento, cum granum eius satum nimia mollitie & intemperantia terre conuertitur in auenam, quæ ab eo in herba cognoscitur, quia latiores, uiridiores & pilosiores habet frondes, & huius granum nigrum & pilosum est, & maturatur & cadit ante maturationem frumenti. Domestica est alba non pilosa, & seminatur tempore seminum frumenti, & eodem modo, & melius mense Februario & Martio, & etiam in macra terra bona prouenit, & eundem querit ærem, & similem terram deside-


rat. Peritiores tamen dicunt quod siccum quærit agrum, & modicum post messem frumenti maturatur & colligitur, & tam herba utriusque auriæ quam semen est optimum pabulum equorum & bouum, & asinorum, & multorum, neutra uero ipsarum homines nisi in suo cibo utantur. Virtutem habet relaxandi omnem humorem & duricies, & faciei immundicias depurandi.

De Cicere.

Cicer notum est, & eius quedam diversitates sunt, quæ quoddam est rubeum, quoddam paruum album, quoddam sanguineum, & ex his quoddam grossum, quoddam paruum, quoddam nigrum. Ex quibus sanguineum tantum rugosum corticem habet, & est melius cæteris, reliqua omnia corticem habent politum. Optime nascitur in aëre temperato & humido, & terram pinguisimam & solutam desiderat, & cretam etiam non formidat. Et terram quidem ualde macilentam reddit, seminatur mense Februarii in locis calidis, temperatis Martio. Cui prode vit ut cito nascatur, si molle seratur, & maxime aqua letamini cum tarde seritur, & circa sulcos hortorum optime plantatur, & cum maturum est colligitur remanentibus herbas. Media corbe semina sua uacca contenta est. Sarculatur & herbis mundatur ut faba, sed nebulis læditur, & inde in elunio facile perit. Colligitur quædam granis existentibus siccis, & cum luna multam proceffit in defectu. Cicer album secundum Isaac calidum est & nimis humidum, sed Auicenna dicit in medio primi gradus humidum. Rubrum est autem calidum & nimis humidum. Sed Auicenna dicit quod est calidum & siccum in primo gradu, & nigrum est fortius. Cicer plurimum est nutrimenti, & uentrem humectat sed inflationem generat et tenuitatem, idcirco auget spermata, et continuat de confortat, quæ tres habet in se causas ad coitum pertinentes, scilicet calorem, nutrimentum, et inflationem, ideoque ualde coitum admissariis est, cum multitudinem equorum

æquorū necessario habuerit coop're. Hippocrates dicit, quod ciceris potestates due sunt, & cum coquitur eas amittit, & in aqua ubi coquitur redeunt, una dulce dimis, & altera saluginis. Cum dulcedine sua nutrimento bono nutrit, & lac augmentat, & ventrem humectat, cum salugine uero humore grossissimo dissoluit ac minuit, urina & menstrua prouocat, & ualet ictericis & hydropicis, & ad totius corporis purgationem. Et si eius iure lauatur impetiginem & serpiginem mundificat. Item secundum Galenum cicer edulcorat labricos, & ualet ad oppilationem splenis & epatis & fellis, lapides frangit in renibus & uesica, sed nocumentum est uulneribus renum & uesicæ. Cicer nigrum est magis diureticum & appetitum, & ideo plus ualet in apertione splenis & epatis & fractura lapidum & lūbricis educendis, & præcipue si cum aqua coquatur, & ius ipsius bibatur. Album uero est melius in augmentatione lactis & spermatis. Auicenna dicit, quod cicer clarificat uocem & nutrit pulmonem melius quam res alia, & propter hoc fiunt sorbitiões ex farina ciceris. Et oportet quod cicer comedatur neque in principio cibi neque in fine sed in medio eius, & uehementer addit in coctum, & eius infusio facit erigere membram fortiter quando bibitur à ieiuno.

De Cicercula.

 Cicercula nota est, ac rem humida desiderat, & terram pinguem & cretosam seminari potest in solida terra, ut faba, deinde de arari & sulcari. Tempore ianuarij & februarij & in principio martij feritur. Et media corbis implet uaccæ, bonis cibis est animalibus, & homines ea utuntur elixa, & in tortis & in pane cum alijs generibus frumentorum pro familijs & his qui laboribus exercentur.

De Canapo.

Canapum est de natura lini, & ideo simile aërem et terram desiderat sed non optet ut sit totius exarata. Verūtamē quod uolunt habere canapum, pro summis, seminare debent ipsum in locis pinguioribus.

pinguissimis, in quibus longum ualde pueniet, & grossam & mē
tam stuppam habens ex grossitie corticis eius, & quanto rarius se-
minabitur, tāto magis ramosum erit. Qui uult ex eo facere pannos
scilicet saccos, lintamina, uestes seminet ipsum in locis mediocriter
pinguibus & solutis sissum, in quibus proueniet sine ramulis, quasi
magnum linum, & tale competens erit p̄dictis operibus, & ite-
rum erit necessarium piscatoribus pro retibus eorum. Nam canapū
ualde melius descenditur in aqua q̄ linum, & similiter rete ex ipso
factum, feritur autem mense aprili & in fine martij, & herbis sar-
culo mundatur & manibus, colligitur cum matura sunt semina eius
scilicet masculinum, & in fascibus ligatum ponuntur in aliquo loco
duo fasces simul, ut semina minus sint super semina alterius, & ra-
dices opposite, & cooperiuntur summitates seminum cum herba,
uel aliquo stramine super quo ponuntur lapides uel terra, ut semi-
num maturitas compleatur, & si per sex uel octo dies iacuerit ele-
uatur stramen & lapides, & ponitur lintamen sub uel iuxta sea-
mina, & excutitur semen quod facile cadit, sed foemininum, quod
semen nō habet, totū per decē dies ante masculinū colligitur cū al-
bescit, deinde totū simul maceratur in aqua, ibiq; dimittitur donec
stappa possit à ligno separari, & ipsum lignū putrefactū cōteri, et ma-
xime quod ex eo subtile est, quod uero grossū est ualde longum, ue-
lut ptice, depilari potest à ligno stappa, que facile ab eo carpitur,
postq̄ fuerit maceratū & in aqua lauādo cōtissum, & postea exic-
catum. Et nota q̄ ex eodē semine canapi nascitur canapū ramosum,
quod semina infinita producit, & aliud non ramosum, quod semi-
nibus omnino caret, semen eius optimum est pro auriculis, & ip-
sum libenter assumunt sibi in escam.

De Frumento,



Lumentum est granū, quod ceteris omnibus corporis hu-
mani cōuenientius nutrimentum est propter similitudi-
nem sue complexionis. Eius quidem diuersitas multae sunt.

Nam

Nam quoddam est nouum, nempe unius anni uel minoris ætatis, et hoc maxime conueniens præbet nutrimentum, & tale feri debet, & quoddam est maioris ætatis, & hoc minus laudabiliter nutrit, nec seminibus competit, quia raro uel debiliter nascitur satum. Et cuiusdam granum est longum mediocriter & album uel rubeum, subtilis habens corticem, & farinam interius albam, & hoc est optimum. Quid uero est grossum, rotundum, rubeum uel album aut lucidum, est minus bonum, & pasta quidem quæ sit ex eo non est tenax, nec eius panis crescit in altum: quæ uero sit ex primo est ualde tenax, & eius panis multum augetur: sed ex agro collectus, mensuræ minus respondet quam grossum. Et granum quidem quod in terra pingui nascitur, est pinguius grauiusq; in pondere & nutritius: quod uero in terra macra oritur, contrarium existit. Et quod in regione uel terra calida nascitur, est calidius, et quod in frigida frigidius, quod in sicca, siccius, & quod in humida regione uel terra prouenit est humidius. Et est quoddam in spicis tonsum, & hoc licet breues faciat spicas, & nebulam timeat, plusquam retonsus ut qui dam dicunt, tamen magis à radice pullulat, & spicarum numerum duplat. Grossum uero & maxime spicas habens rubeas, licet eas magnas producat & grossas atq; multum granosas, tamen parum pullulat, & rariores inuenitur spicas habere. In omni climate habitabili nascitur, licet abundantius & nobilius prouentat in regionibus temperatis, sicut in tertio, quarto, quinto climate terram desiderat pinguem, aut mediocris pinguedinis & dulcis saporis. Creta tam diligit, & in mediocriter soluta bonum prouenit, minus uero solutam, aut sabulum nudum recusat, patenti campo letatur et læditur umbris, locis humidis & aquis degenerat in lolium & auenâ, Frumentum uero cum colligitur robustius est, sed mensuræ minus respondet. Seminatur autem frigidis & niuosis locis in fine Augusti, & toto Septembri, temperatis in fine & toto mense Octobri, in calidis uero in fine Octobris & toto Novembri. In quibus omni-

bus locis primo exiles terra serantur, in frumenti sati radices ante hyemem cōualeſcant. Vltimo pingues quæ ſi materi ſerantur lucuriant in ſpuria diuerſarum herbarum, quæ frumenta necant. In iun-
gero ſeminiſ corbis una ſufficiet. Quod ſi predicto tempore terra fuerit nimis ſicca, ſparſa ſemina melius in agris quàm in horreis ſeruabuntur, ſi uero minus, gelicidio ſequentis hyemis corrigetur, ſi extra agrum aqua poterit deriuari, ne germen extingatur. Si terra ſit temperata in octo diebus de terra egreditur, uel paulo poſt, Colitur campeſtris frumentarius ager hoc modo, eo diligenter exculto ſecundum doctrinam in generalibus traditam, & eo ſeminato iterum aretur, & ligonibus uniuerſum ſemen operiatur, glebæ rumpentur, & ex eius ſulcis mundantur jam directæ minores quàm tranſuerſales maiores per inferiores agrorum partes impreſſi, per quos aquæ pluentes libere ſine obſtaculo ad ſoffata deriuantur, quæ ſi tempore quo granum eſt in lacte & incipit germinare in agro remanent, ſemen extinguent. Menſe uero Ianuario & poſt gelicidilū Februarij & Martij poſtquam frumentum eſt quatuor foliorū ſarculo & manibus ab omnibus adulteris herbis mundetur, fiat autem hoc herbofis locis maturius, non herbofis, ſerius. Menſe uero Maio non ſunt tangenda frumenta, quia florent octo diebus, deinde flore depoſito diebus quadraginta grandæſcunt uſq; ad maturitatis euentum. Item dicit Palladius de ordeo, & de cæteris quæ ſunt ſeminis ſingularis, menſe Iunio in locis maritimis & calidioribus, ac ſiccis: temperatis uero ac frigidis menſe Iulio tritici meſis abſcunditur. Quam paratam eſſe cognofcis, ſi æqualiter ſpicarum populus maturato rubore ſtateſcit. Et modus quidem metendi conſuetus notus eſt. Pars uero Galliarum planior hoc compendio utitur ad metendum, & propter hominum labores unus bouis opera ſpatium totius menſis aſſumit: ſit itaq; uehiculum quod duabus rotis breuius fertur, huius ſuperficiēs tabulis minuitur, quæ forinſecus declinæ, in ſummo reddunt ſpacia largiora ab eius fronte, carpenti breuior

nior est altitudo tabularum, ut ibi denticuli plurimi ac rari ad spicaru mensuram constituuntur in ordine ad superiorem partem decurrunt: à tergo uero eiusdem uehiculi duo breuissimi canones figantur, ubi bos capite in uehiculum uerso iugo aptatur, & hos mansuetus qui non modo compulforem excedat, hic ubi uehiculum per menses ceperit pellere omnis spica in carpentum denticuli comprehensa cumulatur: abruptis ac relictis paleis altitudine uel humilitate plerumque bubulco moderante qui sequitur, & ita per paucos itus & reditus breui temporis spacio tota messis impletur. hoc campestribus locis uel equalibus utile est, ubi necessaria palea non habetur. Seca ta frumenta in mane usque in tertiam, uel totam diem, cum aer temperatus est ligantur, quia in horis nimie siccitatis spicae uel ligamina franguntur, deinde ligata portantur ad aream fasciculis numeratis & sub tecto aliquo disponuntur, ita ut aqua fluens intrare non possit, ibique congregantur donec fuerit uniuersa messis expleta. Postea tritatur aut uirgis aut equis, sed uirgarum trituratione melius totum frumentum ex paleis excutit, trituratione uero equorum ex fractione uel ocus palcas nutrimento animalium melius preparat, ab omnibus folliculis & seminibus extraneis, euentatione mundantur, & conuenienter exiccata et refrigerata iterum in areis ad horrea seruanda portantur, cuius durabilitati proderit si saepe inquiretur ne intra se acerui extraneo inficiantur calore, quod quidem cum acciderit, per granaria siue horrea moueantur uel euententur, uel quod melius est ad solem & aerem deferantur, & refrigerata iterum horreis inferantur, generaliter tamen de omnibus granis praeter milium compertum est, quod in stipulis suis diutius quam discussa seruantur. Frumentum iuxta Philosophos calidum est & humidum temperate, cortex eius calidus & siccus est & mundificatiuus, nutrimentum eius est minimum in aqua calida missus atque solatus, coctus pectora & pulmones viscosis humoribus pur-

ribus purgat, & si aqua mittetur in lac nutritibilior fit cū uino aqua mixto coquatur, & fit cataplasma de eo mamillis duris, nam lac coagulatum dissoluit. Farina frumenti cum melle mixta faciei pustulas sanat. Mamillis ex coagulatione lactis induratis cum adipe & uino decocta duriciem molliciat, collectiones & apostemata maturat, peruos induratos & indignatos & quasi spasmaticos relaxat. Frumentum cum sale mixtum apostemata maturat & aperit. Triticū recentis & noui frumenti parum crudum phlegmaticū & inflatū excitat, rugitum & dolorē latericū mouet, assatum magis nutrit, uentositatem minus facit, & stipticum est: in aqua coctum grauisimum est, & inflatuum, digestionē durum, & rugitum mouet, humores densissimos & viscosissimos generat: sed cum bene digeritur, multum nutrit, & membra confortat: propterea dari oportet eis qui magnis laboribus exercentur, granum fractum cum lacte coquatur sanguinem bonum & laudabilem generat, & nutrimentum multum, si tamen sepe sumatur, oppilationem epatis & duriciem splenis & lapidem in uesica & renibus faciunt, maxime si renes calidos naturaliter uel accidentaliter inueniat. Et pasta quidem frumenti quam pluribus utimur modis. Siquidem azima viscosa est inflatua & ad digerendum dura, ideoq; inflationes & dolores & oppilationes generat, & nutrimentum durum & grossum & illaudabile generat, quare exercitantibus tantum conuenit. Si uero fuerit fermentata bonum & laudabile generat nutrimentum. Si uero frixa uel sub prunis cocta mala est, quia exterius dura & interius viscosa & semicocta remanet, ideoq; nec ociosis competit propter viscositatem & cruditatem intrinsecam, exercitantibus non conuenit propter adustionem extrinsecam. Panis in forma magis corticem subtiliorem & duriores habet, propterea eius cortex parum nutrit, & est ad digerendum durus, humiditatem deficiat, unde & ventrem constipat, medulla uero multum habet, & ipsa medulla est grossa & viscosa, humida & inflatua, & phleg-

gma viscosum generat. Panis parui & subtilioris ignis interiora perforat, medullæ humiditatem desiccatur, unde parum nutrit, & tarde digeritur, uentremq; constipat, præcipue si frigidus est, & uno uel duobus diebus à coctione longinquus, qui uero est mensuræ mediæ in forma est mediæ potestatis. Et panis quidem cuius ignis in coctione magnus & fortis fuit, habet exteriora exsiccata & indurata, item interiora non bene cocta, quia cortex uelociter indurata non permittit focum ad interiora penetrare, ideoq; cortex est durus non nutriendus, sicut serè incensa omnia solent. Unde siccissimū sanguinem parit, & constipat uentrem. Et mica quidem viscosa grossa & indigesta, unde crudos & viscosos generat humores. Si enim antequam coctus sit extrahatur, viscosusq; sit, erit fortiter digerentibus & exercitantibus tantum necessarius. Et si dimissus fuerit usquequo coctus fuerit, siccus erit & stipticus, & durius digeritur, mediocris uero focus temperatus est, quia totum penetrat corpus panis equaliter, & coctus quidem in furno melior est, quia totus equaliter coquitur: sub testis uero deterior, quia focus in una parte magis operatur, & altera cruda remanet & viscosa, si ergo sepe comedatur post multū temporis inflationes & dolores lateris generabit. Similiter subcinericius aut super carbōes coctus uelociter extrinsecus desiccatur, interius uero grossus remanet et viscosus, & multum cineris cum eo admiscetur, maxime si ligna sint mollia & cito incenduntur, & ideo inflationes & grauitates membrorum & obscuritates facit. Et panis quidem calidus aut recens magis est humidus & nutritiuus, qui post unum aut duos dies accipitur laudabilis est, quia temperatus est interius, et exterius siccissimus, rarus est & leuis causa ablatae humiditatis, unde humores desiccatur, & generat sitim propter desiccationem stomachi, & uentrem constipat. Panis autem temperate fermentum habens & sal & bene confectus & sicut oportet coctus facile in stomacho digeritur, & sanguinem alarissimum in corpore generat, unde com-

modior est eis qui inquiete sunt & deliciarum delectatione, exercitantibus & laborantibus inconueniens est propter sui subtilitatem & facilitatem dissolutionis ex membris eorum. Panis uero parum fermentatus & sal non habens nec bene coctus viscositatem ercat & grossitudinem, propter hoc aptus est exercitantibus et fortiter digerentibus. Panis uero superfluum fermenti & salis habens minime nutrit, nec confortat, uirtus enim salis humiditatem eius desiccet, fermentum coniunctione rarificet.

De Faba.

Faba quedam grossa, quedam parua est, quedam alba, & quedam nigra est: & quedam facile coquitur, quedam dura, & alba quedam que facile coquitur est melior, & parua saporosior est & magis fertilis quam grossa, grossa uero pulchrior est, sed minus fertilis. In omni aëre habitabili provenire dicitur, terram desiderat pinguem & cretosam, & in ea subtilem facit corticem, & facile coquitur, & in mediocriter soluta satis conuenienter nascitur. In sabulo uero & macra non prouenit bene, & que ibi nascitur, grossam habet corticem, & dura est ad coquendum, nisi talis ager letamine impinguetur, tunc enim eius malicia emendatur, melior tamē semper est que nascitur in terra pigra et cretosa. Seminatur aut in stipulis & terra non arata, licet et in arata feri cōgrue possit. Spargitur autem semen in locis calidis aut tēperatis mense Ianuario aut Februario cū terra post forte gelicidum talis est quod possit arari post sparsum semen, & melius quidem in humida quam sicca terra feritur. Sed & feri potest mense Martio, maxime in terra ualde pingui, cuius cultum proderit cum tarde feruit, si madida feratur, sic enim statim germinare & nasci coegetur. Quod si in aqua letaminis duobus uel tribus diebus molificari sinatur, que nascitur ex melioris erit cocture, & etiam talis

talis mollificatio pinguis eidem contra terræ macredinem auxilium exhibebit. Quidam dicunt aqua fabam cum scritur respectam contra urā nō linbere difficilem. Nec est necessariū ut nascatur ut glebæ in eius seminatione rūpantur. His enim non obstitibus, licet plurimū infra terrā submersa fuerit erūpit pullulans ad superficiem terræ. Corbis una & minus ugerū cōplet, nam late aspergenda est, ut dilatari in stipitibus possit, luna autē plena melius scritur faba. Hoc genere leguminis terra non læditur, & maxime si radices dimittet in ea, sed tamen in eo non fecundatur nisi per accidens ager fuerit multum humidus. Nam Columella dicit, agrum frumentis utiliorē probari qui anno superiori uacuus fuerit quā qui calamos fabæ cæcæ mēsis eduxit, & uerum dicit duplici ratione, una quia mēsis de nutrimento frumenti aliquid assumpsit, altera quia non potuit in æstate sic commodè exarari, ut nudus. Faba secundū Palladium runcanda est cum quatuor digitis eminet super terram, deinde alia nice sarculetur, cum herbæ nocuæ fuerint in ea renatæ, quo quidem non affligitur, sed proficiet & multū fructum reddit, & flexa quidē prope nodum sicut iniegra respōdet mense Maio & Iunio. Faba quadraginta diebus floret, simulq; grandescit idem est in omnibus qui sunt seminis duplicis, ut pisum & cetera legumina. Mense Iunio faba minuenta uelletur ante lucem, & antequam luna procedat, & excussa & refrigerata ponatur in horreo, & sic gurguliones aut nullo modo aut minus patietur infestos, ut Palladius ait. Varro scribit quod faba & cetera legumina in uasis olearijs cinere oblita perduci incolumia seruantur.

Fabæ ut dicunt Medici, aut comeduntur uirides, & tunc frigide sunt, & humide in primo gradu, & humores generant grossos, crudos & inflatuos, unde uentositates faciunt, & idco stomacho ualde nociuæ sunt: siccæ uero & maturatæ, perfectæ frigide sunt & siccæ in primo gradu, & ibi
laudabilem

laudabilem generant sanguinem, & carnem inflant et dilatant, & operantur in ea quod fermentū in farina, unde in superioribus uētris plurimā grossiciem generant & inflatiuam, ex qua fumus in caput ascendens cerebro nocet, & insomnia multa & corrupta inducit. Cum ergo huius nature sint fabæ, non eis aliquo decoctionis modo potest auferri, sed minui, experimento autem hoc probatur, quia fabis quotidiè utentes in digestionem & inflationem patiuntur, etiam si sanissimi sunt, mundificatiue autem sunt, & ideo ualent ad lētigines, & qui cutem sui corporis mundificare uolunt ex farina eorum lauari assuescant. Diuersis coquuntur modis, quedā enim aqua coquuntur, quedam igne assantur, coctæ in aqua laudabiliores sunt, quoniam aqua eis plurimum aufert uentositatis & grossiciem, maxime si eiecta aqua priori, altera iungatur. Hæc quoq; decoctio duobus fit modis, aut cum cortice, aut sine cortice, & coctæ quidem cum cortice duræ sunt & ad digerendum grossæ, inflatiue, spissitas enim corticis egressionem prohibet uentris, & mora eius diuturna in uentre uētositatem & inflationem generat. Coctæ uero sine cortice minus sunt inflatiue, & cito digeruntur, & si ius fiat ex eis caselactiuis rebus apposis, ut pipere, zingibere, uel oleo, perfecta est medicina ad coitus operationem. Commesta autem cum menta origano, cimino & similibus eius uentositatem & inflationem minuant. Assatæ minus uentositatis & inflationis habent, sed ad digerendum durissime sunt, ueruntamen si aqua infundatur post asensationem, & cum cimino & menta & origano comedantur duriciem amittunt. Fabæ confractæ bobus in cibum quotidie abundanter exhibitæ cito eos impinguant, & hoc modo boues magni & senes à peritis uacarijs impinguantur in diebus quindecim & renouatur caro eorum. Auicenna dicit: quod fabarum rectificatio est prolongatio infusionis earum, & bonitas decoctionis, & comedere eas cum pipere & sale & similibus & cum oleo, ac meliores omnium sunt grosse albe, non perforatæ à gurgulionibus. Et ex proprietatibus

proprietatibus earū est quod abscindunt oua gallinarū cū nutritur ex eis, et quod faciunt uidere somnia cū alienatione perturbata, et quod faciunt accidere pruritū propriē recentes. Item emplastrum ex corticibus earū super femur infantis, oriū prohibet pilorum, et similiter quando sepe iteratur super locum rasum. Et fabae abstergunt morseam in facie, et præcipue cum cortice. Et lentigines, et faciunt colorem bonum, et earum emplastrum est bonū apostemati, et mamillæ, et castitati lactis in ea et quæ ex eis cocta sunt, cū aceto et aqua conferunt solutioni antiquæ, et propriæ cū fuerint cum corticibus suis, et conferunt dissenterie. Plinius dicit, quod faba cocta et colatura eius potata pulmonē mūdifical, apostemata mamillarum curat, cū rosas mixta dolorē et liuorem et lippitudinē oculorū curat, masticata et temporibus apposita, humores ad oculos fluentes cōpescit. Item scissa et super uenam incisam posita, sanguinē restringit, lac effluens de māmilibus sistit, et fluere non permittit, podagricis et arteticis cum adipe eius decocta subuenit, si super doloris locū emplastre tur: tumores et inflationes apostematum repercutit si in principio decocta in aceto tumori apponatur. Itē dicit, quod quādo faba ē in flore aquas maxime concupiscit, cum uero effloruit, diligit siccitatem. Itē dicit, quod in aqua marina uel salsa uix coquitur, dicit etiā quod in insulis maris Oceani nascitur faba spinosa per se, quæ coqui non potest. Itē in Aegypto nascitur faba spinosa, longa decē cubitorum, quam crocodili fugiunt, timentes ne oculi eorum spinis eius lædantur.

De Farre.

Far est simile spelte sed est grossior in herba et grano scriptus tempore tritici et spelte, et corbis una iugerum cōplet, mandatur et metitur ut triticū. Far temperate complexionis est et est bonus cibus sanis et aegris, satius enim nutrit et confortat, et bonum generat nutrimentū, et potius est stipitiū quā laxatiuum.

De Fascohis.

Fascohi noti sunt, et eorum quidam sunt rubei, quidam albi, terræ & æreantem desiderant qualem panicum & milium. & inter ipsa et cicera cōmode seminantur feruntur etiā in hortis inter cepas & caules, sed minus soluta terra proveniūt & eisdem tēporibus seminantur. & quāto magis terra pinguis fuerit, tāto rarius seminētur herbis sæpe mūdetur. Colliguntur autē successiue ipsorū aliqua quotiens albedine sua maturitatem fatentur, & super linteamina ad solem siccantur: rubei calidi sunt & humidi in medio secundi gradus, albi uero parum minus calidi sunt, sed magis humidi testatur hoc, quia grana eorum ut cetera siccari non possunt, & si desiccantur diu seruari non possunt. Humores generant grossos, & inflationem, uentositatem fumumq; plurimum caput implentē, & somnia pessima ac terribilia faciūt & corrupta. Auicenna propterea dicit, quod generant humore grossum, sed si napis prohibet nocumentum & somnia pessima eorū, & similiter acetum cum sale pipere & origano.

De Git.

Git est semē nigrū, & quasi triangulum, cuius herba nascitur in frumentis & speltis & siligine, & uulgariter dicitur gittironus & facit flores rubeos admodū capanelarum est autem calidum & siccum in secundo gradu, uirtutem habet dissoluendi, consumendi, contra oppilationē splenis & renū & diariam passionem & dolorem stomachi, & uentositatem ualēt pulvis eius in cibis. Contra lumbricos datur pulvis eius cū melle, & fiat etiam emplastrum ex pulvere eius & succo absinthij circa umbilicum.

De Lolio.

Lolium sine zizaniam nascitur inter triticum siccis corruptisq; temporibus uim acutam habet & uenenosam. Operit mentem perturbat & inebriat. Cum uino collatum & stercore asinum & semine linicatum plasmate apostemata dissoluit.

soluit, & scrofulas. Cocta cum radicis cortice & vulneribus iam putrefactis apposita sanat & mundificat. Item est adustina tritici, quia trahit nutrimentum eius sicut papauer est & zizania auena, & caulis vitis, quia adurit eam.

De Lenticula.

Lenticula nota est, vult habere locum tenuem & resolutū uel etiam pinguem, sed siccum maxime quia luxuria & humore corrumpitur usq; ad lunā duodecimam: mense februario scribitur: quartarium corbis in sationē iugeri sufficiet. Cum autē lēs ualde cito pullulet, & incrementū accipiat, oportet quod si ager simāsus est, priusquā seratur, cū fumo arido misceatur, et cū lilio uel quatuor uel quinque diebus steterit, sic spargatur in agrū. Palladius hoc precipit fieri debere, ut cito nascatur et crescat. frigida est in primo gradu, sicca in tertio, nutrimentū eius est grossū, & ad digerendū durum, melancholicū sanguinē generat: et si cū corticibus comedatur cerebrū fumo grosso implet. & melancholico, unde causa est doloris & fallacium formidolosorumq; somniorum, uentositatē & inflationem & constipationē faciunt, propterea ceteris granis stomacho nocuior est & pulmōi et diafragmati & pelliculis cerebri ceterisq; neruis pellicularū, & precipue oculorum, quonia humiditatem eorū exccat & exasperat, sanis oculis hoc efficit quāto magis infirmis: est igitur cōplexioni siccae noxia, sed eis qui sunt humide cōplexionis aliquando profuit, si sine cortice coquantur. Item Hydropicis ualent, cum cortice uero nocent nimis, propter uentositatem & inflationem quam faciunt, grandis & noua melior est et concoctu facior ad cibum & medicinam, quā parua, uetus & dura, si cineri misceatur melius seruabitur.

De Lupinis.

Lupini aut terras aut uineas impiguandi, aut seminis colligendi causa seruntur. qui prima causa in uineis uel agris spargitur mense augusto uel collectis uinis serendi sunt, cooperiendi ligonibus uel aratro, deinde mense aprili uel maio, cū

Q 2 ad debitum

ad debitum augmentum peruenerint evertendi, sic etiam vineas
 & agros letamini more impingunt & foecundant & in agris tunc
 seratur milium & panicum & tempore iuuate frumentū. & vineis
 quidem magis letamen conferunt, quod eis non bene competere di-
 citur, quia consuevit uini uiciare saporem. Seruntur etiam optime
 post collectas messes in stipulis bis aratis: uel circa principium au-
 gusti, deinde mense octobri iuxta terram ligonibus inciduntur, &
 per sulcos ponuntur, super quos seminato frumento uomere terra
 uoluitur, et sic de uno grano optimū efficitur, ubi etiā anno sequenti
 iterum frumentum feri poterit uel siligo. Possunt etiam feri eodē
 tempore inter panicum in secunda eius sarculatione qui collecto
 panico manebunt, ut agrum impinguent frumentarium secundum
 modum praedictum. Duæ corbe uel plures in iugero ponuntur, qui
 uero seminis colligendi causa seruntur mense octobri & nouēbri
 debent feri, & corbis una iugerum complet. limoso agro lupinus
 non nascitur, cretam formidat, et exilē terram ac rubricam diligit.
 lupini sarculandi nō sunt & sarculati extinguuntur, quia unā tantū
 radicem habēt. nec hoc quidē desiderat, quia herbas præter auiciliū
 cultoris affligunt, mense iunio & iulio colligitur. & statim si placuerit
 fertur ex area, sed est ab humore lōge ponendus i horreis, sic enim
 diutissime custoditur. maxime si granaria eius afflauerit fumus assi-
 duus. Lupini calidi & sicci sunt in secundo gradu, & eorum alius
 est amarus qui ex natura sua talis est & hic medicine cōpetit, alius
 dulcis & insipidus, qui ex multa mora in aqua dulcoratus est &
 insipidus factus. farina lupinorum cū melle ualet contra lumbricos
 ad idem ualet panis factus ex farina eius cum melle & absinthio
 positus super stomachum, & melius si addatur modicum alois, eadē
 farina apostematata maturat & rumpit. Lupinus, ut ait Auicenna,
 subuliat capillos, & abstergit panos & morpheam & faciem,
 & tunc maxime quādo decoquitur cū aqua pluuiali donec dissol-
 uatur. Quidā dicunt quod farina lupinorum capillos natos adurit,
 & exurgere

et exurgere alios non permittit. In aqua dulces facti lupini nutrimentum grossum pariunt et ad dirigendum durum, ideoque humores generant viscosos.


De Lino.

Linum desiderat aërem temperatum. et terram solutam et pinguem, et quanto pinguior fuerit tanto ipsius stuppa erit grossior, quanto uero macrior, tanto eius stuppa subtilior erit. Sed ex eo parum et breue in tali terra nascetur. Huius autem seminatione terram satis macrari et ladi creditur, ideoque auxilio letaminis eget, si tale semen recipere assuescit. Eius terra ante hyemem debet arari ut glebae propter gelu sequentis hyemis in puluerem reducatur, deinde post hyemem cum primū poterit secūda uice arabitur, deinde aspergatur et iterū aratur quinq; uel sex uicibus in tantum ut in puluerem redigatur: ita tamen quod prima uice profundius aretur, secunda minus profunde. et sic semper profundatio usque ad uicem ultimam minuatur, deinde à medio aprilis usque ad finem eius, ipsius est optima satioque in summo terrae fit minus uno palmo, terra super semē a ratro reuoluta, in cuius satione secundū morē Alexandriae ibi linū optime procuratur, potest unus bos unū ducere aratrū, et duo simul iuncti possunt ducere duo, ut unum aratrum per unū brachium uel parum plus quodam fune sequatur ad primū, quorū unum quodque habeat unum bubulcum, qui aratrum teneat et conducat. Tres corbes huius seminis uel parū plus sufficiūt iugero cui multū proderit si talis ager expexetur postquam fuerit seminatus, quod si tēpus fuerit magne siccitatis ei ualde proderit si poterit irrigari. Potest etiam feri ante hyemem in locis calidissimis quibus linum natum frigore non leditur, et tunc melius prouenit in terra medio critere cretosa quā nimis soluta, nec est necesse quod sit piguis, et quod ultra duas uices aretur, dūmodo terra puluerifetur, et cum fuerit seminatum melius est quod cum expere solummodo de quibusdam spinis factū semen operiatur, melius etiam est quod homo unus cum

fune trahat expexem quam boues, propter nocumentū & hoc est
 cuiuslibet homini facile. Hæc herba bis mundanda est quæ maxime suf-
 focatur, ideoq; extirpandum est antequam circa limum inuoluatur,
 licet per ipsam ambulando ledatur cum magnum est, & ideo mū-
 datur & debet ante se manibus aperire, & ire per eam optime
 eleuatis pannis. Sed cum prima uice mundatur, quia tunc parū est
 & conculcatum releuatur non leditur ambulando per eam. Collig-
 gitur cum maturo colore flauescit, & eodem die ne rore tangatur
 sub tecto ponatur in fascibus deinde malleolis lignis excutiantur se-
 mina, & ipsum linum ad maturandum in aqua ponatur, in qua qua-
 tuor uel quinque diebus si putrida sit stetitisse sufficiat, si autem aqua
 nō sit corrupta, usq; ad septē dies stare in eadē oportet ut putrifiat
 raro herbalis, & cortex ex quo fit stuppa remanet incorrupta. Vel
 potest optime macrari hoc modo, ut Mediolanenses obseruant, cum
 maturum est colligitur sine aliquibus herbis admixtis, & in paruis
 fasciculis ligatur cum herbis uel filigine aut uirgīs, uel in campo
 siccatur, & quantum potest defenditur à pluuijs, præcipue dum est
 siccum, postea deferitur ad domum & sub tecto ponitur, & seruatur
 usq; ad mensem augusti donec completa triturationis necessitas, tūc
 ad aquam portatur, & in ea ponatur, ac sepe cū perticis submer-
 gatur uel ponderetur quibusdam lignis & optime balneetur, &
 in ea dimittatur per mediam diem tantum & sic bene balneatum re-
 ducatur ad domum, & totum ponatur in cumulo iuxta murum sub
 tecto & paleis operiatur et sic quatuor dimittatur diebus, in quibus
 calefiat uel macecrabitur, & tunc cum infrigidatum fuerit uel tene-
 rum ac leue effectum, uel semina in ea remanētia incipiunt germina-
 re, uel stuppa eius à carne remota per se nō torquetur, cōpleta erit
 maturatio, et tūc unusquisq; fasciculus diuidatur in tres uel in quatu-
 or manipulos magnos et cū ipso ligno ligetur, et in area optie exica-
 cetur, et reponatur, postea poterit quolibet tēpore parari ut moris
 est. Erū autē signum temperatæ maturationis, quando macratur in
 aqua

"aqua cum tactu mollescit adeò quod omnē rigiditatem amiserit, cō-
gnoscitur etiamsi ex eo aliquid extrahatur de aqua & siccitū pro-
betur, sic caro herbalis à stuppa facile separatur. Veruntamen si
minus quam expedit maceretur erit stuppa fortior & albius, sed
non perfecte separabitur caro herbalis, & erit durior ad filandū.
Deinde optime leuetur & in aqua excutitur, & ad solem siccatur,
cum autem siccatum fuerit concutitur malleolis ligneis ut eius caro
rumpatur, & deinde ad solem calidum ponatur. & cum fuerit cali-
les factum in pannis calidis in domo simul ponitur, & cum per ali-
quas horas sic steterit, gramolatur, hoc enim modo mundatur op-
time, nec stupparūpitur gramando, quod fieret si statim gramaretur
cū eleuaretur de sole. Quod si tempus fuerit humidū cū multis pānis
madefactis ad ignē preparatur gramē, deinde spatulis eius mūdi-
ficatio completur, deinde pestinatur & filatur. Virtus seminis lini se-
cundum medicos proxima est virtuti seminis scenigræci. Calidum est
in primo gradu, mensuratum in humiditate & siccitate, si sumat-
ur cum melle & pipere mouet coitum.

De Ordeo.

 Ordeū tollerat omnem aērē, & desiderat terrā pinguem
ut optime proficiat, & in mediocri etiam prouenit, & pa-
tenti magis quàm umbroso loco letatur. His temporibus
& eodem modo, ut triticum seritur, & septem diebus sub terra mo-
ratur, & cum egreditur, ut ait Varro: Legumina uero quinq; diebus
præterquam faba, serietiam ab Alberto dicitur in principio ueris
& utrumq; feri posset, sed huius sationis messis tardius ad maturi-
tatem peruenit. Ordeum tamen margolum quod Bononiæ margola
uocatur, seritur toto mense martio et in principio aprilis, et mense iu-
lio est maturum. Item inuenitur ordeum quod in trituratione manda-
tur ut frumentū: & istud eodem tempore seritur quo frumentum, in-
ueniendo corbis una iugerū perficit, colitur & mandatur ut fru-
mentum

frumentum, & maturatur modicū ante ipsū, ideoq; eius melli⁹
 primo recipitur, quæ consumenda est antequam grana refracti⁹
 spicis lapsa decurrant, quia illis uelut triticum folliculis uestian⁹
 tur, eius culmos quos pinguiore^s dicimus in agris aliquam diu iace
 re sinamus, quia hoc modo grandescū & traturatur, ut triticum.
 Ordeū secundū Auicennam frigidum est & siccum in primo gra
 du, uirtutem habet mundificatiuam, & excolatiuam, plus tamen
 faba desiccatur, & propterea ab inflatione liberatur. Ordeum & triti
 cum nutritiora & laudabiliora sunt cæteris granis, sed ordeum
 citius digeritur, & ideo de membris citius dissoluitur: frumentum
 uero tardius digeritur & tardius à membris dissoluitur. Gale
 nus de ordeo & faba secundū medicinam, dicit, ordeum & fa
 ba quoniam temperamēto uicina sunt, in multis secundū medicinā
 locum habent, sicut cera & oleum in cataplasmatibus, fit de ordeo
 confectio utilis, elixatur ordeum prius aqua, postea assatur, dein
 de ferma facta cū Saccharo conficitur, hoc in æstiuo tempore ad
 stomachi & epatis refrigerium ualet, ad sitim etiam ualet cum
 aqua temperatum, sine grossū, ut cum cochleari edatur, sine li
 quidum, ut bibatur. Exco pisana conficitur hoc modo, ut cor
 tex auferri possit mensura ordei sumatur una, aquæ nouem &
 tam diu coquatur, donec redigatur ad unam & colatū potui detur.
 hoc ualet ad sanitatē custodiendam, corpusq; humectat, si corpus re
 frigerari plus appetat, parum aceti misceatur, uel addatur semen
 papaueris albi. Pisana sanis crebro usu clarissimum & perfectissi
 mum sanguinem generat, nec minus quā panis nutrit, quæ sanis
 danda est, in firmis uero diuersis modis prout cuiusq; expedit insir
 mitati. Si enim uelis sitim & epatis calorem extinguere, bibe su
 pra dictū modo. Si excolatiuum & mundificatiuū pisanum habere
 uolueris cum cortice coque. Si laxatiuum et refrigeratiuum cocto in
 mane suppone mel uiolacēū. Si propter epatis oppilationē illud ue
 lis accipere, cum eo coque simul radices apij & feniculi, et accipe
 illud

illud cum oxificcaria. Alij autem dicūt, quod pīfana fit hoc modo: Ordum mundatum decoquatur multum bene in aqua, & colatur per pannum. Farina sic fit, ordum bene mundatum in mola ponitur & teritur, mola tamen aliquantulum sublenata ut grossam operetur farinam, farina talis cocta in aqua diu, est optimus cibus febricitantibus, & praeipue laborantibus in apostemate spiritalium. Anicenna dicit, quod habet proprietates dictas de siligine. Item si fiat linimentum ex eo cum aceto forti, & ponitur emplāstri more super scabiem ulceratam, sanat eam. Item fit ex eo emplāstrum cum citonij & aceto super podagram, & prohibet fluxum superfluitatum ad iuncturas, & aqua eius confert egritudinibus pectoris, et quādo bibitur cum semine sceniculi facit abundare lac, & aqua eius est infrigidatiua & humectiua febrium, in calidis quidem puta, in frigidis cum appio et sceniculo.

De Milica.

Milica est notissima, eius quidem duplex est differentia. Est enim quaedam rubea, quaedam alba. Item inuenitur tertia species quae est albius milio, & iterum quaedam in herba multum excrescit, quaedam parum, & rursus quaedam diu moratur in agris, ut longa, quaedam in paucis maturatur diebus, ut milium, & haec est quae in herba parum crescit, ut milium. Terram desiderat ualde pinguem, & cretosam magis quam solutam, & eam ualde macrat propter multum nutrimentum quod querit, & locis quasi paludosis letatur, ibiq; optime prouenit cum primo reducuntur ad cultum. Nam nimia pinguedine talis loci frumentū & faba periret in eo, nisi primo persationem milici superflua pinguedo consummeretur. Seritur in pastinata terra & in solida, potest etiam seri per sulcos fabarum, & ubicunq; rara nata fuerint in secunda sarculatione, ipsarūq; fabis eradicatis, erit denno sarcu lada. In tēperato aēre circa finē Martij & initium mensis Aprilis, et parum seminis, scilicet octaua corbis, sufficit ad complendum iuge-

Rum

rum in calido uero maturius & in frigido serius est ferenda, sed ea quæ parua est toto temperato tempore quo milium feritur sub terra potest feri, quia tantundem moratur in agris, circa 15. uel 20. diebus semē eius sub terra moratur antequam nascatur, & natum, licet sit parua milica, tamē runatur circa finem Aprilis & initium mensis Maij, & tunc ipsa herba ablaqueatur, ut melius germinet, & pullulet à radice, deinde mense Iunij sarritur siue runcatur secunda uice, & tunc circa ipsius herbam terra cumuletur, ut à casu melius defendatur. Et solo mēse Augusto uel Septembri colligitur, eis iuxta terram incisis, & postea prope panocas si melogaria habere uolueris, si uero eis nō eges perticis floctitur, & panocæ inciduntur, & in fasciculis ligantur, melogarijs super radices in campo relictis. Et in iugero mediocris milicæ circa sedecim corbes prouenient. Siccanda est quantum potest, postquam equabus fuerit triturata uel uirgis facta. Et in loco reponēda uentoso quantum potest aperto nec nimium adunata calefiat, & corrumpatur. Melegaria competunt ad claudenda tugoria, & uias in tempore lustramentandas, & competunt igni & clibanis faciendis, cum fuerint exsiccata, & plantis salicum inuoluendis, ne excoerentur à bestijs, & ne sole urantur æstiuo. Semen milicæ bonus cibus est porcos & bobus & equis dari potest, & homines eo tempore necessitatis utuntur, & canes alijs granis in pane & præcipue rusticis, qui continuis laboribus exerceantur, & est frigidum & siccum, & generat melancholeum sanguinē. Item inflatum est, propter suam pondus fasti descendere cibum, quem in uentre inuenit.

De Milio.

Milium notum est, cuius duplex est differentia, quoddam scilicet, quod circa tres menses moratur in agro, & aliud quod maturitatem recipit in 60 diebus, postquam fuerit seminatum. Terram desiderat ualde aratam, solutam & pinguem. Nam à frigidis & arena prouenit, dūmodo solo frigido & humido celo

cœlo seratur. Nam siccū & argillosum formidat agrum, & terra in qua seritur pinguedinem valde consumit. Scri etiam potest per sulcos fabarum, & inter ipsas ubi rare fuerint inseratur, in secunda sarculatione. Si terra fuerit soluta vel media vel cretosa, quod, euulsis fabis, sarculandū erit mense Aprili, Maio, & Iunio seri potest. Palladius uero dicit, & cum eo concordat experientia rusticorum, quod seratur milium mense Martio, & erit maturum in mense Iunio, ex quo probabiliter sequitur, quod si terra sit bene pinguis poterit in eadem æstate iterum seminari. Corb's octaua pars sufficit in iugero, herbis propterea liberatur assidue, maturum est cum totum albescit, ab auiculis non multo labore defenditur. Cum siccatum est in fasciculis ligatum erigatur ad solem, ibiq; per duos aut tres dies moretur, deinde portetur ad aream, & statim trituretur, ne si in magnum portetur acernum calefiat & corrumpatur, nō bene siccatū statim calefit & corrumpitur, optime uero siccatum, eo triturato, siccatum optime antequam portetur ad horreū, optime uero saccum longissimo tempore seruatur, & quidā colligunt solū spicas, sicut in panico seruatur. Milium secundū Isaac frigidum est in primo gradu, siccū in secundo gradu, testatur hoc leuitas & cōcunitas eius & viscositas, & uentositatis abundantia. Minus nutrit ceteris granis, ex quibus fit panis, gratia tamē siccitatis cōfortatiuū est stomachi, & aliorū membrorū corporis, diureticū est, & idem assatur ad ignē, & ad corrosionē dolorēq; uentris calidum superponitur. Causa eius siccitatis & parui nutrimenti, nō est accipiendū ab his, qui carnes suas augmētari & impinguari desiderāt, nec ab eis q in corporibus laudabilē sanguinē generari uolūt, sed tamē à quibus refrigeratio aut cōfortatio, et humorū supfluatorū desiccatio appetitur.

De Panico.

Panicū desiderat eandē terrā et aërem quē milū, & eisdē seritur mensibus, & eodē modo, & tantundē seminis regitur in iugero, et eodē modo herbis sepe mūdatur, quod etiā inter


fabas & fabeolis & in vineis cōgrue feri potest, secundū doctrinā de milio traditā. Et etiā quoddā pānici genus, quod in paruo tēpore recipit cōplementū, & istud cōgrue seminatur post messes cōpletas in stipulis bis uel ter aratis & glebis confractis, in quibus optime prouenit, nisi tempus fuerit eximie siccitatis. Panicum secundū Isaac in forma & natura simile est milio, minus tamen nutrit, uentrem tamen magis constipat. Accipitur diuersis modis, & per eorum diuersitates actionem suam mutat, quocunq; tamen modo accipiat, melius est milio. Coquitur autē sepe aut cum pinguedine, cū oleo sepe aut cum lacte caprino uel amygdalarū, et coctū quidē cū oleo aut cum pinguedine laudabilius est, quoniam siccitatē suam amittit, & saporositatē bonūq; nutrimentū acquirit, & constipationem perdit, cum lacte uero coctum laudabilius, eo quod cum aqua sola coquitur. Sed coctionis cum aqua duo sunt modi, coquitur enim ut integrum, aut mola fractum, integrum ablato cortice coquitur, ut in una pānici mensura quindecim aquę ponantur. Item coctum grossum est, & ad digerendum durum, sed non est uentris constipatiuum, quia propter suum pondus ad inferiora descendit. Mola tritum coquitur, ita ut farine mundatę decies tantum aquę ponatur, postquam bis uel ter bullierit digitis fricetur & coletur et colamentū susceptū donec dureseat excoquitur, sicq; cōme diuile estet, ceteris subtilius, digeriturq; facilius, magis uero stipticū est.

De Riso.


Risum & Ropelliasum alba & grossa, & seminantur mense septembris et octobris et ianuario et februario, ut puer totius melius in terra facili & soluta, loco tepido, & aura humida. Duę partes corbis in iugero sperguntur, & colligi debet siliquis exsecatis & granis fortiter induratis, luna decrescēte, postquam multum processerit in defectu. Frigidum est in primo gradu, & temperatum inter humiditatem & siccitatem. Cortex eius stipticus est, cortice ergo mundatum laudabiles generat chimos,

ne inflationem aut ventositatem facit, sicut faba, & ad usum edendi bonum est in aestate in calida regione.

De Spelta.

pelta nota est, eius quidem diuersitates sunt, quia quaedam est grauior, & haec melior, quaedam uero leuior, et haec deterior est. Aërem desiderat quali: in frumentū, & terram, sed melius defenditur à macra quàm frumentum, & in creta & in patenti campo optime prouenit. Et his temporibus seritur quibus frumentum, & eodem modo: sed duæ corbes in iugerū seruntur, cum ex frumento corbis una sufficiat. Colitur & mundatur sicut frumentum, metitur autem immediate post frumentum, cum post ipsum modicum maturetur, & eodem modo trituratur, uerū separata paleis, pluries uirgis semē eius percutitur, ut ab arsis mundetur. Tēperato qualitatis est, et equis, bobus, & similibus praebet optimum nutrimentum, sed & homines uti ea cōmode possunt, quia eius panis temperatus est & ualde leuis, & ideo si tres partes speltae cum quarta parte misceatur fabarum. Ex superflua grauitate fabarum & multa leuitate speltae fit panis satis pulcher & bonus, & familijs conueniens, si in eius artificio diligentia obseruetur, quae supradicta est in pane frumenti.

De Siligine.

iligo nota est, & eius quidem non sunt diuersitates, aërē communem cum frumento desiderat, & frigidiorē tolerat, ut alpes, quia citius maturatur, in nemoribus enim alpiū mundantur mense Iunio & Maio omnes ramusculi arborū, deinde cum siccati fuerint inciduntur mense Augusto, & uertuntur in cinerem, & in eis feminatur siligo, quae optime prouenit anno illo, deinde usq; ad septem quiescit annos, & e adē satio denouiteratur, sed ubi non sunt nemora herba, cum suis radicibus & modico terrae inciditur, & exiccata comburitur, in cuius cinere et puluere siligo postea praefato tempore seminatur, & circa octo annos

R 3 quiescit

quiescit, & idem opus postea iteratur. Terram desiderat solutam
 & sabulosam, & in pingui & patenti campo mollior prouenit.
 Et his temporibus quibus frumentum scribitur conuenientius tamen
 antequam uel post. Vna quidem corbis sufficit in iugero. Colitur et
 mundatur sicut frumentum, octo diebus, floret circa finem Aprilis
 & initium Maij locis temperatis, quo tempore tangi à cultore non
 debet, & quadraginta diebus deposito flore grandescit usq; ad ma-
 turitatis euentum. Maturatur & metitur antequam frumentum, et
 trituratur, ut ipsum frumentum. Eius quidem substantia est tenax et
 viscosa ualde, et ideo conuenienter misceatur cum millica, milio, fa-
 ba, & similibus ad panem, quem pro laboratoribus & familijs fa-
 ciemus, quia coniungit & conglutinat pastas eorum, que per se co-
 cto pane retinere non possunt sed franguntur & teruntur, siligine
 uero sola in pane uel nunquam utimur. Auicenna dicit, quod est de
 natura ordeï, scilicet frigida & sicca in primo gradu, eius nutriti-
 um est minus nutrimento tritici, & eius aqua fragit acuitatem hu-
 morum, & similiter farina eius super pannos ponitur, & epistima
 eius calidum accipitur, & fit ex ea decoctio sicut sorbitiones,
 cum pice emplastrum super apostemata dura, & cum solo surfure
 super apostemata calida.

De Vicia.



Vicia dupliciter utimur, aut seminis colligendi, aut pabu-
 li secandi causa, est enim optimus cibus equis & bobus
 herba eius & semen eius, serenda est mense Ianuario et
 Februario non in aurora, quando ros est, sed quando sol absorbu-
 erit rorem, quoniam compertum est uicia rorem sustinere nō pos-
 se, sed euanescere uirtutem ipsius. Habet hoc uicia proprium, quia
 uiridis messā si cum eo & quod in terra remanet ager statim are-
 tur letaminis more terram impinguet, si autem exaruerint radices
 eius antequam terra aretur, succum auferat ab agro.

Tertij libri finis.

CRESCENTII

LIBER QVARTVS DE VITIBVS ET
uinceis & cultu earum, ac natura & ui-
litate fructus ipsarum.



Vperius in libro secundo multa de natura & cultu
uitis dicta intelliguntur, cum de natura plantarum
& rebus communibus cultui cuiuslibet generis a-
grorum generali sermone diceretur. Nunc uero
in hoc quarto libro de natura & cultu uitis & ui-
nearum, & omni utilitate fructus earum specialiter est agendum.

De Vite, quid ipsa sit, & uirtute folio-
rum eius, & lachryma eius.



Itis apud nos nota est, sed in frigidissimis regionibus, in
quibus uiuere non potest ignota, ideoq; dicamus quod est
quedam humilis arbutula, multum tortuosa, nodosa &
scabiosa, latissimos habens poros, & magnam medullam, & frone-
des latas & intercisas, quæ sine putatione & palorū aut arborum
auxilio diu uiuere & commode stare non potest, & eius quidā fru-
ctus est uua, ex cuius succo fit uinum preciosissimum liquorum. Folia
uitis sunt multū medicinalia. Nā uulnera mūdant & sanant, in aqua
decocta, calor em febrilem refrigerant, estuationem & tumorem
stomachi cataplasmata mere sedant, pregnantē afluuant, somnum
prouocant, & cerebrum confortant. Eius lachryma potata sepe
calculos frangit, ut dicit Dios. usum acrit, leppitudinem oculorum
tollit, moribus uenenosis succurrit, & uentum sistit, cinis eius ua-
let ad præliacum succo rute uel nucæ & oleo admixtus. Plinūs
autem dicitur, quod folia uitis dolorem capitis amputant, inflatio-
nem sedant & eum farina ordeici calidam arcticam curant, diffen-
tericos

tericos ualde iunant, si eorum succum bibant patientes. Cortex uitis & folia arida uulnerum sanguinem sedant, ipsumq; uulnus conglutināt & sanant. Cinis corticis per se pilos ablato restaurat & multiplicat.

De uinearum diuersitate,

Cap. 11.

Vinearum genera diuersa sunt secundum uarias & diuersas consuetudines regionum. Nam quedam cum auxilio palearum & perticarum in ordine fiunt, & hoc duobus modis, uno quidem modo, ut cuilibet palo sit uitis, & sic fiunt in pluribus partibus Lombardie & Romaniole, & hoc quidem modo in exili terra tribus plantentur pedibus distantes, quaq; uersum in pingui uero quatuor, in mediocri tribus & semis. Alio uero modo, ut una uitis super multos palos & perticas extendatur, & sic fiunt in pluribus partibus Italie. Et hoc quidem modo plantantur distantes, considerata pinguedine & exilitate terre, adeo ut spacium uniuersum possunt congrue opperire, & hec quidem tantum ligonibus coluntur, nisi fuerint alte & plurimum distantes. Rursus quedam fiunt ut arbutulæ, more prouinciali, quas sine pali auxilio stare constat, & hec quidē aut fiunt per certas acies, adeo ab inuicē distantes, quod arari possunt, & diuersis seminibus feri, aut eque distantes undiq;, quod arari non possunt, & hoc quidem modo tribus distanti pedibus, aut minus uel amplius, secundū quod fuerit letum aut exile solum in quo plantantur. Quedam etiam fiunt in aciebus cum palis & perticis, aut in forma pergulariorum paruorum, quæ à parte stipitis sint depreßa, & ab opposito eleuata, & hic modus à quibusdam Martine & in alijs locis pluribus, & maxime in hortorū spacijs obseruatur. Quedam uinæ fiunt cum arbutulis ad hoc formatis per agros, plus uel minus eque distantibus secundum quod magis & minus de uino uel de tritico paterfamilias optauerit. Mediocris tamen modus distantiæ sedecim uel uiginti

ginti pedum habetur, & iste modus maxime apud Mediolanum & in illis partibus observatur. Quædam plantantur in ripis fossatorum cum fiunt aut per agros iuxta magnas arbores, ut eas quæ sunt in agris aut ripis opperiant & fructificent, & hic modus plurimum observatur in partibus Italie. & iterum supra dictis vineis quæ in ordinibus fiunt, quibusdam ponuntur pali & perticæ, quibusdam vero pali aut frasciones loco ipsorum solūmodo, & sarmentis in quatuor vel in duas tantum velut perticæ extenduntur & ligantur, & hic modus apud Terdonam & Cremonam & Pistoriā præcipue observatur, & quædam sine adminiculis iacere sinuntur in terra, quod pro sola indigentia vel necessitate provincie faciendum est, & hoc maxime potest in montibus valde aridis tollerari, ubi vinee non putrescunt in terra iacentes, sed à sole nimio fervente servantur.

De diuersitate generum vitis, Cap. III.

Diuersitates generum vitis multe sunt. Nam quædam valde timent nebulas & pruinas, quædam parum, & quædam timent siccitatem & ventos, & quædam facile tollerant, & quædam valde fecunde sunt, quædam parum, et quædam vites sunt quarum fructus cito maturatur, quædam tarde, & quædam vehementer fructum suum in flore perdunt, & quædam non. Et quædam melumine fructu priuantur, quædam fructum suum ab eo defendunt, & quædam facile ventis rumpuntur, quædam ad eò tenaces existunt, ut ab eis facile non ledantur. Et quædam timent pluuias, & quædam nimiam siccitatem, & quædam sunt spissos nodos habentes, quædam earum gemmas per longam internodiā distulerunt, & quædam sunt grossos & longos facientes palmites, quædam paruos. Et quædam magnam medullam faciunt. & quædam parnam. Et quædam frondes valde faciunt intercisas,

quedam parum. Et quedam rotundas & continuas. Et quedam faciunt uvas albas, quedam rubeas, quedam nigras, & quedam faciunt botriones multos & paruos, quedam paucos & magnos, & faciunt grana callosa, quedam mollia, & quedam durum corticem granorum, quedam subtilem & tenerum, & quedam faciunt grana ualde pulchra & lucida, quedam obscura, & quedam dulcia, quedam acris. Et quedam faciunt uua seruabilia, quedam corrumpibilia, quas omnes diuersitates facile uidere potest uir industrius et expertus.

De diuersis speciebus uitium,

Cap. IIII.

Species uitis ualde multiplices inueniuntur, & ipsarum multe diuersis nominibus in diuersis prouincijs & ciuitatibus appellantur. Sed quoniam ex eis quedam sunt meliores, & quedam minus bonae. Primo meliores & earum bonas condiciones aperte scribam, & earum ponam nomina, deinde breuiter dicam de alijs minus bonis, ut habita utrarumq; noticia, sciant uolentes plantare uel inserere uineas eligere meliores, dico itaq; in primis, quod est quedam species uuae quae uocatur sciaua, quae satis tarde pullulat, & est alba uua quasi rotundum habens granum, & faciens mediocriter magnos & spissos botriones, & solum mediocriter intercisum, & in quolibet sarmento etiam in ueteri nato duos uel tres uel quatuor & quinque quandoq; botros producit, & tanta est duricies ligni eius, quod sarmenta non siccantur inferius, propter uuarum pondus: unde ultra modum ramulos implet, & uua eius est ualde uinosa & lucida, & cito maturitatem recipit. Et unum eius est ualde subtile & transiucidum & medio cruer potens, & seruabile & maturum. Matram terram aut mediocrem & montuosam desiderat, & in ea melius quam in aliqua alia fructificat, si stridit puitur, nam longos palmities

palmites cum uinis nutrire non potest, & hoc apud Brixiam
& partes montanas Mantuæ præcipue frequentatur, & præ
ceteris in speciali ueneratione habetur. Est & alia species
que uocatur Albana, que tardissime pullulat, & est uua alba
modicum longum habens granum, & satis faciens magnos
botros, & spissos & longos, & mediocriter fructificat, & facit
folia mediocriter intercreta, & eius sarmenta ui ponderis non ste-
tuntur, tanta est duricies ligni eius, & eius grana à sole plurimū
colorantur, & ualde cito maturatio eius completur, & est satis
dulcis in sapore, sed corticem austerum aliquantulum amarum ha-
bet, & ideo melius est quod uinum ex ea exprimatur quàm quod
ferueat in tinis diu cum corticibus & racemis, & uinum quidem
eius est ualde potens & nobilis saporis, bene seruabile & medi-
ocriter tenue, & si tempestiue fiat eius incisio uindemiæ, melius
seruatur uinum eius. Et hæc species uua præ ceteris apud Forliui-
um, & in tota Romaniola in ueneratione habetur, ubi strictissime
putatur, nam cum longis palmitibus minus defenditur. Est & al-
ia species uua que Tribiana uocatur, que est alba cum grano ro-
tundo, paruos & per multos botriones faciens, in inueniunt steria-
lis, & procedente tempore fecundatur, nobile uinum faciens, et
bene seruabile, & hæc species per totam Marchiam præcipue com-
mendatur. Est & alia species que Grangnolata dicitur, que unum
os tantum habet in grano, & est lucidissima, & longum habet ali-
quantulum granum, & facit uinum ualde limpidum & potens, &
durabile, & nobilis saporis & odoris, & hoc apud Tordonam et
in illis partibus maxime commendatur. Est & alia species que à
quibusdam Malicia, à quibusdam Sarcula uocatur, que granum ala-
bum & rotundum habet, & turbidum cum subtili cortice, que mi-
ro modo ponderat, & in terra satis macra defenditur, & uinū fa-
cit mediocri bonitatis & potentie, non multū subtile, nec multum
seruabile, & hoc apud Bononiæ præcipue in honore habetur.

Est & alia species que gargarica dicitur, que alba est & rotunda, mirabiliter dulcis, clara seu lucida, & colore aurea, & cū grosso cortice seruabilis ultra omnes alias, est ualde fertilis scemina, mascula uero nihil ualet, cuius grana sunt longa, & colore aurea, sed sterilis est omnino, & eius uinū est ualde subtile & pellucidum, parue potentiae, & satis seruabile. Et hæc apud Bononiam & Paduam in magna ueneratione habetur. Est & alia species, que Albanica dicitur, que est alba & nō lucida, sed maculis plena, rotunda, & mirabiliter dulcis. Et uinum facit dulcissimū, & quibusdam annis est fertilis, & sæpe sterilis, & præcipue si stricte putetur, sed satis fertilis si cum longis palmitibus relinquatur. Et in quibusdam partibus Bononiæ, & maxime in Purgio Panitalis in honore habetur. Est & alia species que uocatur Buranxæ, que est una alba, multum dulcis, & pulchra, & in arboribus bene fructificat. Item est una que dicitur à frigno africogna, que non est delectabilis ad edendū, & in arboribus miro modo fertilis est, & ideo præcipue competit in locis, ubi homines uuas inuadunt, & hæc due species ad Pistorium præ cæteris diligēter habentur. Sunt etiam quedam alie uuarum species arborū satis bonæ sicut Linodella, que bonum & seruabile facit uinum & multum, que apud Pisani præcipue plantatur, et Verdiga que paruos facit palmites & multū fructum, & Verdecla, que grana facit uiridia & parua, & multas fert uuas, que due species & inferiores que minus bonæ dicuntur in antiquis uinceis & in quibusdam nouis, & per comitatum inueniuntur Bononiæ. Sunt & alie species uuarum albarum, quarum quedam licet apud quosdam in magno habeantur honore, tamen apud nos diuersis rationibus, aut propter paucitatem fructus ipsarum, aut quod nimium multa pericula timent, minus bonæ per experientiam reperiuntur, & hæc sunt Muscatellus & Linatica, que appositæ sunt & ad esum & in arboribus, sed in uinceis spissis & iuxta erram non respondent ad uotum. Et Græca & Vernacia que licet apud


apud nos bonum faciunt vinum, faciunt tamen nimis parum. Et berbigenes & cocerina & groposa & fuxolana & banfa, quæ bonū faciunt vinum, & quibusdā annis sunt miro modo fertiles, & maximos botriones agentes, sed alternis annis fructu destituuntur in flore non multis periculis expositæ. Vuarum similiter nigrarum vel rubearū multæ sunt species, quedam valde bonæ, quedam parum. Et bonæ quidam sunt Grilla, Sisaga siue Mardegana, quæ sunt quasi eiusdem conditionis, sunt enim modicū nigre, multum fertiles, omni anno habentes longa grana & ipsorum corticem subtilem & pulchrum, & delectabile vinum faciūt, & satis seruabile, sed propter nimiam pluuiam crepant eorum grana, & in montibus non bene proveniūt, sed in campestribus locis letantur, differunt tamē, quia sisaga nobilius vinum facit, sed minus, quia paruos facit botriones & raros, sed multos, & parua grana. Grilla uero facit omnium harum opposita, & hæc species abundanter inuenitur Bononiæ, & in multis locis alijs, est delectabilis ad edendum, & est miro modo uinosa, & uult terram pinguem aut stercoreatā, & ualde timet umbras, & mature pullulat, & facit vinum optimum & seruabile & potens ualde, nec audet ultra unum diem uel duos stare in græpsis: & hæc in ciuitate Astensi, & in illis partibus in maximo honore habetur. Est & alia species quæ uocatur Maiolus, quæ est uia nigra, ualde cito maturabilis, & pulchros & spissos & longos botriones faciens, in sapore dulcissima, & uinum facit durum, & satis seruabile quasi nigrum, satis fertilis est, & in plano & in montibus provenit, & hæc maxime apud Bononiā in locis infinitis habetur. Est & alia species quæ aduracla uocatur, quæ ualde nigra est, & habens longa grana, & uinum faciens ualde nigrum & bonū in terris humidis & aquosis, sed in montibus & siccis locis non letatur, & hæc apud Ferrariam præ ceteris speciebus eligitur. Est & alia species quæ uocatur Gmaresta, hæc non est multum nigra, longum habens granū, & ante maturitatē omnia folia perdit

in sapore accida, mediocriter fertilis. botriones facit raros, & uinum optimum diu seruabile. Et hæc uua non comeditur ab auibus uel canibus, nec libenter ab hominibus, & ex ea plurimum inueniatur in partibus montanis Bononiæ. Et est alia species quæ dicitur ginnaremus, prædictæ similis in sapore & uini durabilitate et forma, sed maiores ualde botriones facit, & grana grossiora & abundantius uinum, sed minus nobile, & magis loco pingui letatur, & hæc in pluribus partibus Bononiæ inuenitur. Est & alia species uue nigræ quæ dicitur padrinca, quæ grossos & spissos facit botriones, sed in æstate non durat, & hæc in infinitis uineis Bononiæ inuenitur. Sunt & aliæ multe species uuarum nigrarum, quæ propter uarias conditiones malas minus approbantur sicut est pignolus qui multum diligitur apud Mediolanum in arbutibus, sed apud nos non bene fructificat. Item albarica cum qua tinguntur alia uina, quæ nimis melumen timet, & uinum nimis anserum facit. Et uarana clementina & portina, quæ licet sint mirabilis dulcedinis ad edendum, & bonum faciant uinum, tamen sunt fere steriles, & minus melumen timet. Et ualmirica & tusca quæ ualde nigre sunt, & melegonus, qui ante omnes species denigratur, & canicula quæ pulcherrima uua & seruabilis est, quæ omnes alternis tamen fructificant annis. Est etiam quedam species uue rubræ uocant canopum, ualde dulcis & seruabilis, sed parum fertilis. Sunt etiam quedam genera & species uuarum syluestrium, quæ labruscæ uocantur, quarum quedam sunt albæ, quedam nigre, ualde parua faciunt grana, & paruos grappos, quæ super arbores & species spinarum uiridarum suo naturali motu conscendunt & non putantur, sed si putarentur, & per cultum domesticarentur grappos facerent maiores, & grana grossiora quam prius. Et hæc quæ nigre sunt tingunt uinum, & clarificant si integre uel cum racemis cõquasse, ponantur in dolijs, nec uiciant saporem uini, & quæ albæ sunt clarificant & purificant albæ uina. Sunt & quedam species uuarum grossarum & durarum,

quæ

que dicuntur pergule uel brumelle, quarum quedam sunt albæ, quedam nigre, quedam rubre, & quedam habent grana rotunda, quedam longa ualde, quedam mediocriter, quedam speciosa habent nomina, & earum quedam tempestine maturationem recipiunt, quedam tarde. Et ex eis eligenda sunt que magis placent ad esum, quia propter nihil aliud plantantur, cum ex eis uini non fiat, satis tamen competunt ad agrestum faciendum acerbæ.

De aëre qui uitis conuenit, & de situ uinearum. Cap. v.

 Celum mediocris qualitatis, tepidū magis quàm frigidū esse debet, siccū potius quàm umbrosū, sed ante omnia uitis procellas uentosq; nimis formidat, Aquilo tamen uites sibi subiectas foecūdat, Austro uero nobilitat. Ideoq; in arbitrio nostro est plus de uino habeamus an melius de situ uinearū. Etiam sciendum est, quod campi à montibus remoti & ualles non aquosæ largius uinum ferunt, colles uero & campi iuxta eos existentes & naturam eorum habentes nobilius uinum faciunt. Præterea est sciendum, quod in locis frigidis & in montibus à meridie uineta ponenda sunt, calidis à septentrione, temperatis ab oriente, uel si necesse fuerit ab occidente, ut hac industria excellens qualitas tenueretur, loca naturam sepe uitis mutant, & ideo earū genera frequenter aptentur. Plano igitur loco statues uitem, quæ nebulas sustinet & pruinas, collibus quæ per siccitatem durat, & uentos non timeat, pingui agro graciles atq; foecundas, macro seraces & solidas, frigido & nebuloso, eas quæ hyeme in celeri maturitate præueniunt, aut quæ duris acinis inter caligines securius durent, calido loco teneriores siccæ eas quæ pluuas ferre non possunt. Et ne multa dicam, eligenda sunt genera quæ pro defensione uictorū suorum contraria loca diligunt his in quibus durare non poterant: placida sanè regio & serena caute genus omne suscipiet. Induſtrius ergo

uir probata diligit, & locis talibus mædet, quæ mutare possumus e
unde sumuntur, sic meritum quæq; seruabit.

De terra quæ uitis apta est,

Caput VI.



Solum ad uineas ponendas nec spissum nimis, nec resolu-
tum, propius tamen resolutio esse debet, nec exile, nec læ-
uissimum, tamē lato proximum, nec campestre, nec præ-
ceps, nec siccum, nec uliginosum, modice tamen roscidum, nec sal-
sum, nec amarum, quod uitium sapore corrupto uinum conficiat.
Tophus & alia duriora ubi gelu relaxantur & solibus pulcherri-
mas ferunt uineas, refrigeratis æstate radicibus & humore deten-
to, sed & soluta glareæ, & calculosus ager, & mobiles lapides, si
tamen hæc omnia se glebis pinguius miscuerint, & silex circum
terrâ suppositus, quia frigidus est & tenax humoris radices æstate
scire non patitur. Item loca ad quæ de cacuminibus terra decurrit,
uel ualles quas fluminum saturat aggestio. Argillosa terra cōmo-
da est, sed argilla sola grauitur inimica. Niger sabulo & rubeus
utilis est cui fortis est terra permixta. Carbūculus nisi stercoretur
macras uineas reddit. In rubrica difficile comprehendunt, quam-
uis postea nutriuntur in ea, sed hoc terræ genus est ualde operi-
bus inimicum, quia paruo uel humore uel sole, aut nimium mæde-
scit, aut nimis siccatur, ideoq; maxime utile solum est, quod inter o-
mnes nimietates temperamentum tenebit, et proximus fuerit raro
quàm depresso. Vitilem uineis terram per hæc signa cognosces, si
coloris et coporis rari aliquatenus ac resoluti est, uirgulta quæ pro-
tulit leuia, nitida, procera et fecunda sunt, ut pirus syluestris, prue-
nus, rubus, ceteraq; huiusmodi, neq; intorta, neq; sterilia, neq; sca-
biofa, nec macra exilitate languentia. Ad pascinandum præterea
rudes agros uel maxime syluestres eligamus. Ultima est eius condi-
tio in quo sunt uineta uetusta, quod si necessitas cōgerit prius mul-
tis arationibus exerceatur, ut abolitis radicibus prioris uineæ, &
omni

omnibus carie & squalore depulso, nouella uitis tutius possit induci.

De pastinatione & dispositione terræ, in qua uinea plantanda est, Cap. VII.

Mense Septembri uel Octobri in locis aridis, aut Ianuario, Febuario uel Martio locis humidis fieri debet pastinum siue cultura, ubi uinea est plantanda, quod tribus sit generibus, aut terra in totum fossa, aut sulcis, aut scrobibus tota terra debet effodi ubi ager non est mundus, ut syluestribus truncis & radicibus, silicis, uel herbis noxijs spacia liberentur. Vbi autem sunt munde nouales, scrobibus pastinemus aut sulcis, sed melius erit sulcis, quia humorem uelut in totum spacia pastinata transmittunt, si autem autem sulci longitudine qua destinaueris tabule longitudine triens pedum uel quatuor, altitudine unius pedis in locis humidis, uel duorum in locis siccis. Deinde si ligonibus per homines uinea est colenda tantum crudo solo relinquimus, quod altero sulco impresso uitium acies tribus uel quatuor distet pedibus, scilicet tribus in solo exili, quatuor in pingui, & tribus & semis in mediocri. Si uero arande sunt uinee quinq; uel sex pedum spacia que non fodienda sunt, & in medio relinquatur. Quod si scrobes fieri placeat, tantum fiant longæ quantum uites distare debebunt, ut in quolibet scrobis capite planta una ponatur, possunt tamen commodissime sulci fieri distantes in triplo quàm uinea spissa finaliter esse debet, & in quolibet sulco planta in duplo spissiores quàm esse debeant poni, sicq; acies ligonibus procurari, & spacia per triennium aut quadriennium arari, & omnium generum semine feri, cunq; uites excreuerint unam trahi à dextris, & alteram à sinistris, & de utraq; duos fieri uites. Sicq; spacium totum impleri, scrobes non sunt ultra duas pedes altius fodiente. Neq; pangimus frigore, ne sarmenta laborent, latera in scrobibus æqualiter incisa, ne aliqua uitis saucietur, alæ nitentibus ferramentis cum fossor incumbit, pastinū

T autem

autem omne quod uersetur duorum pedum altitudine uniuersa terra sodiatur, in quo erit diligentia, ne crudum solum occulta fraude fossor inclinat, quàm rem per spacia quæ sodiuntur uirga cistos exploret, in qua modus est predictæ altitudinis designatus. Et radices omnes & purgamenta, maxime rubi & silicis in summum redigi faciant, quæ cura in omni positionis genere est undiq; seruanda. Possunt etiam commodè fieri foueæ parue & stricte, conuenienter tamen profunde ubicunq; uites per uniuersum agrum stare debent, secundum quod omnes agricultores experti bononiæ & in locis alijs pluribus obseruant, possunt etiam foramina in terra circa uitem fieri, in terra ubicunq; uitis plantanda est, quæ quidem cum palo fieri consueuerunt, sed melius ualde est quod fiant cū forti terra, ut uocant, quod est instrumentum ferreum per me primitus inuentum, quo terra educitur, nec in foraminis parietibus concalcatur, ut inflexionem debiliū radicum impediāt, & hoc quidem magno labore perficitur, nisi ager lapidosus fuerit uel saxosus. Locus quidem qui pastinandus erit, prius impedimenti omnibus liberetur arboribus, ne fossa terra post calcatu assiduo solidetur, illud quidem experimentis assiduīs compertum est, uites melius prouenire si uel statim fossæ terræ uel non longe post pangantur, cum tumor pastini nondum repetita soliditate subsidit, & hoc quidem in sulcis & scrobibus est probatum.

Quomodo & quando debent colligi
plantæ, & qualiter seruari

& ad partes remotas

portari,

Cap. viii.



ante uitis quæ talcoli dicuntur colligi debent quando plantandæ sunt, & ante etiam colligi possunt si bene seruentur. Et meliora quidem tempora colligendi eas sunt tempus octobri, quando pars foliorū cecidit, et pars adhuc retineatur in uite, tūc enim calor naturalis uitis adhuc expansus in ramis, sed

sed cum omnes frondes ceciderunt omnino, & superuenit gelu inie-
sum in aëre, tunc rami eius calore naturali destituti sunt, propter
frigus aëris fugam habuit ad radices ad calida viscera terre, quæ
retales plantæ difficilius comprehendunt. Tempus præterea mar-
tij, in quo iam calor & humor ad radices redijt, itaq; eorum gema-
na cum tumescere incipiunt est optimum ad plantarum collectionē
propter eandem rationem. Eligendarum quidem plantarum ratio
multiplex est, & primo quidem ex tali terra eligi debet, quæ non
sit pinguior, & ea in qua pangi debent sit æqualis aut exilior. Nam
si a pingui terra ad solum exile transferuntur, utiles esse non pos-
sunt, nisi sæpe stercore adiumentur. Item eligenda sunt pangenda
sarmenta de uite media, non de summa, nec de infima, quinque uel
sex gemmarum spacia à ueteri procedentia, quia non facile dege-
nerant, quæ de locis talibus colliguntur. Summa flagella repudie-
mus ac surculos, qui licet loco bono nati sunt, tamen feracitatis
beneficio caruerunt. Pampinus aut qui de duro nascitur, etiam
si fructum protulit pro frugifero non ponatur. In suo enim
loco foecundatur à matre, translatus uero tenet sterilitatis
uicium, quod nascendi conditione suscepit. Sumatur etiam
de uite foecunda, nec existimemus ea brachia fertilia quæ uinas
singulas aut binas producant, sed quæ multa ubertate curan-
tur. Nam potest ferax uitis in se habere feratiores mate-
rias. Est autem hoc signum fertilitatis, si de duro aliquo loco
fructum citabit, si foetu impleuerit ramulos ex omni parte sur-
gentes, sed hoc signis proprijs per uindemias est notandum.
Afferit autem Columella uno anno explorari fertilitatem non
posse, sed quatuor, quo numero cognoscitur uera generositas surcu-
lorum. Ad pangendū nouellos palmites, debet eligi duri in se nihil
habens, & ueteris sarmenti, quoniam hoc sæpe corrumpitur et putre-
scit. Mensura sarmenti unius cubiti secundū Palladium esse debet.

Mihi autem uidetur longius esse debere, maxime in locis decliuir, montuosis & aridis, cum in foueis oblique panguntur, ipsūq; ramulis & capreolis siue anchis esse purgandū. Seruanda sunt plantae uitis taliter quod uento aut sole nō urantur, aut aliquo modo laedantur, & praecipue sub terra usq; ad dimidiam partem mersae: si paucis erūt seruandae diebus. Si uero diu seruari eas necesse fuerit, & maxime iam multo adueniente calore usq; ad summities ipsorum terra ualde contrita operiantur, adeo quod terra tam intra quā supra diligēter posita singulas plātas tāgat. Quod si eas trāsnchi ad partes multum remotas oportuerit, paleae molles & modicum lutose cum plantis optime misceantur, & sacco uel sextorio: quod est melius inuoluta stricte ligentur capite grossieri cum praefatis paleis, & storio cooperto, & cum portantur quantū fieri potest à sole defendātur & uentis. Quod si nimia esset aëris siccitas, possunt quādoq; corpora grossiora in aquā demergi, sic enim disposita diu ferri poterunt, & seruari sine lesione ipsarum.

Quando & qualiter uinex & uites plantandae sunt, Caput IX.

IEmpore Septēbri, & Aprilis in locis frigidis uinea sunt plantandae, temperatis uero mense Octobri, uel Martio, calidis mense Nouembri & Febuario, ita tamen quod in omnibus praefatis locis, si humido & campestris depressa fuerint, post hyemem pangantur, ne calor naturalis ipsarum duplici aquositate, loci uidelicet & hyemis extinguatur, si uero arida & montuosa sint, loca pangenda ante hyemē plantentur, ut superflua locorū siccitas circa plantas humiditate hyemis temperetur. In locis uero temperatis ante hyemem, & post congrue pangi possunt. Item panende sunt uites placidis diebus ac tepidis, quando solum est modice humidum, sed potius aridum quā lutosum. Cum uinea plantatur in ordine aut plantantur in foraminibus directis, uel pa-

rium obliquis, duo sarmenta in parte inferiori, oblique incisa foramini imprimantur, & sabulū uel terra soluta & trita, & cum pauco maturissimo letanine palarum uel uinarie mixta usq; ad medium foramen ponatur, deinde creta uel terra ibidem inuenta repletur, ut in paruis foueis conuenienter profundis panguntur, capitibus plantarū longe positis in parte infima & in suprema iuxta signum, tum finium undiq; proportionabiliter positum ex cōiunctis, & terra contrita mediocriter super inducitur cōculcata. Caput sarmenti cum deponitur retorquendum non est, nec aliquo modo uexandum. Nam pars ea de qua radix spectatur iniuriæ nulla subijcienda est, due gemmæ fertiles remaneant supra terram, nec dimersa ponitur secundiori parte supra eam quam est, sterili proximum relinquatur. Vbi pinguis est natura terrarum maiora inter uites spacia relinquamus, scilicet quatuor pedum ubi exilis angusta, scilicet trium, ubi uero mediocris, trium pedum & semis. Præterea non est uno tantum genere uitium omne pastinum conscrendum, ne annus iniquus generi uindemiæ spem omnem excludat: & ideo quatuor uel quinque generis eximia sarmenta pangemus, ac expediet maxime tabulatim disponi. Et sic generum diuersitate distincte posita, poterit eam operatorum minor numerus expedire, & gradatim quæ uelocius maturantur prius condere, deinde quæ seruius, ac melius puro sapore sine admixtione alterius generis una quæq; uina seruare. Et si hoc facere tibi difficile uideatur, non alia simul conseras, quàm quæ sapore & flore & maturitate conueniant. In serobibus uero magnis & latis, ut uitium distantia esse debet, per angulos quatuor sarmenta deponas, & uinarias (ut dicit Columella) stereo core mixtam simul sparges, & si exile solū fuerit pinguem inferas terrā in serobē: si uero nimis cretosa, eidem misceas sabulū, quod si arbusculante delictat habere, plantam generose uitis, prius in seminario nutrire debebis, unde radicata transferatur ad serobem cui arbor est iuncta, in seminario autem breuī spacio distantia inter sara-

menta deponas, & cum conualuerint hinc post biennium radicabitur uitis uel arbutula & transfertur: quas cū depones in scrobem, ad singulas materias rediges, putatis omnibus quę scrobi insunt, curtatis etiā radicibus, quas poteris inuenire uexas. In scrobe autem ad arbutum faciendum duas radicales uites depones, obseruans ne sua radice contingant, & ipsas uites ad scrobis latera discretela coniunges. Varro asserit scrobem non primo anno esse complendam, quę res faciet uitem altius fundare radice. Sed hoc aridis prouincijs forte conueniet, humidis uero sata putrescent humore suscepto, nisi terra statim cultui detur. Sed arbuta quę ferent plantas arborum de his generibus ponat, uel si agro suppetit abundantia his utatur, ulmo, oplo, salice, populo, fraxano, ceraso, nuce, pruno & similibus, sed salice & populo in locis humidis uti possūmus, ceteris uero in his & alijs locis. Ex his autem generibus truncos radicales uel salicem & populum sine radicibus circa scrobem uitis cōstitui oportet. In scrobe uitis ab arbore sua sex qui pedes uel duorum pedum spacio distare debet. Nam arbori nimis proxima uitis aut ipsius opprimit incrementum, aut opprimitur ab ea. Aliud uero etiam de transferenda uite ingenium fieri potest ex uimine parua corbícula ad arborem uel pergulariū feratur, cui uitis adhaeret, & in fundi media parte pertunditur, & inducto in eam sarmento uitis suspenditur, & terra repletur, quod sarmentum ex actō anno in corbiculę fundo incisum, cum ipsa corbícula portabitur ad locum ubi plantare proponis, cum ipsa corbícula obruitur circa arboris maritandę radices, & hoc fiet sine ambiguitate ostēdendo. Casueis etiam munienda est aduersum pecoris appetentis inurias, & arbori suę protinus alliganda. Cum uero arbores riparum uitis munire desideras optimū est, & facile sulcum in ripa facere, ibique spinas et taleolos mixtim ponere, & fossato effosso terrā superinducere, sic enim spinis muniatur ager, et per eas uitis tute cōdescent. Optimum enim genus est prouincialium uinearum quę sunt ad uites

uelut

uelut arbutulae stent, quae quidem plantantur ut haec quae in ordine disponuntur. Et haec quidem aut undique patguntur equaliter, aut unum ordinem tantum seruant ab alio proximo, ut placet, remota, sed in his una sola planta in qualibet potest poni, in duabus uidelicet aciebus, in tertia uero bonum erit ubique duas poni, quibus proximae plantae praedictae possint annis sequentibus reparari, quod si in quolibet loco duae ponantur, cum conualuerit debilior auferatur, ut una sola remaneat. Praterca sciendum est quod naturam uitis coelum solumque sustentat, si genera conuenienter aptentur, ideoque in earum plantatione praecipue obseruanda sunt ea, quae supra diximus, cum de aere et situ uinearum loqueremur.

De propagatione & renouatione uitium & uinearum, Caput X.

Propagationes quandoque in uineis, quandoque ad arbuta fiunt. In uineis quidem quandoque propagantur in locum uacuum, ubi uitis secundum ordinem uinae debet esse: quandoque uero in locum alterius quae infamati generis est sarmentum uitis nobilis propagatur, et quandoque per circumstantias adducitur, ut uinea incrementum recipiat. Et primo quidem modo ad ordinatum protrahitur locum, aut statim cum sarmentum sufficienter est longum, aut successiue per annos, ubi eiusdem deficit longitudo. Et idem seruandum in omni propagationis genere. Si autem in locum eradicandum uitis propago ducatur: aut hoc statim fiet, aut primo anno per unum pedem prope uitem auferendam protrahitur, ut habito uitis dampnandae fructu anni prioris, et sequentis leuiter in locum prius eradicatae trahatur. Cum autem pertrahitur ad arbores uel arbuta, per unum pedem ad minus ab arbore fiat remota propago. In omnibus autem praenarratis modis letamen in foveas supra terram circa propaginem apparentem relictum ponatur, nec sub terra per contractam propaginis apponatur, alioquin superfluo letaminis calore debilitatur uel arescit, nisi fuerit adeo maturum et uetus, quod omnis calor letaminis exalarit.

Et

Est autem sciendum, predictas propagationes fieri, aut in fossione totius vitis que propagatur, aut magis sine curvatura sarmenti, ut velut arcus supra terram relinquatur, alia parte vitis in fossa: quod si fiat, post biennium recidatur aut triennium, quod fiet tuius propter debilitatem biennialium radicum, que vitem novam sepe non convenienter defendunt: vetus & antiqua vitis & que longe nimium producit palmites frugiferos, renouatur per studiosum palmietis cultum, congruis temporibus eidem adhibitum, & per firmationem letaminis aut sarmentorum, aut sabuli in loco nimis cretoso, aut crete in terra nimium sabulosa, & per strictam putationem aut incisionem factam in loco stipitis nitido vel succoso. Columella dicit, quod si vitis pergularij & arbusli, que est integro tronco in solo robusto stricte putetur, & ablaqueata finetur in terra, tertium vel quartum pedem à terra mucrone scietur acuto, ac fossa frequētius incitentur ex eo loco gemme, plurimūq; producit in vere ac materiam vitis fundit qua reparetur vitis. Et si truncus vitis est nimia vetustate corruptus, mense Martio iuxta terræ superficiem, vel sub ea modicum recidatur, ut furculus in abscisso tronco vitis eodem renouetur, vel cum vitis (que sola est) nimium longe producit frugiferos palmites, plicetur unum remotum à vite, & intrans ibi in terram exeat, appodiatu ad vitem, & post biennium incidatur macer vitis renouande, vites autem omnes laudabilis sunt generis, & tunc de omnibus fiat, ut de singulis vitibus supra proxime dictum est. Aut omnes sunt male, quo casu nihil erit utilius, quam eam uniuersaliter extirpare, atq; sufficienter vetustis cōsumptis radicibus, eam denuo plantare, & si quedam vites sunt bonæ, quedam male, radicibus extirpatis peioribus, et appositis palis in omnibus locis in quibus vitis apiantur, que relicta sunt vites adeò fodiantur, quod facile fieri possint, & totaliter submersæ in duas vel in plures partes, secundum exigentiam & possibilitatem ipsarum una quæq; distribuatur, & duobus palmitibus in singulis locis ad plus relicta cum duobus

duabus gemmis supra terram, ceteri amputentur, & unicuique uiti ex fimo aliquid apponatur. Nec est prætermittendum, quod de nouis palmitibus tantum de unoquoque terra mergendum est, quod radices in loco congruo nouas mittere possit, quæ in ueteri nisi sit quasi nouum facile non nascuntur. Quod si aliquis remanet locus ad quem nullus possit palmes produci, eidem aliunde translati noui palmites tribuantur. Omnis præterea propagatio fieri potest in mense octobri, nouembri, februario & martio, cum terra nec adeo mollis est, ut commode retractari non possit, & eius partes comminui, nec adeo dura, quod nimium fossioni resistat. In aquisiis autem nimium locis post hyemem, & in siccis ante hyemem utilius pro pago ducetur, ita tamen quod in plano sub terra quo pede in cliuibus & niuosis & rimosis usque ad duos pedes uitis trahenda mergatur, uel forsan ea quæ sit ante hyemem in omnibus locis est melior, dum tamen in aquisiis terra circa eam bene disponatur, quia firmandis radicibus (ut ait Palladius) uitis incumbit, cum proferendi palmites eam cura non permouet.

De insitione uitis, Cap. XI.



Uites inseruntur, aut in uitis, aut in arboribus. Et in uitate quidem insitio duobus fieri potest congrue modis, in trunco uidelicet & palmite. Insitio in trunco hoc modo, eligatur truncus inserendus talis qui sit solidus, & humoris exuberet alimento, neque ulla uetustate aut iniuria laceratus areseat, recidatur circa terram, aut ad pedem medium infra eam. Nam supra terram difficilius comprehendit. Varro autem scribit, uitem inserendam siccare debere triduo antequam inseratur, ut qui in ea natus est humor diffuset à uite antequam inseratur, aut paulo infra in suam incidatur, ut inde humor aduenticius effluere possit. Item inserendi furculi solidi, rotundi, gemmis spissis & pluribus oculati, ex quibus tres oculi uel duo insitione ponantur. Radicatur ergo sarmentum ad duorum digitorum mensuram, ut ab una parte sit cortex,

ne patiaris nudari medullam, sed leniter rade, ut incisura possit sensim in acumen exire, & cortici matris aptetur. Infimus oculus ita infigatur, ut trunco iunctus adhaereat, qui oculus exteriorem debet recipere partem, deinde ligetur, ut in alijs insitionibus est narratum, tegmento quoq; aliquo à ventis & sole defendatur, ne hii quatiant, hic adurat. Vbi calor temporis ligaturam inuasit, ipsi puniculo tenuis humor circa vesperam debet frequenter affundi, ut hoc alimento contrario uidelicet coeli torrentis rigentur. Potest etiam aliquid ueteris cum nouo conuenienter inferi. Cum ergo germen coeperit incrementum adutorio calami uel pali debet adnecti, ne motus aliquis fragilem sarmenti procedentis quasset atatem, leui uinculo & non stricte ligetur, ne adulescētia molissimi germinis nodo duræ constrictionis angatur, si infra terram inserueris eā beneficio congestionis accumula, ut hæc quoq; nouis sarmentis ministraret alimenta. Aliqui etiam in uite uel ramo biennali, uel ultra, inserunt surculū longum, modicum ueteris habentem, & trunci grositudinem possidentem, uel etiam inaequalem & simul utrumq; iunctis abscissam, uel supra dicto modo in scissione paratam et ligaturam propaginem obseruata. In palmitē autem insitio duobus modis fit, et uno quidem qui omnibus melior est, ut nouū sarmentū noue præcissuræ addatur, incisura utriusq; in eodem iuxta gemmā adhibita, loco et ligatura cum peciola ex cera imbuta & molli uimine, deinde argilla congrue subsecuta, alio modo ut gemma niti: unus excidatur usq; ad medullā profundato uulnere, & transverso utrūq; obligato uulnere, & tantundē de gemma uitis alterius obruatur, & loco primo ponatur, & si at colligatio, ut in alijs, & tūc cōulescit & fructificat. Quidā etiam expertus mihi asseruit, usq; ad medullā uitē parua teretere perforasse, & ibi surculū cōuenientē foramini modicū sum infixisse, & cōprehēdēsse & nō abscissa uite, quæ quidē si abscidatur debet melius prouenire. Est et alius modus optime proueniēs ut incidatur inferēda uitis oblique, usq; ad medullā uel prope eam,

in tan

in tantū quod cuneus duorū prope digitorū possit immergi, et tunc furculus duarum gemmarū modicum habens ueteris usq; ad medullam rufus ab una parte ut incisura in acutum tendat, et preparatus eo modo quo melius adequetur alterius partis, exteriora remota corticula imprimatur in plagam, et ligetur, et creta circumposita, peccola postmodum inuoluatur, et per quatuor digitos mater supra insitam sit abscissa, nec supra eam nec iuxta peremittatur aliquid pullulare, et possunt circa uites plures furculi conuenienter aptari. Optime etiam prouenit si nouus tantummodo furculus inferatur, et si eiusdem grossitudinis sit, cum truncus erit melius. Alioquin cum una parte corticis adequetur, uel secundum rationes fiat adequatio medullarum. Insitio in arbores duobus potest fieri modis, et uno quidem ut uitis trahatur per cerasum, uel aliam arborem, ubi uno tempore fructus arboris maturetur. Alio uero ut inferatur in arbore, sicut omnis insitio in dissimilia fit quandoq;. Et primus quidem modus est, ut plantetur iuxta cerasum, uel aliam arborem pirorum, uel malorum, et perforantur ille, et perforamen uitis trahitur, et cum creuerit arbor et uitis, ita quod efficiuntur ligna eorum continua, præciditur uitis ex parte radicis ita quod non nutritur nisi per radicem et stipitem alterius arboris, et tunc maturatur unā cum fructibus illius arboris. Inferitur autem in arbore ulmi, et forsā in quibusdam alijs, secundum Columellam, ut truncus arboris gallica usq; ad medullam perforetur terebra, ubiq; affigatur furculus uitis, secundum modum supra traditum, cum in communi de insitionibus loqueremur. Fiant præterea dictæ insitiones in locis calidis mense februario, frigidis uero martio cū uites nō aquoso sed spisso lachrimantur humore, licet factæ tempore quo aquosas effundunt lachrimas, aut postq̃ emisserūt pāpinos quādoq; insitæ cōprehēdāt. Potest et à fieri mense martio et unio iā consumptis lachrimis, si palmites inferēdi loco frigido et umbroso à pullulatione fuerint præseruati.

Aliam insuper modū quo nuda gemma loco alterius cum melle vel alia quacūq; re ponitur à quibusdā amulgariter prædicatum non pono, quia eam nullatenus approbare uidetur naturalis ratio propter nimiam teneritudinem gemmæ. Veruntamen quidā Frater Minor mihi asseruit, quod mense Aprili cum folia uitis incipiunt apparere accepit summitatem gemmæ remanentibus folijs paruis, cum quadam concanitate, ac in eodem loco posuit aliam gemmam similem recentissimā aliunde receptam cum molli fimo bubulco, & sine quolibet alio auxilio cōdixit, ideoq; probari potest, licet uideatur cōtra naturalem rationē positam à fratre Alberto Germano. Cato autem scribit, quod uitis insitio una est per uer, altera cum una floaret, ea optima est per uer, uitē sic inscrito, præcрито quam inferes, eam mediā diffindito per medullam, eo surculos præcutos arcito quos inferes medullā cum medulla composito. Alia insitio est, si uitis uitē contingat utriusq; uitē teneram præcрито obliquo inter se medullam, cum medulla libro obligato. Tertia insitio terebra, uitē quam inferes pertundito, eo duos surculos uirginēos quod genus esse uoles insectos aliquos arcito ad medullam facito, his medullam cum medulla coniungas, arcito ea quæ terebraueris, alterum ex altera parte, eos surculos facito sint longi pedes binos, eos in terram dimittito, replicatoq; uitis ad uitē caput, mediā uitē uinculis in terram defigito, terraq; operito. Hæc omnia luto denso oblinito, alligato integitoq; ad eundem modum tanquam oleas. Ego autem aliam insitionem uitis sæpe probavi, & eam inueni infallibilem & securam, à pullulatione & lesione & scissura. Hanc insitionē hoc modo facere debes, palmitem nouum, longum, habentem quatuor digitos ueteris præcedentis anni, & remoue dimidiam partem ueteris usq; ad medullā, ea salua remanente in parte inscrida, & ex alia dimidia, ueteris forma manente in parte cum nouum longum tribus digitis usq; ad palmitem nouū, & ibi fiat una cotherea & cuncus ibi bene foris existat incisus, non à parte medullæ

dulle sed ab altera tantū, & fiat bene acutus & postea scinde per medium stipitem inferendum eiusdem grossitudinis, si esse potest, alioquin sit grossior parum, & de parte habente minus de medulla dematur quantitas unius digiti grossi, & in scissura infige cuneum, ut coherere fortiter adhareat capiti brevioris stipitis scissi, & alia duo capita equalia sint aliquantulum intra nouū, ut uinculum possit stringere utrunq; caput ueteris sarmenti equatam, deinde ligas triste cum iunco scisso totam scissuram, & eo modo poteris inferre duo uel tria uel plura brachia uitis reliquis omnibus amputatis, deinde totam uitem insitam demerge in terram, & tot sulcos in quam partem uolueris facias quot brachia sunt insita, ac in quolibet sulco in loco, ubi loca insita in terra iacebunt, unam paruum fo ueolam facias, in qua tota ligatura insue dimittatur, & terra coope rta pedibus suauiter cōprimatur, & ultra unam spannam ad minus sarmentum superius eleuatum. Item poterunt sarmenta noua in nouo sarmento uel ueteri usitato modo coniungi, & eodem modo in terrā deprimi, sed est opus quod iunctura cannula scissa sita metur, ne flectendo facile rumpatur.

De putatione uitis & arborum uitiferarum, Caput XII.

Locis calidis mense Octobri, Nouēbri, Februario et Martio, donec earum augentur gemme iuxta fiet putatio uincarū, frigidis uero mense Februario & Martio tantū in temperatis utroq; potest tempore fieri. Sed commodius erit in montibus uincas, que septentrionem aut partem occidentis respiciunt, uerno tempore putari, alia pars aduersa clementioribus plauis rescidatur in autumno. Nam in talibus locis & in omnibus calidis pruinarum uis & natura uestitur. Sed semper secundum Palladium in putatione curetur, ut uitis fiat in cruce robustior, ne debili miticulae duo duramēta seruemus. Quod quidem experti putatores


noſtri temporis in ordinatis & depreſſis uineis non obſervant, di-
centes melius eſſe ſtipitiẽ uitis renouari frequenter. Auſerenda ſunt
lata, intorta, debilia, et malis locis nata, & ſarmentũ quidem inter
duo brachia natum d. bet inſcidi. Quod ſi pinguedine brachium
quodcunq; debilitauerit, illud brachio decifo ſuccedat, oportet ta-
men optimum pueratorem ſarmentum: inferius bono loco natum ſem-
per uitis cauſa tueri, & ad unam uel duas gemmas relinquare. In
locis latis & clementioribus alius licebit uites expandere. In exi-
libus aut æſtuoſis aut decliuſ humilior eſt habenda, ſed erit ſapi-
entis extimare uim uitis. Nam quæ alius colitur & pinguis & ſæ-
cunda eſt, plusquam octo palmites habere non debet, ita ut ſem-
per in parte media unum aut duos relinquamus ciftodes. Si macra
& humilis eſt, ſingulis brachijs ſingula ſtagella dimitte, ſed pro-
uidendum eſt ne in una parte ſint ſarmenta quæ ſeruas, quod ſi ſi-
at, tanquam & à fulgure tangatur aſceſcit. Circa crus quicquid na-
ſcitur amputemus, ſi non deſiderat uitis renouari. Relinquenda
ſunt ſarmenta, neq; circa durum, nec in ſummo, quia hæc uelut pama-
pinaria minus afferunt, illa uero uitẽ nimietate fructus onerant,
& longius ducunt, quare ſunt in loco medio ſeruanda, non iuxta
gemmam ſed aliquantulo ſuperius fiat plaga, & auertatur à gema
ma propter lachrymam deſluentem: unguis etiam cuſtodum ſiccus
& anatinos reſcide, & omnia quæ uetera & ſcabioſa reperierit.
Quod ſi truncus uitis ſole aut pluuijs aut noxijs animalibus eſt ca-
uatus, purgemus quicquid eſt mortuum, plagasq; eius amurca linia-
mus, aut terra, quod proderit aduerſus prædicta, cortex etiam re-
ciſus & pendens à uite tollatur, quæ res (ut ait Palladius) mino-
rem ſecem reddit in uino, muſcus etiam radatur ubiq; repertus ſed
plagæ quas in duro uitis recipiet oblique ac rotunde fore debebũt.
Vetere igitur ſarmenta quibus primi anni fructus perpendit om-
nia reciduntur, & noua circuncifiſ capreolis & ramulis inutili-
bus relinquantur. Sed ſciendum eſt, quod in quibuſdam partibus
ſarmenta

sarmenta quantum longa sunt à natura producta à putatione relinquuntur, ut apud Cremonam & Terdonam, & alia multa loca. In quibusdam solum summitates steriles auferuntur, in alijs usq; ad unum pedem palmitum longitudo relinquuntur, alibi uero adeò stricte putatur, quod usq; ad semipedis mensuram palmites breuiantur. Et primus quidem modus non est obseruandus, nisi in locis letis, ubi pertica non ponuntur, sed uites uelut perticae uel funes undiq; extenduntur: secundus uero apud Ast obseruatur, cum palis tantum circa uitem affixis, ad eos palmitibus paucis ductis, & ij duo modi praecipue tollerantur in letis uincis, & in his uitium generibus, quae suas gemmas per longa internodia distulerūt, & huiusmodi uince plurimum fructum ferunt, & multos botros, licet non adeo magnos, ut uites stricte putantur, multumq; & assidue foli & simari desiderant tales uince, ut fructum & palmites congrue ferre possint. Haec uero uince in quibus usq; ad unum pedem breuiantur palmites, ut Bononia, Matina, & in multis alijs locis in mediocri solo defenduntur, & quasi in omni genere uitis, & congrue palmites fructum suum descendunt, quae uero strictissime putantur, ut apud Forlinium, & in quibusdam alijs locis, & in provincia taliter procurantur in uitis, quae sine palis & perticis uelut arbutule in suis stant ordinibus, & in uitis quae spissos ualde nodos inueniuntur habere, & maxime in exilibus solis & in speciebus uitis quae uocatur albana & sclaua, quae si aliter putentur nimis miseras uas ferunt, & sufficientes pro anno sequenti palmites non producant. Et haec est in uineis putationis ratio: in arboribus autem & pergularijs tot maxime relinquuntur, quot uirtus uitis potest commode tollerare, ut tamen non sint in loco aliquo nimis spissae, & in sarmentis relinquendis omnes summitates steriles auferantur, putantur autem à plurius tertio in tertium annum tantum, ut plures uas ferant, sed si annis singulis putentur, eas pingues uel pinguiiores producent,

cent, & longiori tempore uitem defendent, quidam autem nunquam putant uites in magnis aut ramosis arboribus cōstitutas propter nimiam difficultatem putationis earum, sed uites fortiter percutiunt, ut quę arida sunt excutiantur. Et quidam nullo modo percutiunt, sed eas suo naturali motu uiuere sinunt. Item sciendum est, quod in cuiuslibet uitis putatione tria cōsideranda sunt, scilicet fructus spes, ut tales palmites tantum relinquant, de quibus percipiendorum fructuum spes habetur, ut sunt ualde maturi, rotundi, & grossas & rotundas gemmas habentes & spissas, secundum speciem uitis illius. Item successura materiem uidelicet custodes & sarmenta in bono loco nata, ex quibus materia sequentis anni speratur, breuia ualde relinquant. Item locus qui uitē seruat, ut custodem relinquant etiā in parte infima, uel alio congruo loco, cum propter uetustatem aut deformitatem, aut nimiam longitudinem uitis indiget renouari, ut postquam sufficienter creuerit in loco custodis residuum amputetur. Item notandum est, quod si uitis mature putetur, & maturius pullulat, & plura sarmenta & maiora producat, propter retentionem humoris qui non effunditur consolidatis plagis ante cursum eius, quare totum cedit in ramorū augmentum, quod si tarde putetur, serius pullulabit, & fructus plurimos consequeris, propter effusionem superflui humoris aquosi, digestionem humoris uiscosi, ex quo fructus generatur impediens. Ideoq; uites & uineę exiles prius, pingues uero quę superfluo humore indigesto luxuriant nimium in frondes & palmites, & quę pruinis timeant serius amputentur. Item post bonā uindemiam strictius puta, propter cōsumptam uirtutē uitis, post exiguam uero largius, propter uires eiusdem, altera resumpta requie. Arbores uisferę quędam nullo modo putantur, ut quę serunt labruscas quę sunt uites siluestres, quę nunquam putari consueuerunt, uel uites domesticę quę perticus tantum a quibusdam ab aridis purgantur, quędam de tertio in tertium putentur annum, ut sunt arbuta & arbores ma-

græ, que vitas domesticas sustinent, nisi sint fructifera arbores, que auiditate fructus non putantur, utile tamē est si eis annis quibus arbores putande non reciduntur, nimia spissitudo & rami superflui amputentur.

**De vitis & vinearum & arborum
vitiferarum formatione,
Cap. XIII.**

 *Quellam vitem Columella dicit post primum annū ad unā materiam esse formandam, nec recidendam totam, sicut Italianæ consuetudo est anno secundo completo, quia vel intereant vites in totum recisæ, vel infœcunda sarmenta producant, que amputato capite velut pampinaria de duro coguntur exire, quare iuxta ipsam commissuram ucteris sarmenti ad unam uel duas gemmas inferiores capitis relinquenda sunt, quod est merito in uiticula fortiore seruandum. Nam debilis nimis uiticula secundo anno recidenda relinquitur, & sane ad adiuvandam calamis nouellā vitem uel exiguis palis, ut sequenti anno robustiores accipere possit, & tam diu recidenda est usq; ad unam uel duas gemmas, donec lata & fertilia sarmenta producat, quod cum fecerit, siquidem uitis uelut de arbutula formanda est, ad unā tantum materiam reducatur, si uero, cum pali & perticarū auxilio stare debet, in ea dua materia seruande sunt, que tante longitudinis formentur quanta desideria stipitis altitudo, ut uidelicet in exili solo breuioris scilicet unius pedis, in pingui uero & lato maioris, duorū uel trium pedum altitudinis disponatur. Anno deinde sequenti quatuor ad plus materias habere debebunt, que in partes quatuor diuidantur, deinde sequentibus annis totidem uel plures secundū doctrinam in eorumputatione traditam. Quod si uitis super arbores uel arbutia cōscendere debet, per etatem ad hoc ducenda est, donec ad ramos fuerit perducta, ibiq; incidi debet ut in eius summitate nata capita sequenti*

X anno

anno diuidantur, ſecundū diuiſionē quæ inuenitur in arborū ramis,
 deinde cōſequenter per ramos eodem modo uitis procuretur aſcē
 ſus, unam ſemper materiā ad cacumen arboris dirigendam. Formā
 tur uinee diuerſimode ſecundū uarias cōſuetudines ciuitatū & lo-
 corum, nam in quibuſdam locis formantur in ordinibus cum palis
 & perticis, aut cum ſarmentis tenſis, aut ſine aliquo auxilio, ut ali-
 bi diſtū eſt. In quibuſdam collocantur in aciebus, & tunc cum una
 pertica tantū uel duabus ſine tribus cū ſint in lato ſolo, & maxime
 in aciebus arborū in quibus uites mediātibz quibuſdam palis ſu-
 ſtentantur, aut etiam ſunt in pergularijs paruis, & tunc à parte ſti-
 pitis ſunt depreſſe, & altera diriguntur in altū quas multo iunā le-
 tamine & labore, & plurimū fructū ferunt. Ego autē pono unā per-
 ticā ſolam in parte depreſſa, & unam in parte altera bene fortem
 quæ omnes palmites ualde lōgos & ſerē ad terrā procidentes ſuſti-
 net, cum magna fertilitate uariatū. Sed unā perticā d ſtare ab alia
 facio per unū brachium ſolūmodo, & talia pergularia facio in ri-
 pis uincatū et agrorū, in quibus ſunt ſepes & arbores, ſuper quas
 ſarmenta multa & maxima pro anno ſequenti, & hoc modo paucis
 expenſis multas uuas percipio in ripis & ſepibz uiridibus, quæ alias
 niſi pro clauſura & lignis pro igne pauca ac nullius utilitatis exi-
 ſtunt. Quæ etiā uel plurimū loca exornant, in quibuſdā formantur in
 arbuſta humilima undiq; ordinata, uel in magnas arbores aciebus
 d ſt nitas de arbuſta humilima uirifera formāda ſunt, ut eis plantas
 tis poſtquā biennio uel triennio elapſo ſufficienter conualuerint, in
 ſex uel ſeptē aut octo pedum altitudine reſcindantur, ita quod in exi-
 li ſolo breuiora, in lato uero & pingui altiora formantur, ibiq; natis
 ramis anno ſequenti omnes, exceptis quatuor melioribus, amputen-
 tur, & remanentes in quatuor partes diuerſas cū perticis aut uincis
 formentur, & l gatis lapidibus ſufficientibus perpendiculariter co-
 gantur per latera extendi, ne dirigantur in altum. Qui cū ſortificati
 fuerint longitudine trium uel quatuor pedum ſinantur habere, in
 quorum

quorum capitibus erunt uites sortibus uinculis alligande. Et his modis precipue obseruatur in partibus Mediolani, sed Pergamenses faciunt stipitem magis depressum, uidelicet trium pedū, & ramos ibi natos etiam plures eleuant in altum formantes arbutulā uitiferam ad modum campane inuersæ, in cuius medio super stipite moratur, qui putat uitem & arborem, & ipsam uitem circum circa expandit, faciens palmites omnes foras undiq; stare declinēs. Magnæ uero arbores formande sunt ut in altum & depressum habeant undiq; multos truncatos ramos secundum possibilitatem uitis arbore operientis, super quorum capita ligabuntur uites, quæ postmodum omnes onuste iacent, & ad inferiora flectuntur. Possunt etiam commode formari ut uites ferant, & ipse arbores augmentum non perdant, hoc modo uidelicet cum populus, salix uel ulmus erunt sicca, crassitudine brachij circa duodecim uel quindecim pedes summitas incidatur, & rami ibidem nascentibus uitis rector permittatur in altum extolli, quantum uacat ab ea sola summitate, noluerit & similiter singulis annis alternatis ramusculi auferantur ab ea, sola summitate relicta. Ceteri uero rami infra dimissi formantur, ut in humilibus arbutis uitisferis dictum est, ad quos uites ligantur, nec inde supra condescendere permittantur. Item, ut ait Varro, ubi terra naturaliter humida est, ibi altius uitis tollenda est, eo quod in partu & alimonia non ut in calice, querit aquam, sed solem. Idcirco utiles esse puto in locis campestribus humidis pampinare uineas temporibus congruis, scilicet mense Maio et Iunio & ipsas liberare ab omnibus superfluis, & inutilibus pampinis & sarmentis, deinde maturatis serere uitis post mensem Augustum eas superfluis frondibus denudare, ut sol uniuersas uuas mungere & concoquere possit, ut uinum maturius & fortius fiat, & superflua humiditate consumpta, fiat melius duratuum, & melioris odoris.

Quo tempore uinez releuandæ sint & uites leuandæ, Caput XIII.



In cereleuandæ sunt, & uites ligandæ, antequam gemma-
nimum turgescant. Et uinez quidem quæ in ordinibus
cum palis & perticis sunt, ita ut in eis uites spissæ sunt un-
dig, distantes equaliter releuandæ sunt, ut cuilibet uiti palo affixo
eodem in medio uitis cingatur conuenienti uinculo, si uinea est de-
pressa, si uero alta in duobus cingenda est locis, prius tamen ad no-
uum palos, sex perticis aut cannis conuenienti altitudine alligatis,
ita quod una uitis sit in medio & cætera circumstantes, sic enim de-
fenduntur à casu, & uindemiantibus ad omnes uites apertius patet
accessus, deinde palmites in partes quatuor diuidantur, & fortio-
res fortioribus perticis, debiliores debilioribus alligantur. In his
uero uineis quæ rariores habent uites pali, per totum tribus distan-
tes pedibus assignantur, & eisdem cannis uel perticis ligatis super-
inducantur uites, & taliter distribuuntur quod operiant uniuersa
spacia & ligentur, & hic modus observatur in uineis multis Mara-
chie. Sed mihi non placet, ubi uero palmites uelut funes tenduntur,
cuilibet uiti circa eam tres pali parui ponuntur medio pede distan-
tes, & uinculum quoddam circa eos uelut sertum cingitur, deinde
palmites extendantur, inter uitam & uitam surcula parua ponantur
uel baculus ligetur, ne uineæ flectantur ad terram, & tam huic uineæ
quam cæteris in quibus palmites longè relinquuntur multum prode-
rit si facta prope palum ligatura extra eam, postquam iam lachry-
mas effundit, suauiter modicum torqueantur sarmenta. Nam huius-
modi tortura nascitur infra ligaturam successura materies, nec
uiuis nascentibus aliquam infert lesionem, & hic est apud Ast, &
laudatur ab omnibus, si palmites circa uitam siue perticam ad duos,
tres uel quatuor palos post uineæ fissionem satis irrationabiliter
& inepte ligantur. In his autem uineis quæ in aciebus consistunt,
si cum perticis aut sarmentis tantum suum, nota est eorum operatio.

Si uero in parvis pergularijs affixis paruis palis iunctantes, & longis tribus pedibus ex opposito remotis baculis fortibus inter utrumque palū paruum & magnū ligetur, à parte uitis depressus & ad oppositam elcuiatus, super quibus sufficiētibus perticis positis uites distribuuntur equales. Si uero in arbutis uel arboribus sunt uites nihil aliud agendum, nisi ut uites in pluribus locis ligantur ad stipites, & carū palmites per ramos & truncos equaliter distributi ligentur. Sed providendum est, omnibus annis uitem resolui ac ligari, quare refrigeratur, ut Palladius ait.

De simatione uinearum, & radicum inutilium amputatione, Caput xv.

Mense Octobri uel Nouembri, Febuario uel Martio fiunt parue foueae circa uites, & amputatis cunctis radicibus quae in summitate fiunt terrae letamen imponitur, & maxime hoc in uite nouella seruandum, ut amputentur radices superuacuae quas produxit aetate: quae si conualuerunt inferiores radices pereunt in terra, & remanet uitis in summitate suspensa, quae res eam frigori facit obnoxiam & calori, sed haec radicle non ad stipitem debet rescindi, ne aut plures inde nascantur, aut noua plaga corpori uitis impresso, in secuturo algore aut calore uratur. Recidantur autem relicto digiti spacio, & si placida hyems est, uites relinquamus apertas, cum ante hyemem hoc est factum. Si uolentia ante mensem Decembris operimus. Si praefrigida modicum columbinistercoris circa uiticulas largiamur. Sed cum alium finem ponimus paruis parū, magnis uero uitis plus apponimus. Plurimum igitur operatur in uincis letaminis ad demonstratio frequens, ad multum proferendum fructum, sed quia consuevit nimis uiliare saporem, & durabilitatem ledere: qui nobilius uinum habere cupiant, mense Augusti, ubi uinea inferior est lupinorum corbem unum in iugum ferunt, & cum ad debitū augmentū peruenierint eos eueriunt,

Et optimum sterqus præbere uineis dicuntur, uel in foueis circa uites factis ponunt, & minutatim incisum sarmentum, & pampinos operiunt.

De uineis fodiendis. Cap. xvi.

Mense Martio nouella uinea incipit puluerizari, quod tunc deinceps usq; ad Octobrem singulis mensibus agendū est, non solum propter herbas, sed ne tencra adhuc semina solidata terra confringat, sed in mense Iulio mane & uespere iam calore deposito debet effodi, & omni herba & gramine diligenter extirpato radicitus, quoniam radices plurimū obsunt. Fiant præterea sulci per illas partes in quibus aqua colligitur, ut ad extremas partes facile defluat, quæ si remanserint nouellas extinguit, & antiquas elidit. Eodem mense Martio est celebranda completarum uinearum fossio, antequam gemme minus turgescunt, quia si fossorem apertus uitis uiderit oculus cæcabitur spes magna uindemiæ. Deinde mense Maio fit secunda fossio uinearum, eo tempore quo nondum florent, uel eo quo iam florere desierunt, quia quæ florent constat non esse tangenda. In qualibet autem fossione cauendū est, ne fiat eo tempore quo terra nimis madida uel sicca est, sed cū mediæ dispositionis existit, & quāto magis terra puluerizabitur: tanto melius erit, sufficit tamen si mediocriter profunde fodiatur. Sit autem studium, ut uniuersa terra fodiatur equaliter, ut nihil in ea crudi soli remaneat, maxime circa uitem, quā rem uirga (in qua sit altitudinis pastini modus designatus) diligens custos in multis locis exploret. Nam hæc cautela dolosos fossores ab hac negligentiâ submouebit.

De nocumentis quæ uitis accidunt,

Caput xvii.

Accidunt nocumenta in primo anno plantatis uitis ut pereant, uel semine remaneant, quod quidē quandoq; fit propter herbas circa eas nascentes, quarum radices eis

nutrimentum

nutrimentū surripiunt, quod si accidit frequenti fossione et herbarum incisione iuuantur: aliquando uicinis arborum uel sepium umbris, tunc aut amputandæ sunt, aut frondibus denudandæ. Sepe etiam ex nimio solis ardore deficiunt, quo casu, aut obumbratione, aut operimento terre circa eas iuuandæ sunt, ne omnino siccentur, ut aquæ conuenientis exhibitione lesionem evitant. Accidit etiā quandoq; nocumentum uitis ex uicinitate quarundam plantarum, sicut caulis, corilli, & lauri, compertum est enim hæc adarere uitem, ideoq; in uineis plantari non debent. Quandoq; patiuntur animalium corrosione, quæ plurimum ledunt eas & corositant. Ideoq; si paucae sunt uites spinis congruis muniantur, si plures fossat & cingantur & sepiibus, quandoq; uites in hyeme gelu pereunt, quare rescindendæ sunt iuxta terram, & in talibus locis in putatione curandum est, ut nunquam stipes erigatur aliquid super terram, & cum approximat hyems uites putantur, non ut curtatis fragulis & omnibus simul. In quibusdā locis cum iunco ligatis iuxta terram siccantur, & supra capita ipsorum ne surgant aliquid terræ ponatur, deinde post hyemem deducto ligamine releuentur. Aliquando autem frigus non totum perimit uitem, sed solum novos palmites, qui propter ligni tenebritudinem & medullæ magnitudinem se defendere nequeunt, quod cū acciderit sursum in loco idoneo palmitibus procreandis aut eāmodico de palmitibus relicto, si aliquid uiriditatis ibidem habuerint, rescindatur, sic enim quasi renouabitur & formabitur uitis, & forsitan eodem anno aliquem fructum feret. Accidit etiam plurimū, ut postquam palmites & uuas protulerint priuim uiridatem omnem amittant, quare in talibus locis talia generauitum plantanda sunt, quæ tarde uirescant, ut sunt albana gargaunica, & maiolus plurimum. Aliquando aineas inuadunt rugæ, quæ omnē uiriditatē corroduunt, & uetices uirides & aseri parui qui latissimi uocantur Bononæ, qui natos cū uitis palmites deuorant & deficcant, contra quæ subueniendū est, ut per manus mulierū et hominū colligantur

colligantur, & pedibus conculcentur, uel igne crementur. Accidit etiā sepiſſime, ut tempore caloris deſcendat cū ſeruenti ſole parua pluua uenenofa & aduſta, que uulgariter apud Bononienscs melumen uocatur, que multa genera uitū adeo ledit, ut earū fructū in nihilū omnino reducat, ideoq; ubi hoc frequenter accidit, ea plantentur genera uitū, que modicā aut nihil leduntur ab eo, ut eſt malixia & albana et grilla, & quedam alia genera nota. Tempeſtas etiam ſepe uineas omnino conſumit, contra quā nihil omnino uale re poteſt, niſi forſan pia oratio apud deum, mundo corde directa. Licet quidam tam mores quam ſcemine ignorantes naturam & generationem grandinum, imprudenter aut fallaciter afferant contra grandines & fulgur quedā fieri poſſe. Accidit etiam quandoq; quod uitis ligone ledatur, & tunc quidē uitis ſtriſſe ligetur in plaſta, & ea circumſoſſa ouinum uel caprinum admiſceatur cum terra letamen. Accidit præterea ſepe, quod uitis tot pampinos proſert, quod eos & uuas ad debitum producere nequit augmentū, in quibus menſe Maio conſideranda ſunt ſarmenta, que nouella uel uetus uitis protulit, & ei pauca & ſolida relinquamus, & in nouellis adminiculis firmamus, donec brachia firmata dureſcant, ne amplius reſectæ & pullulanti niticula quā duas uel tres materias relinquamus & propter uentorum iniuriā alligentur, ſi relinquantur in primordio pauciores, hoc menſe pampinari conueniet. Sed tum eſt pampinatio neceſſaria cum teneri rami digitis ſtringentibus crepabunt ſine difficultate carpentis: hæc res uuas efficit pinguiores, ſuccurram materiam corroborat, & fructuum utilitati conſulit ſole admiſſo. Accidit præterea uitis ſepe tanta debilitas, ut miſera nimis ſarmenta & uuas producant, quibus ſimo & frequenti ſoſſione, & ſtriſſa putatione ſubueniendum eſt. Quedam autem adeo læta & pingues ſunt, quod magnitudine pampinorum uineas claudant, & ſe uicinasq; uites quaſi ſuffocant, nec fructum ſuum maturati permittunt, quibus ſubuenire oportet larga putatione, rara ſoſſione

foſſione, ſini priuatione, & palmitum & pampinorum amputatione, tempore mali, & frondium ſpoliatione in locis frigidis, & præcipue cui uinæ putreſcunt, pampinentur per latera triginta diebus ante uindemias, & frons illa ſola ſeruanda eſt, quæ in ſummitate poſita ſolem nimium defendit in uertice, & ſi quæ in terra iaceant ſuſum ſine reuolutione ſuauiſſe releuentur. In locis autem ardentibus & ſiccis obumbratur uinæ, ne ſi ſolis aſceſcat. Si modo uinæ breuitas aut facultas permittit operatorum. In quibusdam etiam locis nimium hominum & canum patiuntur inſidias, quas diligenter die noctuq; maturitatis tempore cuſtodiri oportet, & in eis plari debent ea genera quæ non ſunt delectabilia, ſed auſtera ad eadendum, ut gniſ aſteſta & gmaronus, quæ non de facili tanguntur ab aliquo, & nobile tamen & ſeruabile uinum faciunt. Aſturnis præterea ſæpe plurimum inſeſtantur, quod cum accidit fumibus & ſignis terribilibus per uineas appenſis & perſonis gridantibus & eos terrentibus expellantur, quod ſi tanta eſt ipſorum inuaſio, quod prædictis modis defendi non poteſt, fiat in medio uinæ ſuper quas uxor collinis locus eminens ſuper quo puer aliquis maneat, trahatq; & moueat funes ab alijs capitibus ad longos palos circa uinæ ligatos cum cucurbitis & paruis baculis circa eas cum in alia parte uiderit oportuum, ut in ciuitate Clogia ab omnibus obſeruatur.

De conuerſatione uuarum recentium & ſiccarum, Cap. xviii.



Vas quas ſeruare uolumus legamus illeſas, nec acerbitate rigidas, nec maturitate defluentes, ſed quibus eſt granaſſima luce penetrabile & ſplendidum, & tactus cum molli iocunditate calloſus, ſi qua ſunt uitioſa reſecemus, nec patiamur intereſſe quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æſtû caloris induruit, tunc inſeſ botrionum tenaces calida pice amari oportet, atq; ita in loco ſicco frigido & obſcuro ſine luminis irruptione ſuſpendi. licet aliter extracto pane de furno non nimis

Y calido

calido, ponatur in eo pakea, & super eam uuae, ibiq; per horam secundum quod tibi melius uidebitur dimitte, donec aliquantulum fiant passae, uel ponantur super aside, uel aliqua craticula in furno, & postquam inde fuerint extractae submergantur in musto dulcissimo, & ponantur ad solem donec aliquantulum sint siccæ seu aliquantulum mustæ & guttate, ponantur in uase ueluti in lagenâ uel sacco. Item aliter, uuas sale decoctas pone in musto feruenti ad ignem modice dimittendo, & pone ad solem iterum, & sunt optime. Item uuae sanctissimæ & aliquantulum ad solem passæ seruantur in sabulo siccato ad solem. Item in paleis uel feno substratis. Item in folijs uitis siccatis. Item in melle. Cato aut uuam in ollis commodissime condi, & in sapa & in musto. Recte uuam passam græcam sic facias, meliores & dulces botriones in ipsa uite torquebis, & patiaris sponte mediocriter siccari, deinde sublato in umbra suspendis, & uuam districtam componis, & cum uas impleueris desuper pampinos addes, & operculabis, ac statues in loco frigido, sicco, quem nullus simus infestet. Salernitani autem uuam passam hoc modo faciunt, eligunt enim meliora grana uuarum, & ad solem desiccant, deinde in furnum modicum ponunt cum uinis dulcibus, deinde abluunt, & super aspergunt puluerem cinamoni, & ligant in folijs fici, & seruant per annum. Hæc uirtutem habet lauandi, & decocta in uino, & ipsum uinum ualet contra frigidam tussim. Fit etiam uua passa optime hoc modo, torqueatur in uite, & sic torta per tres uel quatuor pendeat dies, deinde collecto quolibet botrione cum manu uel tenacula in musto dulci feruenti ponatur, & ibi tantum teneatur, ut bis potest dici saluatio beate uirginis, deinde siccetur ad solem, sic alidissimus est, & in furno pane extracto, caue tamen ne pluuijs aut rore tangatur, deinde refrigerrata in aliquo mundo uase ponatur, & optime compressa desuper ponderetur. Quidam autem ex ea exiccata ad solem iterum in musto dulci feruenti obtrunt, & exiccant aliquantulum & componunt.

nunt. Sed ad hæc omnia commodè fieri possunt de uuis recentibus sine tortura racemi omnibus alijs obseruatis, quæ dixi, dum tamen scias quod difficilime siccare possunt ad solem in regionibus temperatis. Item Græcis docentibus si uua uel poma in uite uel arbore diu seruare uolueris uasculis clausa fictilibus conseruabis, uel diligenter à summo tecto suspende poma gipso cooperta in longam seruabis etatem.

De uirtute uuarum, Cap. XIX.



Va in duo diuiditur secundum Isaac, est enim acerba et matura, acerba est frigida in tertio gradu, sicca in secundo, hæc tres habet substantias in se diuersas, scilicet grana, corticem et succum. Granorum natura sicca est et dura, et nullius conuersionis in corpore, sed integra egreditur, sed farina ex eis pistatis facta et bibita confortat, et cholicam egestionem stringit, maxime si assentur. Cortex grossus est, nec conuertitur. Et ideo non nutrit, confortatiuus est stomachi, et epatis calorem extinguit, sitim auferit, acumen calide et rubeæ cholera mitigat, vomitum et egestionem cholicam stringit, oculis appositus palpebrarum grossos humores attenuat et exiccat. Itæ ualet ad pruriginem oculorum et asperitatem. Succus uero uuæ acerbæ ante dies caniculares ad solē poni deoet, ut siccetur et spissetur, ut mel, hic ualet humori- bus ad gulā descendentibus et ginguinis et articulis. Si clystere facias ualet uulneribus intestinorum, et diuturnis humoribus in uulua descendentibus. Uua matura quæ est in sua completa dulcedine, sanguinem laudabilem facit, et ceteris fructibus quemadmodū ficus melior cibus, plus tamen ficus quam uua nutrit. Testatur autem hoc quia quidam suis temporibus eis solis utuntur, unde pingues fiunt, et clarent eorum cutes, desistentes uero ab eorum esu facile macrescunt. Eius ossa sunt frigida et sicca, granis acerbæ uuæ uicina, habent tamen acumen quoddā propter quod cito exeunt ante conuersionem. Item cortex eius frigidus et succus, et ad digerendum

durus, & si cum cortice & ossibus edatur indurat egestionem &
 insufflationem & uentositatem generat, & humores longinquos à
 sanguine laudabili. Si comedantur in hora qua de uite accipiuntur,
 si quidem inueniat stomachum malis humoribus & cibis uacuum,
 & fortis sit digerere, digeruntur & in laudabilem sanguinem con
 uertuntur, & uentris adiuvant solutionem, corpusq; à malis para
 gant humoribus: e contra si stomachum inueniant malis humoribus
 uel cibis plenum, & digerere sit imbecillis, in eo morantur & infla
 tionem generant & rugitum, & in humores malos cōuertuntur, &
 fumum noxium plurimū creant. Appense & ab humoribus super
 suis desiccata ceteris uinis sunt laudabiliore, & subtilibus dictis
 conuenientes, ab inflatione longe sunt & fumositate, nec stiptice
 sunt nec solubiles, in mustum misse uel sappam grossæ dictæ sunt,
 & stomacho nimis conuenientes, uentositatem & inflationē pro
 ducunt, propter extraneos humores ex sapa uel musto assumptos,
 uinæ multum carnis habentes nutritiliores & duriores existunt,
 quam hæc quæ plus humoris quàm carnis habent. Item uina cuius sa
 por est dulcis & grossus mellig; uicinus calidior est, situmq; gene
 rat, & grossioris est nutrimenti, & ad digerendum durior, inflati
 onem faciens ac rugitum, & opilationem splenis ac epatis. Et uina
 cuius sapor est subtilis aquosus, frigidior est & digeri leuior sto
 macho, cōfortatiua & mundificatiua à cholericis humoribus, sitis
 mitigatiua, & conueniens complexionibus temperatis. Et uina cui
 us sapor est mediū inter predictas est leuis nutritiua, & mediæ
 potentie. Alba uina clara & aquosa facile digeritur & leuiter nu
 trit, uenas cito permeat, & urinam prouocat. Nigra grossa est, di
 geri dura, sed confortatiua stomachi, & si bene digeratur nutrim
 entum bonum præstat. Ruffa uel citrina est media prædictorum.
 Passa sicca est ad comparationem utridis, & ex ea quedam est dul
 cis, quæ calidior est & humidior, maxime si nigra sit, hæc ualet ad
 dolorem pectoris & pulmonis, & tussim mitigat, quæ uero acerbis
 tatem

tatē habet minus nutrit & frigidior est & siccior est dulci, ideoq;
stomachum confortat, calorem extinguit, & ventrem constipat.

De apparatu uindemiæ, Cap. xx.

Appropinquante uindemiarum tempore preparande &
aptande sunt tinæ in his locis, in quibus moris est uinum
cum suis racemis & arillis bullire, in alijs uero torculara
ria. Item corbes, cophini, cista, & cetera instrumenta & uasa quæ
uiniq; necessaria & oportuna sunt, secundum uarias & diuersas
consuetudines locorum, & omnia uasa necessaria optime molliſi-
canda & lauanda sunt, iunci ueteres seruati quærēdi sunt, quia me-
liores durabilioreſq; sunt nouis, qui adhuc seminatiuri exiſtunt.

De tempore uindemiæ, Cap. xxi.

Vtile est agnoscere quando uindemandum ſit. Nam qui-
dam antequam uua maturētur uindemiant, & ideo ſubtile
& infirmum, non permanens faciunt uinum. Alij uero
tardius uindemiantes, non ſolum uineas ledunt reſolutis iam uiri-
bus eius, ſed etiam tale uinum paſſibilis & minus durable faci-
unt. Cognoscitur ergo tempus uindemiæ guſtu & uifu. Aiunt enim
Demetrius & Africanus ſex ſolum dies habere uuam, & non plu-
res permanere maturam, ſi enim granum uuæ iam nō uiride ſit, ſed
in ea nigredine uel alio colore, in quo tandem eſſe debet ſecundum
naturam generis illius uua, ſignificat eam eſſe maturam. Quidam
autem exprimunt uuam, & ſi quidem affluxerit granū uuæ nudum,
non continens carnē, maturas eſſe ad uindemiam approbat uuas,
ſi uero effluxerit granum cum parte carniū eas non eſſe maturas
dicunt. Quidam autem ex quo incipiunt paſſe fieri maturas concia-
nunt uuas. Alij uero probant ita, ex uno denſiſſimo botro unam au-
ferunt uuam, poſt unum uel ſecundum diem conſiderant, ſi manet in
eadem forma locus acini, & ſi circumſtantes nullam recipiunt au-
gmentationem, uindemiare feſtinant, ſi uero acini locum minorem

factum considerant, quasi his que de circuitu sunt acinis adiunctis, differunt uindemiam donec augmentatione procedit. Palladius autem ait, maturitatem cognosci si expressa uue grana que in acinis celantur sint fusca, & aliqua propè modū nigra, quibus indicatur maturitas naturalis. Oportet ergo uindemiare & maxime luna existente in cancro, leone & scorpione uel aquario, ea uero finiente & subterranea existente festinare oportet uindemiam facere, ut Burgundias ait. Et in summa, sciendum est, quod si uue nimis pingues per latera frondibus denudentur, uinūq; ex eis fiet, minus erit aquosum sed potentius & melius duraturum. Si uue colliguntur post tertiam, rore consumpto, aëre calido & sereno, uinū erit potentius & melius duraturum: contraria uero contrarium operantur, uue nimis mature faciunt dulcius, sed minus potens minusq; durabile. Uue nimis acerbe faciunt uinum acerbius, mediocres faciunt uinum potens & melius duraturum. Uue in augmento lune collectę uinum minus seruabile faciunt, in decrescendo magis. Si uue nigre ad bullendum ponantur in fundo tinae, uinum erit rubicundius, si mature maturius, si acerbe acerbius, si melius dulcius, si salua saluatū, & generaliter saporem & uirtutem acquirit eius, quod in eo loco ponatur, si diebus congruis simul ebullierint. Si uue collectę quibusdam diebus in acervo steterint, uinum maturius erit. Si mustum in dolij sine grassis ebulliat bonum & durabile erit, sed tardus clarificabitur, quā si cum eis ebulliat.

Qualiter uindemiandum sit, Cap. xxii.



Vi portant cophinos maiores uel corbes, & qui in cistis uuas colligunt eligant folia, & si quis acerbis aut putridus uel siccus inueniatur botrus auferatur. Oportet autem ut calcantes uuas si quid oblitisunt, qui præsunt cophinus aut corbis ipsa eligere folia, ipsa enim contrita cum uuis auferuntur magis faciunt uinum, & maximum nocumentum fit uino.

Quali

Qualiter debent uux calcari, & ex eis uinum fieri possit, Caput XXIII.

Lamissas torculari uuas statim exprimi oportet pedib. ab his qui ad hoc sunt deputati, et cum omnes uuas equaliter calcauerint, sursum racemos & grana elcuent, & attrahant ut multum humoris sub torculari defluat, & cum secundo calcauerint, & in altum racemos erexerint & molles ac calidos & non ualde humidos eos fecerint, sic sub ligno & prelo eos supponant. Calidi enim & molles existentes faciles fluxibiles fiunt, si uero humidi ualde disponantur, necesse est granum superpositum scindi eorum compositionem. Intrantes autem in torculari oportet ualde pedibus esse mundos, & non sepe exire & intrare nudis pedibus: & esset bonum quod in eis non comedant nec bibant, & quod sint uestiti & cincti propter sudores superuenientes. In quibusdam autem partibus, ut Dononie calcantur ad uincam in corbibus, sicut mediocriter possunt & calcate posite super curribus in uasis portantur ad tinas, in quibus eas stare ad seruendum permittit per octo dies & ultra, & usq; ad 15. uel 20. ex quo multum purificatur uinum, sed sapore racemorum inficitur. Ideoq; melius est, quod super tinam ponatur cratis uel instrumentum ex assidibus perforatum ad hoc dispositum, super quod stet unus calcator, qui calcando perficiat, quod in corbe complere non poterat, & cum bene calcauerit omnes racemos cum pedibus per unam partem in tinam emittat, in quam tantum bulliat quod purificatum sit, & racemi super liquorē eleuati ab eo diuisi, quod in paucis cuenit diebus, quo facto reponatur in uasibus: & in tinis aquae ponatur parum uel multum, secundum quod nobiliores & potentiores aut melioris uuae fuerint, & secundum quod hoc uinum mixtum melius uel peius optatur. Sciendum tamen quod quanto melius uuae calcantur, tanto minus & deterius fiat mustum, sed de pluro plus habebit, si uero male calcate fuerint, e contra erit, secundum istum modum uinum purificabitur, & sciendum

Et sciendum durabile fiet, nec uitiabitur racemorum sapore. Est autem sciendum, quasdam species esse uuarum adeo racemos suos austeros habentes, quod cum eis bullire plurimum non potest, sine detrimento sui, quasdam uero adeo modicum austeros habentes, quod cum eis bullire plurimum posset. Notandum est etiam, quod quanto uuae pinguiore & aquosiores sunt, tanto magis cum racemis bullire debent minus, & quanto nobiliores & sicciores fuerint, tanto magis in eis stare opertum. Item sciendum est, quod postquam uuae collectae & in accruum posite sunt, si duobus uel tribus diebus sic steterint, ualde ipsarum & uini augetur maturitas & dulcedo, ideoque uile est in uincis habere bitumen in quo ponantur, ubi diu stare poterunt, & extra in tina parua ex bitumine facta colligi maturum uinum quod inde liquabit, quod ualde suauis & delectabile erit, non tamen in aestate facile poterit conseruari. Sciendum est etiam, quod omne uinum quod cum racemis & corticibus uuarum non feruet est album, quod uero cum eis feruet tingetur ab eis, & corticis colorem nigrum uel album, aut aurcum aut rubcum acquirit.

De his quae ex uuis fieri possunt,

Caput xxiiii.

LX uuis fieri possunt agresta, passum, defrutū, sapa, uinū, & acetum, de quibus omnibus dicendum est, qualiter fiant & conseruentur, de natura & uirtutem quam habent in corporibus humanis.

De agresto, passio, & defruto coroēno & sapa.

Agresta fit duplex, liquida & sicca. Agresta liquida fit hoc modo, cum uuae adhuc sunt acerbae, scilicet ad acbitum peruenierint augmentum colliguntur & pistantur, & in mastellum uel aliud uas ponuntur ad solem, & in eis aliquid de sale ponetur, & postquam duobus uel tribus diebus ad solem steterint, accipitur succus, & repositus usui conseruatur, & quodam de sale

sale non ponunt, sed cum eo melius conuersatur, & maxime si ex talibus uinis factum fuerit, quarum uinum in estate sanum seruari potest. Agrestia uero sicca sic facienda est, accipe uinas acerbissimas & pista & exprime, & pone in uase extenso, & soli oppone donec sicceatur, & serua. Et quidam ponunt ad siccandū in sole absq; decoctione aliqua, si sol calidus adest, quidam etiam agrestiam faciunt ex uinis aliquid dulcedinis percipientibus, sed prior stiptior & frigidior est. Potes tertio modo facere agrestiam sspissam, ut & mel, & est plurimū uirtuosum aut supra dictū est de uirtutibus uinarū passarum. Vniuersa Africa pingue ac iocundum passum sic consecere cōsuevit: leguntur uinæ passæ quam plurimæ, & in fascellis ex iunco factis aliquatenus contextis uirgis posite fortiter uerberantur, deinde ubi uinarum corpus ius concussionis exoluerit, exprimitur. hinc passum est quicquid effluxerit, & conditum uasculo melalis more seruatur defrutum. Coroënum & sapa fiunt ex misto. Nam defrutum à deferuendo dictum est, ubi ad spissitudinem fortiter distumat. Coroënum cum tertia parte perditā, duæ partes remanserint. Sapa ubi ad tertiam redacta descendit, quam melioram simul faciunt citonia cocta.

De purgatione uini facti ex uinis acer

bis & corruptis,

Cap. XXV.



Portet omnes uinas acerbæ uel qualitercunq; corruptas sperare à reliquis, & quod ex ipsis est mustum, ita est curandum aquæ pluuiæ usq; ad dimidium est coquenda & ex hac aqua decocta quanta est musti decima pars superinfundit uino, rursus autem cum uino decoquant consumatur in decoctione decima pars. Quidam autem non faciunt ita, sed ipsis uinis immittunt aquam commiscentes ad futurum mustum tertiam partem post calcantes uinas mustum coquunt, ut consumatur tertia pars.

Z

De cu

De curatione uini à pluuiâ agitati,

Caput XXVI.



Si pluuiialibus imbribus multum superuenientibus uine adhuc in uinea existēt et uel post undecimiam amplius quā oportet madefiant ex necessitate ipsas calcabimus. Si aut undecimiatum multum imbecillius esse didiceris, docebit autē te hoc gustus, cum uinum in dolijs nutritur post primam ebullitionem confectum transferantur in alia dolia, manet etiam in fundo omne luto sum propter grauedinem. Quidam autem melius faciunt, uinum coquunt donec uicesima pars eius consumatur, immittebant gipsum uicesimam partem. Laudari uero eo usq; ad ignem uinum decoquit, quousq; quinta pars eius consumatur, & eo post eam consumptum utuntur.

Qualiter uinum mittendum sit in dolia, Caput XXVII.



Dolia, antequam immittatur mustum, aqua salsa pura spōgia ablui oportet, & incenso fumigare, oportet aut neq; nimis facere ea plena, neq; nimis deficientia, sed opinari oportet quousq; uinum bulliens augmentationē faciat, ut nō supra effundatur, conficere postea oportet quod in dolijs est mustū per quinque dies. & manibus et cyphis spuma, & si aliquid superfluum fuerit auferre, & expurgationes omnes à cella educere, & longius projicere, si enim prope manserint canopes inde generantur, & malus inde exit odor, quæ ambo uinum euerti faciunt, idcirco bonam odorem in torcularibus & maxime in apothecis esse oportet.

Qualiter mustum per totum annū haberi possit, Cap. XXVIII.



Nequam calcantur botri, quod ex uuis stillat mustū presmonem quidam uocant, mitte eodem die in uas pice perlinitum interius & exterius ut semiplenum sit uas, & obstruc diligenter gipso, multo enim tempore permanet mustum ualde dulce

de dulce. Multo magis seruabitur, si uase percluso corio in puteum uas immititur, quia non super ebulliens semper erit mustum. Si quis autem paulatim conculcauerit uas, & non comprimat fortiter, et hoc mustum utile ad permanētiam habebit, ut Burgundus ait: atq; hoc per experientiam optime usum est. Alij uas ut dictum est interius & exterius pice perunctū in puteū ponunt, at labia sola super emicent. Et hoc per experientiam optime usum est. Alij in arenam humidam uas infodunt.

De cognitione si mustum uel uinum
habeat aquam, & qualiter sepa-
rabitur ab ea, Cap. XXIX.



VT cognoscamus an uinum uel mustum habeat aquam, pira cruda, uel secundum quosdam mora mitti in mustū debent si aquam habet mergentur, sin autem supernatabūt aquam non habet. Quidam cannam græcam que nascitur in aquis uel linum uel papirum uel focum uel aliquid aridum ungūt oleo, & in uinum mittunt & extrahunt, si aquam habet congregabūtur gutte in oleo, & quanto plus de aqua habuerit, tanto magis erit guttarum aque congregatio. Alij simplicius facientes uinum emittunt in ollam nouam nondum infusam, & appendunt ollam duobus diebus, stillat enim olla aqua mixta. Quidam in calcem uinū supra effundūt, & si quidē aquā habet, diffundat uinū calcem, si aut parum est depressabit eā. Alij uero in fruxorio habent oleum feruens & superinfundūt uinū, & si aquam habet sonabit, & amplius faciens resiliet, quidam uero spongiā nouam oleo ungentes, ea obstruūt os uasis & eueritūt, si aquā habet funditur in spōgiā eadem probatione & in oleo uiuantur. Alij de musto sibi modicū in manu mittunt, & fricant, si purū est uiscosum est & adheret, si aquam nō habet non adheret. Aqua hoc modo separabitur a uino, albumē humidū mitte in testā uini, deinde spōgia uncta oleo obstrue os teste uel alterius uasis, et inclinās sone effundi, et effluit solū aqua.

Vt mustum cito expurgetur, Cap. xxx.

In metreta dulcis musti cotilam aceti mitte, & post tres dies erit purum.

Qualiter uinum non semper ebulliat,
Caput xxxi.

Coronam pulegij uel nepaticæ uel origano collo uasorum circumpone, ut ait Burgundus. Quidam autem in uiciora doliorum circa labia perungunt iacte uaccino, detinebit enim intus bulliens mustum, ut dicunt.

Quo loco debeat stare uinum ut duret,
Caput xxxii.

Cellam uinariam septentrioni habere debemus oppositam, frigidam, obscuram, uel obscuro proximam, longe ab aleuticis stabulis, furno, sterquilinis, cisternis, aquis, & ceteris odoribus horrendis. In libro tamen uindemia à Burgundio edito dictum est, quod fortius uinum sub diuo ponendum est, auertat tamen occasum & meridiem parietibus quibusdam apposis, relictis qua autem uina sub tecto ponenda sunt, fenestras autem excelsiores oportet facere ad aquilonem & orientem uersus.

De transuafatione uini, & apertione doliorum,
Caput xxxiii.

Conuenit uinum transuafare in borealibus uentis, ne quæquam in australi, & imbecilliora quidem in uere, fortiora autem in æstate, uina quæ sunt in aridis locis post solstitium brumale. Cum autem transuafatur uinum in luna plena sit acetum. Scire oportet, quod cum uinam separatur subtilius & imbecillius fit. Affirmant expertissimi uiri, quod si circa festum omnium sanctorum, cum uinum ebullire cessauerit, & sex ad fundum descendere, ipsum remoueat à fece grossa, faciet in hyeme matrem subtilem, cum qua melius cõseruabitur, & post hyemem facilius clarificabitur.

rificabitur tempore ueris. Item dicunt, quod si uinum diu cum fece
 moretur, adueniente calore ei adeo incorporabitur, quod eius sa-
 pore inficietur, & non poterit aliquibus clarificari modis, nisi con-
 quatur usq; ad principium ebullitionis, lento igne & claro, & in
 nase mundo ponatur cum salvia bona, habente in fundo duos bacu-
 los uel unam tegulam mundam inuersam & mantellu de grosso papi-
 no, uel ponatur in tina munda, & in idem uas postea educatur mo-
 do predicto. Prouidendum quidē est ut in hyeme quidem calefiat,
 estate uero infrigidet. Oportet autē transuassare uinum, cum luna
 minuitur & sub terra est. Oportet etiam cum à dolijs in parua uasa
 transmittamus uinum obseruare ortus stellarum, & maxime in flore
 rosarum & florescente uinea mouetur eius sex in occasibus stellarum.
 Consulant autem sapientes cum aperitur dolium, uinum quod
 est in principio dolij, & quod est circa fundum consumetur, medi-
 um autem uinum seruetur quod fortius est & permanentius & ad
 ueterationē aptius, uinum enim quod est prope os dolij ac aëri ad-
 haerens est imbecille, quia euaporat quod autem est satis profun-
 dum seu appropinquans feci, cito uertitur. Oportet autem trans-
 mutatum uinum in testis uel alijs uasculis nō usq; ad labra testiarum
 immitti, sed usq; parum de orsum sub collo ut non suffocetur, sed res-
 pirationem habeat, si de acetositate non timetur sed si de ea timea-
 tur, quasi nihil resspiret, & fiat uentilogus de saice uridi à cortice
 munda. Item bonum est quod iuxta spinam ficariam, sit una pare-
 ua spinella, per quam subtrahitur parum de uino temporibus calidis
 & uentosis, nam per ipsam egredietur aliquid de fece cum uino,
 & ipsum clarificabitur parum melius. Item oportet aperientem
 dolia seruare ortum astrorum, quia tunc uini sit motus, & nō opor-
 tet uinum rimare. Et si quidem uinum in die aperies oportet inten-
 dere soli, ut non eius claritas incidat uino, si autem in nocte neces-
 sitate multatiens prouocante dolium aperies, superintendere opor-
 tet lumen lune. Item oportet euacuata dolia cōfestim abluerē aqua

salsa, uel cinere, uel argillosa terra siccari, si uinum est debile, sed si ualde potens est solummodo bene claudatur undiq; , quia odor & potentia eius tuetur uasa.

De tempore & modo gustandi uinum, Caput XXXIIII.



Vidam borealibus existentibus uentis gustant uinum multabilia & sincera sunt tunc uina. Alij uero experti cognitiones uini, australi uento flante gustant uinum. Australis enim uentus magis uinum commouet, & redarguit quale est. Ictuum autem existentem non oportet gustare uinum, obtunditur enim gustus, nec post ultimam potationem & comestione, ut Burgundius scribit. Sed ex consuetudine & non uises icuano stomacho sentia per gustat uina. Item oportet gustant uinum neq; amarum escam, nec salsum, neq; aliquam quæ gustum corrumpit, comedere sed paucam comedere & bene digerere. Quidam uolentes & reuocare emptores, testam nouam habent, quam persundunt optimo uino ueteri & bene redolenti, & in ea ponunt uinum quod uedere uolunt, Malitiosi autem quidam attribuunt nuces & caseum gustare uolentibus uinum, ut comedant, ut certissimus falsificetur gustus. Hec autem dicimus, non ut faciamus, sed ne decipiamur. Oportet etiam emptorem sepe gustare uinum nouum & uetus, ne obliuiscatur quid effugere debeat.

De signis cognoscendi uinum durable, Caput XXXV.



Immiso uino in dolia, per quoddam tempus transuandandum est in aliud uas quiescibiliter: in prioriuase relinquenda est ipsa sex, & diligenter uas includatur, demum intuentum est multotiens odor antes, ne aliqua transmutatio fiat circa fecem gignentes cenopes uel sangum album, quem facit subius butem, uel magis aliquid talium extimandum est uinum esse corruptum, si nihil tale generatur, credendum est uinum permanens esse.

Quidam

Quidam aut calamus integrum perforantes immittunt usque ad fundum super feces, et precludentes calami superioris foramen magno digito, postea auferentes digitum per orificium attrahunt inferioris odorem, deinde exuentes attrahunt fecis partem ad qualitatem, et secundum qualitatem fecis futurum vinum reliquum esse credunt. Oportet autem ex medio vase futurum vinum esse opinantes, quidam uero partem uini bibentes infrigidant ac gustant, et quaecumque inuenitur in gustu tale futurum vinum reliquum esse credunt. Oportet autem ex medio vase gustum facere. Alij uero ex tegmine uasorum signum accipiunt, discooperto enim vase, quod est in tegmine gustatur, si quidem uinosum est optimum est uinum, si uero aquosum non. Alij autem ex ipso gustu, si à principio austri fuerit signum certum, si autem molle contrarium.

De nocuentis quæ uino accidunt,

Caput XXXVI.



Accidit uino propter aquosum corruptibile in uita, uel postea sibi admixtum, ut corrumpetur, et uertatur propter varias causas extraneo calore in ipsa agente, quod si sex uel modicum talis uini eodem dolio extracto relinquatur in uase, nec aperiat vas, conuertitur in muffam quæ uas inficit, deinde quodlibet uinum in eo positum consequenter corrumpitur. Et si ex uino in sanum dolium uel aliud uinum miscetur aliquid seu imponitur ipsam inficit, et in suam corruptam naturam conuertit. Item uinum forte et potens et præcipue dulce, grossum si tempore calido dimittatur in uase, non plenum, nec desuper clauso, euaporat calidum et humidum uini, remanet frigidum et siccum, quod in acetosum conuertitur, de quorum omnium cura dicendum est.

Quibus temporibus uinum facilius uersetur & corrumpitur, Cap. XXXVII.

Omne uinum sæpius uertitur circa uergiliarum occasum, et circa solstitium æstiuale, et circa canis æstium, quod uulgariter canis uocatur, et generaliter circa omnes uentos annuales, et in æstiu
et in

Et in gelu, Et in largis imbris, uel propter uolentem uentum aut terremotum, uel propter durum tonitruum, uel quando florescunt rose uel uinee, ut Burgundus ait.

Qualiter possit prouideri ne uinum uersetur,

Caput XXXVIII.



Ales usti in uinum inani si id uerti Et ultra quam oportet bullire Et spumam ampliore fieri prohibent. Amygdala dulcia nigris uinis immixta permanens illud seruant, uua passa ablatis granis Et cum arena immissa musto uel uino comesto pingue Et permanens illud facit. Quidam uuam siccam in uinea natam eligunt, Et singulariter utuntur, gypsum immixtum in primordio austerum uinum facit, tempore uero procedente austeritatem euaporat, utilitas autem gypsi multo tempore permanet, Et per manentiam uini facit, Et uerti non sinit uinum. Et eius quidem proportio est, ut si uinum sit lentum Et sapore humectum, aut pluuia agitatum, centesima pars gypsi sufficiet. Quod si uinum nascitur uirtute solidas medietas abunde sufficiet. Foenum graecum si teratur cum sale usto Et cum uino, misceantur uina quae uertuntur à sua mala fece separata, Et in fecem boni uini immissa permanetia erunt, quidam autem tadas accendentes in musto extinguunt, Et non sinunt uinum euerri, quidam cedri fructum ustum miscent, Et gallas uistas miscentes uino permanens hoc faciunt. Alij cineres ex sarmento uineae combustos, Et semine feniculi terentes Et in massam redigentes miscent cum uino. Quidam uasa quibus utuntur in alia uasa Et in aliam domum transferunt, si enim ex calore sint lesa in refrigerantia loca ea reducunt, si autem ab humore Et frigiditate in calidis locis Et siccis transponunt. Alij uero semen lini, uel lignum querci combustum cinerem immittunt uino. Alij lac Et mel miscentes, ut ualde sint leuia immittunt musto. Argilla post ebullitionem uini immissa expurgat deorsum secum deferens turbulentum ad fecem, magis autem si uista fuerit, Et bene redolens uinum facit Et dulce, repulsa enim

hyme eam comedentia niunt, dulcorat enim argilla uinum & permanens facit. Vinū coctū usq; ad tertiā partem immixtum musto permanens illud facit. Elleborū nigrum & albū paucū immixtum expurgat uinū & permanens facit, frumenti farina permanentia uina facit. Resina pini detinet uina. Alumen scissum stiptica uina facit, & acuentia uel acida sedat. Confectio mirabilis ad uinū seruandū quæ uocatur pānacia. Recipe aloës uncias 2. incensi uncias. 2. amomi uncias 2. meliloti uncias 4. cassiæ unciam 1. spicenardi uncias 2. folij uncias 2. mirrhæ uncias duas, hæc omnia panno ligata mitte in uno quoque dolio postquam uinum fuerit ibi mixtum & iam expurgatum, immitte autem in unoquoque uase unum coclearium harum specierum, & postea panno dissolue, & uino puluerem immitte & postea per tres dies radicē calami moue. Qui dam autem alium confectiōnē faciunt, recipe croci uncias quatuor hoc bonū colorem reddit, incensi masculi cribrati, uncias tres, hoc au sterū facit, folij manipulū hoc bonū odorem dat uino, hæc omnia cribrata misce, & in quālibet amphorā uini mitte coclearia duo, cum non uinū bulliat sed subsistat. In omni uino hæc propria seruā, ut iam subsistentia ea speciebus condias. Alij uero sic uina condunt: Recipe cardamomi, ireos æthyricæ, cassiæ, spicenardi, meliloti, xylobalsami, squinanti, costi, sp. ce celticæ omnia consimili pōdere, tere & reconde, et in uino immitte. Itē accipe semen artemisia, & herbam pentaphylon & pulueriza, & cum uinum deferbuit pone inatus, & nō uersabitur. Alij ut non uersetur duobus uel tribus diebus in graphis bullire permittunt & in februario transmutant, & ex co tertiam uel quartam bulliunt, & simul m. sent, deinde ponunt unā cōmunem parapsidem salis in duodecim corbibus uini. Vel aliter in februario transmutetur & quarta pars diminuatur, & iuxta finem ebullitionis, & quarta pars ebulliat ad ignem & dissipetur donec 6. uel 8. pars diminuatur, & iuxta finem ebullitionis ponatur in quolibet caldario in gamula ludecij sicci, uel lini tum tantum, ita

quod parum in uino bulliant, & cum ea calido ponantur in uase, et si ponuntur cum ea grapse bene ablute prius in musto posite clarius erit uinum, & obturetur uas ut inde non respiret, & sit bene circulatum & hoc certum est. Vel aliter, sit delectabile et mirabile ad bibendum hoc modo, quodcumq; uinum sit exprimantur uix, & uinum nihil cum grapsis bullitum totum ad ignem bulliat et dispartitur & in uase ponatur, deinde accipe uiginti gariophilos pro quolibet corbe, & in filo uel pecia positos in os uasis mitte, & est certum. Alij dicunt quod si mustum expressum & in continenti separatum à grapsis ponatur in tina, & coopertum cum aliquo panno mudo uel nouo sextario, sic ad dies quindecim uel uiginti dimittatur, & quolibet die spumetur, deinde in dolium mittatur, erit mirabile in claritate & sapore.

Qualiter uinum uersatum liberetur & clarificetur, Cap. XXXIX.

Accipe cerasa acris in bona quantitate & tota integra in uas ubi est uinum uersatum projice, & sic uinum incipiet bullire, & sic dimittantur per tres dies uel usq; cesset bullire, quoniam in ipsa bullitione purgatur uinum à fecibus optime, & cum clarum uinum uideris in aliud uas transfer, certum est. Si autem cum uino uersato mel in bona quantitate temperaueris, & in uase ubi est uinum uersatum iactaueris per uendonem cum baculo ipsum uinum cum melle agitaueris, & postea dinnsferis, clarescit uinum propter mel quod turbidum est in uino usq; ad fundum descendere facit. Quidam optime facientes tempore uindemie racemos recentes non pressos in magna quantitate in uase uersati uinum ponunt, ubi racemi pro matre sunt ipsi uino, nam racemi uersum reducant ad debitam bonitatem & saporem, post aliquod tempus, hoc aut sciendum quod antequam fiat aliquid de uino uersato transfundendum est. Quidam autem uersum uinum in grapsis de quibus recentius uinum est extractum iactatur, ut in eis clarescat, ibiq; dimittunt

mittant quantum expedit, quod si multum fuerit, non totum subito sed particulariter per uices successiue agendum est, ne calorem grapsarum extinguat, et ebullitionem qua clarificatur in totum prohibeat, et quanto minus mustum steterit in grapsis tanto fortius operatur. Palladius autem dicit, unum ea die limpidum fieri atque optimū, si grana piperis 10. piscacij 20. adiecto modico uini simul conteras, et sex uini sextarios mittas, diu ante omnibus commotis, tunc quiescere patiaris, coles, usui mox futurum. Item seculētum statim limpidum fieri, si 7 pini nucleos in uinum uini sextarium mittas, diuq; commoueas, et paululum cessare patiaris, mox sumere puritatem colariq; debere et in usum referri. Quidam autem clarificant cum nucleis persicorum. Alij autem cum solo claro uinorum et pauco sale. Vel secundum alios accipe lapides albos fluuij, et eos in clibano coque donec in eis crepaturæ incipiunt apparere, quo facto in puluerem subtilissimum deducantur. Item accipe salem album et contere subtiliter, et in uase 10. corbarum pone 6. uncias pulueris lapidis, et quatuor salis, et in uas commiscendo immittas, et si pro quolibet corbe duo addideris oua uel tria erit optimum, quod etiam de dictis lapidibus crudis subtilissime puluerizatis et sine sale fieri poterit, et hæc approbatissima sunt, et optimum est quod aliquid de melle addatur, nam mel rubcum albi uini restituit colore perditum, et omne mel est uiscosum et graue, atque omnium liquorū conseruantium, quod si nimis fuerit turbidū plus de unoquoq; addatur, et hæc retinent feces turbiditiam ad fundum sui pondere, ut non possit sursum facile denuo eleuari, et nullo prorsus sapore uinum inficiunt. Si uero in tantum turbidum est quod efficiatur humidum et fluat ut oleum, calore naturalis eius in toto extincto, nulla tanquam mortuo medicina potest ualere, si uero uinum non omnino extinctum rubcum habens colorem rruptum et crocē cum uino albatico uel cum alio multum rubicundo aut cum lauatura corticum recentium uel siccarum uine albæ,

uel cum colatura seminum ebuli restaurabitur : & succus ipsorum seminum saporem uersati uini corrigit, & similiter mel rosatum. Idem etiam fieri poterit cum lauatura dictorum seminum siccatorum. Item optime clarificatur hoc modo in uase 20 corbium accipiantur 40. oua in aliquo uasa fracta cum manibus uel mundo grantello plurimum aguntur, deinde una communis parapsis tartari misceatur, & uino addito ponatur in uase, quo facto cum claua per uendone in uasa posita fortissime agitur, & pluribus uicibus de subtus per fefariam extrahatur, & in uas iterum ponatur, cum uero clarificatum fuerit omnis turbulentia per spanam in costis & desubtus per fefariam extrahatur, & in uas iterum ponatur. Sed est sciendum quod in uino albo sola clara ponantur, in rubeo uero uitelum & clara, & in multum turbido plus de rebus apponitur. Item loco tartari optime sal ponitur, & tandem modicum aque fluminis in uase ponatur. Alij colligunt in uindemijs uuarum semina, quibus optime siccatis, & ex his facta farina manum plenam in quolibet corbe ponunt, & diligenter permiscunt. Clarificari optime atq; a sapore uersati liberari ab experto ualde dicitur, si in carario uase libra media aluminis de rosa clari & tantundem sacchari rosati cum libris octo mellis ponatur hoc modo, uel coquatur & optime distilletur, quo refrigerato albumen ualde puluerizatum et saccharum dissolutum in eo permiscatur, & cratere uini in his commixta, cum ista ponantur in uase optime concissa pertica agitentur : & uas disclusum usq; ad diem dimittatur sequentem, & in secunda die uel tertia clarum erit. Quod si ualde turbidum & putridum erit uinum, de unoquoq; predictorum plus aliquid ponatur. Ex acerbo autem maturum efficitur modo praedicto, quae res etiam uinum facit boni saporis, uel clarificabitur optime, ac sit purum & odoriferum hoc modo : accipe mediam libram de bono alumine rose, & mediam aluminis saccharini, & subtiliter pulueriza, & pone mediam unciam de praedictis pro quolibet corbe si est parum turbidum, si est turbidum

bidum multum, pone unam & accipe unam libram casi albi & rubei, secundum quod est unum 24. corbibus, & accipe plenam manum salis albi, & tria ouarecentia pro quolibet corbe, & si unum est album non ponas nitella ouorum, si est rubrum pone totum, quibus ouis fractis in aliquo uase & fortiter agitetur, & apposita in ipsis ouis una situla aque fontis uel putei, & iterum agitis & super dictis apposis rebus etiam fortiter iterum agitetur, & in die etiam uegetem 24. corbium positis & cum pertica scissa cum uino optimo in uegete agitis & permixtis donec totum fuerit turbidum, & extrahendo desubtus per secariam, in secunda die clarum erit, & usque ad octo dies quolibet die unus ciathus extrahatur, & similiter per spinam inferiorem in costis ter in die tota turbulencia extrahatur, donec consumpta fuerit. Sciendum est tamen quod antequam fiant predicta, transuassari debet in aliud uas, & a sua mala fece liberari, postea etiam clarificari si parum fuerit cum colatorijs pannorum ubi claretur & coletur.

Qualiter uinum album denigretur, & in alium colorem transmutetur, Cap. XL.

Postquam uinum album de sua uindemia in aliquod uas transfuitaueris, & per unum diem residere in tinam ex qua uinum nigrum extractum fuerit iacta, & post duos dies extrahas clarissimum & ualde rubrum. Item in eius uinis tot albe, quod parum esset rubrum, uindem entur diuisim & in tina cum nigra primo apponantur & albe desuper, & totum nigrum erit. Palladius dicit uitis hanc esse naturam: ut alba uel nigra si redigatur in cinerem uinoque imponatur ei unamquamque formam sui coloris imponere. Candidum uero red datur ex rubeo ea ratione scilicet, ut combusti sarmenti cinis modij unius mensura mittatur in doolum, quod habebit amphoras X & tri duo sic relictis cooperiatur, eritque album uel nigrum XL diebus exactis, uel rubificatur optime

tempore uinde mīdum, cum uuis quæ uocantur albaticæ; & cum la
brustis bene maturis cum steterint circa 12 dies conquassatæ in ali
quo uase si ponatur earum uinum nigrum in illud quod intendimus
denigrare, & ex denigrato uino plures lauentur racemi dicte alba
tica uel labruscæ, & est optimus modus ad nigrandum uinum pu
rum & mixtum in tinis, ut cum grapsi eleuati sunt super liquorem,
quàm melius fieri potest premantur in eodem, & iterum bis fiat
adem, & sic à corticibus unarum nigrarum augetur. Rubificatur
autem siue denigratur & clarificatur, & eius color mortuus remi
niscit hoc modo, pro quolibet corbe accipitur media libra semi
num siccarum ebuli, & in uino calido mollescentur, deinde mani
bus uel cum pistorio pistentur, conterantur, & pluries cum uino
lauentur cum oīs, tartaro & bono rubeo & sale mittatur, & agi
tatum seruetur.

Qualiter uinum de uno sapore mutetur in
aliū, Caput xli.

AD condiendum mustum Græci mustum decoctum ad me
diatatem uel tertiam partem musto adijciunt, suauē de dua
ro fieri dicūt si ordeatei pollinis ciathos duos simul cum
uino subactos mittas in uini uasculo, hora una ibi esse patiaris, ali
qui uini dulcis fecem admiscant, uel melius postquā unus currus uia
rum positus in tina fuerit, mel liquefactum ad ignem in bona quan
titate iactant, deinde quoq; uis in tina ponantur, quod si puluerem
piperis melle miscueris potens fiet, & gariofilos addideris uel ali
ud odoriferum eorum acquirat odorem. Idem erit, si in musto sine
grapsis bulliente ponatur uinum ad potandum suauē sic dicunt fieri,
fœniculi uel satureiæ singulorum congruum modum uino insin
di ac turbari. Vinum quoq; optimi odoris fieri intra paucos dies si
baccas myrti agrestis modo tanas siccas & tonsas mittas in cadum
ubi aliquot diebus saltem 10 requiescere patiaris & tunc coles
& maris

Utaris. Flores etiā vitis arbuti ni collectas in umbra ficcare cura-
bis, tunc diligenter tonsos & tectos herbis in uasculo nouo, & cum
uolueris tribus eadis unam florum mensuram, quam aseriacam uo-
cant adijce, & dolium superlinias & sexto uel septimo die aperies
& utaris. Potest etiam recens in paruissimis manipulis ad funi-
culum ligare habentem in capite lapillum quo mergatur in uino, &
tot diebus in uino suspensum teneri, donec ipsum odoriferum red-
diderit, & non ultra quia malo sapore inficeret uinum. Velut uetus
efficeret de nouo, si amigdala amara & absinthium & pini gum-
mi & fœnumgræcum simul fricas quantum sufficere extimabis,
& pariter fundas, etiam ex his unum ciathum in amphoram mit-
tas. Vinum quoque asserunt ex molli forte fieri sic, alibea folia uel
radices aut eius canem teneram decoctam mitte, aut gypsum aut
ciceris coctlearia duo, aut cupressi pillulas tres, aut buxi folia quan-
tum manus capit, aut semen appij & cinerem sarmentorum, que
ius uis flammæ corpus relinquit exile cum soliditate detracta, & ge-
neraliter quocunq; tempore in acerbū uel forte uinum dulcissimum
poni potest, & uinum acerbū in dulce. Si dulcedo displiceat & ui-
num nobile in ignobile & potēs in debili, quod si uis ei addere ali-
quem saporem extraneum, imponere potes, quod uoles ad filum li-
gatum cum paruo lapillo & tentando gusta, & cum habet de sa-
pore quod sufficiat, extrahere potes filum, & probatum est folia-
rum saporem optimum uino conferre.

Qualiter uinum & uasa liberentur à mûssa,

Caput XLII.

Si uinum mûssam habeat uel alium saporem malum, uitem
albam cum radicibus suis accipe, & subtus botem in-
funde radices eius sub terra, ita quod ueniant radices
eius recte ad foramen dolij desuper, & immerge ramos in uino
palmo uno per foramen dolij desuper, ita quod tribus diebus ibi
permaneat

permanenti, & perdent illum malum odorem. Alij accipiunt uin-
tem albam longam, & procurant quod ab uno capite infigatur, &
in uase in loco spinae fecarie, & stetatur ad terram, & super eam
mergatur, ita quod stet firma, & aliud caput reuoluatur duobus uel
tribus digitis supra terram, & uidebis quotidie per poros uitis al-
bae moffam exire, & sic minorabitur sapor moffae. Ad idem fac unū
panem panicij inter testas, & calidum pone super mofferos dolij.
Item à moffa uinum curare fertur, si diebus pluribus pane candido
dissimulo obturetur, quod quidam dicunt totiens faciendū donec ap-
positus panis nullatenus denigretur, uel accipiantur semina lauri,
quae dicuntur orbata, & bulliant cum uino, & ponantur in uase, hoc
etiam modo dicuntur liberari uasa & uina, si unū malo sapore infi-
citur, & ideo melius est, ut rami lauri bulliant in caldario uini, &
in uase ponatur & misceatur uinum. Rami uero simul uel dissim-
ligati per uendonem suspendantur in uino, ibiq; diebus aliquibus di-
mittantur, donec uinum fuerit liberatū, deinde auferantur, & hoc
modo non inficitur uinum à malo sapore. Item expertus sum, quod
multa nespula acerbata in quatuor uel pluribus cordulis incisa per co-
thionem, ut descendant in uinum, & ibi per XV dies uel unū men-
sem dimissa, optime uas liberatur & uinum. Item curari fertur, si
mane & sero manipulus saluae suspendatur in uase ne uinum con-
tingat, extracta aqua lauetur foramine optime obturato. Item à
moffa uinū curari fertur, si saccus strictus plenus panico calido,
in foramine dimittatur per uinum natans & aliquotiens permutetur.
Item pro certo liberari dicitur, si accipitur manipulus herbae,
quae uocatur morella, & in superiori parte cum corbula ligatū, in
mane per uendonē in uase ponatur, taliter quod duobus digitis tan-
tum descendat in uinū, & funiculo supranas aliquod legato ipsum
uas optime obturatur, & sic per illum diem solummodo dimittatur:
deinde de sero tollatur, & tantundem de recentibus herba ponatur,
ibiq; usq; in ortum solis diei sequentis dimittatur, & sic per tres uel
quatuor

quatuor uices fiat, & liberabitur uinum. Vel ponatur sacculus mādus lincus plenus sale uel gypso aut calce per uendonem cum suniculo ligatus, ut in medio uini descendat, & sic teneatur semper, & conferet. Vas mufsa infectum hoc modo curatur, ponatur calx nō exuncta, scilicet una quartula in 12. corbium & uase bene stricto ponatur aqua uel uinum feruens in eo, & obturetur ne respiret, quo sic per aliquam horam dimisso, pluries reuoluetur, & aqua frigida aperiatur et laetetur. Vel aliter zaniprus in caldario uini decoctus in uase cum feruentissimo ponatur, & fiat ut supra, & melius erit si utrunq; scilicet secundū post primum fiat, & optime sine dubio curabitur. Alij dicunt quod curatur sale in uase posito, & tribus mensibus ibidem cōtrahere moram, idem fiet cum calce uel gypso uel cinere. Vel liberabitur hoc modo, radatur optime uas intus cum gratula in rimulis & gremis cum puncta cultelli, & ab omni nigredine & mufsa mundetur, & ponatur in uase 10. corbium una quarterula cinerum sarmentorū, cum omnibus prunis suis, & plus si erit nimis infectum, et ducatur cinis cum prunis tunc per singulas partes uasis, deinde claudatur uas per uendonem, in eo ponatur aqua feruens & obturetur, & ad omnes partes reuoluetur, & sic dimittatur donec cinis & aqua infrigidata erunt, tunc optime laetetur, ultimo rotetur, cum aqua calida bene salita. Eodem modo curatur tinacia, sed quia non possunt ita claudi, cooperiantur sextorijs & pannis, ut parum respirent. Item uinum & uas à peritis dicitur liberari à mufsa si solum puluerizatū in subtili sacco positū per uendonem in uase ponatur, ut in medio uini pluribus diebus moretur, & non inficitur malo sapore, & una uncia in uase quinq; corbium sufficit. Item dicitur uas curari cum aceto fortissimo bullito, si ex eo laetetur & aliquantulū dimittatur. Alij dicūt si fiat ignis paleatū in eo curatur, uel forte melius curabitur cū igne sarmentorum. Conseruentur uasa à mufsa si cum euacuata erunt usq; ad parua uini quantum atē aperiantur extrahantur & optime siccantur, uel aqua

salūa uel uino rorentur, uel eo non extracto si fortiter obturentur, ne uini odor fumus exhalet, & quod in musto non obijet, ut putatur, in uase audeat remanere.

Qualiter prouideretur ne uinum fiat acetum, & qualiter ab acetositate liberetur. Cap. XLIII.



Inerē de uite alba pone in uino, & non fiet acetū, ut quidam dicunt. Melius tamen precauatur, ne fiat acetum, si teneatur in cella frigida, plenis dolijs, & clausis optime ne respiret, quod si uas nō est plenū, & est in loco calido, & de acetositate futura timetur, accipiantur frustū lardi grossi optimi, & in alba & subtili pecia lini ligetur, & ab uno capite ligato funiculo per uendonē immittatur, et in mediū uentris uini descendat, & cum uinū bibēdo minuetur, ipsius lardi fiet descēsus, et de super uas claudetur, et si teneatur donec uinū consumptū fuerit, & quāto plus lardi fuerit, tanto melius praeseruetur. Ut acetū mutetur in uinū in eum semen porri debere immitti oportet. Alij dicunt quod de acetositate uinatur super uendonē frōdibus uitis positus et saepius permu- tatis, lapide semper aliquo superius existente. Alij dicunt, quod si oleū oliuē ponatur in uase tantū quod operiat superficiē uini, optime ab acetositate defenditur, et cum ultima parte uini erit oleum & potest colligi. Qualiter fiat acetū, Cap. XLIIII.

Acetū fit hoc modo, ponatur bonū uinū ita quod semiple- nū sit uas, et praecipue uinū dulce in loco calido, et in uase ac- to infecto, & discooperto, & fiet acetū. Itē si ponas uinū clarum uel turbidum in graphis unde sit uinū extractū, & parua quantitatē su- per addis aceti, & dimittas per unū mensem uel amplius, optimum fiet acetū, si uis cito facere, calefacias calibē uel lapidē ponatur ad soīē per quatuor dies cū uino addito sale. Vel potes adhuc citius fa- cere hoc modo, accipe quoduis uas et imple uino optimo, et bene op- pila, & in caldario pleno aqua facias uas bullire diu, et statim acce- scit. Ad faciendū acetum fortissimū, accipe corna quando incipiunt rubescere

rubescere, & centimora que nascuntur in capis quando similiter incipiunt tumescere, & de pignolis sepius acerbis et puluerizata omnia subtiliter simul, & tunc accipe de meliori aceto quod inuenies, & distilla per a et cum pulvere illo, ita quod facies panes bene desiccatos, & quando uoles facere acetum fortissimum de aliquo uino, si fuerit forte uinum pone uncia 1. & si fuerit debile pone plus, secundum quod uino debetur tibi de illo pane & statim erit acetum fortissimum, uel infra octo dies. Item dicunt experti ualde si graphi uinari uindemiarum tempore bene lauentur & a corticibus & omni immundicia purgentur, et modicum ad solem siccantur, et in aliquod uas ponantur, ut medullis impleatur, tantum de uino addatur, et desuper uas claudatur fiet fortissimum acetum, cui ut puto multum proderit si graphæ prius madefiant aceto, & toto tempore poterit inde acetum extrahi & uini addi. Si radices raphani siccantur & puluerizentur, & in uase ponentur fiet acetum statim. Item accipiat acetosa & siccetur & puluerizentur, & ex eo cum forti aceto fiet panis & siccetur, & in uino ponatur statim fiet acetum, quod etiam in mensa fieri poterit, et idem dicitur de radice raphani. De uirtutibus aceti, Cap. XLV.

Acetum frigidum & siccum est in secundo gradu, penetratiua uirtute habet, & diuisiua ex sui substantia, & constrictiua ex suis qualitatibus. Contra uomitum & fluxum sanguinis bulliant in aceto gallæ uel rosæ uel similia. In tali aceto ponatur lana uel sponsa, si sit uomitus supra stomachum: si fluxus uentris supra renes et umbilicum. Sirupus acetosus qui fit de aceto, ualet ad simplicem tertianam et quotidianam de phlegmate salso, et ad omnes acutas febres si mane detur cum aqua calida, auerit enim naturam cholericam, fiet aliter sic: Saccharum debet resolui in aqua & aceto, & coquatur donec adhæreat tacue. Item ualet contra omnem materiam calidam hic sirupus. Sic similiter fit de aceto quandoque simplex, quandoque compositum, simplex fit ex duabus partibus aceti. & tertia mellis, compositum fit hoc modo, recipe radices appii, feniculi & petroselini, & tere aliquantulum & per
bb 2 decm

diem & noctem iaceant in aceto, & coque secundo simul, & pos-
tea cola et cum aceto pone mel ad tertiã partẽ, & coque ut supra.
Squilliticum acetum sic fit, recipe squillam, & dimitte per diem &
noctẽ in aceto stare, & coque & cola, & oportet interiora & ex-
teriora abisci, & mediana admisceri. Deinde admisce mel, & co-
que ut supra. Si uero non habes squillã loco eius pone radices rafa-
fani, & similiter fac de eis. Datur oxymel simplex uel compositum
contra frigidam naturam, sicut sirupus acetosus contra calidam,
quia diuidit & digerit eam. Salsa ex aceto, saluia, petrosilino &
menta & pipere, appetitũ confortat. Item si carnes comedantur so-
lummodo cum aceto appetitus confortatur. Idem uero acetum si in-
uenit stomachum plenum, laxat uentrem, si uero inueniat uacuum,
tunc constipat. Idem ualet contra debilitatẽ ex egritudine, si in eo
ponatur panis assus, & ex eo panis mollicato tingantur os & na-
res patientis, & uene pulsatiles in brachio, & super ipsius uenis la-
getur panis prædictus. Plus ad hoc ualet, panis intinctus in succo
mentæ. Valet etiam acetum cõtra lethargum & pbrunesim, sed fiat
fricatio circa uolas manuum, & plantas pedum cum aceto & sale.
Auienna autem dicit, quod acetum etiam confert adustioni ignis,
quando miscetur cum uino olei aut cum oleo rosato. Et cõquassatur
& infunditur in eo lana non abluta, & ponitur super caput con-
fert sode calide, & oris collutio ex eo adidem ualet. Et proprie
cum albumine oui confert medicine dentrũ, & uaporatio aceti ca-
lidi, confert difficultati auditus & acuit ipsum, & aperit oppilati-
ones collaterales fortiter, & resoluit sonitum, & quandoq; bibitur
calesactum post medicinas mortales confert ad membra.

De uino & uirtutibus eius, Cap. XLVI.



Inum secundum Isaac, bonum dat corpori sanitatem, &
si accipiatur secundum quod oportet quantum ualet na-
tura sufferre, uirtutem digestiuam confortat, tam in sto-
macho quàm in epate, quia impossibile est uirtute actionem dige-
stiuam

siuam confortari absq; calore, qui est naturalis uirtutis confortati-
uius & augmentatiui fortitudinis, nullus aut inuenitur cibus aut
potus adeo naturalis uirtutis cōfortatiuius & augmētatiuius ut uinū
propter familiaritatis confortiū, quod cū natura habet: & ideo cito
cōuertitur in naturalē & mundissimū sanguinē, unde uinū non solū
naturalē cōfortat calorē, uerum etiā clarificat turbidū sanguinē: adi-
tus corporis maxime uenarū aperit & clarificat, epatis oppilatio-
nem aufert, & aperit tenebrosam fumositatē, tristitiā generatam à
corde repellit, totiusq; corporis membra cōfortat. Et non solū eius
bonitas in corpore ostenditur, sed etiam in anima, facit enim illam
oblivisci tristitiam & angustiam, & dat ei leticiam, & confortat
eam ad inuestigandum subtilem rem, eiq; tribuit audaciam, neq; ab
ea sentiri dolorē neq; laborem permittit. Est igitur cōueniens omni-
bus etatibus temporibus & regionibus cum sumptum fuerit secun-
dum uim & consuetudinem bibentis, & secundū quod natura ferrē
potest. Actio enim uini non eodē modo operatur in senibus, inueni-
bus & adolescentibus & pueris: in senibus est secundum medici-
nam: quia calor uini eorum frigiditati repugnat: inuenibus uero est
secundum cibum, quia natura eius est similis naturæ inuenis. Ado-
lescentibus uero & pueris est cibus & medicina, quia licet calor
eorum naturalis sit fortis, substantialiter tamen non dicitur esse in
perfectiōe propter abundantiam humiditatis eorum, proinde uin-
um naturali calori eorum dat augmentum & nutrimentū, & eo-
rum deficcāt humiditatem, unde est medicina. Præterea sciendū est
quod in hyeme & frigida regione conuenit uinum purum, in æsta-
te uero calidāq; regione uinum non uinosum multumq; commixtum,
necessario cōgruit, cum corpora refrigerat & hunc flat per aquam
que ei est mixta, repugnat etiam aëreo calori, ne calida & siccā fa-
ciat corpora, & perducit uelociter cibum cum sui subtilitate ad to-
tius corporis membra. Est igitur contra duas causas contrarias
inuantium, calefacit enim corpora frigida, & deficcāt humida na-
turaliter

naturaliter, in frigidat calida & humectat sicca accidentaliter, quia cum sui subtilitate & perforatione aqua ad membra portat, quando necesse habent refrigerari & humectari. Diversitas vini generatim est triplex, recens scilicet unius anni, vetus quatuor annorum, & ultra, mediocre duorum annorum vel trium. Recens vero calidum est in primo gradu. Unde utile frigiditati & humiditati, ideo eo est ceteris nutritivius, malorum generat humores, inopinata somnia, ventositates stomachi & intestinorum. Unde tale vinum quodcumque recens fuerit, non habet vim ducendi cibum per corpus, neque urinam promovendi, oportet igitur frigidas & humidas habentes naturas illud cavere, ideoque si necessitas fuerit eligatur vinum clarissimum aquosum, diu à torculari expressum. Vetus autem vinum calidum & siccum est in quarto gradu, vinum huiusmodi habet quandam amaritudinem, parum nutrit, caput cito ascendit, & mentem percutit pro sui punctio nis acumine: maxime si ex eo multum bibatur, & si parum aquae miscetur, propter hoc ergo cavent illud debiles nervos habentes, & qui sensus acutos habent magnam eius nocum mentis præstat, nisi multam in suis corporibus humiditatem habeant, quæ ei resistat, unde Gal. multum est, inquit, vinum vetus comenitens his, in quorum vasis multitudo humorum crudorum est accumulata. Vinum mediocre est bonum, utpote temperatum, & hoc est calidum & siccum in secundo gradu, proinde huiusmodi vinum eligatur, & antiquissimum spernatur, similiter novum vitetur quod ab ebullitione non quieverit, nec terrestre ad locum suum naturalè descendit, nec quod est æthereum ad locum suum, id est quod ad superiora ascendit, nec liquor eius mundificatus & lucidissimus apparet. Præterea sciendum est, quod color, sapor, odor & liquor, debilitas et fortitudo diversificant vinum in eius qualitate & actione. Et color quidam generaliter quadruplex est, albus et niger, qui sunt simplices, rubeus & amœnus, qui sunt ex his compositi. Sunt & alij colores inter hos scilicet glaucus et rufus, qui sunt inter rubrum & album, & pallidus & subpallidus

subpallidus, qui sunt inter aureū & citrinū. Qui omnes hoc modo generantur. Vinū quoq; de albis uvis factū primo est albū pro aquo sitate & cruditate & defectione sui coloris naturalis, sed cum aliquantulū inueterauerit, ut unū annū transierit, color eius confortatur, & ipsius humiditas minuitur, fitq; coloris subalbidi, quod si plus inueterauerit, ut duos transeat annos multo plus calor eius confortatur, eiusq; humiditas minuitur, fitq; color eius pallidus, quod si plus fiat uetus, ut quatuor annos excedat, suamq; digestionē cōpleat, & naturalis caliditas in statū uenerit colorem habebit rubedini uicinū. Cumq; unum transierit unū annum confortatur color & digestio eius, & fit rosei coloris, & si duos annos transeat, & suam digestionem compleat & uirtutem, rufum habebit colorem. Quod si unum fuerit ex uvis nigris in initio est nigerrimū & obscurum, propter terrestrem partem sibi dominantem, & defectionem sui caloris & digestionis. Quod si unum transierit annum, eiusq; calor & digestio confortatur, & descendit terrenum ad locum suum, & maxime clarificatur, fit inter rubrum & nigrum mediocre. Si autem transierit annos duos, & eius calor compleuerit complexionem & digestionem, & descendat terrestre ad inferiora, & clarificatum sit, fit rubei coloris. Palam ergo intelligimus unum album & nigrum minus ceteris apta, sed album magis quā nigrum humiditatis & aquositatis habet, nigrū uero terrestritatis & grossitiei. Diverfitas uini est propter saporem, quia aliud est dulce, aliud ponticum siue acerbum, aliud insipidum, aliud forte. Dulce calidum est in secundo gradu, siccum in primo, aliquantulum humiditatis habet, unde est grossum & illaudabile in sua actione, nisi quia ventrem soluit, quia in omni re dulci est nis laxatiua & colatiua: quod unum si aliquid inuenerit, quod sue actioni sit contrarium, & cohibetur adhaerendum sibi, & calefit & bulit, ascenditq; ad superiorem partem stomachi, & in cholericos humores conuertitur, suū generat & uentositatem inflatuiam, oppilatio-

nem

nem splenis & epatis, & lapidem in renibus creat, ac maxime si membrain talibus passionibus preparata inuenerit, aut digestiua uirtutem debilem. Propter hoc caueant illud ij quibus grossa & humida natura dominatur, sua enim grossitie facile subtiles uenas oppilat epatis, sed pulmomi non nocet, quia non transit ad eum, nisi quod de ipso est subtilius, quia uenas pulmonis quae ualde late sunt oppilare non potest. Sed cum uinum dulce rubore & claritate habens bibitu fuerit quantum oportet & secundum quod naturae sufficit, conueniens est ab egritudine excurrentibus, & quibus necessaria est multitudo nutrimenti. Ponticum uero uinum quod acerbum dicitur durius, clarius & grauius est tardiusq; digeritur, uenas quoq; difficilius permeat quam dulce, quia dulce calidius est, & acceptabiliorem habet saporem, unde difficile est ad perforandas uenas, neq; digestionem neq; sudorem prouocat, nõ ergo bonum sanguinem generat, uentrem & intestina confortat. Vinum autem insipidum melius est pontico, quia temperatum est ad compositionem pontici, unde congruit calidas complexionibus habentibus, maxime stomacho parum tamen natrit, citoq; urinam eijcit. Vinum fortissimũ est cunctis calidius, & fortioris actionis, citoq; caput ascendit, & bullire & seruere facit corporis humiditatem. Unde fumus ascendens à stomacho nocet cerebro, mentemq; percutit, necesse est ergo ut illud caueant calidas complexionibus habentes, nisi multũ fuerit commixtum, & quantum oportet & decet accipiatur, & secundum quod conuenit ætatibus, regionibus & consuetudinibus laudabilis, quia grossos humores dissoluit, & uias uenarum à putredine mundificat, atq; sanguinem clarificat. Senibus autem & qui eorum ætatibus uiciantur propter superfluitatum coadunationẽ in eorum corporibus est huiusmodi uinum opportunũ, maxime si puritati fuerit uicinum, quia eorum calorem confortat crudorumq; humorum abundantiam dissoluit: cõuenit enim his quibus grossi humores & aridi collecti fuerint. Diuersitas uini propter liquorẽ est, quia aut
subtile

subtile aquosum, aut terestre grossum, aut medlocre: uinum autem subtile aquosum semper inuenitur cum albedine & claritate, unde facile in stomacho digeritur & uenas perforat, urinam prouocat, ideoq; est uile febricitantibus quia non fortiter calefaciat, neq; mentem percutit, nullum etiam cerebro uel nervo nocumentum infert, & si mixtum non fuerit erit melius, maxime ad extenuandam sitim. Vinum terestre & grossum oppositum est subtili aquoso, unde stomachum grauat, quia durum est ad digestionem faciendam, & difficile ad perforandum uenas, urinam non prouocat & tarde ad caput ascendit propter sui grauedinem & duriciem, & idcirco facit ebrietatem facile. Item uinum quoddam est odoriferum, quod cito sensum odorabilem in pellicula cerebri stantem perforat, propter sui leuitatem. Quoddam est nullius odoris, & propter grossitatem & grauitatem sui, & quoddam est horribilem habens odorem. Vinum odoriferum suum significat liquorem temperatum esse & subtilem ab omni sorde mundificatum, penitusq; digestum, unde clarum sanguinem generat, laudabilem & mundum, cordisq; confortatiuum est, animamq; letificat, tristitiam & angustiam expellit, quoniam mundificat sanguinem à putredine in corde existentem, propterea huiusmodi uinum omnibus ætatibus & complexionibus conueniens est, & si accipiat secundum quod oportet & secundum quod natura sustinet, præterea mutat uitium animæ in uirtutem, quia auertit eam ab impietate in pietatem, ab auaritia in largitatē, à superbiam in humilitatem, à pigritia ad alacritatem, de timore ad audaciam, ab ignauia ad facundiam, astutiam et ingenium: sed hoc fit cum temperate prout oportet bibitur, sed si usq; ad ebrietatem potetur, generabitur supradictis contrarium, quia ebrietas rationalis animæ lumen extinguit, unde permanet caput, ut nauis in maris sine gubernatione, & milita sine rectore. Vinum uero nullius odoris innuit suæ fumositatis grossitatem & grauitatem & indigestibilitatem, idcirco nullus est nutrimenti, & turbidum & grossum

sanguinem generat, & funditur: turbidum & obscurum: quare si canis sativissimus, sed non cito caput ascendit. Vinum autem grauem & horribilem odorem habens, pessimum est, nam sui odoris horribilitate & gravitate cerebro noscet, & mentem percutit, & nervos et rebr. q; pelliculis lesionem infert, & pessimum sanguinem, & maxime si est ponticum.

PET. DE CRE.

SCENTII DE ARBORVM NATVRA

& de utilitate fructuum ipsarum,

LIBER V.



SUPERIVS in libro secundo multa de arboribus generaliter dixi, cum de natura plantarum & cunctislibet generis agrorum cultu communi sermone locutus fui. Nunc autem in hoc libro quanto speciatius aliter de singulis arboribus est tractandum, verum quia quedam sunt ipsis communia, quedam propria, primo generaliter loquar de omni cultu sermone communi, postea vero dicetur de cultu singularum arborum, quae in nostris inveniuntur regionibus, secundum ordinem alphabeti, ut facilius uniuscuiusq; tractatus inveniatur, & primo de fructiferis latius, ultimo vero de infructiferis & earum utilitatibus breuiter pertransire intendo. Dicam itaq; de fructiferis quot sunt, & de diversitatibus earum, & qualem terram desiderant, qualiter plantantur, & quando, qualiterq; inferantur, & qualiter colantur, & qualiter seruantur seu formentur, & qualiter à nocumentis liberentur. Item de fructibus earum qualiter colligantur, & quando & qualiter servari possint, & quod ex eis fieri potest, & de virtutibus quas habent in corporibus humanis.

De arboribus in communi, Caput 1.

De scriis

Descriptiones arborum & diuersitates earum narrare in
 cōmuni non expedit, quia satis unicuique nota sunt in regi-
 one propria, et per singulares earū tractatus inueniuntur,
 aërem uero quedam calidum ualde desiderant, ut piper & palma,
 quedam frigidum ut castanea, plurimæ uero temperatum ut frêne
 omnes, quedam in omni aëre uiuunt, ut malus, pirus, & quedam
 aliæ, & quedam desiderant terram ualde pinguem, ut morus & fi-
 cus & similes, quedam macram & sabulosam, ut palma & pinus.
 In hoc tamen omnes arbores conueniunt, quod desiderant ter-
 ram in superficie siccam, & in uisceribus humectam, ad quam
 dirigantur radices earum, magna quippe corpora arborum
 multum desiderant cibum, præcipue corpora domesticarum, quæ-
 rum fructus ex magnis & pluribus singulis desiderant annis. Qua-
 liter autem plantentur, & quando & qualiter inferantur sufficien-
 ter dictum est in libro secundo. Colende sunt hoc modo: circa au-
 tumnā oportet fodere terram circa eas usque ad denudationem radi-
 cum, & aliquid imponi lataminis, ut hoc ipsum ablaqueatis arbori-
 bus per pluiæ fluxum radicibus apportetur. Quod si nimis sabulo-
 sa est terra, conuenienter recipiat terram uel cretā pinguedinē. Et
 si nimis cretosa est, eidem sabulum loco fimi ponatur. Hæc aut non
 solum stipiti apponenda, sed tribus quatuor uel quinque pedibus cir-
 cūque secundū magnitudinē arborū et radicū, & cum terra que
 ibi primo fuerat cōgrue misceatur, si hoc usque ad extēsiōnē radicū
 fieret sine dubio plurimū arbori inuamē afferret, ex his enim emēda-
 to nutrimento nādiior efficeretur arbor, & redit ad ipsam aliquid in-
 uētutis ex tali cibo, propter quod in loco inter duas aquas sito pro-
 ueniunt arbores, aut in loco qui est supra riuos, & talium arborum
 planior & subtilior est cortex, & rami magis confortati & ex-
 aliati quam aliarum. In loco etiam decliui ad quem fluui humor de
 montibus & pinguedo, propter similem humoris abundantiam,
 nam in uallis uisceribus optime colitur ager confitus, & nobilitat

arboris locus talis. Si autem aliud habere non posset pro canali inducatur riuus, qui quandoq; clausus ad radices arborum inundet, & reddat terre viscera humecta. Sin autem hæc & fieri apte non possint, neq; terra sit bona, proueniunt arbores cito spissos & hispidos habentes cortices, qui sua spissitudine incrementum & fructuum arborum impediunt. Formandæ sunt arbores ut antequam plantentur si quidem parua fuerit planta ab ea omnes circumstantes rescindantur ramusculi, & sola summitate relicta ponatur in scrobẽ. Si uero magna sit planta ab ea omnibus profus amputatis ramis & solo stipite eidem relicto, plantetur. Si uero fuerit insita, quædam habet stipites debilior auferatur, ut letior relictus solus in arborem erigatur, nisi sit forsan ficus uel malus punicus uel similis, quæ potest unum uel duos uel plures habere cõmode stipites, pro domini uoluntate. Cum planta uero comprehenderit usq; ad triennium non putetur, nisi forsan loco incongruo nascerentur in ea ramusculi adeo leti quod summitati eius optatum augmentum nutrimenta subducant, quo casu tales, relictis cæteris, tanquã totius arboris inimici tollantur: post prænarratam ætatem putentur quæcunq; in parte stipitis nate erunt, uel minus secundum naturam arboris, & pinguedinem uel macredinem, ut in pingui solo altius, in exili depresso erigatur, ibi ramorum diuisio in partes congruas procuratur. Si stipes sursum directus non perexerit, pertica cū uinculis corrigatur, & si diuisus supra truncum in partes non fecerit ramum, cuius summitas sursum directæ coelum afficiat idoneorum sensum leuetur in altum, & directæ perticæ alligetur. Quod si commode fieri poterit, nihil utilius erit quàm plantam præscindere ubi conueniens ramus nasci speratur, ut cum natus erit & conualuerit leuibus uinculis alligetur, ut quod sponte noluit faciat iusticia uolentia coactus, deinde per tempora ubi rami nimium spissi aut scabri aut non conuenientibus nascentur locis, duris & acutis serratentis ab arbore rescindantur, & si aliquam cœli plagam deferentes ad quasdam.

dum se conspirantes contulerint, à pravo proposito reuocati deserunt locum inhabitare cogantur. Si uero superbiens humor per latera non diffundens ramos in altum extulerit, in eo rescindatur locus ubi fragra sint conuenientius processura. Sic ergo ab adolescentia eius usq; ad debitum complementum procuretur sollicite ut stipites in ramos, & rami in uirgas & uirge in fragra fructifera diuidantur. Deinde cum minorata uirtute ac succedente senescentis arboris impotentia pondere fructuum rami trunpantur, aut humore deficiente arescunt, & alternis tantum proferantur annis, ampuetur ab ea omne ramorum superfluum & importabile pondus, ut non totus humor necessario sed pars potius in substantiâ cōuertatur ramorum, & alia nutrimento fructuum ne pereant tribuatur. Considerare tamen oportet quantitatem nutrimenti sufficiens, quod potest prestare locus generationis arborum, in ea enim proportionē oportet defalcari de uirgis & ramis ut non relinquuntur nisi tot quot nutrimentum sufficiens possit ex loco. Si aut ita non fiat, erunt arbores intermissis annis ferentes fructus, & non satisfaciens cultori ad uotum. Dicitur autē putationes & formationes fieri possunt à principio Nouembris usq; ad finem Martij, ut naturalius & magis proprie loquar, à tempore casus foliorū, (excepto tempore frigoris maioris) usq; quo incipiunt pullulare. Accidit quādoq; non leuibus plantis ut quasi arescant, propter uehementem intemperantiam est folijs, quibus subuenire oportet fossione atq; irrigatiōe frequenti, obiectis etiam defendantur umbraculis, & straminibus ligatis ad plantam, uel luxuriosis frondibus & herbis, uel viscosa emplastreantur argilla, uel seuo aut oleo, uel unguento frigido cortices liantur australes. Formicae praeterea plantam insitam teneram conualescentem inuadere cōsueuerunt, & in frondibus quibusdam ab eis generatis uermiculis folia contrahere, ramusculorū etiam impedire augmentū, cui subueniendum est intercisis folijs, quae lesa & contracta perspicis, à uermiculis diligenter manū, seu digitorum

constrictione purgētur? quo facto, ab eis importunis hostibus plan-
tula liberata in altum tuta conscendat. Et ut plantis parvis vel ma-
gnis, aut etiam fructuum lectoribus ascendentes formice præfatam
aut aliam non inferant lesionem eisdem, ne rursus repetere poss-
sint, tale obstaculum faciamus, succum portulacæ cum aceti media
parte permixtum præcepit Palladius debere infundi, vel uini feci-
bus truncum arboris illiniri, aut rubrica cum pice liquida, se d mo-
derate pro arboris robore, ne idem quod pro remedio exhibitum
est fiat uenenū. Vel quod puto melius, uellus lanæ aut lini uel foeni
aut paleæ quantitas circa stipitem in altiori distarum parte ligetur,
in inferiori sparsum, & quasi pectinata pendente. Vel fiat nas figu-
liformis & latum, in cuius medio sit amplum foramen per quod
planta figatur, siq; ut aquam undiq; possit sine effusione tenere, ut
ad plantam formice accedere non possint, sic enim earum notius
exercitus à solito impeditus ascensu inuitus ab arbore deuidbit. Alij
dicūt, quod si arbor cordula sirica oleo unctæ cingatur, prohibetur
formicarum ascensus. Præ omnibus autem cauendū est ab anima-
lium ingressu, quia illa plurimumq; plantas rodunt, ex quo planta
plurimum contrahitur & quandoq; arefcit, aut nimis nodosa effi-
citur, ita quod substantiam eius crescere impedit, & fructificare nō
permittit. Quod si est in tali loco quod ab ingressu animalium defen-
di non possit, affixo eodem congruo palo spinis pungentibus muni-
atur. Contra impulsus & rabiem uentorum, quibus nouelle insilio-
nes & maxime in locis eminentibus factæ facile dissipantur, uni-
cuiq; uirgæ insitæ cōueniens adminiculum spinis uinculis alligetur,
& si facta fuerit insilio scisso trunco, duplici uinculo cum admini-
culis relinquatur estate. Surculum uero inter corticem lignumq; de-
positum oportet triennio sub adminiculorum custodia remanere.
Oportet autem in omni arbore attendere, ne spuria in arbore nata,
aut ex radicibus iuxta stipitem erumpentia permittantur, quoniam
illæ ram nutrimentum subtrahunt arbori, & cum conualuerit &

multiplicata

multiplicata fuerint arefcet arbor, primum quidem in ramis, po-
ftea uero in ftipite, oportet igitur talia in principijs amputare, am-
putanda etiam funt in ramis quæcunq; in uirgīs aruerunt. Accidit
etiam plurimum arboribus, quod humor fupernus indigeftus ex-
pellitur ad corticem, ut ad cutem in hominibus & animalibus. Idq;
plurimū uidemus, cuius putrefactio uermes generat, qui arboris fa-
lutem nequiter profequuntur, ideoq; cum in aliqua parte ftipitis cor-
ticem tumefieri uides, illico locum feinde, ut inde uirus noxiū ela-
batur. Quod fi iam uermes creauerit, unco ferro curabis auferre,
fi uero perpenderit in plurimis locis humores indigeftos, & uides
corticem utiari, præftat in quibusdā feindi locis ab alto ftipitis ufq;
ad ircium, ut putrefcētia in ipfa durefcant. Si languida eſt arbor,
ut fructus uermiculofos aut lapidoſi generis ferat uitio forſan hu-
moris, à malitia qualitatis terre prodeunt: ſublata terra circa par-
tem radicū, alia melioris addatur ſaporis, & perforato circa ter-
ram ftipite, cuneus ex quercu foramini imprimatur ſeu inſigatur,
quod etiam augendum puto, cum in arbore adeo nutrimentū abun-
dat, quod calor naturalis eiufdem quaſi extinctus diminuta dige-
ſtione ſuccum inſpirare ad debitam fructuum generationem non
potest, ideoq; luxuriare cogitur in multitudine foliorum. Sed na-
ſcuntur ſuper arbores aliæ plantæ capillares, uirides, ſtudiū autem
eſt radere aliquid de h ſpitate corticis, & deponere uiridia de ſu-
per nata, & ſæpius ſtercorare radices maiores, & inſundere eas
bene apte & imponere lapidem in ſciſſuram, ut melius attrahē-
do poſint reſtaurare tempore humido ſitim quā ex ariditate agri
patiantur. Si autem terra nimis conculcata eſt, aut magnas ha-
beat herbas, & profundas radices habentes plurimum generat
impedimentum, conſolidata enim terra non permittit ad radices
deſcendere humorem, & ſua compreſſione implet & obturat po-
ros radicū & extrahere nutrimentum non poteſt, impedit eti-
am exaporationem quæ ab inferioribus ſit ad radices perſtingere.

eo quod uaporis debilis calor tantam uirtutem spissitudinis loci penetrare non ualet. Huic autem impedimento fossione succurritur, non aratione, quoniam atrati continuus sulcus multam inferi radicibus lesionem. Herbae autem magne quae radicibus usque ad ima per tingunt, praeipiunt nutrimenta arboribus, eo quod habent radices molliores et rariores quam arbores, et ideo citius attrahunt nutrimentum. Oportet igitur eradicari illas, et radicitus euelli, sed forte quia loco denudato penitus ab herbis indelectabilis nimis efficiatur, dimitti possunt gramina subtilia, sicut fila illa quae non nisi de superma superficie nutrimentum trahunt. Horum igitur graminum nocumentum, aut omnino nullum est, aut non tantum de quo sit curandum. Plurimum autem nocet erucarum genus, folia et quicquid uiriditatis in eis est corrodens, et flores dissipans, ut omnino fructus pereat. Igitur in Decembri, Ianuario et Febuario ipsorum quae super ramusculis sunt quibusdam telis inuoluta, priusquam nascantur optime colligantur, et igne crementur, quia concussione aut concussione uix omnia deleri possunt, sed ignis cuncta consumit. Accidit etiam plerumque piris in decrepita aetate, ut duritie corticis radicem attrahere nutrimentum non possunt sufficiens ad nutrimentum ramorum arborum et fructuum, quare sequitur ut alternis aut rarioribus annis ferant fructum, scindantur ergo per medium grossiores radices arboris, et in scissura ne claudi possint flumiales immittantur lapilli, ut humor sufficienter digestus, qui per compactum corticem subintrare non poterat, per scissuram aperti ingrediatur meatus. Ramorum etiam superfluis adeo minuatur numerus, quod succus attractus sufficere possit nutrimento fructuum et ramorum. Arboribus ergo praedictis modis excultis, si ager est nimis humidus, proferent arbores fructus uermiculosos, eo quod humidum conceptum, indigestum putrescit interius a qua putredine cum subtile humidum uaporare incipit, animal de genere uermium procreatur, quod postea arboris fructum corrodit, et inutilem reddit, cuius

figura

signum est, quod semper in loco seminis ubi subtilior est humor vermis generatur, oportet igitur (si possibile est) ut proportionabiliter exsiccentur locus, ut plantæ non ultra modum cibentur, si autem forte faciliter fieri non poterit, perforentur stipites arboris iuxta terram, ubi ad stipitem uniuntur radices maiores, ut per foramen illud stilletur humor superfluus, & tunc curabuntur fructus. Si autem e contrario aridus est locus & exilis, ita quod cultu curari non potest, arbores efficiuntur spinosæ, & fructus afferent parvos & accidos, & ideo à talibus locis plantæ excidendæ sunt. Fructus colligentur sine ramorum fractura, & colligendis cautio casu præcipiti in arboribus, quorum fructus perticis non excutuntur, si rami altiorem debiles sint congruis funibus cum fortioribus alligentur, inferiores vero longis secundum quod sufficiat, scalionibus ligentur cum uncino ferreo bene firmante ab utroque capite: cuius unum caput ad ramum inferiorem debilem colligendum ponatur, aliud vero ad superiorem ramum fortem ubi melius aptabitur & confirmetur. Leguntur autem fructus & præcipue pira diversis temporibus secundum diversitatem maturationis eorum, hac consideratione adhibita, ut hi qui tempore maturantur æstivo, tunc legantur cum odore, sapore & colore sibi attributis maturitatem fatentur, quasi aliquantulum ante legantur videlicet cum prima indicia maturitatis apparuerint diebus pluribus servabuntur ad usum, quam hi qui fuerunt ultima maturatione collecti, qui vero in fine maturantur autumnii ad usum veris vel saltem hyemis servantur octobri mense legantur, sereno & sicco tempore existente, cum luna sui fulgoris minuta potitur etate. Et hæc de arboribus in commune dixisse sufficiat.

De Amygdalo.



Amygdalus est arbor satis nota, & eius quidem diuersitates in fructu duæ sunt, quoniam quædam faciunt fructus dulces, quædam amaros: dulces usui hominum in cibo cõpetunt, amari quia sunt calidiores magis cõpetunt usui medicine. Item quædã sunt grossum & durũ ualde habentes corticẽ, & quædã subtilẽ amant aërẽ calidissimũ, licet in tẽperato proueniẽt, in terris calidis multum fructum ferunt, propter abundantiam sui humoris, ut ait Albertus. In terris autem frigidis inspissatus est succus eius, ita quod fructui non est habilis. Et ideo in terris multum frigidas natus, aut omnino perit, aut parum uel nihil fructificat, & fructus eius non diu durat. Sed in hoc genere nil utilius est quàm seminariũ facere, formemus seu fodiemus ergo altam secundum Pallas diuises quipedæ aream, uel secundum Albertum duobus pedibus, mihi autem unius pedis fossio satis sufficiens esse uidetur, deinde in ipsa area seu seminario obrucimus amygdala non amplius quatuor digitorum, ita quod cacumina figamus in terram, spacio inter se binorum pedum, uel unius solummodo separata. Sed ipsa amygdala ad ponendum grandia legamus, & noua non niuis grossam restam habentia, quæ antequam ponamus in mulsâ maceremus multum aquata, ne germen extinguat ex multo melle mordacitas. Alij eas nutes prius liquido fimo per triduum macerant, decem die ac nocte eas stare patiuntur in mulsâ, sed quæ suspensionem tantum possit habere dulcedinis. Terra autem seminarij debet habere letamen admixtum, cui etiam multum proderit si sabulum admisceatur, ut terra sit soluta & mollis. Cum uero in seminario disposita erunt, si siccitas interuenerit, ter in mense conuenienti aqua rigemus, herbis circumstantibus sæpe purgantes. Est autem diligentis cultoris unicuique nuci eius posita signum paruum insigere, ut seminariũ sine lesione germinum antequam supra terram emittat uel emineat fodi possit. Proderit etiam multo seminario
si an

si antequam in eo ponantur amygdala terra noua quae subius fuerat desuper eleuetur, & optime puluerizata semina recipiat. Cum in seminario adoleuerit duobus annis elapsis praedictis mensibus transferantur ad locum ubi perpetuo stare debent. Statuenda autem sunt ut ad meridiem spectent uiginti aut quindecim pedibus ab inuicem separate. Inferuntur mense decembri & Ianuario & locis frigidis Februario. Si surculos colligis & condas antequam germinent, utiles autem sunt qui de summitate sumuntur, sub cortice inferuntur & in trunco, in se, in persico & in pruno. Sed eius insitio non est ita utilis, ut satio, ut ait Albertus. Primo anno quo plantatur ut optime conualescat à mense Februario usq; ad Octobrem singulis circumfodiatur mensibus, & herbis iam nascentibus librentur, uel quater ad minus dicto tempore cum terra non nimis mollis est, ut in puluerem aliquid humoris habentem conuertatur, & imbres accipere possit, quia conculcata nimium terra de negat humorem. Tempore autem florum non fodiantur, quia flos eius facile fossura excutitur, ut idem dicit, si terra eius macra fuerit in autumno effossa letamen accipiat, si nimium sabulosa, lapides uel letamen & cretam accipiat. Formari autem debet, ut supra dixi, cum in communi de formatione arborum locutus fui. Sit autem uno solo stipite cōtenta qui primos ramos à sex pedibus usq; ad octo uel decem erigatur à terra usq; ad primos ramos. Eidem multa nocumenta emergunt, quae alijs arboribus pluribus eueniūt & earum cura superius est sufficienter inserta. Praeterea accidit eis si rodantur quod fiunt fructus earum amari, ideo plurimum sunt à pecore seruandae. Item cum timetur ne pluuia seu pruina laedantur, nudentur radices earum antequam floreat, ut Martialis asseruit. Albertus uero addit, quod lapidibus albis paruis cum arena grossa operiantur. Et si de pruina nō timetur submoueatut arena & reponatur humus. Teneras nuces creare dicit Palladius dari alem asseruisse, si ante florem radicibus ablaqueatis aqua

calida per dies aliquot inferatur. Ex amaris dulces fiunt, si circumfosso stipite tribus digitis fiat à radice caueria, per quam noxi
us humor exudet, uel medius terebretur truncus, & melle ligni
cuncus oblitus imprimatur, uel si etiam circa radices ouis stercus
aut parui suis infundas, ut Palladius ait. Infixos clauos plurimū in
uatur fructus, & maxime si aurei sunt, ut ait Albertus. Si non fera
ces uero sunt tede cuneum, terebrata radice immergamus seu iun
gamus, uel si silicem inferamus, ut cortice tegente claudatur. Hæc
arbor hoc habet propriū quod in senectute plus fructificat, eo quod
humor eius tunc à calore non exiccetur, sicut in iuuentute. Fructus
eius colliguntur perticis excussi cum maturi sint, sicut acerbi & ad
huc teneri appetuntur à mulieribus & maxime pregnantibus cum
multa auiditate. Matura autem sunt amygdala cum cortex extra te
stem existens apertus separatur ab ea, decorata autem si aqua sala
sa lauentur candida fiunt & duratura, sed & sine aliqua industria
uel cura seruantur in longum, si fuerint exiccata. Si difficulter co
rium amittant, paleis obruta, continuo relaxabunt. Ex uirgis amy
gdalis fiunt optimæ uirgæ clauorū quibus utuntur milites. Item ex
stipite earum iuxta radices fiunt fortissimi mallei ad sciendenda li
gna. Amygdala dulcia calida sunt, in medio primi gradus, uiridia
teneriora & laudabiliora sunt quàm sicca, propter earum humidita
tem, idcirco si sicca in aqua calida una nocte excorticata iacent,
fiunt in actione uiridibus uicina Et si uiridia priusquàm habeant aper
turam edantur gingiuas confortant, & stomachi dolorem uel calo
rem refrigerant. Dioscorides confirmat, & addit quod caput gra
uant, caliginem nutriunt, uenerem accendunt, somnum faciunt, &
ebrietati resistunt. Amygdala amara calida est & sicca in secundo
gradu, ualet contra asma & tussim ex frigidityte cum saccharo ad
reprimendum earum amaritudinem. Oleum ipsarum ualet con
tra sordiditatem & saniem in auribus immissum. Item ualet contra
lumbricos cum farina lupinorum super umbilicū posita. Idem ualet
ad menstrua

ad mēstrua prouocanda cum triphora magna suppositorium factum. Auicenna dicit, quod amygdala amara sua proprietate interficiunt vulpem, si cum aliquo cibo comedantur ab ea. Item cōferunt posita super panum, contra lentigines, cicatrices & percussiones, & applanant contritionem faciei, & cum radix coquitur & linitur super panum est medicina fortis. Et cortex & folia sunt mundificatiua & extenuatiua & sanatiua, ut dicit Diosc. & comedere amygdala dulcia, impinguat. Galenus uero dicit, quod aperiunt opilationes epatis mirabili apertione amara amygdala.

De Auellana.



Vellane notae sunt, ex his quaedam sunt syluestres, quae nascuntur in nemoribus, quaedam domesticae. Syluestres sunt paruae saporosa, grossam trita habentes: domesticae quaedam sunt rotundae grossae, & quaedam longae, ex quibus longae saporosiores sunt, & citius maturantur. Omnes tamen maturitatem fatentur cum suis folliculis spoliantur, & cum fuerint ad solem siccate possunt diu seruari. In omni ferè aëre proueniunt, loco gaudent macro, frigido, humido, sabuloso, licet in omni genere terrae ferè nascentur & conualescant. Ponende sunt autem nucibus suis, nec amplius duobus digitis terra super eas ducenda est, melius autem plantis & sabulo proueniunt. Mense Februario plantandae sunt, licet mense Martio & Octobri & Nouembri plantari possunt & conualescant. Ex ligno huiusmodi arboris fiunt optimi circuli uasorum uini, & arcus ad sagittandum satè boni. Auellanae sunt calidae & parum siccae, & nucibus frigidiores & potètiiores, earum enim corpora sunt solidiora & spissiora, uentositate carètia: ideoq; plus ad descendendum ex uentre nucibus sunt nutritiue, tamen tardiores ad digerendum & ad descendendum ex uentre, inflationem in corpore generant, maxime si cum interiori corticula comedantur, ablata ea fiunt utiliores, digesti: piliores & utiles, antiquam habent

tibus iussim, precipue si pistata cum melle esui dentur. Ut eius cortex est stomachicus & stringit uentrem.

De Berberis.

Berberis est fructus cuiusdam arboris parue ualde spinosa se similis arbori mali granati, & sunt rotundi, rubei: quasi nigri, ut fructus spinæ albe aliquantulum oblongi quasi subnigri, plantantur uel malapunica. Frigidi sunt & sicci in secundo gradu, ualent contra febrilem dispositionem. Srupus ex eis & saccharo factus, contra calefactionem epatis. Pulsus eorum cum succo solati conficitur, & supponatur epati, Auicenna dicit, quod sunt frigidi & sicci in tertio gradu. Dicit etiam & sunt uincentes choleram & extinguunt suum ualde huiusmodi fructus. Arbustula optima est pro clausuris & sepibus si haberetur plantarum copia: que quidem per sationem fructus uel seminis eius facile haberi potest.

De Ceraso.

Cerasus est arbor nota, & desiderat aërem frigidum & temperatum, calidum uero sustinere non potest, in tepidis tamen regionibus parua proueniunt, cerasi montana uel in collibus uel prope montes constituta regione letantur: solum autem desiderant positionis humelle. Quædam sunt dulcia, quædam pontica, & hæc magnā faciunt arborem, & sua sponte di recte sursum ascendunt, & hæc proprie dicuntur cerasa. Aliæ uero sunt ualde acris, & hæc minorem faciunt arborem, & sursum non diriguntur sed solummodo per latera diffunduntur, & hæc uocantur uilgomarchæ siue mareschæ, quæ multas plantas in circuitu faciunt super radices ad plantandum habiles, plantantur semine eius posito tempore Octobris uel Nouembris, uirgulis etiam ipsius paruis positis, affirmatur à Palladio facile in arborem proficere, quæ autem similibus plantis fuerint predictis mensibus trahi possunt. Inscritur mense Nouembri, uel si necesse fuerit

rit extremo Ianuario. Ego autem; nuci eius insitionem factam tempore Februario & Martio optime provenire, licet sit melius, & omnium arborum germina habentium insitio, quādo humor vel his non dum est vel fluere desinit. Varro scribit, quod inseritur temporibus brumalibus, hoc est à die duodecima Decembris usque ad calendas Februarij. Inseritur autem optime sub cortice & trunco fisso & in summitatibus eius, sed qui in trunco inseruntur omnem lanuginem auferre debebunt. Inseritur in se in pruno vel in plantano, & ut quidam dicunt, in populo amant, serobes altas, & spacia largiora videlicet triginta vel quadraginta pedum, & assiduas fossiones, putari in eis putrida & sicca debebunt, & quæ præstius arctata procul, ut arescant. Fimum non amat, atq; inde degenerat, formantur ut stipites dulcium ab octo pedibus usq; ad duodecim erigatur à terra, plus etiam vel minus, secundum quod in leto solo fuerit vel exili. Stipes uero marcenarum acrium, sex pedibus vel circa eleuentur à terra. Si cerasus humore excepto putrescat in trunco foras accipiat. Si formicas patitur vel alio modo ledatur ei subueniendum est: ut supra dixi cum locutus fui de arboribus in communi. Cerasa non aliter quàm in sole siccata seruantur. Ut sine ossibus nascantur sic fieri debere asserit Marcialis, arborē teneram ad duos pedes rescindes, & eam usq; ad radicem findes. Medullam partis utriusq; abradere ferro curabis, & statim utraq; partes unculo stringes & oblines, fimo summam partem vel creta & laterum diuisuras, post annum solidatur cortex vel cicatrix. Hanc plantam surculis qui adhuc fructū non attulerint inseris, & ex his absq; ossibus poma nascētur. Cerasa dulcia cito de stomacho descendunt, & earū iuuamentū stomacho est parū, & pōtica faciunt contrariū harū, acetosa uero desiccant plus quàm pontica, & cū hoc incidunt & conferunt stomacho phlegmatico pleno superfluitate. Diafcorides autē dicit, quod humida molliunt uentrē, & sicca retinent eum, gūm eius cū uino & aqua mixtū curat tussim antiquā, & meliorem reddit

reddit colorem faciei, & acuit uisum, prouocat appetitum: & cum uino solo confert lapidi.

De Castanea,



Castanea est arbor nota. Ex his quedam sunt domesticæ, quedam syluestres, & domesticæ sunt mediocres fructus facientes qui castanæ dicuntur, & quedam faciunt fructus ualde grossos, quos Mediolanenses marronas uocant. Diligunt cæli statum frigidum, & tepidum non recusant, si humor assenserit delectantur cliuis & opacis regionibus, ac maxime ad septentrionalem uersis, amant solum molle & solutum notamen arenosum, & in sabulone proueniunt sed humecto, terra nigra illis est apta & diligenter comminuta in agro spisso & rubrica uix proueniunt. In argilla & glarea non possunt nasci. Seruntur plantæ & que sponte nascuntur ex semine, sed quæ plantæ seruntur ita ægræ sunt, ut biennio de earum uita sæpius dubitetur. Serendæ sunt igitur castanæ mense Nouembri & Decembri. Item Ianuario & Febuario. Eligendæ sunt castanæ adserendum recentes, grandes maturæ, sed ita faciendum est, ut durent usque ad Februarium, castanæ in umbra siccentur expansæ, tunc in angustū & siccum translate cum mulatq; diligenter flumiali operiantur arena post dies 30 eas arena remota in aquam frigidam mittas, quæ sanæ sunt merguntur, quæ superenatant non ualent. Item quas probasti similiter obrues, post 30 dies iterū probabis, & hoc cum tertio feceris ad ueris initium serere debes, quæ manserint illibatæ, aliqui in uasculis seruant, arena pariter immissa. Pastinari ergo locus debet, qui huic deputatur arbusculo, altitudinis pedis unius & semis, uel duorum sulcis in ordine destinatis. Aut terra aratris resolui debet glebis redactis in puluerem, castanearū semen accipiat, non amplius pedes dodrante demersum. Vnicuiq; semē propter notam surculis debet affigi, & ipsa scientia simul trina uel quina ponantur, & inter se quatuor uel trium pedum spacio separata. Quas cum transferre placuerit

binas plantas transferre debet, ita tamen quod in nemoribus spissiores, in agris uero seminabbus rariore putentur. scilicet quadraginta pedes distantes, ut possint per latera convenienter diffundi. Locus tamen deductorium liquorē accipiat, ita ne infedens humor humor limo germē extinguat. Inscritur mense aprili, martio & maio in se & in salice, tardius prouenit & maturatur, in cortice inscritur & inoculatur, et melius inscritur ad bucellū. hoc modo praescindatur arbor nobilis generis, & ad modū populi colligantur surculi antequam germinēt, & in frigido & umbroso loco seruentur obruti, ut postmodum mense aprili & maio habeantur, & tunc ex eis cōmode fiet insitio ad bucellum uel more emplastri. Et si multas insitiones fieri oportet ex surculis inserendis multi fient bucelli cum germine longi, secundum latitudinem unius digiti grossi & plurimi, deinde insitio surculo inferendo in loco congruo, & cortice intres uel quatuor partes scisso eligatur surculus equalis stipiti, qui tantum deprimatur inferius quod aequetur, & cortex eleuatur, minus bucello formetur, & quod excorticatū est super bucellū totaliter incidatur. Nouū castaneum circūfodi debet assidue mense martio & septembri, incrementum maius accipit, si putationibus adiuvetur, in nemoribus latis depressius, in agris uero qui seminantur altius in eis rami formantur. Castaneae colliguntur cum propter maturitatem suam de ericijs suis deciderint in terram, uel cum in eis apparere incipiunt excutiantur pericis, & collectis ericijs in acernum intra septem timore porcorum coaceruantur, & cum sic in gazara aliquibus diebus manserint aperiantur & haemoliores quam praedictae sunt ad seruandum uirides, quia per totum martium possunt uirides seruari. Sed alae quae maturae ab arbore cadunt usq; ad quindecim dies solum seruantur. Virides si ad summum posita ut siccentur diu seruari possunt, & saporosiores ceteris esse dicuntur, seruantur uirides in sabulone, ut dixi, uel in cratibus ad summū duobus saepe mensibus posita, ut postmodum siccatae

nundetur & diu seruetur, signū castaneæ optimū est in domibus, & mirabilis durabilitatis sub terra, & ad pluias extra tella, & ideo ex eis sunt optimi pali prouincis & pergularijs, & ex eis sunt optimæ uegetes tine & nasa in quibus castaneæ siccae seruantur. Castaneæ secundū Isaac calidæ sunt in primo gradu, & sicci in secundo. Significatio caloris earum est dulcedo earū, quoniam saporositas & ponticus innuit siccitatem. Et ad digerendū satis sunt faciles & nutritibiles, non multū stipticæ & diureticæ sunt, si assantur earū corpus rareficatur & si aqua elixentur, quia earū complexio temperatur ex aqua mollitie, & humiditate, sunt boni chumi in corpore generatini, & siccitatis in corpore & in pectore temperamentum, & urinae difficultatē dissoluant. Cholericis eas cum saccharo comedant, phlegmaticis uero cum melle. Item hæ secundū medicinā uirtutem habent laudabilem, quia abominationis & uomitus constipatiue sunt, ieiuniūq; intestini cōfortatiue. Cataplasma quoq; ex eis cū ordeī farina & aceto siue uino factū super mamillarū tumorem positum, eis potenter auxiliabitur. Castanearū uero corticibus ustis uel puluerizatis cū sapa tēperatis capitiq; adolescentis in modū cataplasmatiss positis eorū capillos confortat & augmentat, & cōtra allopeciā ualet. Auicēna dicit, quod castanea est abstersio et inflatio in uentre inferiore & stipticitas, & cōfortat mēbra, & est tarde digestiblis sed est boni nutrimenti, si ergo cū saccharo misceatur eius nutrimentum est bonum. Galenus dicit, quod est nutritibilior omnibus granis, adeo quod est proxima grani panis.

De Citonio.



Citonio est arbor nota, & ex his quedā sunt quæ faciūt pira citonia, & hæ arbores maiores sunt, & minores habēt folia, & quedā sunt arbores minores & latiores habentes frondes, quorū fructus proprie uocantur citonia, amāt locū frigidū & humidum, si in tepido statuuantur opus est illis irrigatione. Erunt tamē statū medioris sius inter naturā frigoris & caloris,

& in planis & decliuibus proueniūt, magis tamē inclinata & cō-
 uexa desiderant, terrā desiderant satis pingue, & in soluta magis &
 in creta letātur, plantantur plantis iuxta ipsas arbores cū radicibus
 inuentis. Itē talcis & cacuminibus. Itē locis calidis mense octobri
 & nouēbri, frigidis uero mense februario & martio, in tempera-
 tis in utroq; tēpore possunt feri. Itē longe ponēda sunt secun dū Pal-
 ladiū, ne altera quatiente uento stillicidiū tangat alterius. Mense fe-
 bruario inserūtur in trūco & cortice, in seipsas inserantur autē no-
 uelle arbores quibus succus in cortice est, si maior est circa radicem
 melius inseritur, ubi cortex & lignum beneficio soli adherentis hu-
 mescat. Item recipiunt in se surculos pene omnis generis, scilicet pu-
 nici, sorbi omniumq; malorum meliora producunt. Dum minor est
 timetur stercore, maior uero cinere uel crete puluere, semel toto an-
 no misso radicibus. Poma in his cito matura & maioris prouentus
 asiduius humor cito efficiet. Rigandæ sunt quotiens celestis nega-
 tur infusio, & circūfodiendo locis calidis octobri & nouēbri, locis
 frigidis februario & martio. Et nisi circūfodiatur asidue, aut steri-
 lis efficitur aut eius poma degenerant, formātur ut unū solum stipi-
 tem habeant, quatuor uel quinque pedibus eleuatis à terra, putandæ
 sunt & à nocumentis seu uiciosis omnibus liberandæ. Si ægra est
 arbor amurca equaliter mixta aqua radicibus debet infundi, quod
 annis singulis factum à uitijs custodiet, sed arbores longē derogab-
 it ætati. Colliguntur citonia mense octobri cum adueniente pruina
 maturitatem aureo colore fatentur, & quæ magis odorifera sunt,
 debent eligi, sed si per cotilidones suspendātur in frigida regione
 forte durabūt per annum & amplius, uel seruātur inter binas tegu-
 las posita si luto ex omni parte claudantur, uel si defruto incoquā-
 tur aut passo. Alij aut quæ meliora sunt fici soleis inuoluta custodiūt
 alij siccis locis tantū reponūt, à quibus uetus excludatur, alij in mel-
 le dimittunt, quo genere condiendi satis matura eligūtur, alij milio

et 2 obruunt

obruunt, uel in paleis separata demergunt, alij uasculis optimo uino plenis dimittunt, alij dolijs musti immergunt, quod odoratū uinum reddit. Ex citonijs sunt bonæ & spissæ sepes sp nas tamē non habent, sed ingressus animalium inibent, & quandoq; fructū reddunt, & incise satis igni respondent. Citonia, ut ait Isaac generaliter in duo diuiduntur, uidelicet in crudum & ligneum, & perfecte maturatum, crudum itaq; ligneum pessimum est & durissimū ad digerendum & nihil nutrit, idcirco ea uitare omnino oportet, maturatum naturaliter frigidum est in fine primi gradus, & siccum in medio secunda, praterea ponticitas eius maior est quā in alijs malis, ideo ualet ad sanguinis fluxum & egestionem & uomitum. Confortatiuū est stomachi si moretur in eo, & si comedatur sub uacuo constringit uentrem, si post cibum accipiat laxat comprimendo & constringendo os stomachi. Sed ex his quedā sunt pontica, quedā acetosa, & quedā dulcia pontica stiptica, & frigida sunt, ad digerendum duriora, & ideo nō sunt cum carne sua edenda, sed liquor eius tantum naturam stomachi confortat, & urinam promoucat, egestionem uomitumq; constringit, & si cum carne edatur ingeniari, ut sic loquar, oportet ut carnis durities auferatur, uel elixando uel supra aquam calidam apponendo, uel quod melius est scindantur, & abiectionis granis in eius concavitate ponatur mel, & excorticentur, & in lino uel stappa uel quod melius est in pasta inuoluta in cineres calidos mittantur, sic enim erūt stiptica ualde confortatiua. Acetosa subtiliora & penetrabiliora sunt, ideo sitim extinguunt, & acumen cholere rubæ, & uomitui cholerico & egestionem conferunt, urinam promoucant, & uim appetitus augent, odor earum uomitum prohibet, & succus post uinum bibulū deponit suum salientē ad caput. Vnde dicit Auicenna, quod citonia conferunt uomitui & ebrietati & sedant sitim, & confortant stomachum, recipientē superfluitates, & conferunt dyssenteria, & quando sumuntur post cibum soluant adco quod quando plurimū ex eis sumuntur

sumitur extrahunt cibum ante digestionem, dulcia uero sunt magis temperata quoddam caloris habentia, unde uis eis manifesta non est ad suum extinguendam uel calorem.

De Citro.



Arbor citri nota est, desiderat aëre calidū, sed irriguis & maritimis locis gaudet & quibus humor exundat, solum desiderat rarioris naturæ. Si quis hoc genus arboris in regione frigida nutrire desiderat loco parietibus munito uel in partem meridionalem uerso disponat hanc arborem, bybernis mensibus tectum stramine uelat agresti, & ubi æstas redierit arbor aëri nuda & secura reddatur, terram rarioris naturæ desiderat. Mense Martio feritur multis modis, scilicet semine, ramo, talca & claba, si granis uelis serere ita facies terram in duos pedes fodies, & eisdem cinerem miscebis, breues areas facias, & utrinque per cannales aqua decurrat. In his arcis palmarem scrobem manibus aperias, & tria grana deorsum uerso cacumine iunctam constitues, & obrue ta quotidie regabis, citius procedent si beneficio aquæ tepidæ uis, natis germ nibus semper proxima herba truncetur, potest tria na planta transferri. Si ramum uelis ponere non amplius semipede seu sexquipedē debet s immergere ne putrescat, clabā feri com modus est quæ sit manubrij grossitudine, longitudine cubitali ex utraq; parte longa nodis & aculeis recisis, sed integra summitate gemmarum, per quas spes futuri germis intumescat. Diligentiores tamen finum bubalum adhibent utrinque, quod summum est, uel marina alga uesciunt, uel argilla subacta partis utriusque extrema cooperiunt, atque ita in pastinato solo deponunt taleam, & gracilior & breuior esse potest, quæ similiter ut glabam mergetur, sed talca palmis duabus superfit, claba omnis obruitur, alijs arboribus non debent aduerti seu annexi. Talca siue claba calidissimis regionibus per autumnum ponitur, frigidissimis Iulio uel Augusto positis, & quotidianis iritationibus animatas, Palladius usque ad poma &

magna incrementa produxisse affirmat. Inferiuntur mense Aprili calidus locis, Maio frigidis, non sub cortice, sed scisso trunco, circa ipsas radices, & in piro & in moro secundum quasdam. Gaudent assidue fosiōe, & hinc proveniunt poma maiora, nisi quæ arida sunt rarissime debemus abscindere, hæc arbor pomis non caret cum huiusmodi abundantia maturis se acerba substituunt, arborum vero ætate florentia consequantur orbem, quendam continuæ fecunditatis administrante sibi natura. Feruntur acres medullas mutare dulcibus si per triduum mīsa aqua semina ponenda maccrentur vel lacte ouili. Aliqui mense Februarij truncū obliquo foramine ab imo terebrant, ita ut altera parte non exeat ex hoc humorem permittunt fluere, donec poma formetur, tunc foramen luto replēt, sicquod est mediū dulce fieri affirmant, poma eius in arbore toto serē anno seruari possunt, vel in paleis vel melius si in uasculis quibusdā claudantur. Poma citrina secundum Isaac ex quatuor rebus sunt composita, prima est cortex, secunda caro, tertia medulla, quarta semen. Cortex est calidus in primo gradu, siccus in secundo, quod acumen eiusque odor ostendunt, eius tamē substantia dura est & solida, idcirco non est pro cibo accipienda, sed si exigua pars eius pro medicina sumatur, stomachum confortabit, & digestivam vim adiuvabit, bonumque odorem præstabit, atque erit contra venenū mortiferum potatū cum uino datus, qui succus inter pannos missus eos à uineis conseruat incolumes. Item prægnantibus esui datus escarum irrationabilem appetitū curat. Caro autem frigida est & humida in primo gradu, unde est stomachi refrigerativa, & ad digerendum difficilis propter eius duritiem, quapropter necesse est stomacho exmanito cum melle & saccharo accipi ante omnē cibum, & si in medio aut fine cibi edatur sit causa ac materie duræ & grossæ febris. Medulla vero subtilis & aquosa, omnique caret nutrimento, & hæc est duplex, quia quedam est insipida, quedam acetosa: insipida frigida est et humida in secundo gradu. Unde calorē refrigerat

refrigerat & sitim mitigat. Acetosa uero frigida est & sicca in secundo gradu, uirtutem habet incidentem, extenuantem & refrigerantem, ideo uero fit caloris epatis mitigativa, & stomachi confortativa, uirtutem appetitivam excitat, & acumen cholerae rubrae mitigationem praebet, sitientibus perfecte subuenit, suspensionem ac tristitiam de cholericis cardiaca generata removet, egestionem uomituum; cholericum sedat, impetigines & lentigines cum ea frictas destruit, quod testatur quia pannus in caustico madefactus, cum ea purificatus ad colorem pristinum redit. Semen calidum est & siccum in secundo gradu, quod amaritudo ostendit, ideoque secundum cibum conueniens, secundum medicinam est salubre, apostematum quoque dissolutum, & contra uenenum propiciatum canuino. Frons des quoque ipsius arboris sunt cortices pomorum propinque in inuauinis actione, quia sunt odoriferae, & quiddam acuminis habent.

De Corno.

Cornus est arbor parua, quae licet nascatur in nemoribus, & sit communiter arbor syluestris, tamen quia domestica per culturam facit fructum ad quaedam utilem ideo de ipsa dicam. Haec arbor serè omnem aërem sustinet, & in omni terra maxime in pingui & in humida conualescit. Plantatur semine suo & plantulis, quae cum radicibus iuxta ipsas inueniuntur. Fructus eius maturitatem satetur cum ex rubedine colorè nigrum assumpsit, & facile ab arbore cadit. Ex ligno huius arboris quia durissimū & tenax est, fiunt optimi dentes molen dinorū & manubria malleorum, & uirgæ ad triturandum frumenta & carminandū lanam, & generaliter omnia quae ligni duritiem & tenacitatē requirūt, ideo utile est ex eis facere sepes, ubi nō est necessaria clausura spinarū, nam haec arbor spinas nō habet. Et quia non habetur ipsarū plantarū copia fiat seminarū, de semine eius tarde collecto, & ad solē siccato, seminetur aut mense Octobri & Nouēbri. Corna ualde de pontica & stiptica

stiptica sunt, & quanto minus sunt nigra, tanto magis pontica. Ad usum cibi non competunt, sed propter medicinam valent ad fluxum ventris & vomitum cōstringendū, qui fit ex acumine cholerae, propter ipsorum frigiditatem & stipticitatem. Item ex eis fit optimum acetum si p̄sidentur, & cum fortissimo aceto misceantur, & in pane formata & siccata seruentur, & uino cum opus fuerit misceantur.

De Fico.

Ficus est arbor nota, & eius quādam diuersitates sunt multae, ideo unusquisq; illa genera eligat, quae in loco in quo plantare desiderat, uel in simili uideat melius provenire: hoc tamen provideat, ut in locis aridis, macris, nō plantet eas. Item in locis non tutis, non plantet ea genera, quae cum folijs uel ante folia ficus producant. Haec arbor aërem calidum & temperatum desiderat, & in oriente & in mediocriter frigido cum hominis auxilio sustentatur, uidelicet si est ab oriente & meridie cooperta, & ab alijs duabus partibus aliquibus obstaculis munita. Item non impinguetur terra eius ne eam nimis teneram hyems inueniat, & tunc stipes eius paleis muniatur usq; ad ramos circūquaq; ligatis, & supra terram circa pedes fimus animalium recens ponatur, & maxime columbinus, qui recedente frigore post hyemem auferatur, nisi fuerit terra macra nimis, frigidum ualde aërem recusat, terram pinguem uel mediocrem desiderat, & in macra etiam & in sicca quaedam eius species defenduntur, in qua sicciores & dulciores fructus proveniunt, in pingui uero & humida aquosiores & minus dulces magisq; insipidi & grossiores. Plantantur plantulis aliunde acceptis, locis siccis mense Octobri & Novembri, temperatis mense Februario, frigidis uero mense Martio uel in mense Aprili si taleam uel cacumen ponas ultimo Martij uel in mense Aprilis cum eis se uiridis succus infuderit, si acumen ponas ramum binum uel trinum ab australi parte decides, & sic obrues, ut diuisa cacumina terra interiacentis

interiacente velut tres furculos reddant, talem sic ponemus ut ei leuiter ab una parte diuise lapide infisso mergemus, legende sunt plantae in quibus frequens nodus exuberet, quae uero nitidae sunt et oculos suos per longa internodia distulerunt steriles esse creditur. Si plantam fici nutries in seminario, & maturam in scrobem transaseras, poma generosiora producet, scrobes amat altas, & magna intervalia propter longitudinem radicum eius. In locis frigidis ficum seramus, quae cito ueniant, ut ante imbres genus hoc possit occurrere, calidis uero & arduosis, eam quae serius maturat. Ficus inferitur mense aprili inter corticem, uel si nouella sint arbores scisso ligno, statimque cooperiendum est & ligandum ne uentus introeat. Melius comprehendunt si circa terram resecta inserantur arbuta, aliqui & iunio mense inferunt. Varro scribit, quod ea quae uerno tempore inferuntur, possunt etiam circa solstitium inferi, ut ficus, quod densa materia non est, & ideo sequitur calidior, a quo fit, ut in locis frigidis ficus fieri non possunt, aqua recens inimica est, tenebunt cito facili putrefacere, ita quod canicule signo commodissime credimur ea inferi. Quae autem natura minus sunt mollia, uas aliud quod supra ligatur unde stillet lente aqua, ne prius arescat furculus quam coalescat. Cuius furculi corticem integrum seruandum & ita exacuendum, ut non diuidetur medulla, ne extrinsecus imbres noceant, aut nimius calor, argilla obliniendum & libro ligandum. Cato scribit quod etiam per uindemiam ficus inferi potest. Furculus est legendus anniculus, inutilis enim creditur maioris uel minoris etatis. Item inoculari siue emplastrari & ad buccellam inferi potest mense maio & aprili, iunio & iulio. Inferitur autem in caprifigo, in moro, & in platano & oculis & furculis. Gaudeatur assidua fossione, cui multum proderit si per autumnum Rercus apponas maxime de armentis. Formatur ficus in locis frigidis ut unum solum habeat stipitem a terra modicum eleuatum, sic enim melius a frigore defendetur, in locis uero calidis unum uel plura

res, dummodo non ultra tres vel quatuor stipites habeat pro domini voluntate, rescindenda sunt in ea quaecumque aut putrida aut male nata reperies, & ea ratione putanda est ut inclinata per latera possit expandi. Truncus arboris scarificandus, quo loco tumet, ut humor possit fluere, ne vermes creet, qui si creati fuerint uncis ferreis trahantur seu tollantur à fico. Alij solam calcem vivam lasebris vermium apponunt. Si formicæ molesta sunt, rubrica, butiro & piceliquida mixta, circa truncum induci debet. Si fructus suos velut ægra projicit, aliqui radici terebrate cuncum insigunt, vel securi arboris corium sæpe proscindant cum folia incipit producere. Fici ut multum & pinguem faciant fructum in principio germinis cacumina summa decidamus, vel hoc tantum cacumine quod ex arboris medietate procedit. Ut ficus cito maturet, succum cepæ longioris cum oleo & pipere mixto unge poma quando grossa incipiunt subrubere. Ficus virides servari possunt vel in melle ordinate ne se contingant, vel singulae intra viridem cucurbitam clausis locis unicuique cavatis. Siccantur autem & servantur hoc modo, quo Campania tota custodit. In cratibus ficus expanditur usque ad meridiem, & adhuc mollis in qualum refunditur, tunc calefacto furno ubi bis cocta ficus fuerit sicut est calida interpositis folijs suis in vase fistule clauditur bene picatum densius pressa, & operculo diligenter obducitur. Si pluvij abundantibus crates non potes expandere sub tecto eas ita compones, ut semipede erigatur à terra, & eas ad lucem solis cui subiectus vaporet, subinde ficus sicut est divisa vertatur, ut ficorum coria & pulpe siccentur, tunc duplicata in cisternis servantur aut loculis. Alij maturas mediocriter ficus & divisas in cratibus expandunt, coctas sole siccandas, & recipiunt nocte sub tecto. Ficus sicca cum pinguedine sua servantur. Secundum Hispanorum morem hoc modo, siccantur mediocriter & optime refrigerate in vase aliquo componantur, & ponderate bene servantur, ficus sicca quas cescnates optimas habent, procurantur hoc modo

Modo ab eis, colliguntur ficus grassule mediocriter mat. & ad solem per biduum integræ dimittuntur, deinde pinguiorcs scinduntur per medium ex transverso, & iterum parte inferiori seu interiori conuersa ad solem duobus uel tribus diebus siccantur, uel duobus simul iunctis, ac iterum duobus uel tribus diebus ad solem relictis, tandem in testa ponantur & iterum ad solem triduo dimittuntur, deinde in serinio per quindecim dies tenentur, & postea iterum ad solem si necessarium uidebitur reponuntur, quibus postea refrigeratis in aliquo uase stricte fortiter ponderantur, & caueant siccantur ut imbrem & pluuiam unquam tanguant. Ficus ceteris fructibus laudabilior est & nutritibilior, sed grossos creat humores, uirides uero sunt cruda non perfecte matura, parum est calida magis grossa, propter dominium terrestris partis in ea. Vnde Hippocrates ficus quando longinquior à maturitate tanto minus calida est & grossa, perfecta matura est, calida in primo gradu, & temperata inter humiditatem & siccitatem. Ficus ex trium rerum compositione consistit, scilicet semine, pulpa & cortice, seminis nutrimentum nullum, ut arene uel lapidis, cortex siccus est ut cutis, propterea durissimus ad digerendum, caro nutritibilior salubriorq; existit. Sicca uero ficus calida est in principio secundi gradus, sicca in medio primi, quamobrem calefacit, & sitim creat & in cholericos mutatur humores, ceteris tamen fructibus nutritibilior est, minusq; inflationis habet, sed si superfluos in stomacho humores inuenit, dura fit ad digerendum, ad corruptionemq; mutatur, & inflationem & uentositatem generat, ac pessimum sanguinem, in superficie etiam corporum pediculos creat, si autem humoribus mundificatos inueniat, bene digeritur, ac sanguinem laudabilem facit, corpusq; pulmonem, renes & intestina ab humoribus grossis mundificat. Quia uult eius uentositates uitare, ieiunius accipiat, & post ipsas peper & zinziberim, & ut laudabilem sanguinem

guinem generat, nuces simul siccat aut amygdala manducet. Item secundum medicinam ualet si cum byssopo coquatur, pectus pulmonemq; mundificat, tussim diuturnam emendat, gargarissata in hunc modum in cannalibus pulmonis apostemata dissoluit. Cocta in uino si clystere fiat, ualet ad dolorem uentris, qui ex grossis procedit humoribus. Auicenna dicit, quod alba est melior, deinde rubra, postea nigra, & succus foliorum eius uehementis est calefactionis & absterfionis, & in ipsa quidem est lenificatio ultima, & lac quidem eius coagulat liquefactionem sanguinis & lactis, & liquefacit congelatum, & illa quidem que humida est uelocis est nutrimenti, & in ramis quidem fici incit tantum subtiliationis, quod quando caro coquitur cum eis, dissoluitur, & ficuum decoctio confert apostematibus gutturis, & apostematibus radicum aurium gargarissata, lac eius confert punctura scorpionis in uentre, & similiter rutelle, & similiter illa que est immatura, aut folia recentia apponuntur super morsum canis rabidi & conferunt.

De Lauro.

LAURUS est arbor satis magna, cuius frondes late & longe & solide, semper uirides & odoriferæ ualde sunt, cuius arboris est fructus quem orbatam uocant niger & paruas. In omni ferè aëre prouenit, maxime in temperato & calido delectatur, terram solutam & maritimam diligit. Plantatur ramis & surculis aut semine eius mense Martio proprie cū humor ad corticem ramorum peruenit. Eius folia & rami sunt optima ut in eis fici sicce seruentur, & in geladia ponuntur, ut eam odoriferā reddant, circa diacitoniten parua ipsius frustra ponuntur, in quacunque autem re adcoquendum ponantur plurimum eius odorem augent, & stomachum ac cerebrum odore ac sua ponticitate confortant. Fructus eius qui orbatam dicitur, in uino musta infecto posuit sanat, sed ipsum suo sapore satis incongruo inspicit. Auicenna dicit, quod

grana

grana, cortices & folia eius sicca & calida sunt, sed grana sunt calidiora & sicciora, nam sunt in secundo gradu, & eius oleū est calidius oleo nucum, & confert doloribus neruorum omnibus, & resoluit laxitudinem, & quando de cortice eius aut granis bibitur auarus frangit lapidem, & interficit scetum propter suam amaritudinem additam super amaritudinem aliorum, & confert morsus scorpiorum cum uino, & est bona uestipe & api quando pungunt, & omnino est theriacal uenenis omnibus bibita. Dioscor. dicit, quod frondes lauri libros & uestes cum quibus ponuntur à tinea defendant, & à uermibus & corrosione tutos reddunt.

De Malo.

Malus est arbor notissima, & eius quidē diuersitates sunt multe, nam quedam mala mense Iulio & Iunio maturantur, que si usq; ad completam maturationē in arbore dimittuntur sunt dulcia & odorifera ualde, quedam parua, quedam mediocria, quedam rubra, quedā crocea, quedam uiridia, quedam dulcia, & quedam acetosa, & quedam pontica & acris, & quedam longa, & quedam lata, & quedam rotunda, & quedam diuersuabilia, quedam parua, quedam dura & solida, quedam molalia & facile frangibilia, quedam in arbore durabilia, & quedam facile cadentia. Sunt autem malorum multe species, quorum meliores aut deteriores quilibet poterit per experientiam in qualibet regione eligere uel refutare, hæc arbor & in omni aëre prouenit, & pingue ac letum solum diligit, cui humorem non tam rigatio quam natura suppeditet, & si arena uel argilla sit irrigationibus adiungetur, montanis locis debet ad meridiē uersa constitui. Macer & aridus locus poma uermiculosa, & caduca facit. Scribitur rami & semine, sed tardius est in utroq; prouentus, melius igitur in locis calidis Octobri & Nouembri: in frigidis uero Februario & Martio. Plantas syluestres malorum ponamus, & cum conuenerint insecantur spacia uero inter ipsas arbores 20 pedum esse debent.

Malus inferi potest in se, piro, spina, sorbo, ficu, platano, populo, & salice, mense Februario & Martio per solstitiū quinquaginta dies, ut ait Cato, & alijs, quibus pirus, in cortice & trunco, emplastro & ad buccellam, & in amidam uel salicis peritica perforata, ut in generalibus est traditū plene, libro secundo. Hæ arbores primo plantationis suæ anno circumfodiuntur, & ab herbis omnibus liberentur, quolibet mense æstatis, deinde quibusdam annis bis uel ter quælibet circumfodiuntur æstate, sed postquam cōsuauerit ut & suas radices fundauerint, neq; exarari neq; effodi desiderant: circum marginis eis prata conuenient, stercus non exigunt quidem, sed libenter assument, & maxime si eis cineres misceantur. Amant moderatas irrigatiōes, putatio his apta est, & maxime arida & male nata tollantur: formantur sex uel octo pedibus stipes erigatur à terra, quæ alio stipiti nunquam sociatus existat, cureturq; ut stipes in multos diuidatur ramos, & rami in uirgas & fragra, quæ fructum ferant, & quod æqualiter per omnia latera expandatur, taliter quod rami quandoq; nimium onerati ligamine apposito sustententur, & hæc in capitulo communi de arboribus plenus sunt tractata. Accidit scilicet huic plantæ quod poma eius sint caduca, quod si euenierit scissa radici lapis iniectus poma tenebit. Si spissa poma ramos onerauerint mense Iunio & Iulio interlegenda sunt, quæq; utiosa, ut succus ad meliora uertatur, generosis abundantiam ministret, quæ minus microsa uilitate perdebant, & si hoc commode fieri nō possit, palis, pecticis & funibus defendantur à ruptura ramorum ne copiosa ipsarum liberalitas uertatur eis in interitiū & perniciem Colligenda sunt, cum colore, odore & sapore dulci maturitatem fatentur, seruabilia uero colligenda sunt circa finem Septembris, & usq; ad medium mensis Octobris, quando casu plurimum sanorum, & migredine seminum maturitatē præciunt, cum longius stipes, usq; ad ramos quos attingere possunt, ab inde supra cum manibus debilibus rami cum funibus uel uncinis ad forices bene firmatis. Legenda sunt diligenter

diligenter que volumus mala seruare, & ea ponenda sunt in obscuro loco ubi uentus nō sit uel paruus, ut ait Var. Nā si foris sint fenestre claudantur fenestre stramētis, prius i cratic suppositis uel paleis aut loco aut in cumulos secreta disponimus, aliqui oīa simul ponūt. Vinū & acetū fit de malis sicut de piris infra dicetur. Poma diuidūtur in duo, scilicet in cruda, nō matura ac in cōpleta, & perfecte in sua arbore maturata, cruda dura sunt & lignea, male nutriunt, stomacho nocent, dolorem generant, & uenas non penetrant, & contrā assuescitio causa est febris diuturne, que dure dissoluitur, quod & de ceteris fructibus intelligendum est, & qui non sunt perfecte in arboribus maturati. Perfecite in sua arbore maturata diuersa sunt pro sui diuersitate saporis, quedā enim sunt pontica, quedam acetosa, quedam dulcia, quedā sunt terrestria frigida & secca, & ad digerendū dura seu tarda, multum autē stomachū confortatiua, propterea quod stomachū comprimunt & humiditatē superfluam ibi inuentam descendere faciunt, sunt etiam egestionis cōstrictiona, maxime si ante cibum sumantur, & conuenientia his sunt quorum stomacho calor & humiditas dominatur, sed sunt grossa digeri & dura, tarde penetrantia uenas, inflationem faciunt, neruis nocent, liquor uero eorum laudabilior & subtilior est & lenior, idcirco stomachum cōfortat & intestina, & ualet ad sanguinis fluxum & ad dyssenteriā ex cholericā digestionē & uomitū, propterea quod morū huiusmodi succus debet madēdo exprimi, caro uero eijci. Maturatur autē eorū asperitas & duritia tribus modis, aut illa elixando in aqua, ut ex aqua humiditatē attrahat & mollitiem, aut super summū aque calide suspēdenda ut humedētur & maturētur, aut scissa per mediū granis interioribus duris reiectis eorū locis meli & saccharū apponendo, secundū naturā accipientū, & pasta inmoluendo, & in cineribus calidis & prunis dimittendo donec pasta exterius decoquat. Huiusmodi enim ars mollitiē præstat, & maturitatē, saporositatē, et ad digerendū uelocitatē, et noxitatē eorū in neruos aufert.

Acetosus

Acetosus autem dominatur aquosa substantia, cum terrestri exigua, quare frigida eorum & siccitate temperantiores sunt ponticis propter uiciniam liquoris aërea natura, unde actio eius composita cum sua stipticitate confortat & constringit stomachum, & uentrem & egestionem cholericam & uomitum inhibet, cum frigida tate & tenuitate liquoris sitim extinguit, & acumi cholerae rubrae & cardiacae cholerae vires auferit & humores grossos qui calidi sunt in stomacho destruit, dulces uero chimos tenuat, ut totum corpus ualeant penetrare. Huiusmodi poma ante cibum & post cibum sunt bona edi, sed pira ante cibum sunt nocua, dulcia uero quia temperata sunt inter quatuor qualitates stomacho minime nocent, & ad constrictionem uel laxationem uentris uim manifestam non habent. Prondes, rami, cortices quia stiptici sunt & accidi confortatiui sunt stomachi, uulnera sanant, & humores malos ad ea concurrere prohibent. Auicenna dicit, quod in eorum substantia dominatur humiditas superflua & frigida sunt, illa quae sunt uehementius dulcedinis, in caliditate sunt temperata, aut declinant ad eam, & in pomis quidem est inflatio, & proprie in eis quae non sunt dulcia, & insipida sunt aquae ualde ad partem humidam superflue declinant. Et acetosa & immatura generant phlegma, putredines, & febres proprietate sui humoris & suae cruditatis, quia facile recipiunt putrefactiones. Et uinum pomorum & reliquorum antiquum est melius quam recens, propter resolutionem uaporum malorum ab eo. Et assiduitas comestionis pomorum facit euenire dolores neruorum. Et proprie uernalia & odorifera confortant cor, & si sitibi angustia ex caliditate, sunt magni iuuamenti, & confortant debilitatem stomachi quae stiptica sunt aut pontica uel acetosa, & conferunt dyssenteria, maxime pontica, & tam poma quam succus & folia conferunt uenenis.

De Malispunicis.



Alapunica sunt malagranata, quæ nota sunt, ex quibus quedam sunt dulcia, quedam acris sine acetosa, quedam autem mediocris saporis inter dulcia & acris. Regio illis apta est calida aut quæ temperata existit, frigidam uero sustinere non potest. Solum cretosum amat hæc arbor, & insoluto etiam conualescit, item macilentum, licet etiam in pingui proveniat. Albertus tamen dicit, quod nulli solum arenosum & pingue. Scribitur plantis de matrum radice exulsis, melius si ramus eius cubicularis incisus in anubrij grossitudine, ac de utroq; capite falce lenigatus acuta velut obliquus immergitur, prius tamen porcino stercore & in capite & in parte quæ ima est liniatur. Vel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora defigi. Melius tamen proveniet, si ponendus ramus gemmata iam matre sumatur, curandumq; est ne virgulta ponas inversa siue corticibus spoliata. Si in scrobem depones tres lapillos in ipsa radice constitutos, providetur ut Palladius ait, ne poma scindantur. Fiant autem prædictæ plantationes locis temperatis martio vel aprilis, calidis autem & siccis novembri inseri posse dicunt. Et inseruntur ramorum connexionem, ut medulla utriusq; divisa se iungat. In se tantum inseri potest circa finem martij Kalend. aprilis, in trunco scribitur in quo furculus recentissimus statim inseri debet, ne mora exigui qui est exiccet humorem. Circumfodi debent autumno & vere, & formari ut duos vel tres habeant stipites, à terra modicum elevatos & singulis annis rescindi omnia quæ in stipite nascentur, aut etiam circa radices. Plantæ illi accidunt nocumenta, quare si arida fiunt rigentur absque, nam humiditas moderata suavitatem præstat & copiam, cuius tamen radicibus cuneus seu clavis debet infigi. Alij algam marinam obruant ad radices, cui nonnulli stercore asinum atq; porcina miscent. Si florem non continet cum aqua pari mensura temperabis, & ter per annum radicibus infundes, vel amurcam mittes infusam; vel

radicibus algaminiges, bisq; rigabis in mense, uel arboris florentis truncum, ut Palladius ait, plumbeo-circulo debebis includere, uel corio anguis involuere. Si crepant poma lapidem in media arboris radice suppones, uel squillam circa arborem seras. Si uermibus laborant, & tangas radices felle bubulo, continuo morientur, aut si clauo aeneo uermes eiusdem purges, difficile nascentur, uel asini urina stercorei admixta porcino uermibus obuiabis. Licinio circa punici truncum frequenter infuso lata & fructuosa punica reddi arbuta. Afferit Martialis candida in his grana fieri, si argille & crete pariè quartam gypsi misceas, toto triennio hoc genus terræ radicibus eius adiungas. Itē dicit miræ magnitudinis poma fieri, si olla fictilis circa punici arbore obruatur, & in ea ramus cum flore claudatur, ne resiliat ligatus ad palum, tunc cooperita olla contra aquæ muniatur incursus, autumno patefacta suæ magnitudinis poma uidebit. Multa in punico ait poma procedere si thimali & portulacæ succus æqualiter mixtus antequam germinet illiniatur arbor in trunco. Colliguntur autem cum suorum granorum rubedine completa maturitatem præstendunt. Seruantur si picatis appendiculis ordinate suspendas, uel aliter lecta integra in aquam marinam uel salsam mittantur ut combibam, post triduum sole siccentur, ut sub diuo nocte permaneant, postea in loco frigido suspendantur, & cum eis uti uolucris, dulci aqua pridie macerabis. Item si induantur argilla, & ea siccata frigido loco pendeant. Item si olla sub diuo obruta quæ habeat arenas usq; ad medium, & mala cum tenacibus lecta impræmantur cannis singulis, uel sambuci uirgultis, & ita separata in arenis figantur, ut quatuor digitis emineant ab arena, & hoc sub tecto in scrobe fieri potest, & utilius est ad seruandum si non ramo longior tollantur. Aliter in seriola cui ad medium aquæ mittatur suspenduntur mala ne humorem tangam, & seria clauduntur ne uentus irrumpat. Item in dolio sic ordinantur inter ordēum, ne se inuicem tangat

hægant, & dolum desuper operitur. Ex malis granatis hoc modo fit unum, grana matura diligenter purgata in palmeam fissellam mittas, & in corbea exprimis, & leniter coquis usq; ad medietatē, & cum refrigeraverit picatis & gypsatis uasculis claudis. Alij succum non excoquant, sed singulis sextarijs libras singulas melis miscent & in prædicto vase custodiunt. Ex malis punicis fiunt optime sepes spissæ & spinosæ, fortes & multū ferentes fructum. Malapunica utiliora sunt medicinae quam esui, nutrimentum quippe eorum & si laudabile est & bonum, tamen parum propter subtilitatem eorū facilius digestionem. Hæc autem quatuor partibus composita sunt, quæ omnes slipticæ sunt, prima est cortex, secunda caro, tertia liquor, quarta grana, liquor frigidus est, sed diversis modis, secundum suos saporēs & liquiditates, sunt nam pontica, acida, mura, dulcia & insipida, pontica impossibile est accipi secundum cibum, quia propter asperitatem & duriciem abhorret ab eis natura, nec recipit nisi secundū medicinam, proinde huiusmodi malagranata si parum in superficie excorticentur & ipsorū succus aut cum uino aut cum sirupo laxativo potetur, superiora stomachi exprimunt, & expellunt humiditatem putrefactam de inferioribus, & post mandificationes stomachum confortant absq; lesione nervorum eius, idcirco ualet ad febres diurnas, quæ ex putrefactis humoribus procreantur, & ad pruriginē & scabiem de putredine salis phlegmatis ortā. Acida in multis rebus propter paruitatem terrestris substantiæ, melioris sunt actionis quam cetera, calores epatis extinguunt, mēbra confortat, & præsertim os stomachi, epas & cor, unde ualet ad cardiacā cholericā, & ad dolorem qui nascitur in ore stomachi, ex cholera rubra, habet etiam hoc propriū, q; in oculis ictericorū stillatū citrinum ab eis abijcit colorē, propterea si ablato cortice malagranata acetosa omnia possentur, & succus extractus cum melle coquatur, ut unguenti similitudinem habeat, ualet ad expulsionem uuguum, oculorum purificatq;

aciem à grossis & viscosis humoribus. Malignanati liquor dulci⁹
 grossior est & calidior & digestibilior, & propterea caloris ali-
 quantulum stomacho ingerit, citoq; in choleram rubeam mutatur,
 & ideo febricitantibus est incōueniens, sed humectat uentrem, pe-
 ctoris lenit asperitatem, & tussi mītigatio nē tribuit. Muzum uero
 quod est inter dulce & acetosum medium ad epatis calorē non mi-
 nus ualeat & stomachi quā acetosum, sed nim uomitū compeſcen-
 di ac uentrem constringendi nō habet. Inſipidum quoq; quod quasi
 aquae saporem refert, propter sui liquoris & aquositatis copiam ad
 frigiditatem pertinet, unde est inconueniens & secundum medici-
 nam & secundum potum, secundum cibum quia saporem non ha-
 bet, ut membris attrahat, secundum medicinam, quia propter aquo-
 sitatem nec stomachum confortat, nec uomitum, nec solutionē pro-
 bibet: idcirco fastidium facit stomacho, de bilē & exilem mollemq;
 ipsum reddit, & cibum in stomacho digerere non permittit, unde fit
 causa rugitus. Malorum granatorū nuclei à succo expressi sunt uti-
 les ad uomitum cholericum constringendum, & egestionem: prae-
 cipue si assantur, eorumq; puluis bibatur, calorem etiam stomachi
 atq; cholerae rubae acumen extinguunt, eorum uero cortices frigide
 ac siccae & terrestres sunt, quod si in aqua coquantur, ut fiat cly-
 ſtere ualeat contra dyſſenteriam & diarrhæam. Item decoctio ex eis
 facta gingiuas confortat, & constringit fluxum sanguinis haemor-
 rhoidorum & mulierum. Item idem cortex in uino coctus & pota-
 tus lumbricos, ascarides & cucurbitinos ex uētre mortuos abiicit.
 Flos corūque balauſtia uocatur stipticior & siccior est praedictis
 omnibus, debet aliquantulū siccari, & nītreo uase recondi, est enim
 frigidum & siccum in secundo gradu, & seruat in multa efficacia
 per duos annos. Valeat etiam contra uomitum cholericum & fluxum
 uentris ex debilitate uirtutis contentinae, nam contra uomitum cho-
 lericum terantur balauſtiae, & coquantur in aceto, & sponsia ine-
 uincta ponatur super surcula pectoris, & cōtra fluxum coquantur in
 aqua

aqua pluviali & fiat somentum. Avicenna dicit, quod cortex mali-
granati & balaustie utrumq; retinet omnem fluxum sanguinis, &
cōsolidat plagas & ulcera antiqua, & fortes efficit dentes motos.

De Moro.

Morus est arbor nota, plurimum vitis amica, quæ calidum
desiderat aërem aut temperatum, frigidum uero recu-
sat. Loca autem querit sabulosa & plerūq; maritima, &
in mediocriter soluta provenit, sed in topha uel argilla uix compre-
hendit, stercore uel terra pingui ualde letatur, idcoq; inter domos
in ciuitatibus ubi est multa pinguedo plurimum letatur, & magis
uiridisq; efficitur. Seri potest locis temperatis mense Martio & cir-
ca finē Februarij, calidis uero mense Octobri & Nouembri. Seri
autem potest semine, sed poma & uirgulta degenerant, melius au-
tem seritur taleis & cacuminibus & melius taleis sexquipedalibus
ex utraq; leuigatis & fimo oblitis, cum scrobem ante fecerimus, im-
mergamus, & cinere terre admixto tegamus, nec amplius quā qua-
tuor digitis supra terram relinquamus. Plantam robustam transfe-
ras mense Octobri & Nouembri, teneram Februarij & Martij.
Scribes desiderant altas & interualla magna 30 pedum uel circa,
ne una umbris prematur alterius, & in radicibus se impediat. Inse-
ritur autem in se, & in persico, secundum quosdam & in ficu, ulmo
etiam insita, ut ait Palladius, comprehendit. Morus ablaqueandus
est, & radicibus eius uini seces ueteris recentissime insundendæ.
Formanda est autem, ut uno stipite sit contenta, & rami principa-
les circa octo pedes eleuentur à terra uel plus aut minus, secundum
quod in lato fuerit solo uel exili; ut in lato altiores, in exili depres-
siores formentur. Feracem latioremq; mori arbore aliqui fieri tra-
diderunt, si perforato hinc inde trunco, singulos cuneos inseramus
terebinthi, accidit præterea nocumētum magnum moro, ut eius im-
mediatè augmentum & fructibus eius, ut omnino inutiles fiant, si sua
is folijs spolientur, & maxime si non fuerint quæ in summitatibus

sunt ramusculorum in eis relicta: uel quod peius est, si sint ipse sum-
 mitates cum frondibus collectæ, ut sæpe importune nimium faciunt
 mulieres, cum eas propter escas uermium colligunt, quæ uermibus
 sunt optimus cibus. Colliguntur statim cū uermes nati fuerint, usq[ue]
 quo à cibo desistunt, & incipiunt opus facere. Fructus autem cum
 sua nigredine & teneritudine maturitatem fatentur. Mora duobus
 sunt modis, acris non perfecte matura, aut perfecte dulcia matura
 ta: Acris frigida sunt & sicca, u. m. habent stipiticam, stomacho &
 intestinorum confortatiuam, & uentrem constipant, quare humore
 re siccata ualent ad diarrhœam & dyssenteriã, maxime siccata secho-
 lerica sint. Item eorum succus plurimum ualet ad gutturis & fau-
 cum & urinae dolorem, & maxime cum sapa & modico saccharo
 coctus, matura autem & dulcia modicum ad calcrem pertinent, ad
 humiditatem uero multum, quare cito de stomacho eiciuntur, nena-
 trem humectant, & urinam prouocant. Si tamen cibum in stomac-
 cho ante se acceptum inuenerint, commorante cibo resistente, in cor-
 ruptionem conuertuntur, & stomacho ac epati & capiti nocent.
 Si uero stomachum uacuum inuenerint, bene digeruntur, modicum
 tamē nutriunt. Ieiunis accepta in aqua uel uino refrigeratiua sunt.
 Refrigerantia ualde sitim auferunt & incensionem caloris exting-
 guunt. Radix mori cum aqua cocta & potata uentrē humectat, &
 lumbricos & cucurbitinos expellit. Si uero frondes simul cum ra-
 dice coquantur, & aqua eorū retineatur in ore, ualet ad dolorem
 dentium, si autem cum uino coquantur, & gargarismus fiat, ualet
 contra humores, ad uiam descendentem & guttur. Si pilulata mo-
 ri radix in aceto ponatur ad solem, & diebus 12 dimittatur, & de-
 siccata redigatur in puluerem, hic dentes perforatos & putridos
 euellit appositus. Auicenna dicit, quod morum est malū stomacho
 nam corrumpitur in eo, & quando corrumpitur, stomacho ueloci-
 ter nocet. Et oportet quod comedantur omnes species ante cibum,
 & recipiantur in stomacho in quo non sit corruptio, & morū quod
 salutem

salutū est & siccitū, retinet uentrē uehementer & prodest dyssenterie, & in cortice eius est mundificatio & solutio eius est plurima, & in omnibus speciebus mori est provocatio urinae, & cortex mori est theriaca hyoscyami.

De Muniaco.

Muniacus est arbor quedā, quæ est quasi similis pruno, sed est magis nodosa, & eius fructus est magnitudinis cōmuniū prunorū, similis fructuum persicorū in forma, tamen est ualde odoriferū, & in calore aurcū eius pomū, aërem & terrā desiderat ut prunus, solutū tamē solū desiderat non argillā, uel cretam. Seritur semine, mense Februario, & Martio transplantantur, in se uero pruno & persico & forsan amygdalo potest inseri. Circūfodi debet assidue, & siccis temporibus irrigari, atq; putrida & arida in ea recidi, atq; ut prunus formari, minus sunt humida poma eius quā persica, aut pruna, magis tamē stomacho & cerebro cōfortatiua, cum optime matura existunt, quod eorum color, sapor, & odor aperte demonstrat.

De Mespilo.

Mespilus arbor nota. Et ex pomis eius quedam sunt grossa, domestica, media, pōuca: & quedam sunt syluestria parua, ualde pōuca. Aërem calidum, temperatum & frigidū sustinent, & terram desiderant sabulosam, & pinguem, uel glaucosam, cui arena permixta est, uel argilla cū saxis. Seritur mense Martio uel Nouembri taleis, sed solo stercore aruo, ita quod urunq; caput sterqus obruat. Seritur & semine, sed in longam speratur etatem, inseritur in se, in piro, & pomo, in spina alba, & citonio. Sarculus autē eius ex arbore media debet assimi, nam de summitatibus uitiōsus est. In trunco fissio inserenda est, nā corticis materies ieiuna non potest nutrire, & amat putari & circūfodi, finus & uitū cinis, si radicibus infundatur, eam fertilem reddunt, formatur ut modicum
supra

supra terram, scilicet circa quatuor pedes habeat stipites siue ramos, & exteriorae leuati tendantur, ut altitudinē bonā excedant. Albertus autem dicit, quod quando insitio fit de eis in truncum alterius generis scilicet mali, uel piri, uel etiam alicuius spinæ magnæ quæ est similis fago, in ligno ac cortice, & uocatur spinæ sagina uel ganter, crescūt mēspila maiora, & meliora quā sint alia, si autem deiecerunt mēspila in aliqua regione, expertum est, ut dicit Albertus, quod scribitur fagrum perfici in truncum spinæ magnæ quæ est similis fago, crescunt mēspila maiora & meliora, quæ non producūt ossa. Ego autem sepe inserui mēspila in pērum, & malum in coctanum, & spinam albam & non inueni ossibus carere, nec in quantitate augeri. Si uernibus occupatur stilo eneo secundum Palladium sunt purgandi, & amara uel humana ueteri urina uel calce perfundendi, sed parcius propter arboris noxam, uel aqua decocta cū lupinis. Sed putatur hæc arbor sterilis fieri, si formicæ infestæ sunt, rubrica cum aceto & cinere temperata necabunt. Si poma labuntur frustum de eius radice abscisum uel præcisum in media trunci parte figamus. Mēspila ad seruandum legantur nondum mitia, quæ & in arbore diu durabunt, uel in uasculis picatis, uel in ordinē suspensa, uel cum pēdiulis semimaturæ & aqua salsa per quinque dies macrata, ita tamen ne innatent. Die serena legantur ac media, & paleis obruantur discretæ, ne ea uicissim talius officiat. Seruantur & in melle, si nimis matura collegeris. Ex mēspilis fieri bonæ sepes possunt, si spisse plantentur, uel uirgis propaginentur, uel spinis albis sepius inserantur. Mēspila siue frigida sunt et sicca in primo gradu: proprietates habent stomachum confortandi, & cholericam egestionem ac uomitum auferunt, urinam prouocant, magisq; ad medicinam pertinent quam ad cibum, parum enim nutriunt et grossum faciunt cibum. Meliora sunt si ante cibum sumantur quam post, quia stomachi sunt confortatiua & neruositati eius non nocua.

De Myrto.

Myrus est frutex in littore maris, super quo mare sepe
exundat precipue abundans. Aërem querit calidum aut
temperatum aut frigidum, secundum Albertum. Terram autem de
siderat sabulosam, solutam, macram, & heremi proprietates ha-
bentem. Scribitur plantis ab ipsa matre ciuissis, myrtuli qui sunt fru-
ctus eius frigidi sicut in primo gradu, & sicci in secundo, principa-
liter competunt medicine, secundario folia & flores, & quanto
recentiores sunt fructus & flores, tanto meliores. Fructus post ma-
turitatem collectus in magna efficacia per biennium seruantur, ad
solem debent siccari, flores autem non possunt diu seruari, sed sola
folia diutius, uirtutem habent constringendi ex ponticitate, & con-
fortandi ex aromaticitate. Contra uomitum & fluxum uentris &
profluuium mulierum ex debilitate uirtutis continentiae uel ex humi-
ditate, dentur ipsi fructus ad comedendum uel succus expressus de-
tur, etiā sirupus ex succo eorum & saccharo addito, quod optimū
est contra praedicta, & potest per annum seruari, si bene coqua-
tur succus. Si uero nō habes saccharum adde mel ex puluere uel fru-
ctibus decoctis, & albumine oui, fiat emplastrum circa os stoma-
chi, contra uomitum, & contra dyssenteriam, circa renes, & pe-
ctinem, & umbilicum. Fiat etiam fomentum ex aqua pluuiali de-
coctionis foliorum eius circa inferiora propter fluxum & dyssente-
riam, & profluuiorū mulierum. Item fomentum ex hac aqua circa
frontem, & tempora & pedes, somnū prouocat in febre acuta, &
soluit dolorem capitis ex caliditate. Et fasciculi summitatis eius in
aceto uel aqua pluuiali cocti & super os stomachi positi refrenant
uomitum, & super renes, pectus & umbilicū, ualent contra fluxum
uentris, & in acuta febre soluant dolorem, qui fit ex acumine dolo-
ris dissoluentis. Sirupus ex frondibus factus miro modo ualet con-
tra praedicta, puluis etiam florum ipsius datus in cibis ad eadem ual-
let, & ulceribus superpositus consolidat. Item puluis myrtulorum

Et florum eius mane ante cibum datus confert laborantibus fœtore oris qui stomachi uitio factus est. Auicenna dicit, quod retinet solutionem, et sudorem, et omnem fluxum sanguinis, et omnem fluxum ad membra, et quando cum eo fit fricatio in balneo confortatur corpus, desiccantur humiditates quæ sunt sub cute. Item oleum et succus eius et decoctio ipsius confortant radices capillorum et prohibent casum et perlongant eos et denigrant. Et proprie eius fructus semina et folia eius sicca prohibent fœtorem axillarum et inguinum. Item sedant apostemata calida, et adustionem ignis cum oleo: et similiter emplastrum ex ipso fructu et prohibet à morbis uiscæ. Item emplastrum factum ex fructibus eiusdem coctum cum uino est conueniens mollificationi iuncturarum. Et eius folia cum uino decoquantur, et fit inde emplastrum sedant fœdum uehementem, item sedat ophthalmiam, et cum decoquitur cum ordeo seu oleo, sanat eorum apostemata. Item confortat cor et aufert tremorem cordis. Item confortat stomachum, et proprie robur eius, et eius semina prohibent cursum superfluitatum ad stomachum. Item est bonus in prohibendo menstrua. Item eius succus confert puncturæ scorpionis.

De Nuce.

Nux dicitur à nocendo, eo quod umbra eius nocet alijs arboribus. Hæc arbor nullum recusat aërem, neque genus terre, licet in pingui soluto latior et maior efficiatur. Seruitur extremo ianuario nucibus suis, eo modo quo seruntur amygdala et eisdem mensibus. Sed quas nouembri disponis aliquatenus sole siccabis et exiccetur noxiū uirus humoris. Quas uero mense ianuario uel februario positurus es, aqua simplici pridie macerabis. Ponentur autem transuerse ut latus electo cacumine, id est, ipsa tarma figatur in terram. Cacumen ipsum cum in seminario uel alibi nucem componimus ad partem dirigimus aquilonis, lapis subtus uel testa, ut ait Palladius, ponenda est, ut radicem non simpliciter sed repercussa respergat. Transplantatur in locis calidis et siccis mense octobri, cum casum

sum foliorū passa est, & melius mense nouēbri, in frigidis uero mēse februario & martio. Sed in temperatis satis cōmode utroq; tempore transplantatur, biennalis in frigidis, & triennalis in calidis regionibus transferatur. Radices autem plantarū in hoc refecare nō debes. Latior fiet si sepius transferatur, fimo bubulo planta est obducenda. Sed melius cinis in locis frigidis, & sabulum in calidis spargetur in scrobibus, ne calore stercoris aduratur. Nam & cinis creditur corticem, & tenebritudinem procurare & fructuum densitatem, altis delectatur scrobibus pro arboris magnitudine, & inter ualla maiora desiderat, scilicet quadraginta uel quinquaginta pedum ad minus, quia stillicidijs foliorum suorū proximis uel sui generis nocebit arboribus. Inseritur autem in se in trunco februario mēse, & in pruno, ut ait Albertus. Debet aliquando circūfodi, ne cana fiat uitio senectutis, & cānalis longus à summo trūco usq; ad innū tempore ueris debet extendi, ut beneficio solis & uenti durecant quæ in putredinem transibant. Sormatur autem ut sex uel octo aut decem pedibus, stipes earum eleuetur in altum ibiq; diuidatur in ramos, qui primo sursum deinde procedente tempore flectentur inferius, & per magna latera se diffundent. Si dura nux erit, uel nodosa, stricta, ut inde nucleum facile auferri non possit. Cortex circūcidendus est, ut uitrū mali deducat humoris. Alij radicum summa præscindunt. Alij terebratæ radici palum de buxo imprimunt, uel cuprinum clauum, aut ferreum figunt, sed ea inutilia puto, & oemini ratione carere. Colligunt autem eas perticis excutiendo, cum inter nucleum & testam aliqua rubedo apparet, aut cum exterioribus corticibus incipiunt posse expoliari, ut in acernum congregantur, ut quibusdam diebus elapsis possint cum lapidibus aut modico ligno ductis corticibus facile remoueri. Deinde duobus tribus uel quatuor diebus in aëra secundū quod sol magis uel minus calidus fuerit ponantur ut siccantur, & seruabiles fiant. Et si antequā ad solē ponantur aqua lauantur, pulchriores & magis uenales efficiuntur

cientur, & cū siccate fuerint utile erit omnes perforatas & à uermibus occupatas eligere, & ab alijs segregare, ut statim rumpantur. Et nucleis siccatis seruentur propter oleum faciendum, qui propter diuturnitatem temporis remanentes in testis à uermibus consumpti fuissent. Reliquas autem electas seruare, quas in arena seruandas obrues uel folijs suis aridis, uel in arca ex ligno suo facta includes, uel cepis miscebis quod etiam eis acedemē tollitur. Martialis autem expertum se ait, ut uirides nuces putaminibus suis liberatas in melle demergi, & post annum uirides esse, & ipsum mel medicabile fieri, ut ex eo facta & potio arterias curet & fauces. Ex ligno eius fiunt optima scrinia, & ualde pulchra, & diu durabilia, & cætera uasa ad res gubernandas, & fortes rotæ pro curribus, & tenaces diuq; perdurabiles, & in his operibus excelsunt omnia ligna quæ in nostris inueniuntur partibus. Ex fructu eius fit oleum cum instrumentis ad hoc paratis, quod est ualde pulchrum & delectabile crudum in cibis sumptum. Ex uno aut corbe nucum fit tertia pars nucleorum, ex quibus fiunt 24 libræ olei, si bonæ fuerint nuces, quædam sunt uirides, quædam siccæ, uirides minus sunt calidæ siccis, aliquantulum enim humorē habent, & parum stomacho sunt nociuæ, quæ manducatæ cum ruta faciunt contra uenenum. Siccæ uero nuces calidæ sunt secundū Auicennam in tertio gradu, & siccæ in principio secundi. Et sunt tripliciter, nam quædam sunt uicinæ tempori, quo fuerūt uirides, quædam remotæ, & quædam mediocres uicinæ sunt humidæ, modicū uentositatis habentes, & quanto magis ab eodem remouentur tempore, tanto magis eorum humiditas consumitur, eisq; uentositas dominatur. Ideoq; tunc comedite cito in humores cholericos cōuertuntur. Quibus itaq; uetustioribus existentibus, & uentositate eis multo magis dominante, fit earum sapor quasi uetustissimū oleum, & cibi naturam amittunt. Nuces stomacho sunt contrariæ, nisi cum inuenerint stomachum temperatum, aut tantam habentem frigiditatem qui calore

nucum

nucum ualet repugnare. Idcirco talis stomacho sunt boni nutrimenti, bonæq; digestionis. Sed calidum habentibus stomachum, putrescunt seu prestant uersionem, & in cholericos mutantur humores, & furiosas. Capitiq; dolorem faciunt, & oculorum uertiginem, sed ut ab eis omne auferatur nocumentum. mundari eas est necesse, & per noctem unam in calida aqua poni, ut partem humiditatis aque acquirant, hancq; quasi uirides nuces. Si ante cibum cum ficibus edantur contra rem uenenosam corpus descendunt. Quod si ex eis cataplasma fecerimus cum cepis, melle, & sale proficiet morsui canis rabidi. Rursus cataplasma factum ex eis cum ruta & melle supra apostemata ex cholera nigra ea mire dissoluit, quæ etiam cum suis tritacorticibus & super umbilicum posite destruunt apostema intrinsicus corpori manens. Corticis quoq; uel frondium sine arboris unum exagium esui datus cum uino stranguriæ optime subuenit. Et si cum aceto potetur, repugnat febris rigorem habentibus. Auicenna dicit quod folia & cortex nucis sunt constringentia fluxum sanguinis, & eius cortex adustus, est desiccatiuus sine moderatione, & eius medulla masticata, id est, nucleus uiridis ponitur super apostemata melancholicam ulcerosum & confert. Item cum melle & ruta confert torsioni neruorum, & facit sodam. Et oleum antiquum facit euenire dolorem gutturis. Et emplastrum nucis confert mamillæ apostemose, & mixta cum melle confert stomacho frigido, & cum ficibus & ruta est medicamen omnibus uenenis. Dioscorid. præterea dicit, quod umbra nucis est ualde mala dormientibus sub ea, & diuersorum ægritudinum generatiua, & succus corticis eius & radicum eius potatus subuenit difficultati urine, ad quantitatem unius exagii, & cum aceto potatus repugnat febribus uenientibus.

cum rigore & frigore, crines tingit & mundat & probibet casum capillorum.

hh. 3 De oleo

De Olea.



Olea est arbor nota, & eius quidem multa sunt genera, quæ propter similitudinē earum uirtutis numerare non expedit aërem calidum & temperatū requirit, & in modo dice frigido uiuit, sed ualde frigidum sustinere non potest. Terram desiderat cui glareæ sit mixta, aut creta sabulonis admixtione resoluta, aut pingue sabulū, aut terram naturæ depressionis uiuide. Cre tam figuli omnino repudiat, & uliginosam, & in qua semper humor existit, & macrum sabulonē, & nudam glaream, quāuis enim comprehendat in eis non conualescit. Et situs quidē terrarum oleæ aptus est hoc modo. Quod locis æstuosis, septentrionali colle frigidis meridiana gaudet, medijs, cliuis delectatur, neq; imum neq; arduum patitur locum. In his enim continue propter deflexum stillat ad eam humor, quem multum requirit & satis retinetur circa radices eius, eo quod locus non est præceps, sed late de uexitatis, neq; imum neq; arduum patitur locum, quia in imo nimia est aquositas, in arduo pauca. Locis calidis & siccis Octobri & Nouembri, frigidis uero Febuario & mense Martio plantantur, quæ uel pastino constituenda sunt, uel suum locum scrobibus tenere debebunt. Seruntur autem ex radicatis plantis aut à stipitibus euulsis, & ad inferius laceratis, aut ex ramis pullulat, & ex nucleo sue amorce, sed à plantis euulsis & ramis in terram infixis melius conualescit. Propter quod miratus fuit Virgilius: Ramum oliuæ qui ferè siccus uidebatur pullulasse cum in terram fuisset infixus. Quæ cum ponuntur in pastino aut scrobibus decisis capitibus, & brachijs & in trūcum redactæ usq; ad mensuram cubiti iunius, & palmi in fermento terræ fossæ defigantur, locum palo ante deprimente. Ordei grana secundum Palladium subtus iaceantur, & deputetur, & amputetur, quicquid putridi uel arentis inuentum fuerit, & tunc capita eorum iuto uelantur & musco, uinculis quibuscunq; constricta, sed maximum beneficium est, ut proueniat incremento, si partes rubricæ uel aliter

aliter notentur, quibus oppositæ steterint, & contra eas similis ratione ponantur. Cum plantantur in scrobibus, fiant quatuor vel tribus pedibus latæ, cum duobus profundæ in quibus ubi lapides sunt, glareæ misceatur. & stercus si clausus est locus, modicèq; ponantur supra terram, ut emineant. Si uero pecora formidantur, altiores trunci esse debebunt. Si oliuetum constituas sint à se distantes uigintiquinq; pedibus subinde circa eas herba uellatur, & quotiens se imber infunderit, frequentissimis fossionibus sollicitentur, & subinde ducta à trunco terra atq; permixta in aliquanto altiores cumulos congregatur seu congeratur. Si autem frumentarius est ager & pinguis, quem conserimus oliueta inter se quadrigenis pedibus distent, si macer uicenis quinis. Cui proderit si ordines in saione dirigamus. Si prouincia in qua plantare desideras indiget oliueto, & non est unde planta sumantur, seminarium faciendum est, ut & ibi rami ferro incisi in modum sexqui pedalem disponantur. Inde in quinquennium poterit ualida planta transferri. pleriq; autem quod facilius & utilius est radices oliuarum quæ in syluis plerumq; sunt aut in locis desertis, in cubitalem mensuram duas in seminario, & postmodum in oliueta instituant & disponant & admixtione stercoreis adiuuant. Quare prouenit & ex arboris unius radicibus numerosa planta nascantur. Inseritur autem in se, & rami quidem in trunco subali infiti illico conualescunt, hæc insitio fit optime per uindemias, ut ait Cato. Coluntur autem ut in singulis mensibus, quæ sunt in seminario uel scrobibus nouellæ pastinentur. Cum uero adoleuerint, ter in æstate uel bis ad minus fodi eas oportet, & omnibus herbis circum nascentibus liberari, in locis aridis aut tepidis mense Octobri ablaqueandæ sunt oleæ. Itaut ab eis superiore parte possit humor induci, omnem sobolem Columella præcipit concelli. Paloladio autem uidetur dimitti paucas semper, aut solidas, ex quibus in uetustate matris loco noua succedat, uel melius nutrita & aggesta

aggestæ terræ beneficio etiam suas habens radices ad oliuetum faciendum sine seminarij cura transferatur arbutula. Eodem Octobri mense locis frigidis, & exilibus sunt stercoranda oliucta. Columella dicit octo annorum ætate transacta. Palladio autem uidetur unoquoque anno sicca infuctuosa cum aliqua debilitate nascentia resecare debere. Cui magis assentio: Ait etiam Palladius egregie, quod hæc arbor amat mediocriter ab humore suspendi, scalpî, asidue lætaminis ubertate pinguescere, uentis clementer feracibus agitari, formatur ut paucos habeat stipites, et parum eleuatos à terrâ, ut per latera quantum poterit diffundatur. Accidit olis ex uicinitate aliarum plantarum plurimum nocumentum, eo quod ipsa olea plurimo humido indiget, & ideo quicquid iuxta eam platur ei nutrimentum surripit, & ipsam macilentam facit: quare oportet plantas propinquas euellere, nec ibi aliquas dimittere. Item uult diligenter custodiri à bestiarum accessu, quoniam corrosio eam plurimum lædit, nec radatur cortex eius, qui tunc exudaret & efficere tur sterilis & arida. Similiter nocet ei plurimum transitus quorumcumque, ea conculcata terra & indurata in transitu non permittit ad eam descendere sufficienter humorem, quare fodienda est & stercoranda est. Non uult autem hæc arbor irrigari fontibus uel riuis, eo quod talis aqua grauis est & cito fluit à radice decursum. Sed potius pluuijs gaudet quæ aqua uaporosa est, & statim fumat ad radices ipsius. Si sterilis est olea, gallica terebra perforabis, tunc duos frugiferæ arboris ab australi parte ramos eiusdem magnitudinis tolles, & stricte in foramine utrumque concuties, uel lapide muel pini uel quercu palos, & absciso eo quod superabit, luto paleato curabis occultare: Si sine fruge luxuriant oleastri, palum radicibus eius insige, quod si fructus arbor læta non fert, terebratur gallica terebra usque ad medullam, impresso foramine cui oleastri in formis tale admittitur & ablaqueatæ arbori amurca infunditur, uel uetus infundatur urina. Hoc modo steriles arbores uberantur, quas tam

men durante malicia inferere oportebit, mense nouembri, oliua tollitur, cum uaria esse coeperit uel manibus uel excutiendo pertice suauiter ne ramusculi ledantur. Ipsis enim lesis sequenti anno fructus plurimum derogabitur. Ex qua primū fiet oleū, sed cū tota nigrescit melior est, et illud quod speciei merito derogauit fecunditate cōpensat. Aristot. autem dicit, quod nunquā perfectē in arbore maturescunt, etiam si per multos annos ibi essent, sed ut ueram et perfectam consequantur maturationē oportet ut collectae de arbore per plures dies in una congerie coaceruantur, ut sic per pressionē mutuā confortato calore et retento ad interiora ad plenā maturationem producantur. Plinius uero dicit, quod quamdiu in arbore dimittuntur comeliores fiunt, semper enim nouas uires sumunt, et difficilius cadunt. Varro scribit, quod olea de qua fit oleum debet congeri et mundari seu aceruari per dies singulos in tabulato, ut ibi medio-criter fracescat, ac prius quisque aceruus dimittitur in sex partibus seu uicibus ad uasa olearia, et trapetas, et submittitur mole olearia, quae est de duro et aspero lapide. Olea lecta si diu nimium fuerit in aceruis, calore fracescit. Itaque si nequeas mature conficere in aceruis iastando uentilari oportet. Item scribit Cato, quod oleum quanto ab amurca steterit tanto deterius erit. Item dicit quod olea purganda est à frondibus, et omni immundicia antequam oleum fiat. Item scribit Varro, quod amurca est huius uirtutis quod si de ipsa nimis ponatur in agro terram denigrat, et sterilem facit. Si modicum ad agri culturam uehementer pertinet, et circa radices arborum infundi solet, et maxime ad taleam et ubicunq; in agro herba nocet. Amplius scribit Cato uestimenta ne tinea tangant, amurca decoquito ad dimidiam coungito fundum arce, et extrinsecus pedes, et angulos ubi ea aruerit, si hoc feceris tinea non nocebunt. Item ligneam omnē suppellectilem si ungues non putrescit, et cum ea terseris splendidior fiet. Item enea omnia ungit, sed prius extergito bene, postea cū uti uolueris extergito, splendidior erit;

Et erugo nõ erit molesta. Oleum si in uas nouũ traditurus es, amara
 ca ita intẽda est, calida uel cruda prius collinato, oppilato agitatoq;
 diu, ut bene combibat, id si feceris uas oleum non bibet, Et oleũ me-
 lius Et ipsum uas firminus erit, oliuæ quædam sunt domesticæ, quæ-
 dam siluestres, Et domesticæ quædam sunt acerbæ uirides, quædã
 mediocres, scilicet uariæ, Et rubæ, quædam nigre Et maturæ. A-
 cerbæ Et uirides nihil habent adhuc unctuositatis, sed aquositatis
 tantum, Et hæ sunt terrestres, ponticæ Et frigide Et siccæ. Vnde
 sunt stomachi confortatiuæ, Et uentris constipatiuæ, Et ad digerẽ-
 dum tardæ, Et corpus nihil ferẽ nutriunt, sed has oliuas quidã præ-
 parant cum sale Et aceto. Alij cum aceto tantũ, Et hæc sunt frigidio-
 res Et tenuiores, quare cholerae acumen extinguunt, Et uirtutẽ appe-
 titiuam excitant, maxime si in medio prandij accipiantur, quæ uir-
 tuti digestiuæ obediẽtes ualde stomachũ confortat, Et uentrem
 stringunt. Cato scribit eas optime usui conditas, si sale sint confrica-
 te diebus quinq;, Et tũc sale excusso si biduo in sole fuerint posite,
 Et manere idoneas. Et solere easdem sine sale in defrutum conde-
 re. Nigræ quidem maturæ calidæ sunt Et temperate humide, qua-
 re cibus earũ est multum nutritibilis, Et grossus, mollificans stomachũ,
 tardus ad digerendum, Et faciles ad egerendum. Et tardioris qui-
 dem digestionis propter unctuositatem, facientẽ cibum uacare in
 stomacho uel in ore stomachi. Facilitas uero egestionis propter un-
 ctuositatem accidit, quæ facit stomachũ lubricum unde priusquam
 digeratur de stomacho descendit, Et nonnunquam in cholera mru-
 beam cõuertitur. Mediocres uero minus nigris sunt nutritiuæ, pro-
 pter uentositatem suãq;, ponticitatis priuationẽ Et paucitatem. Ole-
 um quidẽ quod de oliuis fit, aliud est recens, nouiter de olcarum
 fructibus expressum. Aliud uetus quod diu de fructibus manuerit.
 Cognoscitur aut laudabile oleum in odore, si est odoriferũ, in saporẽ
 si est optimi saporis, cuius scilicet ponticitas in lingua sentitur,
 acuminis indigens qualitate, quia ponticitatis quantum habet tan-
 tum

tum frigiditati & siccitati pertinet, & ob hoc stomachum confortat, proinde antiqui assimilauerūt ipsum oleo rosato, illudq; in multis passionibus olei rosati uice dederunt. Oleū quidem recens ex oliuis nigris & maturis calidū et humidū est, mediocriter stomachi & uentris molliciatinū, citoq; in cholera rubeam cōuertitur, quod uero longe ab oliuis maturis fuit omni carerebit malitia, quo ad aliquid retinebit ponticitatis. Sed ablata penitus ponticitate fit nocibile, citoq; in malos humores conuertibile. Quod si multo magis inuicta uerit, ut saporis fiat asperioris & horribilioris inconueniens erit esui, tamen utile medicine.

De Piro.

Pirus est arbor nota, & eius quidē diuersitates infinitae sūt et in qualibet ciuitate diuersa inueniuntur pira. Ideoq; in finita et inutilia omīssa, hoc solū hic dicere sufficiat, quod quaedam maturantur in mense iunio. Quedam in mense iulio, quaedam augusto, quaedam septembri, & quaedam octobri, & quaedam si sunt collecta & seruata in sequenti tantum maturantur aestate, ut pira regina, haec arbor omnem cœli statum patitur, nam in calido, frigido & temperato aëre satis congrue cōualescit, & fructum profert. In macra & pingui potest terra plantari, uerū in macro, arido & cretoso solo pira minora & duriora erunt, & ipsae arbores paruae & quasi uetustate cōsumptae, & maxime ubi falsedo est uel amaritudo terrae ad ipsarum radices. In loco autem dulci & pingui solo ualidas arbores & fructus nobiles & plurimos confectumur. Et maxime si tale solum in lateribus montium uel in planis prope montes fuerit, in quo pirorum arbores sunt plantatae. Non enim in talibus locis degenerabit haec arbor, nec in se aut in fructibus defacili patietur defectum. In locis autem multum à montibus remotis, nimium humides, & aquosis erunt arbores magne & frondosae, fructusq; ipsarum turgentes & uirides, ac uiuo calore carentes, & corū odor & sapor quodāmodo insipidus et obtusus.

Plantari possunt rami pirorum, ut de oliuis dictum est, & eodē modo, sed quandoq; tardus est euentus, & non perfecte fructificant. Item plantatur pira & nasci quidem necesse est originem suam reuoluerentia, sed quandoq; hoc est huiusmodi homini expectare longinquum, & non domestica sed syluestria nascuntur. Melius ergo est ut pirorum plantas radicas seruamus agrestium, & cum comprehenderit inserantur. Spacia uero inter ipsas arbores ut melius conualecant 30 pedum esse debebunt. In aridis & siccis locis mense Octobri & Nouembri, frigidis Febuario & Martio, temperatis utroq; tempore congrue pirus plantatur, aut etiam transplantatur. Inseritur conuenienter in piro agresti uel domestico & in malo, in quibus optime prouenit. Itē in spina, sed in hac ad debitū augmentum peruenire non potest. Item in quibusdam alijs arboribus insita comprehendit, sed inutiliter, & ideo hoc omitto. Potest autē inseri hæc arbor sub terra, & supra eam iuxta terram & in altum secundum distinctionem traditam in libro secundo, cum in communi de insitionibus locutus fui. Fit eius insitio sub cortice, & in trunco scisso. Item in salicem pertica perforata & sub terra sepulta. Item per illum modum qui emplastratio nominatur. Item per illum qui dicitur ad buccellum. Horum autem nodorum doctrinam in libro secundo sufficienter ostendimus. Assidue gaudet fossione, ac letaminis ubertate pinguescere. Formatur autem ut unum solum habeat stipitem, qui usq; ad octo uel decem pedes aut plures eleuetur à terra; ibiq; ramorum diuisio procuretur. Accidunt piris multa nocumenta, quæ cum corū cura nominata sunt in principio huius libri, cum sermonem feci de arboribus in communi, & colliguntur sine periculo, si rami debiles altiores congruis funibus cum fortioribus alligantur. Hæc enim arbor ualde fragiles habet ramos & casui colligentium expositos, & maxime cum ad ætatem decrepitam incipit declinare. Pira colliguntur diuersis temporibus, secundū diuersitates maturationis ipsorum, ut cum æstiu, tunc legantur cum odore

odore & colore sibi proprio maturitatem præcendunt, quæ si duobus aut tribus diebus ante legantur, uidelicet aperientibus primis maturitatis indicijs, pluribus seruabuntur diebus ad usum quam si sint ultima maturatione collecta. Quæ uero in fine autumnii maturantur per hyemem seruanda Octobri mense legantur, sicco tempore & in luna decremento. Seruantur pira si à caducis diligenter electa, integra & prope dura & aliquantulum uiridia obruta inter paleas uel frumenta ponantur, in loco tamen obscuro & sicco. Alij cum tenacibus suis statim lecta picatis urceis condiderunt, & aribus uasculorum gipso clausis aut pice ipsa sub diuo obruta sabulone texerunt. Alij pira diuisa & granis purgata in sole siccant, & in frigida aqua salsa manere permittant. Postea in aqua puro biuo macerentur, deinde in fine in uiso dulci mersa custodiuntur, uel in sapa uel passo usui reseruantur. Vinum fit de piris si concussa & sacco rarissimo condita ponderibus comprimantur uel prælo, hoc in hyemem durat, sed prima accedit æstate. Acetum de piris sic fit pira syluestria uel asperi generis in cumulo seruantur matura per triduum, deinde mittantur in uasculum. Cuius fontana uel pluuiæ aqua miscetur, & operculum per triginta relinquitur dies, ut subinde quantum sublatum fuerit ad usum aceti, tantum aquæ ad reparationem reddatur. Liguamen de piris sic fit, pira maturissimæ cū sale calcantur, ubi carnes eorum fuerint resolutæ, uel in capsellis uel in uasis fictilibus paratis clauduntur, post mensem tertium suspensæ hæ carnes liquorem dimittant, saporis iucundi, & coloris albiduli. Ex ligno piri pulchræ assides & tabulæ fiunt, quæ optime leuigantur, ex quibus multa opera cōgrue fiunt. Pira quedam domestica, quedam syluestria sunt. Syluestria frigidiora, duriora & sicciora & magis pontica sunt domesticis. Rursus pira quedam sunt acerba pontica, & quedam matura dulcia, acerba pontica omnia sunt de natura syluestriū, & stomachum cōfortant, uentremq; constipant, & sunt frigida & sicca medicinæ, non nutrimento conuenientia.

Idcoq; oportet operam dare ut mollescant & asperitatem amittant, ut uidelicet elixentur, aut super calidā aquae fumum suspendantur, aut operta pasta assentur, aut cum melle condantur. Pira siue cocta siue cruda sint, uentrē constipant, & si cocta sunt in aqua pluviali posita super os stomachi cōpescunt uomitum ex cholera, & super pectinem posita fluxū uentris constringunt. Pira dulcia matura temperate complexionis sunt, quia minus cæteris frigida sunt, quia propter calefactiū & augent digestionē, ualētq; in his quoq; quorū stomachi frigidi sunt & sicci, habent autē pira proprietatē, quod si cū fungis coquantur omne auferunt lesionē, præcipue si syluestria sunt, propter ponticitatē suā. Cinis arboris piri agrestis bibitus in his qui fungorū sunt comestione suffocati multū ualeat. Frondes pitorum & rami stiptica sunt, sed pitorū stipticitas cū aquosa dulce dine mixta est. Auic. dicit, q. pira syluestria exiccata cōsolidant uulnera.

De Prunis.

PRUNUS est arbor nota, & eius quidem diuersitates sunt, quia quedā est domestica, & quedam syluestris, domestice quedā faciunt pruna alba, quedam nigra, quedam rubra, & rursus quedam mollia, quedam callosa & dura, & iterum quedam grossa, quedam parua. Aërem desiderant tepidum principaliter, & frigidum satis commode sustinere possunt: loco gaudent leto & humido, & similiter lapidoso & glareoso inuuantur loco, letamen recusant, quia ex hoc fructus uermiculosos & caucos faciunt. Seruntur osibus suis autumnio mense nouembri, patri solo & subactō duobus palmis uel minus obruantur ossa: eadem ponuntur & Februario, sed tunc sunt per triduum lixiuo maceranda, ut cito germinare cogantur. Cui rei proderit, si in seminario triantur, ut postmodum elapso biennio transferantur, ponantur etiam eisdem mensibus & plantis quas sumenus de radicibus & cortice matris, radicibus cū ponuntur fimo oblitis. Hæc arbor nō multum profundas querit scrobes, quia non multū in profundo radices figit

figū, nec multa magna spacia, quia se inuicem parum impediunt. Inscritur in se & in persico & amygdalo. sed eam degenerem reddet & paruam, & in se recipit amygdalū & malum. secundū quosdam, & optime persicum. Extremo Martij sit eius insitio, uel mense Ianuario anteq̃ gummi eius incipiat lachrymare. Sed ego etiam mense Februario expertus sum sepe optime prouenire, iunatur frequēti humore, & assidua fosiōne. Extirpanda sunt soboles circa radices, exceptis rectoribus, quę seruantur ad plantas, formantur aut ut unū solū habeant stipitē, nō multū eleuatū à terra, si languida est arbor pruni, amurca cum aqua equaliter temperata radicibus debet affundi, uel cineres ex furno et maxime sarmentorū, si poma decidunt oleastri cuncū terebrata infige radici. Si uermes aut formicas patitur, curetur ut supra in tractatu cōmuni de arboribus dixi. Pruna siccantur etiā in sole, scissa in tribus uel quatuor partibus circa ossa, alij in aqua marina, uel aqua feruente recentē lecta pruna demergūt, & inde sublata in furno faciūt uel in sole siccari. Ex prunis fiūt optime sepes & utiles, quia sua spissa pullulatione eas spissas et fortes faciūt, & fructū abundanter prębēt, & cū duobus uel tribus uel quatuor annis elapsis incidūtur, quibsdā rarioribus relictis multos preparāt uinearū palos, & igni satisfaciūt abundanter. Sed ut diuersorum prunorū plantę pro sepiibus faciendis habeatur copia, nihil erit utilius quā tempore maturitatis earū pueros ad forum plateasq̃ mittere ubi uendūtur, & à personis uilibus comeduntur, quia omnia ossa cuiuslibet generis inuenta colligant, et hæc sicca sua pradietis temporibus plantanda seruentur, ex quibus quatuor usq̃ ad sex simul in seminario poni possunt, & postea in seminario nutriuntur, & cum conualuerint ad loca sepium transferantur & sulcos. Pruna parum nutriunt, & alba quedam dura sunt ad digerendum, stomacho notius, sed exiguum solutius. Ideoq̃ cum sint grossa non debent comedi nisi grandia & perfecte in arbore maturata, & pruna nigra quedam sunt domestica, quedā agrestia,

rursus

rursus domestica, quedā sunt nigra, perfecte in arbore maturata,
 & dulcia nimis sunt frigida & magis humida in secundo gradu, ut
 Auicenna dicit. Nam eius frigiditas est in initio primi gradus, humi-
 ditas uero in fine. Platearius tamen dicit, quod sunt frigida & hu-
 mida in secundo gradu. Auicenna dicit, quod sunt frigida in primi
 pio secundi, & humida in fine tertij, stomachū humectant, uentrem
 molliunt, & choleram rubeam soluant & proijciunt, tamen si nimi-
 um utamur stomacho nocent. Cruda uero dura, uiridia & pontica
 pessima sunt in medicina & cibo, durum enim stomacho ualde noti-
 uum est, & minime nutrit atq; fatigat. Rufa uero magis sunt frigida
 & humida. Nimis agrestia nimis stiptica sunt, ideoq; ualent ad
 diarrheam & dysenteriam, & quidem ea matura colligunt, & scin-
 dunt per medium & ad solem siccant, aceto aspergunt, & in uase
 reponunt, & hæc magis sicca, habent uirtutem infrigidandi, &
 intestinali leniendi, unde ualent in acutis egritudinibus, & ad acutis
 tris constipationem ex humero cholerico. Et si sunt uiridia, dentur
 ad edendum si sicca coquantur in aqua, & pruna comedantur &
 aqua bibatur. Auicenna dicit, quod gummi eius est subtiliatuum &
 incisuum & conglutinatum & consolidat ulcera. Et cum ex folijs
 prunorum colligitur os, prohibet fluxum in uenam.

De Perfico.

Persicus est arbor nota, que parua est, cito tamen crescit,
 & paruo tempore uiuit: in locis quibuscunq; prouenit,
 sed pomis & frondibus & durabilitate præcipua sunt, si
 cælum calidum, solum arenosum, & humidum sortiantur. Frigidis
 uero & maxime uentosis intereunt, nisi aliquo defendantur obiecto
 mense Nouembris in locis calidis, cæteris uero Ianuarij persici ossa
 in pastinatis arenis sine ponenda, binis uel uno à se pedibus separa-
 ta, & cum ibi plantæ excreuerint transferantur, & non amplius
 quam duobus palmis uel tribus secundum Palladium obruantur,
 dum tenera sunt germina, herbis persæpe circumfossa liberentur,

plantam bimam recte transferimus brevis crobe, nec à se longe statuenda sunt, ut inuicem à se calorem solis excutiant Ianuarij & februarij in locis frigidis. Nouembri calidis persicus inseritur, maxime circa terram furculis plenioribus & prope arborem seu sitipitem natis. Nam cactum na uel non tenebant uel diu durare nō poterant. Inseritur in se, & in amygdalo, & pruno, aprili mense uel maij locis calidis. In Italia uero maio existente & in iunio persicus inoculari potest, quod emplastrari dicitur, praeoso dū super trunco & emplastratis plurimis gemmis, eo modo quo dictum est. Ego autem inueni eius insitionem in pruno factam mense februarij optime conualere, ablaqueandae sunt per autumnū, & suis folijs stercoreandae. Item putandae sunt, putridae & aridae tantum uirgulae tollantur, nam si aliquid uiride auferatur arescūt, ut Palladius ait. Apud nos experientia contradicit, imò si rami uirides loco incongruo nati tolluntur pulchrior & melior efficitur arbor, sed forsitan in sua regione loca erant arida nimis, haec arbor ardore solis arescit. Et ideo emuletur aggestione frequenti, uespertino iuuetur humore, & obiectus defendatur umbraculis, ut idem Palladius dicit, quod intelligo in locis nimium calidis & siccis, quia in nostris partibus temperatis nō eget. Vnum solū stiputē habere debet à terra modicā eleuatū. Languenti arbor: ueteris nini feces aqua mixtas oportet infundere. Contra pruinas stercois ingeratur persico, uel, ut modo dixi, nini feces cum aqua mixta, uel quod magis prodest faba, in qua aqua decocta est, ut idem Palladius ait. Si uermes pantur, cinis ac muricem mixtus eos extinguit, uel bonis urina, cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca fiant, radices eius nudatae uel trunco lentisci uel terebinthi cuneus infigatur, ut ait Palladius. Vel terebrae in medio palus salicis imprimatur. Si poma rugosa creabit aut putrida, circa unum truncum cortex rescindatur, & cum inde modicus humor effluxerit, argilla uel palliato luto tegatur. Contra uitia persici fertur proficere sparteā ad ramosissima. Persica

sica seruantur si detractis ossibus in sole siccantur. Item detractis ossibus melle condiuntur, & sic saporis iucundi sunt. Item seruari dicuntur si umbilicum eius gutta picis calentis oppleueris, & in uase clauso reponas. Persica diuiduntur in duo, quedam enim sunt grossa mollia, hæc sunt magis aquosa, scilicet frigida & humida, & quedam sunt parua, solida, dura, & hæc sunt magis terrestria, scilicet frigida, & quodammodo sicca, & maxime si non fuerint perfecte in arbore maturata, aut fuerint omnino acerba & cruda. Frondium eius succus potatus lumbricos & cucurbitiuos eijcit. Persica frigida & humida sunt in secundo gradu. Phlegma generant, ieiuno stomacho sunt edenda, & post uinum uetus odoriferum est potandum, idem facit si ex eo cataplasma feceris umbilico, secundum Auicennam. Et succus foliorum eius in autem missus uermes interficit. Matura sunt bona stomacho, & in eis est uirtus faciendi appetitum cibi, & oportet quidem ut non comedantur post alium cibum, quoniam corrumpuntur post ipsum, & eorumpunt eum qui præcessit, & sicca sunt tardæ digestionis, & non boni nutrimenti, quamuis sint multi nutrimenti, & naturalia minuunt uentrem, & immatura constringunt.

De Palma.

Palma est arbor ferens dactylos, aërem desiderans calidum aut temperatum, nam in climate calido ante hyemem maturat fructum, sed in frigido, quod est quintum uel sextum clima, non maturat, nisi post hyemem ad principium ueris aut æstatis anni sequentis. Sed circa septimum uel quartum clima pullulat, sed propter frigus non conualescit, sed est uerius dicere quod nec in sexto climate uiuat, uel in quinto difficile. Terram solutam & sabulosam requirit, nam constat locum prope nullis fructibus esse utilem, in quo palmæ sponte nascuntur. Seritur plantis aprili mense uel maio tamen quando planta ponitur

ponitur circa eam uel sub ea pinguis terra fundatur. Item feritur mense octobri semine siue ossibus dactylorum non ueterum, sed recentium & pinguium in cuius seminario terræ cinis miscendus est, uel notandum est tamen quod ex uno nucleo uix unquam planta crescens conualefcit, sed potius ex multis simul positis, & hoc indeo est quia plantula quæ ex uno oritur admodò debilis est quod truncum qui arborem portare possit facere non potest. Sed multe plantæ simul exortæ, propter compressionem sibi inuicem continuatæ perficiunt illius arboris truncum. Porro cum semina & nuclei aliarum plantarum habent uirtutem pullulatiuam, quædam in summo, quædam in imo, quædam in circuitu, quædam in medio, nucleus palme qui est os dactyli habet quasi in dorso suo, & ibi est foramen stridulum aliquantulum longum, per quod germen suum egreditur.

Quare optima plantatio eius est, quod hæc ossa in sacculo lineo in sabulo ponantur, & quanto fieri potest foramen unius foramini alterius applicetur, ut plantule unius coniunctæ perfectiorem faciant arborem, palma enim unius uirtutis non proficit, tam propter sexum qui in ea districtior, quàm in alijs plantis, tum etiã propter ligni debilitatē. Item palma masculus nūquā facit aliquē fructū, sed plantatus masculus iuxta fœminā inclinatur se ad eā, ita quod tangit se rami maris & fœminæ, & cōprimunt bifurcatio ramorū fœminæ ramos maris, & tunc recte palme decedūt à se inuicē, tunc fœmina cōcipit nō substantiā aliquā emissam à masculino, sed uirtute ipsius. Similiter autem hæc ostendant opera rusticorum, quoniam cum longæ sunt ab inuicē plantatæ masculus & fœmina abstrahūt masculi ramos, et ponunt super fœminā, & illa in furcis suis uel cōprimunt eos, & cōcipit ex eis. Cum autē sit at fœmina fructu onusta, per uentū qui spiritū & humorē mascululi ducit super fructus fœminæ, & eius maturatur fructus. Nō autē est arbitrandū quod ista in pregnatiōe et maturatione fœmina indigeat, quādo ex pluribus seminibus planta cōualefcit, quia tunc plures masculos in uirtute & substantia in se habet.

Annua uel bima debet transferri mense Iunio, & Iulio inchoante, circumfodiatur assidue, ut irrigatio continua aestatis uincat arboris. Aquis aliquatenus salis palmæ inuantur. Si egra est arbor, feces uini ueteris ablaucatæ oportet affundi, uel radicum superuacuum capillationem decidere, uel cuncum salicis interfossis radicibus imprimere. Hæc arbor difficilime crescit, & longissimo tempore uiuit, ante centum annos fructum non facit, ut dicit Plinius. Et est sciendum quod fructus dactylorum non percussiones dependent à ramis eius, sed potius habent sedes quasdam in quibus immediate super ramos existunt. Et quod mirabile est in una. si aliqua profert fructus suos & ramulos in quibus fructus sui consistunt, quasi aliqua in superiori parte aperitur, sicut fit in siliqua rosæ & lilij, & aliorum multorum florum, sed aperiuntur inferius ex parte ramuli super quos sunt, eo modo quo aperitur siliqua papaueris & porri. In summo autem cacumine habet hæc arbor cassam, in qua est substantia mellis, quæ multum accidit ad substantiam dactyli, hæcque cum abscinditur palma arescit. Dactyli calidi sunt & humidi in secundo gradu, grossi sanguinis generatiui, & difficilis digestionis, sicut tamen siccis sunt digestibiliores, & magis urinam prouocantes: sed illis assuescentes epatis & splenis constipationem duritiem atque grossitiam & tumorem patiuntur. Ginguuis, & dentibus sunt nocui, & dolorem in ore stomachi faciunt.

De Pino.

Pinus est arbor nota, quæ creditur prodesse omnibus quæ sub ea sunt: amat locum gracilem, sepe maritimum, inter montes & saxa uastior & procerior inuenitur, uentosis & humidis locis arborum sunt incrementa letiora. Sed huic genere deputabis ea spatia uel montes, quæ alteri utilia esse non possunt. Ex arabis ergo ea loca diligenter atque purgabis, & frumenti more semine aspergas, ac leni sarculo curabis operire, nec plusquam palmo debet abscondi,
 & nata

Et nata non transferantur, quia non facile comprehendū, Et uix crescunt, nec aliquo tempore incidantur, quia moriuntur, Et loco rami siue radice incise alie non nascuntur. Scribitur igitur nucleis suis, aqua per triduum maceratis, calidis Et siccis regionibus mense Octobri Et Nouembri: frigidis uero Et humidis Februario Et Martio. Alij dicunt, fructum pincum translatione in multa semina duci, in colliculis terra Et sumis repletis obruant, que ubi creuerint relicto eo quod solidius est, auferunt alia. Vbiuistum ceperit nutrimentum, trinam plantam cum ipsis colliculis transferunt, in scrobe indulgent radicibus largitatem terre, tamen equi sterens admiscant. Seruandū est autem ut radix eius que una Et directa est usque ad summitatem eius possit integra Et illasa transferri, descendenda est arbor tenera à pecore, solumque ne calcetur inualida. Putatio nouellas pini arbores tantum promouet, ut paucis annis in iustam magnitudinem crescat. Item fertur quod sub eius cortice nascuntur facile uermes, qui lignum corrodunt Et destruunt, Et ideo longiori tempore durat, si sepe corticibus spoliatur, nuces pinei usque ad mensem Nouembris in arbore esse possunt. Maturiores pinee legentur prius tamen quam putrescant nuclei, qui nisi purgati durare non possunt. Tamē aliqui in uasis fictilibus nouis Et terra repletis cum testis suis asserunt custodiri. Pinee calida est Et humida in secundo gradu, secundum Auicennam in tertio, uirtutē habet leniendi, humectandi, Et aliquantulum aperiendi. Optimus cibus est laborantibus in instrumentis spiritualibus, Et apostemate ex frigido humore, asmaticis, id est, sicce tussientibus, hectica febre laborantibus Et consumptis. Sanguinem augmentat, libidinem incitat, per se potest dari, uel cum sirupo uel electuario, uel in cibus. Contra tussim uas-

let cortex exterior, cum primo pinca ab arbore sumitur,

si decoquatur bene in aqua, Et postea super
carbones ponatur, ut patiens suum
recipiat.

kk 3.

De Pipere

De Pipere.

Piper est arbor parua, & nascitur optime, & fructificat sub cancro, & climate ubi est multa adustio solis, & precipue in monte Caucaſo, ut dicit Iſidorus, dicit etiam quod eius syluas serpentes custodiunt sed incolæ illius regionis tempore maturitatis syluas incendunt, & serpentes fugiunt, & ex incendio grana piperis quæ naturaliter erant alba, efficiuntur nigra & rugosa. Diaſc. dicit quod Saraceni collectam ponunt in clubano, ut uirtus generatua auferatur, & non possit in alijs partibus mundi feri, in locis etiam temperatis nascitur, sed in eis fructum non facit. Ideo apud nos ipsius plantatio & industria nullius utilitatis est. Piper calidus est & siccus in tertio gradu, uirtutem habet dissoluendi & confortandi, puluis eius naribus appositus sternutationem prouocat, & cecebrum à superfluitate phlegmatis mundificat, uinum decoctionis eius & ficuum siccarum, spiritualia mundificat à glutinoso humore, & miro modo ualet contra frigidum asma. Puluis etiam eius cum ficibus datus ad idem ualet, puluis etiam in cibis datus digerit, & confortat sanguineis & cholericis non est utilis usus piperis, dissoluit enim & quandoque inducit lepram. Item puluis eius super carnem positus eam corrodit. Auicenna dicit, quod cum melle positus in palato est conueniens ad anginam, & pulmonem mundificat cum aceto bibitum, & linitum est bonum apostematibus splenis. Item prouocat urinam, & elicit factum cum fortitudine.

De quercu, rouere, & cerro.

Quercus, rouer & cerrus sunt arbores magnæ, quæ sunt ferè eiusdem nature, multamque similitudinem habent in soliditate, & duritie lignorum, & foliorum forma & fructus, nam omnes produciunt glandes, omnesque profundas multas & magnas radices faciunt sed in arborum forma differunt, nam quercus breuem facit stipitem, & ramos magnos, ab omni parte diffusos. Cerrus est quæ stipitem facit longissimum, & ualde rectum, & paucos

paucos ramos. Rouer uero facit stipitem directam & altum, cum paucioribus ramis. Hæ arbores terram solidam & duram ac mendiocrem querunt, & montuosam uel montibus propinquam, resolutam uero & aquosam & præcipue sabulosam refugiunt. Seruntur glâdibus suis in seminario, uel in agro, uel ad ripas fossatorum positæ, mense Ianuario uel Februario & etiâ mense Nouembri colliguntur glandes, tempore quo maturæ uel ab arbore cadunt, & ad solem siccatae seruantur pro cibo porcorum, quibus est conueniens & bonus, omnes prædictæ arbores in aquosis sub terra diu durabiles sunt. Supra terram uero rouer melior cerro est. Glandes frigidae sunt in primo gradu, siccae in secundo, non utimur eis in cibo hominum, sed porcorum, quia sunt digestionis inobedientes, & uentri cõstipatiuæ, & ideo ualent dyssenteriæ, & ulceribus uentri norum, & fluxui sanguinis. Sed tamen urinam prouocant, & corporis sunt nutritiuæ, quasi quædã grana, tardeq; de stomacho descendunt, & capitis dolorem faciunt, propter funum earum ex stomacho ascendentem, sed eius superficies multum est stiptica, & similiter ipsarum arborum gallæ, unde ualet ad sanguinis fluxum mulierum. Item decoctio earum conuenit intestinorum uulneribus, puluis etiam eorum combustorum in loco uulnere immisus humores putridos fluentes desiccatur. Anicenna dicit, quod etrû folia sunt uehementis stipticitatis, & fructus quidẽ glandis confert apostematibus calidis in principio. Folia præterea glandis faciunt coërere plagas cum ieruniur & puluerizantur desuper. Et gallæ ipsarum liniantur cum aceto super impetiginem & auferunt eam.

Et puluis earum spargitur super aquam & bibitur ad uulnera intestinorum & ad fluxum antiquum: & similiter quando ponitur in medicinis conueniens est ad hanc operationem.

De Sorbo

De Sorbo,

Sorbus est arbor nota, cuius fructus duplex est, scilicet par-
uus, rotundus, & hic ex femina producit, uel maior pa-
rum longus & acutus, qui ex mascula procreatur, amat lo-
ca humida, & proxima frigida, & in montanis uel montibus pro-
ximis locis magis quam in uallibus & remotis à montibus delecta-
tur, solum pinguiſſimum desiderat, cuius indicium certissimū facit,
quod in huiusmodi locis frequētes uidentur nasci. Mense Ianuario,
Februario & Martio locis frigidis. Calidis uero Octobri & No-
uembri. Sorba seruntur egregie, ita ut maturata in seminario ipsa
poma pangantur. Plantas etiā si quis ponere uoluerit, habebit ara-
bitrium, dummodo calidis locis mense Nouembri; temperatis Ianua-
rio & Februario, frigidis Martio disponat, planta est transſeren-
da robustior: scrobem desiderat altiore, & spacia longiora, ut
quod illi maximo prodest à uentis frequētibus agitata grandescat.
Mense Aprili uel ultimo Martij sorbæ inscruntur in citonia, spīnam
albam, licet in ea parua proueniat, sub cortice & in trunco, uel, ut
puto, etiam in piro, & in malis competenter inseri potest. Gaudet
irrigatione temporibus siccis, & assidua fossione. Formanda est, ut
unum solum habeat stipitem circa 10 uel 12 eleuatū à terra. Si uer-
mes patiatur insectos, qui in earum aut pilosi solent internam me-
dullam secare, aliquos ex his ab arbore detractos, incendio uicino;
cremare debere Palladius ait. Quo genere alij creduntur sugere
uel perire. Sorba seruantur hoc modo, lecta duriora & posita ubi
miserere ceperint, fistilibus usq; ad plenum clauduntur urceolis,
gypso desuper tectis, et in b. pedanea scrobe loco sicco sub sole mer-
gentur, ore peruerso, & desuper spissius terra calcatur. Item secta
per tres partes siccantur in sole, & seruantur, uel per medium di-
uisa siccantur. Cum uero uoles uti aqua feruēti macerata reuui-
ſcunt sapore incundo, aliqui tamen pendiculis suis uiridia lecta sup-
ponunt locis opacis & siccis. Ex sorbis maturis situinum sicut ex
piris

Piris. Lignum sorbi est solidum non corrigenu, sed facile frangibile, quare optime leuigatur. Ideo ualde est conueniens operibus uasorum scrineorum, & idoneum ijs quae superficiem tersam & politam requirunt. Rubrum tamen habet lignum. Sorba frigida sunt et sicca, uentrisq; constipatiua, etiamsi sint perfecte matura.

De Zezulo.

Zezulus est arbor quaedam parua, multum scabiosa. Cuius folia multa, quasi in uno ramunculo sunt coniuncta, simulq; tempore hyemis ab arbore cadunt. Eius fructus similis est baccis rosarum, uel fructui oliuarum, unum tantum habens os, aërem desiderat temperatum, nec frigidum formidat. Et in terra pingui & soluta latatur. Seritur nucleis suis in seminario mense nouēbri aut februario, satis & diligenter nutrire oportet, quae cum conualuerint biennio uel triēnio transferantur. Seritur etiam plantis super radicibus matris natis. Inferi eam posse putato in spina alba, & forsan in pruno mense februario & martio scisso trunco. Et formatur ut unum solum habeat stipitem, per sex pedes eleuatus à terra. Colliguntur autem zezula uindemiarum tempore, quando rubedinem uel uarietatem ostendunt, & quia satis sunt delectabilia, ad edendum tamen modicum nutriunt.

De Zanipro.

Zaniprus est arbutula satis nota, quae aërem calidum aut temperatum desiderat, & terram arenosam, solutam & fere sterilem, & maxime oritur & fructificat in littore maris, & in montibus fere sterilibus, in quibus est soluta terra, quae lima uocatur. In locis uero aquosis et uallibus non uiuit, quia nimia humiditate corrumpitur, & nutrimento sicco & modico sustentatur. Huius arbutulae sunt duae species, sed species mascula, quae in altum porrigitur, & ualde modicum fructum facit, & foemina quae iuxta terram ramos quasi serpendo expandit, quae miro modo toto fere

tempore anni fructificat, & fructum maturat. Item est tertia species pulchrior & melior. Fructus superioris speciei est parvus, rubens, & grossus, ut parua cerasa, sed fructus superioris speciei est parvus & niger. Hæc arbutula sylvestris est, & in dictis sponte nascitur locis. Tamen si quis eam plantare desiderat nucleis suis serat, uel plantulas eradicatas de loco matris quo uoluerit transferrat. Item eius radices multum sub terra demergat, quæ nec fossione letatur, ubi locus nimis fuerit adustus, uel nimis siccus & durus, mense februario & martio est serenda, putari aut formari nõ eget nisi forte quis masculum uelit propter uoluptatẽ aliquam in altum extollere. Colligitur autẽ fructus, cum successiue eius nigredine uel rubedine maturitatem fatentur. Eius lignum rubrum pulchrum & quodammodo uarium est, odoriferum, competitq; ueribus, quæ suum saporem carnibus ex ipsis assatis conferre dicuntur, fiunt etiam ex ea coctlearia satis pulchra. Fructus eius calidus & siccus est, & multum ualet contra frigidum tussim si comestus edatur. Rami eius cum fructu & frõdibus in aqua uel uino cocti, & in uasa ex muffa infecta, cum ipso uino uel aqua calidissima positi & obdurato uenædone in eadem agitati, uasa mirabiliter liberant, ipsisq; saporem & odorem laudabilem præstant.

De arboribus non fructiferis & omni utilitate ipsarum.



alphabeti.

Vfficienter dictum est supra de arboribus fructiferis, & de cultu & utilitate ipsarum. Nunc autem dicendum breuiter de omnibus arboribus & fructibus infructiferis quæ reperiuntur in partibus nostris, & de utilitate ipsarum, secundum ordinem

De Abiete

De Abiete.

Abies & quæculgo vocatur picula & arcefe ferè eadem sunt arbores, non enim coluntur, & in alpibus & locis niuosis magnæ ualde proueniunt, & omnes miro modo directe in altum extolluntur, frondes uirides omni tempore habent ex ipsis fiunt arbores, & antennæ nauium magnarû, quibus nullæ aliæ arbores sufficere possunt, optimæ sunt in omnibus operibus sic eis edificiorû, quia lenes & rigide sunt & durabiles, & asides ex eis factæ ubiq; plurimû domos exornant, fiunt etiã ex eis uasa uinaria, tam magna quàm parua sed in eis facile uinum in acetum mutatur. Sed arcefe præcipue competit situlis in quibus aqua desertur. Nam species per aquam facile utiuntur.

De Amedano.

Amedanus quæ alnus uocatur, arbor est quæ nō colitur, sed in locis palustribus & aquosis præcipue delectatur, & fabricis inutilis est, sed necessaria si locus humidus fundamentis planus est. Nā sub terra ilico radices infixæ uiridis emittit, & in grossa ta ex pluribus palis prope positis & in unâ corpus redactus fortissimû & diu durabile fundamentû facit. Item ex ea conuenienter incisoria fiunt, & passides, quibus rarissime accidunt crepature.

De Azero.

Azerus est arbor satis magna, quæ in alpibus inuenitur, quæ optime cōuenit cyphis, & parapsidibus & incisorijs faciendis & uasculis, et omnibus delicatis opibus, quia eius lignû est magnum, albû et solidû, & ualde politû efficitur, sed eius parapsides facile per calorem scinduntur, nisi factæ sint de quaterno, id est, de ligno in quatuor partes scisso aut de nodosa siue nervosa radice.

De Anoruo.

Anoruus est arbor parua, quæ similiter circa alpes oritur. Cuius medianus cortex datus in cibis aut potibus, mirabiliter uentrem laxat.

De Agnuscasto.



Agnuscastus est frutex, id est arbutula parua, quæ omni tempore uiridis reperitur in aquosis locis magis, & in siccis minus, & eius lignum est durum, & folia eius sunt sicut folia oliuæ, sed sunt leniora. Calidus est & siccus in tertio gradu, secundum Auicennam est calidus in primo & siccus in secundo. Flores, folia competunt usui medicinæ, & magis flores quàm folia, & flores quidem agnuscastus uocantur, qui in uere colliguntur, & per annum tantum seruantur, & uirides sunt maiores efficacie, quàm siccati. Dicitur autem agnuscastus, quia libidinem repræmendo castum facit, lectus enim ex eo factus libidinem stringit, prohibendo pollutionem, & uirge erectionem, ut Auicenna dicit. Promouentur genitalia, etiam ex aqua decoctionis eius, & succus potetur. Contra gomorrhæam decoquatur modicum castorij in succo eius, & detur in potu. Item folia & flores eius decoquantur in aceto, addito castoreo, & genitalia cataplasmentur. Et nota quod quidem extinguunt libidinem inspissando sperma, ut semen lactuæ, citrulli, melones, cucumeres, cucurbitæ, portulaca, acetum, agresta, camphora, & similia, quedam muniendo spiritus & consumendo sperma, ut ruta, maiorana, agnuscastus, cymium, calamentum, & anethum. Hæc sunt calida apertiuæ, & uentositatem exterminant & soluant. Item fomentum factum ex aqua decoctionis agnuscasti matricis exiccat superfluitates, & ipsius angustat orificium. Contra lethargiam uaslet decoctio agnuscasti, apij, & saluie in aqua salsa. Si ex ea fortiter capitis pars posterior fricetur, Auicenna dicit, quod suffumigantur mulieres, cum uehementis desiderium coitus adest, & liberantur, & eius folia fugant uenena.

De Buxo.



Bvxus est arbor parua, quæ solidissimum, croceum & pulcherrimum habet lignum, pulcherrimæ frondibus & uiridibus semper uestita est, ex quibus domicelle ferta faciunt.

hnt. Plantari potest nō solum si plantula radicata de stipite matris euulsa ponantur, sed etiam si rami eius denudatis frondibus infinguntur in terram. Rasura huius ligni quia frigida est & sicca, decocta in aqua putæi constringit fluxum, ut dicit Diasc. Tingit etiam crines si eius decoctione sepius abluantur. Ex ipsius ligno fiunt optimi pestines, & cochlearia, & manubria cultellorum, & calculi & tabule cereæ, & omne opus paruum quod pulcherrimū lignum sculpendum requirit, recipit enim & retinet commode omnem formam.

De Grillo.

Grilus est arbutula parua, quæ in arenis fluminiarum oritur, quæ pulchras ualde uirgulas & multas emittit. Quæ colliguntur mense Aprili, cum succus in eis mouetur, & excoriantur. Deinde fiunt ex eis corbes, caueæ auium, & casei succandi & conseruandi, & canistra, in quibus panes portantur & fructus. Item ex radicibus eius ligantur manubria falcium, & saltellinorum, & quæ ad incidendum ligna & putandas uineas sunt necessaria.

De Cypressso.

Cypressus est arbor nota, & pulchra, quæ uiridis semper existit, & ideo in claustris monachorū frequenter plantatur. Eius lignum est ualde odoriferū & pulchrum, & ex eo fiunt pulcherrimæ astides, quas homines libenter ponunt in fundis instrumentorum musicorum, ut ciubare, & aliorum, & in omnibus operibus delicatis. Hæc arbor, ut ait Auicenn. calida est in primo gradu, & sicca in secundo. Et quidam dicunt, quod est frigida: folia & nux eius stiptica sunt, & folia eius delent morphæam, & consolidant uulnera, & nux eius confortat nervos, & roborant mollificationem, & stringunt etiam, & decoctio nucis cum acetō sedat dolorem dentium.

De Canna siue arundine.

Canna siue arundo nota est, terram desiderat mediocriter humidam & pinguem. Canneta fiunt hoc modo, uide licet quod pastinata equaliter terra mense Februario & breuissimis scrobibus uno pede distantibus cannarum oculi per scrobes singulas obruuntur. Si calida & sicca provincia est, ualles humidas irriguas opus est deputare cannetis. Si est humida regio, locis medijs instituantur, sed succo uillarum subditis. Ligonizantur ut uineæ, & ligonibus in equalitate terre equabimus mense Octobri & Nouembri. Sed siqua sunt antiqua canneta, mense Februario sarcientur, recisis quæ sunt in radice purganda, & putribus male porrectis, & siqua gignendi non habent oculos. Ex cannis fiunt pali, & perticæ uinearum, & scorea quibus intra se domus pauperum distinguuntur, & secundum Auicennam sunt uehementis inofrigidationis. Et folia canne, radix & cortex conferunt alopecie, & abstergunt sordes, & radix cum capæ syluestri extrahit carni infixæ. Et lanugo quæ est flos eius quando cadit in aurem, facit euenire surditatem, qui inuisatur in ea & non egreditur.

De Genesta.

Genesta est quedam arbutula, adeo parua, quæ plurimum ad herbe naturam accedit, quæ in montibus & locis maritimis oritur, & flores facit ualde pulchros, quibus profertis domicelle utuntur ramisculis eius. Deficientibus iuncis possunt palmites uinearum ligari. Item ex genestis potest fieri stuppa, quæ loco canapi uel lini succedere potest.

De Fago.

Fagus est arbor magna, nascens in alpibus, ex qua optime fiunt lanceæ, & sellarum asides & librorum. Item fabricis utilis est in sicco, sed humore corrumpitur. Isidorus autem dicit, quod glans siue fructus fagi est multum dulcis.

sis. Et eius medulla est muribus amica, & glires impinguat, turdis & columbis conuenit, & eos nutrit, & eius carnes concoctu faciles facit. Eius ligni substantia multum operibus est apta, sed non multum durat, quia à uermibus corroditur. Item est necessaria uitarianæ arti, si nondum à uermibus corrosa est: quia ex eius cinere utrum cum aliorum quorundam appositione per ignis conflagrationem artificialiter preparatur.

De Fraxino.

Fraxinus est arbor satis magna, quæ in pinguibus & humidis nemoribus delectatur, eius lignum satis igni competit, & est optimum pro circulis uegetum & cadorum & scalis turrium. Item ædificijs idonea est hæc arbor exiccata, non uiridis, dum tamen terram non contingat, quia statim humore corumpitur. Eius etiam sylua de tertio in tertium uel quartum annum incisa optimas pro uincis profert peticas. Plinius autem dicit, quod folia fraxini sunt utilia contra uenenum. Nam succo expresso potui dato cõtra serpentes, & eius umbra summe auxiliatur: tantaq; ei est uis contra serpentes, ut eius umbram uespertinam uel matutinam non attingant. Et si inter ignem & fraxini folia ponitur serpens, in ignem potius quàm in folia fraxini fugit. Et eius cortices & folia uentrem stringunt, & nonnium ex defectu uirtutis contentius factum, si cū aqua plumali & aceto coquatur, & super stomachum ponatur, sedat. Et est arbor calida & sicca in secundo gradu.

De fraxinagolo.

Fraxinagolus est arbor fraxino in frondibus & in ligno similis, quæ in locis domesticis seu cultis delectatur. Hæc arbor fructum quandam siue granula parua producit, quæ nigra sunt quando matura exsunt, & ualde dulcia, sed sere nihil super ossa ex pulpa habent. Item exiccata multis mensibus conseruantur.

De Fusco

De Fufano.

Fufanus est arbor parua quæ in sepibus oritur, ex cuius ligno
fiunt fusa optime, & alia hoc genus.

De Oplo.

Oplus, id est, taxus, est arbor parua, quæ in alpidibus & montibus eis proximis inuenitur, quæ optima est pro balistis ligneis & arcibus faciendis.

De Opolo.

Opolus est arbor satis magna, quæ lignum habet ualde albidum & pulchrum, ex quo fiunt optima iuga bouum, incisorie passides, & asides, pro delicatis operibus faciendis.

De populo & albaro.

Populus & albarus sunt ferè similes arbores in magnitudine, & forma frondium, sed populus magis in altum extollitur, & eius lignum non politur. Albarus uero magis per latera ramos extendit, & est lignum eius albidius & pulchrius pro asidibus faciendis, ædificijs in sicco satis competunt, licet longissimo tempore in eis non duret, locis humidis & arenosis præcipue populus delectatur. In montibus locisque saxosis ac cretosis durare non possunt. Plantatur ramis annalibus uel biennialibus, uel etiam maioris ætatis in terram infixis, & facillime comprehendunt. Item compertum, albarum incidi & quocumque inerint fragmina incissuræ, inde quasi spissam sylvam nasci, potest etiã hoc euenire ex pullulatione radicum, quæ circa præcisam arborem uniuersam occupant terram in superficie eius, propter quod etiam præfate arbores plurimum inueniuntur obesse uineis, & frumentarijs agris.

Populus hoc habet proprium, quod si æstiuo putetur tempore, aut perit, aut infirmatur, aut scabiosa efficitur.

Dicitur autem populus, eo quod incisa
pullulat ad modum populi,
ut dicit Isidorus.

De Rosarijs.

Rosaria nota sunt. Ex his autē quedam alba, quædā rubra. Et iterum quedam domestica, quedam sylvestria sunt, alba vero tam sylvestria quàm domestica fortes constituunt sepes, quia multas & fortes habent spinas, & omnes adeo retortas et uolentes ingredi retinent uolētē. Sed rubra rosaria debiles uirgulas producant. Plantantur autē plantulis & uirgultis in paruas particulas diuisis, & in seminario satis seminibus. Et semina quedā sunt quæ in pomulo rubeo sunt collecta, quorū maturitas ad plantandū apta cognoscitur, cū post uindemias calorem fuscum et mollitiem quandam habent. Si qua sunt antiqua rosaria circūfodiuntur, & ariditas reciditur uniuersa. Item quæ rara sunt, possunt uirgarum propagine reparari. Rosa frigida est in primo gradu, sicca in secundo. Viridis & sicca competit usui medicinæ. Siccantur autē aliquantulum ad solem, & possunt per triennium seruari. Cum receptio rosarum inuenitur sicca ponendæ sunt in medicinis, quia facilius conteruntur. Ex uiridibus autem fit mel, uel saccharū rosatum, aqua rosata. Mel rosatum sic fit, primo mel spumatur, deinde coletur, postea addantur folia rosarū, abietis stipitibus, & quibusdam albis, quæ sunt in parte inferiori, & minutatim incisa ponantur, & fiat decoctio aliquantula, & signum decoctionis eius est odor & color rufus. In septem libris mellis una rosarum ponatur, per quinq; annos seruari potest. Et habet uirtutem confortandi, ex aromaticitate, mundificandi ex melle, competētē datur phlegmaticis, cholericis & melancholicis, in hyeme & æstate debilitatis, cum multa facta ex aqua & melle rosato; & facit mundificationem stomachi ex frigidis humoribus mel rosatum cum aqua decoctionis feniculi seminis tribus granis salis additis. Vel fit hoc modo: Succulentorum rosarum una libra ponatur in cacabo ad ignem posito, cum bullire cœperit uiridium rosarum cum sorficibus uel cultello incisarum libra quattuor addantur, & dum bullierint, semper ad

gitetur, & in fissili uase repositis quantomagis tenebitur tanto melius erit. Cum aqua frigida stomachum confortat, & consilipat, & cum calida mundificat, datur in mane & meridie. Eodem modo fit mel violatum, & ualet capitis doloribus febricitantibus cum tepida datum. Saccharum rosatum fit sic, folia rosarum uiridissimum pistata conterantur bene, & ponantur in uase uitreo per uiginti dies ad solem, & quotidie moueantur, & bene commisceantur. In quatuor libris sacchari libra una ponatur rosatum, & potest per triennium seruari, uirtutem habet constringendi, & confortandi, & ualet contra dyssenteriam, & leuenteriam, & diariam ex debilitate uirtutis continuae factam. Item ualet contra uomitum cholericum, contra sincopim, & cardiacam passionem, cum fit ex calefactione spiritualium datur cum aqua rosata. Electuarium de succo rosarum fit sic: Recipe sacchari, succi rosarum ana lib. 2. & drach. 4. sandali trium generum drach. 6. spodij drach. 9. diagridij drach. 12. camphoræ drach. 1. tempera admodum eleuarij, cum sirupo facto ex saccharo, & succo rosarum, & datur cum aqua calida admodum castaneæ in matutinali hora, ualet etiam contra guttam calidam & cholericam rubeam purgatur, & conualescentes tertianarios quotidie purgat, sine molestia, & reliquias malorum humorum, quæ ibi remanserunt potenter educit. Sirupus rosatus sic fit, quidam decoquunt rosas in aqua, & in tali aqua rosata addunt saccharum, & faciunt sirupum. Alij autem faciunt, ponentes rosas in alio uase, habentem strictum orificium, & supereffundunt aquam feruentem, & dimitunt ibi stare donec aqua sit rubea, & inde faciunt sirupum, & hic est optimus. Et nota quod sirupus factus ex recentibus rosis prius aliquantulum laxat, postea constringit, factus uero ex siccis in principio & in fine constringit. Contra fluxum uentris, & uomitum cholericum, datur cum aqua pluuiali, uel rosata. Febricitantibus post minutionem cum aqua frigida potui datur. Contra sincopim similiter secundum Nicolaum

colatum sic fit : Accipe rosas recentes , & pone in uase per se & in caldario pone aquam donec bulliat , & bullientem super rosas prædictas infunde , & postea uas ipsum tege , ne fumus exeat , ex quo aqua ibi refrigerit , rosas elice , & alijs recentibus aquam bullitam eandem , iterum superinfunde , mutando rosas , donec aqua illa rubea fiat , de hac autem aqua quatuor libras accipe , & ibi libras quatuor sacchari infunde . Cum autem bullire inceperit , album ouorum aliquod in aqua frigida multum concutias donec spumescat , & illā spumam in sirupo bulliente spargendo infunde , & cum ferè nigrescere illa spuma inceperit , suauiter cum tacia remoue , & iterum aliam infunde , donec clarus fiat sirupus & cum cœperit sirupus quasi filum facere si cum digito tetigeris aut taciæ dependens adhaereat , coctus est . Valet calori & siccitati febrilium , sitim reprimi & confortat & consipat . Eodem modo fit sirupus uiolatus , & sirupus nenusarinus , qui ualet contra maximos calores in acutissimis ægritudinibus . Oleum rosatum sic fit : quidam decoquant rosas in oleo communi , & colant , alij terunt rosas uirides , & in oleo & uase uitreo soli exponunt per dies quinquaginta , & hoc est bonum . Sed secundum Nicolaum fit hoc modo : in duabus libris olei communis abluti libram unam uiridium rosarum aliquantulum concutiarum ponantur in olla plena , posita super ignem in caldario pleno aqua suspensio , & tam diu bulliant donec aquæ tertia pars inde minuatur , quod demum album pannum lini immixtum torculari deprimatur , eodem modo fit uiolatum sabatinum & neritinum oleum , & ualent ista olea contra acutas febres , inuncta super epas , & pulsus & tempora , & plantas manuum & pedum , quoniam calorem extinguunt . Aqua rosata fit multis modis : Nam quidam sunt qui habent patellam plumbeam quam ponunt super quodam textu euerso , cui est ab una parte osium , unde sub eo ponatur ignis , & inter textum & patellam est cinis , grossitudinis digitorum duo-

rum, ne aqua saporem fumi accipiat, & circa textum est fornacella parua, de lapidibus ac luto facta, deinde patella rosis impletur, & capellum plumbeum ponitur super ipsam, ita quod uersus partem unde aqua rosata egredietur aliquantulum pendeat, & ignis continuo pendeat super ipsa patella, tantum quod rose dimittantur in ea, quod in eis humiditas sit consumpta, & tunc reiciuntur. Et alie recentes in earum locum ponuntur, & in alio uase uitreo super pipeo capellæ posito, aqua recipitur, deinde in gestarijs ad solem positis, quibusdam diebus decoquenda relinquitur, & seruatur. Alij uolentes succi omnem uaporem fumi & odorem euicere, in aqua rosata ponunt patellam prædictam ad capellam in cacabo aqua pleno. atq; in fornacella disposita, quod ab una parte possit in co aqua immitti, quæ loco eius quæ ab igne consumitur succedere possit, hæc est optima. Quædam in filo folia rosarum posita in uase uitreo ut suspensa in uase ex aliqua parte adhæreat soli exponunt, desuper adeo claudunt ut uapor rosarum exire non possit. Et hæc est melior quàm ulla poterit esse: tamen ualde parû & cum nimio labore fieri potest. Habet autem uirtutem constringendi, & confortandi fluxum uentris, & uomitum cholericum. Detur rosata simplex uel aqua decoctionis mastichis & gariophylorû, & præcipue contra fluxum ex debilitate uirtutis cõtinentiæ, uel acumine medicinæ, & quando ipsa nimis ducit, sincopantibus & cardiacam patientibus detur in potu, & super aspergatur faciei. In colyrijs competenter ad oculos ponitur, & in unguentis ad faciem quia abstergit pannum faciei & subtiliat cutem. Rose siccæ naribus appositæ cerebrum confortant, & reparant spiritus, contra fluxum uentris ex cholera detur aqua pluuialis in qua rose sunt decoctæ, ad idem ualet emplastrum de rosis. & albumine oui & aceto posito super renes et pedinem. Contra uomitum fiat decoctio in aceto & spongia marina intincta ori stomachi superponatur. Contra sincopim detur aqua decoctionis rosarû, detur etiâ puluis in ouo sorbili.

Item.

Item contra ruborem oculorum, si sentiantur puncture, ualent rose
secoctæ in aqua & cataplasmate. Flos rose, quæ interiorius reperie-
tur, ualeat contra fluxum uentris & uomitum. Item puluis eius lineæ
superpositus humiditatem eius consumit. Et nota quod succus rosæ
rum tari diu in uase uitreo potest seruari per annum. Auicēna di-
cit, quod rosa rectificat sactorem sudoris, quando in balneo admi-
nistratur. Et emplastrū de rosis coctis & contritis, & non expre-
sis positum super aposthemata calida soluit ea.

De Rosmarino.

Rosmarinus est quedam parua arbuscula odorifera, quæ
semper habet frondes uirides, & quæ simulatur zampiro
& scopæ, marinis locis precipue delectatur, & ideo rosa-
marinus appellatur, plantatur autem plantulis euulsis de matris ra-
dice. Item ramis in terrā affixis, his mensibus quibus aliæ fiunt plan-
tationes. Calidus & humidus est, sed excessus eius non determinat-
ur in gradu, flores & frondes eius medicinæ usui sunt. Et flos eius
dicitur anthos unde dianthos electuarium fit ex eo, arbuscula ipsæ
etiam lanotides dicitur, uel detrolibanos. Vnde cum istorum rece-
ptio inuenitur folia debent poni. Flores autem aliquantulum desic-
cate ad solem per annum seruantur similiter & folia, uirtutem ha-
bet cōfortandi ex aromaticitate, dissoluendi ex caliditate, extergen-
di, mundificandi & consumendi ex siccitate, & diaforeticam ex ca-
liditate. Contra syncopim & cardiacam detur dianthos cum uino.
Item aliter fiat decoctio florum in uino: & tale uinum detur pati-
enti contra frigiditatē stomachi & ad digestionem cōfortandam,
detur dianthos uel uinum decoctionis florum & mastichis contra do-
lorem intestinorum & stomachi ex uentositate detur uinum deco-
ctionis eius & cymini, & contra cerebri frigiditatem fiat eius deco-
ctio in uino & patiens capite cooperto sumā recipiat. Contra humi-
ditatem uisæ accutum uel uinū decoctionis eius gargarizetur. Con-
tra stranguariam & dysenteriam, flores uel saltem folia decoctā in

uino cataplasmentur. Ad mundificationes matricis & conceptuum inuandum fiat fomentum circa pudenda ex aqua decoctionis eius, flores autem in oleo decoctos supponunt sibi mulieres.

De Rubo.

Rubus notus est, competit sepibus faciendis, quia eas fortes ac spissas & pungentes facit, sed per se non multū, nisi plantas arborum uel aliarum spinarum admixtas habeat, quibus sustineatur, quæ adeo sunt solidæ, quod non flectantur & destruantur ab eo. Plantatur autem plantulis suis, quæ facile inueniuntur, ubi capita tangunt terram, quia ibi statim radices emittunt. Item plantatur seminibus suis mature collectis, & siccatis, usq; ad initium ueris seruatis, & tunc seminatis, fructus eius sunt mora, quæ mulieres & pueri comedunt, sed optima sunt pro porcis. Rubus calidus est & siccus, ut quidam dicunt, Constantinus autem dicit summitates eius esse slipticas, & ualere contra uisturas, & calida apostemata, unde uidetur, quod sit frigida & sicca. Contra ruborem oculorum turiones eius cum utello ouorum conterantur, & addito croco superponantur oculis. Contra quaslibet uisturas cera munda resoluitur, postea addatur oleum rosatum, deinde succus turionū eius cum maiori quantitate. Contra calida apostemata folia summitatū trita cum aqua rosata superponantur. Cōtra dyssenteriam succus turionum eius cum aqua ordci pro clystere inijciatur, uel ex turionibus cum albumine oui & aceto fiat emplastrum super peccinē & renes, si sit uitio superiorum, lenticula aliquantulum exusta in succo eius detur ad manducandum.


De Salice.

Salix est arbor nota, sic dicta eo quod plantata facile salit in altum. Hæc arbor in locis humidis & arenosis & solutis delectatur, & non multum radices profunde figit. Plantatur optime sine radicibus, si terra perforata cum palo aut cum foratura. Planta biennalis in parte inferiori acuta foramini fortiter imprimatur,


instatur, & usque ad superficiem foramen ex sabulo impleatur, vel terra soluta. Terra ubi plantatur cretosa sit, deinde creta superponatur, quod si soluta est, terra in qua plantatur sufficit si ex eadē impleatur foramen. Cui multum proderit si eisdem cardinibus, quibus in salice steterat apponatur, sit autē eius plantatio mense Octobri & Novembri aut Februario & melius mense Martio, cum iam ipsis plantis, super salice adhuc existentibus, viridis succus se effunderit. Eis autem plantamense Aprili & Maio abradatur quicquid in stipite præter superiorem oritur partem. Tertio quoque aut quarto anno incidantur omnes equaliter sex pedibus supra terram, sed si duobus tantum pedibus supra terram ipsius formarentur stipites, proceriores produceret perticas, & longiori duraret tempore: quia hæc arbor tanto in ramis erit fecundior, quanto est terra propinquior, & est ad incidendum aptior. Veruntamen si est in loco animalibus expósito magis timetur corrosio ipsarum, quæ octo vel decem pedibus à se invicem distare debebunt, ne si nimis spissæ fuerint superfluis umbris perimant ea quæ seminantur in agris. De tertio in tertium annum perticæ inciduntur, videlicet subtiles iuxta salicem, & grossæ tribus vel quatuor digitis remota ab ea, incidantur rotunde, vel non multum oblique, & quicquid est in salice siccum vel mortuum amputetur, nec fiant in eis cannales remota sed paulatim per omnia latera equaliter diffundantur. Hoc enim modo perticas proceriores, & minus ramosas efficiunt, & tempore longiori durabunt. Et nota si eo anno quo non inciduntur & amputentur, nimis parva & inutilia remanentes virgæ suscipiant maius incrementum. Ex ligno salicis solido pro perticis faciundo non exciso, fiunt trabes & materie domorum satis bone, & ex grossis fiunt asides & conchæ, & unguisoria, & uasa multa uinaria, ex concavis vero fiunt cochlearia & situle & stria, ex ramis fiunt umina, & ex minimis fiunt sepes & clausura curiarum, & porticorum, & multa alia utilia. Hæc arbor competit
usui

usui medicinae secundum corticem, folia & flores, habet uirtutem constringendi & consolidandi contra dyssenteriam. Succus expressus, ex folijs, & potui datus ualet contra ulcerationē intestinorum, ex dyssenteria factam. Puluis ulcerationem exteriorum partium consolidat, detur puluis eius corticis combusti in potu aliquo. Item puluis, ut testatur Dioscor. cum aceto potui datus & cum aceto cataplasmat, nervos & poros curat. Item folia salicis respersa aqua ponenda sunt circa febricitantes. Isaac autem dicit, floris & seminis salicis hanc esse uirtutē, quod si qua illud in potu sumpserit prolem non generat, sed efficitur infecunda.

De Sauina.

 Auina est arbor satis parua, quae semper uiridis est, & habet folia cypresso similia. Haec arbor satis commode uiuit in omni aëre & loco, & in uiridarijs & in claustris religiosorum, quia circulis & perticis circa eam positis ramos undique conuenienter expandit, plantatur autem ramus, sicut de buxo dixi in terram affixus. Haec arbor calida & sicca est in tertio gradu. Cuius sola folia competunt medicinae, & per biennium seruari possunt, uinum decoctionis eius ualet contra dolorem stomachi & intestinorum. Item decocta cum uino ualet contra dyssenteriam & stranguriam cataplasmata ualet etiam contra iliacum dolorem. Est enim diaphoretica & diuretica, fomentatio autem ex aqua decoctionis eius in uino ualet contra praedicta, & etiam menstrua prouocat, & foetum mortuum educit. Item decocta cum oleo & superposita idem melius operatur. Contra tenasmon ex frigida causa ualet, si fiat decoctio eius in aceto & uino, & fumum patiens recipiat.

De Sambuco.

 Ambucus est arbor quaedam quae in sepibus nascitur, & ramis in terram affixis plantatur, & facillime comprehendit. Ex cuius ligno grosso uel mediocri fiunt arcus, & ex grossiori non nodosa fiunt optime sagittae. Item fiunt canellae

tinaciorum

inaciorum & negetum ex eius ligno. Virtus eius est calida & sicca in secundo gradu, medicine competit principaliter cortex eius, secundo flores & folia, uirtutem habet diureticam & attractiuam & purgatiuam. Contra quotidianam precedente purgatione, ante horam accessionis detur uinum decoctionis corticis mediani sambuci. Item succus sambuci per se datus uel cum melle lumbricos interficat. Ad menstrua prouocanda succus corticis eius per sarigatur uel folia cataplasmentur, fomentum ex aqua salsa decoctionis eius corticis tumorem pedum soluit & dolorem exteriorum parat.

De Sycomoro.

Sycomorus est quedam arbutula paruula similis sanguino, & forma ligni, que pulchras ualde producit uirgas, & eius cortex ualde pulcherrimus, adeo adheret ligno, quod ex eo fiunt pulchra manubria cultellorum, & nascitur in nemoribus prope alpes.

De Sanguino.

Sanguinus est arbor quedam similiter parua que multum pullulat in sepibus, & eas ualde inspissat sed spinis caret, & pulchras & solidas uirgas producit, ex quibus fiunt breuicelli ad auculas capiendas, & uimina ipsius texendis telis optima sunt.

De Spina alba.

Spina alba est arbor satis parua, que optima est pro sepibus, quia ualde acutas habet spinas, nec in radicibus per agros pullulat, & in se optime recipit insitionem, mespila & pirus & malus in ea facile comprehendunt, sed ad debitum augmentum uenire non possunt, propter inequalitatem magnitudinum earum. Lignum habet album & solidum. Ideoque competit pyxidibus & coclearijs. Frigida & sicca est in secundo gradu, & eius decoctio confert instrumentis iuncturarum & podagrae, & confert ad molificationem stomachi.

De Spina Iudaica.

Spina iudaica melior est omnibus prosepibus, quia in quolibet folio duas habet spinas, unam habet uidelicet magnā rectam & acutissimam, & aliam paruam retortam, & spissam sua pullulatione constituit sepem.

De Spina ceruina.

Spina ceruina non multum sepibus competit, quia non est bene spinosa, sed ex ea pro uineis optimi fiunt pali, quia sub terra multo tempora durat.

De Scopa.

Scopa est arbutula ualde parua, similis zanipro. Cuius radix est rotunda & adeo dura & nodosa, quod ex ea optimi fiunt cyphi.

De Tamarice.

Tamarix est arbor calida & sicca in secundo gradu. Vinum decoctionis eius ualet ad oppilationem splenis et epatis. Item stranguriam dissoluit, & plus in cibo cocta, ad idem ualet, frequens bibitio cum uase ex tali ligno facto, cortices aut maioris sunt efficacie quam folia.

De Ulmo.

Ulmus est arbor nota quæ plantatur plantulis cum radicibus uiuentis, quæ facile conualescant, hæc arbor optima est ut uites super eam ascendant. Ex ligno eius fiunt trabes, & materia domuum, licet non diu durent in eis. Item fiunt mozoli rotarum, & fusoli molendinorum, & scale turrium in his ualde competunt. Item fiunt mallei ad ligna scindenda & uasa uinaria stringenda, quia tenax est & non facile scinditur lignum eius. Item fiunt force, & competenter omnia instrumenta quæ tenacitatem requirunt, ut potius eruantur quam rumpantur aut

aut scinduntur, & folia quidem eius optima sunt pro pabulo bouum.

De Vinco.

Vincus est nota, quæ plantatur, ut salix, quæ eiusdem est nature, & ideo conuenienter in eam inseritur. Et quedam facit uirgas croceas, quedam nigras, quedam rubeas, item quæ in loco calido & exili oritur tenaciores uirgas producit, quæ uero in umbris aut in loco pinguiſſimo minus tenaces facit. Item est alia species uincorum quæ gorræ uocantur, quæ optime sunt pro tinis & uergetibus, quia longis ramulis carentes & in summitate grossas & ualde tenaces uirgas producant. Et hæc quidem facillime comprehendit, si ex uirgis fiunt frusta semipedem minora, & in terram figantur duobus solum digitis supra terram relictis, quæ nullo tempore in stipite altius ascendere debet.

De Vindecto.

Vindectus est arbor nota quæ locis delectatur aquosis, ex qua sunt pro uincis competentes pali.

De Subere.

Suber est arbor, cuius cortex grossus est, & optimus ad pannelas & zinas, qui singulis tribus annis uel quatuor ab arbore sua tolli dicitur & renasci, quod est contra naturam corticum aliarum arborum, quæ excorticate siccantur. Est enim cortex in arboribus sicut cutis in animalibus. Cuius si qua pars ab scissa sublata fuerit non renascitur in eodem statu, sed cum deformitate & maxima cicatrice.

LIBRI V FINIS.

PET·DE CRF.

SCENTIIS, DE HORTIS ET DE

natura & utilitate tam herbarum, quæ seruntur in eis
quam cæterarum quæ in alijs locis sine ho-
minum industria naturaliter
nascuntur,

LIBER SEXTVS.



Rastaturus de hortis & de industria cultus ipso-
rum, & de omnibus herbis quæ propter alimen-
tum humani corporis seruntur in eis, dicam de his
mixtis, secundum ordinem alphabeti, quæ sine ho-
minis ministerio ex ipsorum elementorum commu-
tatione in alijs nascuntur locis, quibus frequenter utimur, ut earum
uirtute corpora in aliqua egritudine lapsa ad salutem pristinam re-
ducantur, uel ante lapsum sana seruantur, huiusmodi namque cogni-
tio ualde utilis erit omnibus & præcipue habitantibus rura, ubi me-
dicinarum compositarum copia non habetur.

De uirtutibus herbarum in communi.

Dicimus quod arbor sola perfectam plantam contingit na-
turam, & in ipsa qualitates elementares magis recedunt
ab excellentijs, quas habent in ipsis simplicibus elemen-
tis. Herbe autem & olera secundum minorem satis rationem acci-
piunt rationem & nomen plantæ, & qualitates elementales in ipsis
magis sunt acute, & minus ab excellentijs simplicium elementorum
recedentes propter quod etiam sunt meliores, & quod à primo hu-
more pinguescente in terra minus recedunt, nec alte eleuantur, pro-
pter debilem uirtutem animæ uegetabilis in ipsis, quo autem uicinio-
res sunt elementis, eo uiciniores sunt materię. Et forma, quæ est ue-
getabilis animæ, minus uincit in eis, & propter hoc sunt efficaciores

ad transfmutandum corpora. Et ideo magis sunt adhibite medicinae, quàm alie, quod quasdam qualitates habent à componentibus, quasdam à compositione, quasdam autem à specie secundum sydenra: à componentibus uero habent calfacere & refrigerare, humectare, exsiccare, à compositione autem habent has qualitates frictas & aliquando adherentes, & aliquando subtiles, & penetrantes, quoniam multe earum n si habent calores fractios in humido precipue & frigido, absq; dubio ea quibus adherent exarrent & incenderent: idem autem est de frigiditate, quoniam n si fracta esset mortificaret, similiter autè est de humido & sicco. Atq; calor non staret adherens in floribus, nisi teneretur ab humido & sicco aliquantulum passione siccum penetraret, nisi subtilitatem acciperet ab humido, & acumen à calido, & retinentià à frigido, & detentionem à specie. Habent autem qualitates & operationes multas & mirabiles, sic quod aliqua uirtute purgat choleram, ut scamonia; & aliqua uirtute purgat pblegma, ut ebulus: & aliqua melancholiam, ut sene, & sic de alijs. Has enim uirtutes non habent à componentibus elementis, neq; ab ipsa compositione, quoniam compositio non dat uirtutem, sed uirtus componentis ipsa dat modum agendi uel patiendi, sed sunt compositiones istae & qualitates à tota specie causatae, à uirtutibus coelestibus & à uirtute animae, non enim unquam calidum purgaret, sed potius consumeret, nisi à uirtute coelesti causaretur hæc operatio. Sicut enim in intellectu practica sunt formæ per se mouentes corpus eius in cuius sunt intellectu, & in exterminationibus animalium sunt formæ quæ mouent animalia, ita sunt formæ quæ à motoribus orbium per figuras stellarum influxu generalibus, quæ sunt formæ per se etiam mouentes ipsas ad quasdam qualitates elementares, per illum modum nullo modo mouent. Experimento autem scimus, formam formine intra existentem, mouere ad uenerem per se ipsam, & ipsa sibi mouetur in corpora instrumenta & membra per quæ exercetur coitus, & si-

multiter forma artis per seipsam mouet, & quarit instrumenta conuenientia fini suo; & secundum hunc modum efficaciores sunt mouitores orbium mouentes formas inflare suis materijs, quas mouent motus stellarum & coeli, quam sit anima ad influendum formas tales corporis sibi coniuncti. Hæ autem formæ obtinentes materias generabilium & corruptibilium multis probantur effectibus, in lapidibus & plantis. Erunt enim multi effectus lapidum & plantarum, quæ experimento accipiuntur in eisdem in quibus student magici, & mira per eas operantur, & istæ operationes sunt quæ nec componentium elementorum sunt nec compositionis ipsius secundum se, sed sunt formarum secundum quod influxæ sunt ab intellectualibus & separatis substantijs. Amplius autem sciendum est, quod materia nihil agit per se, sed omnia patitur, & non sunt nisi tria formaliter in plantis, formæ enim sunt quæ sunt in eis aut sunt complexionales aut coelestes, aut animales ex anima uegetabili quæ est in eis. Et forma quidem complexionalis est in eis absoluta & comparata. Absoluta uero est ut calor, & frigus, humiditas & siccitas, & istæ absolutæ formæ uariantur maxime, secundum duo quæ sunt in planetis, quorum unum est elementi componentis quantitas secundum uirtutem, in una enim est plus caloris, in alia plus frigoris. Alterum autem per quod uariatur ista forma in agendo, est loci natura in quo crescit: plantæ enim habent qualitates locorum in quibus crescunt. Et secundum diuersitates climatū uariatur actio qualitatum & plantarum. Plantæ radicibus terre adherent & habent plus de qualitate loci, quam cetera quæ sunt mobilia de loco ad locum, quamuis enim mutabilia sunt secundum locum, immobilia tamen sunt dura, nisi suggestia locorum proprietates quæ etiam molles sunt primitus, & maxime herbæ, & sugunt nutrimentū suū à locis, sicut à uentre quodā: cōpositæ autem istæ eadē qualitates & acuitur & franguntur. Calor enim acuitur siccī dominio, frangitur autem & habetatur & ab aquea humiditate, et inde fit, quod aliquādo duæ plantæ habent duas

qualitates

qualitates equales, secundū essentiā, & tamē in equaliter agūt secundū eā, quod caliditas unius acuta est, et alterius fracta, inde etiā fit quod una fortius agit in profundū, altera fortius in superficie, que enim est in subtili humido, fortius penetrat in profundo, & illi adheret, & in eo congregatur virtus eius, & que adheret grosso sicco, forte maior est, & tamē nō pertingit nisi ad superficiem, eo quod penetrare nō potest grossa siccitas ipsius. Hoc autē modo etiā frigidū cōparatur ad siccū & humidū, quia licet omnis qualitas actiua fortificetur in grossa substātia postquā receperit eam, tamē ipsa grossities eius impedit penetrationē, & ideo minus agit in aliā, aliāquādo minor vel equalis que est in substātia subtili. Arguetiā qualitas illa actiua que est in substātia subtili, licet forte maior sit quā alia que sit in substātia grossa, tamen non perficiet operationem suam, quia evaporabitur cum subtili humido, in quo est antequam complet operationem suam, sed sic eam diutius agit, quia retinebitur in substātia grossa ipsa qualitas actiua.

De hortis & cultura ipsorum.

Generali sermone de hortis loquens, dicam in primis quod aērē desiderāt liberū & temperatū, vel iēperato proximū, quod patet ex eo quod tēpora & loca nimie caliditatis aut frigiditatis formidāt, & in eis herbe quasi ad ultimā ariditatē proveniunt, nisi tunc multis pluvijs aut irrigationibus adiumentur, & similiter videmus quod loca & tēpora mortificantis frigiditatis tollerare non possunt, item videmus, quod in locis umbrosis nullius vel modice utilitatis existunt. Terrā desiderant mediocriter solutā, & humidā potius quā siccā. Creta enim & argilla sunt hortis & cultoribus plurimū inimica, & herbe in nimis soluta terra posite in principio veris optime cōualescūt, sed in estate siccantur. Itē irriguus esse desiderat, ut supra se rivū habeat, quo possit per cōvenientes sudcos cū opus fuerit irrigari, q. si hoc habere nō potest, habeat in se piscinā, vel fontē fontē vel puteū qui in loco rivi succedat, & si nullū habere

habere potest fiant foueae multae paruae per ortū, in quibus pluriarū humor aliquandiu retineatur. Vnde Palladius egregie dicit, quod hortus qui cœlo elemēti subiacet, & fontano humore percurritur, prope est ut liber sit, & nullam ferendi disciplinam requirat. Item requirit terram pinguiſſimam, ideoq; in altiori parte sui finum semper habeat. Cuius succus cum sponte fœcūdat, & ex eo semel quolibet anno, si habetur copia eius, singula hortorum spacia impinguentur, eo tempore quo feri debebunt. Sit autē hortus domui proximus, longe tamen ab area situs, nam puluerem pallearum (quia herbarum folia perforat & exiccat,) patitur inimicū. Felix autem horti positio est, cui leuiter inclinata planities cursus atq; fluentis aque per spacia discreta deriuat. Si habetur copia terre horti exposte, partes eius sic diuidendae sunt, ut haec in quibus autumnose minabitur, uno tempore pastinemus, & quas semine uere complebimas, autumnū tēpore debemus fodere, ita ut utraq; pastinatio decoquatur beneficio aloris & solis. In locis autē humidis seminandis in uere utile erit circa finem Nouembris multos imprimere sulcos concauos, ad quos labatur superfluous arearum humor tempore reſationis, ut maturius talis locus tunc sulcis repletis seminibus impleatur. Si uero penuria terrae habetur, quocunq; tempore anni terra inter humiditatem & siccitatem inuenitur equalis pastinari potest, & statim feri: sed si optime sunt impinguata ea quae sata erūt, magis suscipient incrementum. Pastinum uero fiat profundum prima uice grossum cum uanga, & super terram finis spargatur, deinde cum ligonibus iterum minutatim pastinetur, & quantum fieri potest letamē & terra misceantur, & in puluerem deducantur. Cum autem seminandum erit, cum sunt fiant areae circa decem pedes amplae & longae quantum nolueris super quibus iaciabitur semē, & raſtro operietur: & siquid terrae dure in superficie remanserit conteratur, & iterum areae fino operiantur, maxime cum sit satio hyemalis, impinguat enim terram & à frigore semen defendit,

dit, herbae autem scilicet lactuca, beta, borago, colliculi, & ceterae quae in eo loco ubi sit seminarium praedictum erant euulsa, cum sit pastum comode plantantur circa sulcos ararium, ut in sequenti habeantur quadragesima, & seminario non auferunt nocementum, ex quibus quas uolueris poteris ad semen producendum seruare. Potest autem in hortis satio plurimum herbarum fieri toto tempore anni, quo aer & terra naturaliter seu hominis industria inueniuntur aequales, aut ab aequalitate non nimium discrepantes. Sed principalis & praecipue satio duplex est, una uernalis quae fit mense februario uel martio, altera autumnalis quae fit mense septembri uel octobri, ita tamen quod locis frigidis autumnalis satio maturius fiat, uernalis tardior. In calidis uero regionibus autumnalis serius fieri potest, & uerna maturius. Hoc tamen scias, quod in temperatis locis & etiam calidis praefata satio uerna melior inuenitur, si facta fuerit in fine nouembris, uel in principio decembris, quam si februario uel martio mense fiat, licet ante aduentum februarij semina non nascuntur, & porri & cepae citius poterunt transplantari, possunt autem comode seminari herbae separatim & mixtum. Nam si mixtim seminantur, cum conualuerint euellent quae fuerint transplantandae, ut porri, caules & cepae, & ex his quae transplantari non debent, primo euellentur atriplices & sp. nachia, quae non durant in hortis, & remanebunt beta & petroselinum, satircia & aliqui caules, & ex lactucis & forniculis aliquae quibus ad congruam tatem deductis sarculabuntur, & ad debitum ueniant complementum, & herbae quaedam quae transplantari non debent rare serende sunt, quae uero transplantantur sp. sius feri debet. Et est notandum, quod ubi debet plantari porri, cepae, & caules, phascoli, meliū, panicū, cucurbitae, cucumeres, melones, & citrulli possunt mense decembri, ianuario & februario feri omnes herbae quae consumuntur ante praedictam plantationem, ut sunt sp. nachia, atriplices & lactuca, caules porri & cepae & ceterae similes. Cavendum est ne quae se-

riuntur semina sunt corrupta. Ideoq; eligenda sint quæ farinâ interius habent albâ, & quæ magis fuerint ponderosa & pinguis, siue grossa & in pluribus sint utilia, quæ nõ excesserint anni ætatem. Sæpe tamẽ euenit quod semina quantũcumq; sunt bona, si iacta fuerint non nascantur ex aliqua malitia corporũ celestium impedita. Ideoq; utile est diuersa semina simul seri, ne tempus alicui semini contrariũ ex toto terram destituant, licet enim aliquando plantæ seinuicẽ impediunt, ut supra probatũ est in secundo libro, tamen herbas, ut plurimũ uidemus, cõmode simul nasci & uiuere, ut aperte patet in pratibus & in locis cæteris in quibus diuersis simul herbis & raro unius tantũ generis natura suo naturali motu producit, quam quidẽ sequi debemus in omnibus tanquã ducem. Scias autẽ quod omnis herbarũ satio est optima cum luna fuerit in augmento propter rationẽ quam supra dixi in libro secundo, & sæpe euenit ut non sit utilis satio cũ luna processerit in defectu. Fit autem transplantatio, ut sapor herbarum in melius cõmutetur & domesticetur, & quæ nimis spissæ nate fuerint, ad eò rare ponantur, ut sarculari possint, & ad debitũ peruenire augmentũ, nec est in transplantatione necesse firmari radices, sed in quibusdã est utile amputari radicũ summitates, ut in tractatu cuiuslibet herbe patebit. Sarculantur autem quotiens herbe nociuæ nascuntur in eis, quæ tam sarculo quã manibus optime auferantur, ne melioribus herbis surripiant nutrimentum. Fit etiã am sarculatio cum propter pondus terræ, ac imbrium compressionẽ & ambulantium conculcatione terra nimis fuerit consolidata, dum tamen scias, quod quando terra fuerit nimis mollis non tangatur, sed si fuerit nimis sicca, licet terra moueri non possit, herbe nihilominus sarculo recidantur, quæ res multũ proficit hortis. Accidit hortis multa nocumẽta, quandoq; autẽ necessitas nos cogit hortũ sacere in terra nimis solida et cretosa. Cui multũ proderit si sabulũ miscetur uel letaminis multitudo, et terra sæpius moueatur. Et quãdoq; terra est ad eò soluta q̃ humor cõceptus facile resoluitur, et hor

tas æstiuo tēpore nimis exiccatur. Cui proderit si eidē misceatur leta
mē & creta. si nō potest facile irrigari aut diu negatur coelestis infu
sio. Si autē hortus est omnino nimis aquosus, magnus cingatur fossatis
& per ipsum hortū fiant etiam fosse quod humor aquosus superflus
us defluat ad partes extremas: si fuerit uero nimis siccus & aridus
foveis non cingatur, quia horto subducū humores, & alie duobus
pedibus pascinetur, quia hortus sic cultus negliget siccitates, & tem
pore magni æstiu irrigetur, & plantæ parua obumbrentur.
Hieme uero frigida cooperiantur noue seminationes, ne superfluo
frigore quæ sata fuerint corrūpantur. Cōtra nebulas & rubiginē
paleas & purgamenta pluribus locis per hortū disposita simul om
nia cum nebulam uideris instare cōbure. Contra limaces qui eas
de horto remoueat sint lectores. Contra formicas qui habent in
horto cor noctue foramini apponamus, ut Palladius ait, uel origa
no uel sulphure tritis foramē asperge, si de foris ueniant, omne hor
ti spaciū cinere aut creta cingamus. Si seceris linēā de olco, nō au
debunt intrare donec fuerit exiccatum sed hoc est difficile. sed uti
le erit hoc facere cōtra arbores patiētes formicas & cōtra crucas;
semina quæ spargēda sunt semper succo madefiant erucarū per ma
nus fuerorū colligantur & occidantur cum hortiū infestant. Cicer
est inter olera propter multa portenta serendū, ut olera infesta nō
generet animalia in corio testudinis, omnia semina quæ sparsurus
es desicca, uel mentā locis pluribus & maxime inter caules sere. Cō
tra mures & talpas prodest in hortis cattas habere, aut mansuetas
mustelas. Alij foramina eorū creta & succo agrestis cucumeris im
plent, & alij foramē cum pastino usq; ad terrā solidam auferūt, de
inde ponunt aquā in foramine in terra solida existente, & inde en
grediens animal occidit. Præterea omnia semina horti ferūtur &
agri ab omnibus malis & noxijs animalibus aut mōstris intacta ser
uari, si succo radicū agrestis cucumeris et erucarū mixta macerētur.
Herbæ colligūtur propter cibū, ipsis recisis cultello modicū supra

terrâ, & ex multis sola folia colliguntur, quæ ad debitu peruenierint augmentu, ut in betta, felarea, boragine, petroselino, et in caulib. obseruatur, sed in hyeme caules totaliter inciduntur. Porro in his omnibus excepto petroselino, fœniculo, et salvia, et quibusdã alijs, si sæpe stipites cum nati fuerint uel creuerint auferantur, longiori tempore sine sem nibus uir des habebuntur. Verum propter medicinam oportet colligere, postquam integram incipiunt habere quantitatem, antequam florum alteretur color & cadant, sed semina colliguntur postquam eorum terminus figitur & exiccatur cruditas, & aquositas, & radices sumende sunt cum adest foliorum casus, flores colligere oportet post aperitionem integram, ante exterminationem & casum: sed tota herba colligi debet cum ad suam integritatem peruenierit. Et fructus quidem sunt colligendi postquam finitur complementum eorum, & antequam sint parati ad cadendum, & quæcunq; colliguntur decresciente luna meliora sunt, & magis seruabilia his quæ colliguntur crescente luna, & in eius augmento, & similiter quæcunq; colliguntur claro aëre, meliora sunt his quæ colliguntur in dispositione humiditatis aëris, & uicinitatis ipsius pluuiæ. Et syluestres quidẽ domesticis sunt fortiores & minoris quantitatatis, secundũ Plinium, & ex syluestribus montanæ sunt fortiores, & illæ quorum loca sunt uentosa & sublimia sunt præter alias fortiores, & illæ quarũ color fuerit magis tinctus & sapor magis apparens, & odor fortior, erunt potentiores in genere suo. Atq; etã scias, quod uirtus herbarum debilitatur post duos uel tres annos, sed plurimum herbar, flores & semina seruanda sunt in locis siccis, & obscuris, & in sacculis, aut in uasis constrictis melius seruantur, ne odor & uirtus eis exhaletur, & præcipue flores, radices autem melius in subtili arena seruantur, nisi sint radices quæ siccate seruantur, quæ similiter in loco sicco & obscuro melius seruabuntur, semina tamen porri, & ceparum melius, quàm aliter, in suis siliquis seruabuntur.

De Allio.



Allium mense Septembri & Novembri optime plantatur, in terra maxime alba, fossa et subacta, sine stercore, licet in alia terra etiam stercoreata proveniat sed inseri potest mense Octobri, Septembri, Februario & Martio, & in locis calidis mense Decembri, & si d. mittantur in terra quando matura sunt, reperiuntur eorum radices & folia, & faciunt semen sequenti anno, quod seminari potest, & allia producit. Plantantur in arcis uno pede seu palmo distantes. Item possunt poni in arcis herbarum duæ aut tres acies in qualibet. Sarculanda sunt frequenter, ut melius eorum capita crescant, si bene capitata facere volueris, ubi coeperint eorum stipites prodire, procul calca, ita quod succus revertetur ad ea. Colliguntur cum corum stipites se amplius sustinere non possunt, in lunæ defectu & claro aëre. Fertur enim quod si feruntur luna sub terra posita, & sub terris luna latente uellantur, odoris foeditate carebunt. Item in paleis condita vel fimo suspensa durabunt. Allium siccum & calidum est in medio quarti gradus, uirtutem habet consumendi, dissoluendi & expellendi uenenum. Contra morsus uenenatorum animalium, accipe allia & tere & cataplasmentur. Succus eius interius receptus discutit uenenum, ut tberiacum dicitur rusticorum. Contra lumbricos accipe allium, parum piperis, petroselinum, succum, mentem & acetum, & inde fiat salsamentum, & comedere cum pane vel carnibus. Ad aperiedas uias epatis animales meatus, fiat salsamentum cum uino & succo herbarum diureticarum, & detur patienti. Contra stranguriam & dyssenteriam & dolorem uirorum accipe allia & coque in uino & olco, & facias inde emplastrum & impone pectini & circa uirgam & loca dolentia. Allium uisum obest, quia desiccatur, & toti corpori nocet, si ultra modum sumatur, quia generat lepram, apoplexiam, maniam & multa alia. Auicenna insuper dicit, quod allium costum clarificat uocem & guttur, & confert tussi antiquæ & doloribus pectoris ex frigore. Isaac

dicat, quod parum dant nutrimentum, & sunt nociua cholericis, & calorem naturalem habentibus, frigidis & humidis seu liquidis naturaliter urinam prouocant, & ventrem humectant, & siccis naturalia contrarium faciunt, sed uolentes caloris eorum nocumentum uitare bis ea elixent, deinde condiant ea cum aceto.

De Atriplice.

Atriplex seritur mense februario & martio, & aprili & ceteris mensibus usque ad autumnum, si poterit irrigari, & non desiderat transplantari, & à quibusdam seritur mense decembri, in terra bene culta & stercorata, & melius prouenit si rara fuerit seminata, potest autem feri per se in suis areis simul cum alijs herbis, & semper amputandus est ferro, quia pullulare non cessat. Sepe etiam irrigari desiderat, si tempus fuerit magnæ siccitatis. Semina eius per quatuor annos seruari possunt. Atriplex frigida in primo gradu, humida in secundo, parum nutrit, eius liquor est aquosus, & cito eiicitur, & non est uetris solutius. Cataplasmata super calidum apostema, illico refrigerat & sanat. Semen eius est mûdio ficatum & colatum, & proinde utile est chericis habentibus, quæ nascitur de epatis oppilatione, ex quo duabus drachmis cum melle & aqua calida potui datus cholericis ualde prouocatur uomitus.

De Aniso.

Anisum desiderat terram bene pastinatum & pinguem, et optime prouenit si humore inuetur & stercore seritur mense februario & martio per se, & cum alijs herbis, ac semen eius suspensum per triennium durat. Anisum calidum & siccum est in tertio gradu, alio nomine dicitur cyminum uel forniculum romanum, & est semen cuiusdam herbe, quæ simili nomine appellatur, uirtutem habet dissoluedi & consumendi, potest autem conseruari per quatuor annos multa efficacia. Cum lauatur facies ex aqua ipsius clarificat eam, & similiter eius acceptio & usus cum mensura, sed nimis

nimis usus ipsius faciem citrinat. Contra uentositatem, indigestionem & acidas eructationes detur. Vinum decoctionis anisi, facinis culi, & mastichis uel puluis ipsorū in cibis, addito puluere cinamomi, & dolorem intestinorum ex frigiditate mitigat. Contra uitium matricis ex frigiditate, ualet decoctio eius cum alijs rebus diureticis. Contra liuorem ex percussione, & praecipue si sit in facie iuxta oculos coquatur cum cymino, & supponatur cum cera calefacta. Ad augmentationem lactis & spermatis ualet puluis eius sumptus in cibo & potu, & hoc operatur aperiendo meatus lactis & spermatis.

De Anetho.

Anethum desiderat communem hortorū terram, & seritur mense februario & martio, septembri & octobri, & in locis clementibus etiam mense decembri per se & cum alijs herbis, omnem caeli statum patitur. Sed in tepidiori latatur, rarius seratur & irrigetur, si non pluuiat, aliqui semen eius obruū, oppinātes quod ab aere nulla tangatur. Anethum calidum est & siccum in secundo gradu. Eius semen principaliter competit medicinae. Secundario radix recens. Nam radix recens habet uirtutem diureticā, calculi frangitiam, & uiarum urinalium apertiuam. Sicca uero nullus est utilitatis. Tertio herba. Semen per triennium potest seruari, melius tamen est si singulis annis in nouetur, decoctio herbae & seminis ualet ad stranguriam & dyssenteriam, & lac augmentat. Contra dolorem matricis fasciculi anethi bulliant in uino, & cataplasmentur. Semen eius uentositatem tumorem & inflationem dissoluit, & similiter rami eius, & ipsum semen uentrem de humorū putredine mundificat, habet etiam proprietatem extinguendi singulum de plenitudine factum, quod si uratur, calidum & siccum est in tertio gradu. Etiam ualet contra uulnera putrefacta & diuturna in uenire uita. Auicenna dicit quod assiduatio comestionis anethi debilitat uisum.

De Appio

De Appio.

Appium mense Februario, Martio, Aprili & Maio feri debet & multum multiplicatur in circuitu, & eius uetustiora semina citius nascuntur. Appiū aliud est domesticum, aliud syluestre: domesticum aliud hortense, aliud aquaticū. Quod in hortis nascitur calidum est, in principio tertij gradus, & siccum in medio. Idcoq; coctum uel crudum esui datum oppilationem aperit, urinam prouocat, & uentrem stringit: habet proprietatē constipationem membrorum soluendi, & uiam humoribus faciendi: unde nocet epilepticis & pregnantibus, eosq; ad stomachū uulnam & caput attrahendi habet uirtutem, nocet epilepticis & pregnantibus, & uomitum inducit. Vinum eius decoctionis torsionem uentris faciliā ex uentositate compescit. Semen est efficacīe minoris, secundo radix, tertio herba. Aquaticum autem ranum dicitur, eo quod in aquis nascitur ubi ranæ morantur, uel eo quod renibus opitulatur, parum est calidum, unde digestibilis est & calidis naturis conueniens. Cataplasma facta de eo & mica panis super stomachum positus eius ardorem mitigat, syluestre dicitur apium risus, eo quod melancholicum purgat humorem, ex cuius abundantia tristitia generatur. Apium risus in uino uel aqua decoctus stranguriam & dysenteriam soluit, & fumigium ex eo factū menstrua prouocat, uel succus eius suppositus. Et nota quod appium risus ore sumi debet, quia in quibusdam locis adeo uehementissimum inuenitur, quod si sumatur est causa mortis.

De Absinthio,

Absinthium calidum est in primo gradu, & siccum in secundo, duas dicitur habere uirtutes contrarias, scilicet laxatiuam & constrietiua, primam ex caliditate & amaritudine, secundam ex grossitie & ponticitate substantiæ, unde non est dandum nisi materia exsistente digesta. Debet autem colligi circa medium Maij, & in umbra siccare. Contra lumbricos in inferioribus

ribus intestinis existentes detur cum pulvere centaureæ, uel persicariæ uel nucleorum persicorum aut foliorum. Ad menstrua prouocanda persarigetur succus eius, uel fiat suppositorium ex eo, & apio & artemisia coctis in oleo. Contra ebrietatem detur succus eius cum melle & aqua tepida. Contra suffocationem ex sanguine, detur succus eius cum aceto & aqua calida. Ad duriciem splenis absinthium coctum cataplasmetur. Contra liuorem & dolorem membrorum ex percussione ex absinthij pulvere & cymini & melle fiat emplastrum. Contra duriciem & uermes aurium, instilatur succus eius. Succus eius potatus usum clarificat, & oculis impositus ruborem & panum remouet, libros & pannos à uermibus & tinea totos reddit, & tuetur & carthas à corrosione & corruptione.

De Artemisia.

Artemisia, que alio nomine dicitur mater barbarum, calida & sicca est in tertio gradu, folia eius magis quam radix competit medicinæ. & uiridia magis quam sicca. Valet contra sterilitatem, que fit à frigidityte. Nam si esset ex caliditate magis obesset, quod satis perpendi potest ex complexione mulierum, si sunt macræ uel pingues, detur ergo pulvis eius cū pulvere bistortæ, & nucis muscatæ, cū melle confectus, uel sirupo simplici, in modum electuarij. Item balneatur in aqua in qua sit cocta artemisia, uel ex tali aqua somnietur uulua, uel ex ea & oleo cōmuni fiat suppositoriū. Ad menstrua prouocanda fiat pessarium ex succo eiusdem. Contra tenasmon ex frigida causa, patiens recipiat sumum eius per anum, & herba calefacta & super lapidem posita sedeat super eam.

De Aristolochia.

Aristolochia duplex est scilicet longa & rotunda, & utraq;
calida & sicca est in tertio gradu, & quidam dicunt quod
est sicca in tertio gradu, radix magis quam folia competit medi-
ne. Radix colligitur in autumno, & exiccata per biennium potest
seruari in multa efficacia. Et folia cum floribus habent dissoluendi
& consumendi & expellendi uenenum, & morsum uenenatorum
animalium, datur succus rutæ cum pulvere eius, pulvis etiam eius
carnes corrodit in uulnere, & in fistula, ad expellendum factum
mortuum coquatur bene in uino & oleo, & radix eius, & fiat so-
mentum iuxta semur, pulvis eius aceto mixtus cutem optime & sca-
biem & saniem mundificat. Albertus dicit, quod habet mirabilem
uirtutem in attrahendo spinas & alia carni infixæ. Item dicit, quod
mundificat sordes auris, & mundificat & confortat aurem quan-
do ponitur ipsa cum melle, & prohibet saniem si generetur in ea,
si linatur super splenem cum aceto confert ualde, & rotunda in o-
mnibus est fortior.

De Abrotano.

Abrotanum est herba calida & humida in primo gradu, &
subtiliat uia & apertina ualde. Cuius emplastri inprohi-
bet attractionem neruorum ad membra. Item frangit lapidem in
renibus, & promouat menstrua sedendo super eius decoctionem, et
confert uicibus eius, & eiecit secundam, & factum, & confert
coadunatione oris matricis, & aperit ipsum, & duriciem eius bi-
bitum, & more emplastri superpositum.

De Alphodelo.

Alphodeli & centumcapita & albutium idem est calidum
& siccum in secundo gradu, folia eius sunt similia folijs
porri, radix eius competit medicinae magis quam herba, & uiridis
melius quam sicca. In radicibus eius inueniuntur quedam capita
in modum testiculorum, diureticam habet uirtutem attrahendi, d. s.
foluendi

solvendi & consumendi, & valet ad ea ad quæ valet anethum, & eodem modo. Item valet ad ea quæ valent contra maculas & onnem vitium oculorum, hoc modo. accipe unciam croci & uncias 3. mirrhe, bullas in libra media boni vini rubei, & libra media succi assibodeli usq; ad media partis consumptionem, uel ponatur ad solē in uase aneo, per tot dies ut ad medietatem reducatur miro modo dest, si tali collyrio illiniantur oculi.

De Acetosa.

Acetosa frigida & sicca est in secundo gradu, in ipsa est stipticitas & superat choleram, & eius humor est laudabilis, radix eius cum aceto confert scabiei ulcerosæ, & excoꝛiatio ninguinis. Ex ea fit emplastrum scrofolis, ita quod dicitur si radix eius suspendatur in collo habentis et inuictur, & eius decoctio cum aqua calida confert pruritu, & similiter ipsa in balneo est proptissima, & comeditur propter desiderium cibi.

De Blito.

Blitum desiderat terram pinguiſſimā, humidam, ster coratam & subactam, & optime proficiet. Seritur propter cibum mense decembri, februario & martio precipue. Sed potest ferè toto anno serri, si inueniatur terra æqualis, & optime quæ spissa fuerit rareficatur, & alibi transplantatur, cum aliquantulum erueat, ut sit quinque uel quatuor foliorū, radicibus suis simo recenti obrutū, & quæ inueniuntur in loco ubi sunt seminaria euulsa et seminatis areis, plātetur circa ipsa ab utraq; parte sulcorū. Itē potest serri in areis ubi sunt melones & citrulli aut cucurbitæ, cum incipiunt ramos extendere, siue sint ibi cepe siue non, quæ remanebūt remotis melonibus, citrullis & cucurbitis. Sarculanda est sepe, et ab herbis inutilibus liberanda, si per se sola fuerit. Sed blitum quæ propter semina colligenda seritur optima erit, si seratur mense augusto, deinde mense ianuario per sulcos hortorum uel per arcas transplantetur, hæc enim

postea nobiliora semina serunt. Et nota, quod ex eodem semine bliti nascuntur nobiles, quedamque primo anno non producant, sed solum anno sequenti. Et hæc debent propter esum seruari. Et quedam nascuntur ignobiles, quæ prima æstate surgunt in stipitem, & semen producant, & hæc extirpentur de horto, cum semen proferunt. Item feri potest & cum alijs mixtim quæ remanebunt & sarcalabuntur remotis quasi cæteris herbis. Eius semen per quatuor annos durat. Blitum frigida & humida herba est in tertio gradu, laudabilem chimum generat, uentrem humectat, & conuenit calidis natura uel accidentaliter calefactis, & sitim extinguit. Blitum lentes & alias immundicias capitis & faciei maculas emendat. Capillos capitis reparat, & conseruat, malos humores nutrit, si nimium sæpe in usu habeatur, ut dicit Dioscor. Auicenna dicit, quod super eius radicem sicut & super caulem potest plantari surculus, qui tandem roborata radice in arborem transmutatur.

De Boragine.

Borago feritur mense augusto, septembri, decembri & aprili, uel sola in areis, uel circa nouellas areas aliarum herbarum, nec apte alio tempore feri potest, & transplantatur congruo ferè toto tempore anni, semina eius colliguntur seminatura, ne de siliquis cadant, & herba cum seminibus per duos uel per tres dies ponitur in acruum, ut semina maturitatis recipiant complementum, & super linteamine concutitur seu conteritur, super quo semen facillime cadit, aliter enim haberi non posset, semen per duos annos seruatur. Borago calida & humida est in primo gradu, habet enim proprietatem leticiam generandi, si in uino missa potui datur. Cor enim ualde confortat, unde ualet cardiacis cum aqua cocta, & cum melle, aut saccharo potui data. Canales pulmonis, pectoris & gutturis optime mundat, optimum sanguinem generat, unde conalescentibus ex ægritudine, sine opem patientibus

tibus, cardiacis & melancholicis commesta cum carnibus uel condita cum sanguine. Contra syncopim datur sirupus ex succo eius & saccharo factus. Contra cardiacam addatur dicto sirupo pulvis de corde cerui. Contra istericiam comedatur frequenter coriaccum cum carnibus, item succo eius & scariole utatur patiens.

De Ocimo.

Basilicon que est Ocimū, calida & sicca est in primo gradu. Cuius tres sunt species, scilicet gariophilatum, quod habet folia minuta, & hæc maioris est efficacie. Item est beneuentanum quod latissima habet folia. Hæc herba ex aromaticitate uirtutem habet confortandi, & ex qualitatibus dissoluedi, consumendi, extrahendi, extergendi & mundificandi. Contra syncopim & cardiacam ipsius herbe decoctio datur, cum aqua rosata. Ad idem ualet uinum in quo eadem herba per noctem steterit & si in eo cocta fuerit, tale uinum multum confortatiuum & aromaticum erit, & ualet contra predicta & contra indigestionem ex fluxu uentris ex frigidityte. Sed contra fluxum ualet precipue si herba uel semen quod est melius decoquatur in aqua pluuiali, cū modico aceto, & talis aqua datur patienti. Item ualet ad matricem mundificandam & menstrua prouocanda.

De Betonica.

Betonica calida & sicca est in primo gradu, folia eius precipue competunt usui medicine uiridia & sicca. Ad dolorem capitis ex frigida causa fiat gargarismus ex colatura decoctionis eius cum straxigonia in aceto. Contra dolorem stomachi datur decoctio eius in succo absinthij cum aqua calida. Ad matricem mundificandam & conceptum iuuandum fiat somentum ex aqua decoctionis eius, fiat etiam suppositoriū & datur eleuatium confortatiuum ex puluere eius & melle.

De Branca ursina.

Branca ursina calida & humida in primo gradu, virtutem habet molliendi, contra frigida apostemata conterantur folia eius cum axungia porcina ueteri & superponatur. Contra vitum splenis fiat unguentum ex ea contrita diu in oleo macerata & colatura eius addatur cera.

De Bistorta.

Bistorta est radix cuiusdam herbe simile nomine appellata, & que frigida & sicca est in tertio uel in secundo gradu, virtutem habet constringendi & consolidandi & confortandi. Contra uomitum ex debilitate uel feruore, pulvis eius conficiatur cum albumine oui super tegulam coquatur, & detur patienti. Contra dysenteriam detur cum succo plantaginis: ad menstrua constringenda da fiat fomentum ex aqua decoctionis eius & puluere ipsius.

De cucurbita.

Cucurbita desiderat terram pinguem, bene subactam, stercoreatam & humidam, plantatur in fine Aprilis, & principio Maij, tribus uel quatuor pedibus distantes, hoc modo, bina grana simul mittantur circa tres digitos in terra, & rami deorsum & acuitas sursum mancant eleuata, sed per noctem an tequam plantentur mittantur in uas aqua plenum, deinde grana eliciantur natantia, & plantentur alia que non natant in loco, ubi ponuntur, misceantur cum terra & latamine. Nec plantentur in fossis ne pluuie aggregentur in eis, & germen extinguant cum bene nate fuerint & eleuata, modicum supra terram sarculantur, & circa eas terra ponatur, & cum opus fuerit paulatim irrigentur. Et si plantate fuerint in terra parum mota, cum augeri incipiunt, uniuersa terra circa eas posita fodiatur profunde, ut radices possint extendere per spacia uniuersa, & cum creuerit coopertura fiat desuper ad modum

modum vineæ ad staturam hominis, & rami foliati ponantur de-
super propter umbram, & super ipsas cucurbitas propter calo-
rem herba ponatur, ut melius crescant. Vel sinantur ire super ter-
ram earam vites si placuerit: cui multum proderit, ut multa & ci-
tius poma faciat, si ipsius capita principalia & grossiora modie-
cum in summitate rumpantur, ut ramos faciant qui poma pro-
ducant. Item inuentus est modus plantandi maturius cucurbi-
tas & melones, & habendi maturus fructus, ponatur parum
de terra trita super massam finii calidi nuper extracti de sta-
bula mense Martio, & super dicta terra plantentur semina,
hec cito nascuntur, propter calidum finium & finium eius, &
nata defendantur in noctibus à pruinis coopertorio aliquo, &
tempore quo pruina cadere destitit, statim cum modico illius
terra & finii transplantentur ubi uolueris eas esse, quæ pro se-
minibus seruare uolueris grossiora, quæ de primo nati s fue-
rint usque ad hyemem in uite sua indurare permittite, deinde ad
paruum finium suspende ubi semina optime seruabuntur. Et
nota quod grossities appendentiæ futuram cucurbitæ magnitu-
dinem indicat, & cum plantare uolueris aperias, & scias quod
quanto in altiori loco cucurbitæ semina fuerint, tanto longio-
res creabuntur. Et nota quod semina predicto modo seruata
per triennium seruabuntur. Cucurbita frigida & humida est in
secundo gradu, phlegmaticum chimum generat, unde compet
calidis natura & proprie cholericis, nam ipsorum calorem mi-
tigat, & suum extinguit, & est eis optima, & maxime si cum
cotonijs aut maligranati succo aut agresta aut aceto malorum
granatorum detur. Phlegmaticis autem detur cum pipere, si-
napi uel menta. Et si in pasta inuoluta affertur, & succus in
pasta inuentus potui detur, calorem febris mitigat, & suum
extinguit. In acutis febribus datur aqua eius uel sirupus ex ea
factus, & ipsa cum carnibus cocta cholericis in æstate confert.

Semina

Semina eius frigida & diuretica sunt, propter subtilitatem substantie, & præcipue competunt medicinis. Contra oppilationem epæstis renum & vesicæ, & contra apostemata pectoris semina mundata & à corticibus suis bene terantur, & in aqua bordci aliquantulum coquantur & aqua colata potui detur patienti. Si autem non potest bibere talem aquam fiet ex ea sirupus. Et nota quod maiorem habent efficaciam si non bullierint, sed ablaſcentur.

De Cucumeribus & citrullis.

Cucumer & citrulli desiderant eandem terram cum cucurbita, & eisdem mensibus, eodem modo plantantur & cucufodiuntur, sed habere debet intervalla maiora & postquam nati fuerint omnino non rigentur, quia in rigatione facile destruantur, & cum plantata fuerint, eorum semina per sex uel octo dies inquirentur ne sint corrupta, quod sciatur si dura sunt uel aperiantur, quod si mollia, non sunt bona. Ideo loco ipsorum alia sunt ponenda, & iterum post sex dies rimanda, & alia ponenda si inueniantur corrupta. Herbis iuuantur, & ideo sarculo & runcatione non indigent. Si semina omnino lacte & mulsâ maceres dulces nascuntur, & candidi, longi & teneri, & si aqua in patenti nasculo sub eis ponas duobus palmis inferiores tales fiunt ut Martialis affirmat. Cucumeres & citrulli frigida & humida sunt in secundo gradu, & sunt ualde indigestibiles, & citrulli deteriores sunt cucumeribus, & in utroque pars exterior est durissima ad digerendum, sed medulla ipsorum perfectiorem generat chimum, habentibus calidum & fortem stomachum, & exercitantibus in æstate consueverunt cum substantia sua phlegmaticis, & ociosis nocent multum, et specialiter stomacho & nervositati eius. Sed aqua siue succus eorum confert febricitantibus, & statim sedat, non comeduntur cocti, sed crudi tantum. Sed cucurbitæ coctæ solummodo comeduntur. Citrulli quanto minores & teneriores & uiridiores seu acriores sunt tanto melius

to meliores, nec boni sunt postquam eorum substantia ad duriciem & color ad citrinitatem accedit. Sed cucumeres meliores sunt, maturi existunt, quod cognoscitur cum molles sunt & leuiores sunt.

De Caulibus.

Caulis in omni aëre proueniunt, & terram desiderant pinguem mediocrem & stercor atam, & profunde fossam, & amant potius terram mediocrem quam sabulum aut cretam. Caulium quidam habent folia plana lata & grossa, & his cōmuniter utimur in partibus nostris. Quedam sunt folia crispissima, & hij licet boni sint, tamen sunt minus mundi propter crucas & alios uermes qui nimis occultantur in eis. Sunt etiam caules quidam habentes folia magna, subtilia & aliquantulum crispa per totum, qui caules romani dicuntur, & hij meliores sunt omnibus magisq; coquibiles, si terram ualde pinguem habuerint, in macra meliores sunt: Seminari possunt & transplantari toto tempore anni, quo tempore terra non fuerit congelata, aut adeo siccata quod coli non possit, & durant eorum semina per quatuor annos. Et qui seruntur mense decembri, februario, martio & aprili & maio habentur toto aestate & hyeme, donec pruinis & nimio frigido destruantur. Quod si stipites eorum nō euellantur, in uere produciunt semina, quæ cum matura fuerint colligantur, utuntamen si plures, auferantur ab eis ramusculi seminum cum nascuntur, ita quod materia seminis consumatur, uinciuntur: & postea folia pulchra produciunt, & per annos plures eorum uita durabit. Quidam tamen nimis facile semina produciunt, & hij non possunt sic facile seruari. Alij uero sunt qui non sic facile semina proferunt, & his proprie competit hæc cautela: Et qui seminantur postmodum augusto usque ad octo dies intrante septembri, deinde plantantur de mense septembri uel octobri uel aliquantulum creuerint erunt magis pulchri in quadagesima sequenti, & post ipsam, & semina non produciunt & gelu & pruinam hyemis non timebunt. Si uero ante datum tempus

serantur semina producunt in quadragesima, & conuenientes erunt, quod si post dictum tempus serantur nimis teneri et debiles erunt, quod si post dictum, & ueniente frigore hyemis non durabunt, & hæc in partibus Tusciæ Bonon. sunt probata. Spissi ualde feri possunt, & irrigari si tempus fuerit nimie siccitatis. Et nota, quod caulium semina per quinque annos dicuntur posse seruari. Cum uero plantantur in foramine cum palo facto amputentur summitates radicum, ne cum ponuntur sursum plicentur, quod eis magnū nutrimentum auferret. Et nota quod ponendæ sunt incrementi maioris quoque, quia licet serius comprehendant tamen fortiores sunt, nec est necesse quod radices fango uel molli letamine liniantur, nec quod terra sit mollis. Nam & in mediocriter sicca planta uiuunt, licet arescant folia, donec ueniente pluuia prima confortabitur rigor eorum. Et non solum caules mense martio uel aprili plantate, sed etiam quæ iunio iulio, augustoque mense plantantur erunt in hyeme magnæ, plantentur autem foli in loco ubi nihil aliud est. Et optime & similiter proueniunt per sulcos omnium herbarum, ceparum & aliorum, scilicet una acies per sulcum uel duæ, si una in qualibet parte sulci per unū brachium uel minus ab inuicem sint separati. Sed quanto rariore plantantur, tanto maiores efficiuntur, & quanto spissiores tanto minores erunt. Item caules quoque diximus pro quadragesima esse plantandas, optime plantantur inter magnos caules in duplo spissiores quam ipsi magni sunt, prius optime culta terra, & quasi in puluere redacta, qui remanebunt maioribus rescatis poterunt rarificari, ut magnifiant & durent per totum annum, & tota illa æstate semina non producent. Item plantari possunt per agros inter milium, panicum, & fabas per sulcos frumenti, & cæterorum granorum, & inter cicera & sulcos melonum & cucumerum. Item possunt plantari in uineis & in his bene proueniunt, sed eas maxime ledunt. Compertum est enim caulem esse inimicum uitis, & debilitare plurimum, & adurere si fuerit iuxta ipsam. Item caue

cum

cum caulem plantas, ne tantum terra submergas quod summitas
 stipitis plantule non remaneat super terram, quia statim planta
 periret. Caules sarculandi sunt & herbis inutilibus liberandi, &
 cum post incensionem, siccitatem aestatis veniunt pluvie quibus re-
 novari sperantur, auferantur & ab eis folia inutilia quæ sicca fue-
 rint & perforata. Caulis frigida & sicca in primo gradu. Sed Au-
 uicenna dicit quod est sicus in secundo gradu. Turbidum & me-
 lancholicum generat sanguinem, & eius nutrimentum paruum est.
 Cum uero coquatur cum carne pingui aut gallinis fit bonus, parum
 ius eorum uentrem humectat, & urinam prouocat. Eorum uero
 corpus est siccum unde constipatiui sunt, ergo simul recepti in hac
 actione temperati, sed solum ius datum soluit, & substantia sola cō-
 stipat. Nocumētum eorum auferitur si elixentur, & aqua proie-
 cta coquantur in allia cum pingui carne pecudum, aut suis cum pi-
 pere aut cum cymino aut oleo dentur. Auicenna dicit, quod eius
 decoctio & semen ebrietatem tardant. Et ex proprietatibus eius
 est exiccatio lingue, & facit somnum comestio eius clarificat uo-
 cem. Galenus dicit: si caules assati dentur pueris ad comedendū
 dum, faciunt eos citius ambulare. Plinius dicit, quod folia can-
 lium mire sanant vulnera canum. Item dicit, quod caulis parum
 coctus soluit uentrem, & multum coctus stringit eum: & dicit,
 quod caules confortant nervos, unde ualet paralyticis & tremu-
 losis, lactis ubertatem præbent, & eius succus ualet contra uene-
 num, & contra morsum rabidi canis.

De Cepa.



Epa desiderat terram solutam, pinguem & optime
 subactam, eorum semina durant per annum tan-
 tum. Sed in mari suffensa per triennium seruantur
 illesa. Scrivitur à quibusdam mense nouembri circa
 principium & maxime per uniuersam Tusciam, & fit super
 ipsarum seminarium uelut pergularum de aliquibus strami-

n'bus coopertum uersus aquilonem, per unum brachium, & per
 duos uersus meridiem eleuatum, & à multis feruntur mense De-
 cembri, Ianuario, Februario, Martio, cum primum possunt feri So-
 le feruntur in areis, n'xtimq; cum alijs herbis feri possunt, cum ali-
 quātulum creuerint siue sit mense Aprili uel Martio uel Iunio plana-
 tantur in areis per unum semissim uel spannam ab inuicem separan-
 ta, & in area quatuor acies poni debent. Quas uero uis ante ma-
 turitatem comedere, plantabis in areis ubi sunt cucurbitæ, cucumen-
 tes citrulli uel melones. Et cum hæc creuerint sæpe colliguntur ubi
 etiam si dimittantur ad maturitatem perueniunt, licet non sint ita
 grosse sicut hæc quæ in areis sole plātantur. Cum plantari debent,
 rescinduntur radices usq; ad grossitudinem unius uel medij digiti,
 iuxta cepam, & per unum digitum tantum sub terra merguntur.
 Hæc enim planta facile adeo comprehendit, quod si solummodo po-
 neretur uel caderet super terram uel ad partes longinquas porta-
 retur etiam discooperta in terra quasi arida, dum tamē optime pula-
 uerizata plantentur summa facilitate nascetur & angebitur. Sæ-
 pe circumsodi desiderant & ab herbis quibuslibet liberari, quod si
 terra eodem anno stercoreata non fuerit debet plantationis tempo-
 re stercoreari, ut optime conualescat. Collectis autem cepis maturis
 quod patet cum se sustinere non possunt & amplius non augetur,
 Meliores earum plantarum mense Augusto ut anno sequenti semen
 faciant, deteriores uero plantantur ut in quadragesima uiridia hæ-
 beantur, mediocres uero seruantur, quæ si in augmento lunæ euiden-
 se fuerint elaro uel sicco tempore existente, melius seruabuntur in
 loco obscuro & sicco. Cephæ calidæ sunt & humide in tertio gradu,
 proinde sæpius comestæ cum sui acumine humores malos in stoma-
 cho generant: & sitim, inflationem, uentositatem, dolorem capitis
 atq; insaniam faciunt, propter fumū ex eis ad caput ascendentem,
 & cerebrum percutientem. Vnde affuescentes eis, cadunt in mania-
 am & terribilia somnia, & melancholica cernunt, præsertim si ex
 egritudine

egritudine excuntes eas comederint, cruda uero comestæ nihil nutrimenti corporis tribuunt, sed si elixentur & in aqua proiecta in alia coquantur dant nutrimentum bonum & plurimum, maxime si cum carne pinguisima & cum bono condimento odorifero condiantur. Si autem cruda propter medicinam moderate secundum quod oportet sumantur, calorem inducunt grossos & viscosos humores incidunt, uenarum ora aperiunt, urinam & menstrua promoucant, & appetitum augmentant, & uenerem suo calore & humiditate augent. Succusq; earum naribus intrusus, uel si odor earum patienti naribus fuerit attractus caput optime purgat. Cruda uero comestæ incrementa capillorum præstant. Auicenna dicit, quod in cepis est acuitas incisina, amaritudo, stipticitas: & quod est longius est acutius, & rubrum est acutius albo, & siccum humido, & crudum cocto, & in ipso est attractio sanguinis ad exteriora, quare est rubificatiuum cutis. Cephæ præterea cum comedantur proprie prodest nocumento aquarum, & semen eius delet morpheam, & cum fricatur ex eo in circuitu alopecie confert ualde, & ipsum cum melle eradicat uerucas, & plurimus usus eius nocet cerebro, & sunt ex eis quæ nocent intellectui, propterea quod generat humorem malum.

De Cymino.

Cyminum desiderat terram pinguem, & aërem calidum, & seritur mense Martio, siccum & calidum est in tertio gradu, per quinque annos potest seruari, uirtutem habet diureticam & fumositatem subtiliandi, unde sumptum in cibis & potibus & salisamentis digestionem consortat, unum decoctionis eius & siccum siccaturum & seminis fœniculi dolorem & torsionem intestinorum ex uentositate mitigat. Item unum ualet contra frigidam tussim. Contra tumorem faucium cyminum & ficus bene tritæ in uino coquantur & emplastrum factum super locum dolentem imponatur. Contra frigidum reuma capitis puluis eius & baccarum lauri simul

in testa calefactus, & in sacculo positus capiti superponatur. Contra stranguriam & dyssenteriam & alios dolores ex frigiditate cuminum cum uino coctum superponatur. Contra sanguinem oculorum non in principio sed post pulvis cymini cum vitello oui confectus super tegulam calidam ponatur, & diuisum per medium sepius superponatur. Contra liuorem, & commixtionem, uel alio modo factum, dum recens est pulvis cymini subtilis bene confectus ad ignem, & sepius appositus certum remedium est. Et nota quod ex frequenti usu cymini fit discoloratio cutis, ideo fratres minores, quia multum eo utantur, sunt multum croci sic uolunt uideri multum ieiunare & de hoc summe gloriantur,

De Croco.

CROCUS est duplex, scilicet syluestris, qui seritur sicut alie herbe, qui est modice utilitatis, sed facit altum stipitem, & multas maculas in quibus nascitur crocus, qui cum apparet in ortu solis colligitur. Item est bonus crocus domesticus, qui non seritur, quia semina non producit, sed cepule eius colliguntur mense Aprili uel Maio, & dimittuntur octo diebus in accruo, ut maturentur, & tunc mundantur & siccantur in loco calido, non tamen ad solem, ne coquantur, cum sint mature, quod cognoscitur quia tunc folia eorum sunt sicca, & seruantur usque ad mensem Augusti, & tunc uel ante aut post una separata ab alia in arcis pastinatis plantentur cum radicibus quas habent per unam spannam distantes, in quatuor digitis submergantur in sulcis uel duobus uel tribus annis dimittantur, & quolibet anno mense Aprili si fuerint tunc folia sicca & mense Maio, Iunio, Iulio, si herba nascitur in arcis immittantur, superando terram per totam superficiem per duos digitos deorsum, ut non tangatur cepa. Et si plantantur circa finem Augusti aut mense Septembri radatur terra, ut area ab omni humiditate seu uiriditate mundaetur, deinde nascentibus floribus colligantur, &

*fur, & crocus siccus siccetur ad lentum ignem & aliquo loco clauso
seruatur, & elapsis duobus vel tribus annis totus euellatur mense
Aprili, & iterum plantatur, ut dixi. Terram desiderat cretosam vel
mediocrem, & potest optime plantari ubi fuerint cepæ, ubi sunt
iunisse. Et est sciendum quod crocus non multum leditur umbris,
sed plurimum leditur à muribus, qui sub terra corrodam cepas
eius: contra quos nihil qui sub terra tantum ualet contra tendere
trapulas iuxta eorum foramen, & sulcos inter areas concauos face
re, qui eam defendunt ab humore aquo, quæ ualde timent, & pro
pter hoc sunt impeditiōes transfuū murū & talparum, quæ mul
tū appetunt cepas eius. Crocus est calida & sicca in primo gradu,
in suis qualitatibus temperatus, & ideo confortatiuus ualde, unde
contra debilitatem & defectum cordis multum ualet. Ruborē oca
lorum ex sanguine uel macula tollit, sitritus cum rosīs & uitello
oui apponatur oculo, ut dicit Diosc. Item qui crocū prius bibit ebri
etatem & crapulam non timebit. Item coronæ ex eo facillè non per
mittunt homines inebriari. Item somnum facit & stimulat uene
rem, ut dicit Plinius. Item dicit, quod curat morsus serpentium &
arenarum & puncturas scorpionum.*

De Cepulis.

Cepule Malixie plantantur ut porri cum palo mense Iunio
scilicet unā in foramen per unum pedem distantes, quæ
magnum ut uulgo uocant, cassum faciunt. Quo postea utimur
state sequenti post pascha, & sunt ferè eiusdem complexionis cum
alijs cepis.

De Carduo.

Cardus scribitur mense Martio, terram stercoratam dili
git & solutam, quamuis in pingui posset melius proue
nire, & hoc illi prodest contra talpas, si, non in solidiori terra
pangatur, ne ab inimicis animalibus facile perforetur. Sunt in

arca iam perfecta cardui luna crescente ferendi, semina discreta spacio semipedis. Cauendum est ne semina immersa ponantur, nam debiles & curuos creabunt & duros, non alte imprimenda sunt, sed tribus digitis comprehensa mergantur, donec ad primos articulos digitorum e terra proueniat: herbis liberentur assidue, donec plantatura solidentur, & si æstas calidior fuerit, irrigentur, si acumina seminum constringas, spinulis carere Palladius affirmat. Mense Octobri cardui planta ponantur inter frumentum iam natum uel alias segetes cum palo, quod est utilius, quam eas in crudo solo ponere. Quas cum ponemus radices summas coru ferro ressecamus, ac simo cingimus ternorum pedum spacio separamus, cum incrementi canna pedali scrobe depositas binas aut trinas. Cinerem sæpe sub hyeme siccis diebus, simumq; miscebimus. Colliguntur autem non simul, sed successiue maturantur, nam tunc est colligendus carduus cum habet adhuc flores in parte inferiori, sicut fertur non ante nec cum flores omnes ceciderint, quia deterior esset. Sane singulis annis quotidie auferende sunt plantæ, ut nec macres fatigentur, & soboles per alia spacia dirigantur, cum tamen aliqua sunt radices parte uellendæ quas seruabis ad semina colligenda liberatas omnibus pullis, testasupertegere debes aut cortice, nam solent semina sole uel imbribus interire.

De Chamomila.

Chamomila calida & sicca est in primo gradu, & est propinqua uirtuti rosæ in sui subtiliatione, & ipsius caliditas est sicut caliditas olei cõueniens, & aperitiua & subtiliatua spissitudinis, mollificatiua & resolutiua absq; attractione, et hæc est eius proprietas in medicinis, sed et apostemata calida mollificando & resoluendo, & confortat membra neruosa omnia, & est ex medicinis plus conferentibus laxitudinem quam reliquæ.

Et est confortatiua cerebri, quia resolut
materias capitis.

De cuscuta

De Cuscuta podagrælini.

Cuscuta id est podagrælini uel grungus, calida est in primo gradu, & sicca in secundo, cum floribus debet colligi, & per duos annos potest seruari, principaliter uirtutem habet purgandi melancholiam, secundo phlegma, unde conuenienter ponitur, in decoctionibus purgantibus melancholiam & phlegma. A qua decoctionis eius ualet contra stranguriam & dyssenteriam, et etiam herba si poteris habere in magna quantitate decoctam in uino & oleo rumbus pectori & alijs partibus dolentibus cataplasmata. Auicenna dicit, quod aqua cuscutæ est mirabilis ad ictericiam, sed Aristoteles dicit, quod de proprietatibus eius est expellere superfluitates antiquas à uenis.

De Calamentho.

Calamentum aliud est aquaticum, & uocatur mentastrum, aliud est montanum & uocatur nepeta. Montanum melius est, quia est magis siccum, cum florescit debet colligi, & in umbroso loco siccare, & potest per annum seruari, uirtutem habet dissoluedi, consumendi & confortandi. Contra frigidam tussim & contra frigidum asma, uinum decoctionis eius pulueris & sicuum siccarum ualet, nam ex eo & alijs quibusdam rebus fit diacalamentum, quod ad idem ualet. Item puluis eius in ouo sorbili & in farina hordei ad idem ualet. Contra dolorē stomachi ex frigidityte utatur patiens puluere eius in eibis & in uino decocto. Item contra frigidum rheuma ungetur occipitium ex melle decoctionis pulueris eius, postea fiat satellatio ex puluere calefacto in olla cruda, uel ex ipsa herba, multum enim confert. Contra relaxationem uulæ fiat gargarismus ex aceto decoctionis pulueris eius uel herba, & ponatur puluis eius & puluis rosarum. Contra tenasmon ex phlegmate, nitro, uel ex alio humore frigido inungantur renes ex melle & aqua decoctionis pulueris eius uel herba. Et sic etiam libetra-

tur matrix. Vel fiat fomentum ex aqua decoctionis eius ad desiccandas superfluitates matricis, & multum ualebit.

De Centaurea.

Centaurea calida & sicca est in tertio gradu. Hæc herba amarissima est, & alia est maior, alia minor, sed maior est maioris efficacie, competit medicine principaliter, secundum folia & flores, unde cum incipit flores producere debet colligi, & in umbroso loco siccare. Per annū in multa efficacia potest seruari, uirtutem habet diureticā attractiuam & consumptiuam. Vinum decoctionis eius ualet ad oppilationem epatis, splenis, renum, uescicæ, stranguriam & dyssenteriam. Vnde Galenus, centaurea est ex melioribus & nobilioribus medicinis ad oppilationem epatis, & confert magis duriciæ splenis emplastrata & bibita. Contra uermes aurium inijciatur succus eius cum succo porrorum. Ad lumbricos detur puluis eius cum melle. Ad usum clarificandam succus radicum centaureæ maioris cum aqua rosata conficiatur, & oculi liniantur.

De Capillo ueneris.

Capillus ueneris frigidum & siccum est temperate, uirtutem habet diureticam ex subtili substantia, recens multe est efficacie, parum potest seruari, quia subtilis herba est. Contra caliditatem epatis detur aqua decoctionis eius. Item ex ipsa aqua & saccharo fiat sirupus. & sistit cum uitio splenis, addatur aliquid calidum diureticum. Item plagellæ intinctæ in succo eius uel ipsa herba trita superponatur. Auicenna autem dicit, quod parū declinat ad caliditatem, et sic est subtilissimus, resolutissimus & apertissimus, et in ipso est stipticitas, & quando permiscetur cibo gallorū et coturnicum facit eos fortes ad dimicandum & interficiendum. Cinis eius cum aceto & oleo confert alopecie, & cum oleo myrtino & uino & lixiuio prolongat capillos, & prohibet casum illorum, &
eius

eius cinis cum lixivio confert furfuribus capitis, & delet eas & eradicaſt ulcera humida in eo, & confert pulmonipurgâdo ipſum, ualde prouocat urinam, frangit lapidem, & prouocat etiam menſtrua, & trahit ſecundinam & purgat mulierum ſectum, & abſci dat fluxum ſanguinis.

De Cicuta.

Cicuta calida & ſicca eſt in quarto gradu, uirtutem habet atrabendi, diſſolucndi & conſumendi, ea tamen non utitur in interioribus medicinis, quia uenenosa eſt & in ſubſtantia & in ſuis qualitatibus, diſſoluit enim tantum ut ſpiritus minuantur, ex quorum inanitione membra moriſicantur, uirtutem habet poſſimam ſecundum radices, deinde ſecundum folia, ultimo ſecundum ſemina, unde ſemen eius quandoq; ponitur in medicinis contra uitium ſplenis, talis ſit uſus: tota herba in aceto cum bolo armenico per decem dies iaceat, deinde bulliant quouſq; reſolutum fuerit armenicum, & poſtea coletur per pannum, illa liquorofitas bulliat bene ad ignem, & addita cera & oleo fiat unguentum, quod eſt poſſimum contra ſplenis duriciem, & contra dura apoſtemata, & contra arteticam & epilepſiam ſi inſigatur. Contra podagram & arteticâ coquatur radix in paſta ſiſſa per medium, ponantur ſupra arteticam, tutiſſimum remedium eſt. Contra iliacam paſſionem, ſtranguriam & dyſſenteriam ex decoctione eius in uino ſorti & oleo dolentia loca cataplaſmentur. Ad matricem mundificandam ex frigidis humoribus & glutinoſis, & ad menſtrua prouocanda fiat fomentum ex uino & aqua ſalfa decoctionis eius. Contra ſcrofulas ſiccas ſit uſus herbarum diureticarum, poſtea ſit cataplaſma ex duabus partiſbus cicuta, & tertia ſcabioſa.

De Catapucia.

Catapucia calida est in tertio gradu, & humida in secundo. Sed sunt qui dicunt esse calidam & siccam in tertio gradu. Est autem semen cuiusdam herbe simili nomine appellata, quæ remoto exteriori cortice seruatur per annum, eligenda est quæ uiridat s non perforata interius, nec liuida, sed alba uirtutem habet purgandi per superiora ex uentositatē & lenitate quam habet, unde quandoq; datur sanis ad conseruationem sanitatis, quandoq; ægris ad ægritudinem remouendam. Contra quotidianam de phlegmate falso & scabie conteratur catapucia in magna quantitate, & posita caulium folijs inuoluta sub cinere ponatur, diuq; dimittatur, ut bene coquatur, deinde cōtracta comprimatur, & oleum quod inde fluit seruetur, quod per annum seruari potest. Et cum necesse fuerit detur patienti in cibis, uel aliquo alio modo, & ita possunt decipi multi, ut fiat claretum ex catapucijs bene contritis, & cum melle decoctis. Deinde commisceatur uinum & fiat claretum. Et nota quod in 20 lib. uini debet esse catapucij una libra, idem in uncijis & alijs ponderibus minoribus. Item possunt poni catapucie bene contrite in iure carniū uel piscium uel aliorum ciborum, & comestie multum ualent sanis & ægris. Gerhardus tamen dicit, quod catapucia est multum laxatiua & purgat superius & inferius laboriose, & cum angustia, unde cauendum est ne detur nisi facile uolenti, & nisi sit materia digesta, nec sunt dande habentibus stomachum debilem, & intestina, quoniam subuertunt ipsum, nec dantur nisi detemperate, ne moram faciant in stomacho, nec est sumo pro hoc medicamento dormiendum, nec quiescendum, sicut ne in cæteris uomitiuis medicinis. Et usus eorum est ut ex eis acuantur medicine. Item dicit, quod per se possunt dari trite & distemperate cum aqua calida uel uino, & dicit quod purgant principaliter phlegma & uiscosos humores, & maxime à stomacho & intestinis, unde prosunt cholericis, cardiacis, iliaticis, arteticis, febris quotidianæ.

diane, & ex vitrio vel naturali phlegmate. Diosc. autē dicit, quod dantur an. 5. granis usq; ad 9. & quando stomachus fuerit fortis dentur integra, & si sit debilis dentur contrita. Item dicit, quod si folia catapncie dentur cocta cum pullis aut cum oleribus aut alijs cibis laxant phlegma & choleram.

De Cretano.

Cretanus, id est, runci marini, est calidū & siccum in tertio gradu, herba est que in locis marinis inuenitur, virtutem habet ualde diureticam ex substantia subtilitate. Contra stranguriam, uitium lapidis & iliacam passionē herba in multa quantitate in aqua bullita salinaria uino & oleo & in illa aqua patiens sedeat usq; ad umbilicum, & si tantam quantitatem habere non potest, cataplasma ponat ad loca dolentia, herba etiam comesta uel unum decoctionis eius urinam prouocat.

De Chelidonia.

Chelidonia calida & sicca est in quarto gradu, cuius duplex est differentia scilicet indica, que maioris est efficacie, & citrinam habet radicem, & est communis, que est in partibus nostris, & est minoris efficacie, unatamē pro altera ponitur, & cum in reptionibus inuenitur radix non herba debet poni, uirtutē habet dissoluendi, attrahendi, & consumendi. Contra dolorem dentium ex frigida causa radix inter dentes aliquantulum contrita, & allium superponatur ad caput purgandum, & uix ex frigido humore radix in uino decocta patienti superponatur, & patiens suum per os recipiat, deinde uinū gargarizet, quod unam desiccet, & caput purgat. Plinius autem dicit quod succo chelidoniae oculi hirundinum cruti uel lesi ad statum pristinum reducuntur.

De Cherefolio.

Cheresfolium seritur mense Augusti, & est bonum per totum hyemem, & post ipsam.

De Coriandro.

Coriandrum est herba satis communis, que calida & sicca est in secundo gradu, cuius semen in receptionibus debet poni quod per duos annos seruiatur, uirtutem habet confortandi ex aromaticitate, ad digestionem confortandam, & dolorem stomachi ex uentositate, detur semē eius in cibis & uinū decoctionis eius in potu. Item puluis eius seminis super carnes aspersus eas sapidat facit. Isidorus dicit, quod eius semen in uino datus dulci reddit homines ad uenerem promiores. Sed cauendum est ne nimis detur quia amentiam parit & furorem, cuius herba cum semine est canibus uenosa, & eos interficit, si ab eis aliquoties sumatur.

De consolida maiore.

Consolida maior, id est, symphytum, frigida & sicca complexionis est, sed proprie radix ipsius est medicinalis, uirtutem habet constringendi substantiam seu materiam grossam. Per quinque annos seruiatur, puluis eius datur in cibis, ualet contra fluxum sanguinis menstruorum, & similiter fomentum ex ipsa herba factum.

De Cucumere.

Cucumer agrestis est herba sic uocata, ex cuius succo fit electuarium hoc modo, in canicularibus diebus colligitur fructus ipsius herbe. Cum est serē maturus, & conteritur, & succus ipsius expressus soli exponitur & deficcatur, & quidam decoquunt succum cum melle serē usque ad consumptionem succi, & dant ad modum electuarij quod satis laxat per inferiora, per duos annos potest seruari, habet autem uirtutem purgandi phlegma & uiscosos humores, secundario choleram nigram, siue melancholiam, unde ualet contra paralysim ex phlegmate uitreo uel naturali, sciaticis, arteticis, podagricis subuenit, attrahit enim maxime à remotis partibus & purgat. Item coctum passionibus ex phlegmate medetur, non tamen per se solum datur, purgat per os & per

Et pernentrem, Et usus eius quidem est ut admisceatur alijs confessionibus, Et ex drachma medicina acuatur, Et qui electuarium accipit non dormiat sed moueatur sicut qui suscepit helleborum, quoniam solet suffocationem inducere. In iliaca passione precedat aliquod clystere mollitium, Et postea fiat aliquod ex aqua maluarum oleo Et melle cum uncia i craderij, Et iniiciatur, Et erit contra iliacam Et contra arteticam, chiragram, Et podagram. Item herba ipsa si habere poterit conteratur aliquantulum, Et decocta in uino Et oleo dolenti superposita strangurie, iliace Et podagrie subuenit, ad menstrua provocanda pulvis electuarij conficiatur cum oleo mustelino uel rosato, Et bombox intinctus superponatur, Et apostemata frigida matura electuarij uncias 5 Et farina hordei conficiantur cum uitello oui, Et superponatur. Ad apostemata rumpenda sit optimum ruptorium ex electuario Et terebinthina. Ad uermes auris conficiatur electuarium in quantitate granorum quinq; cum modico aceto, Et modicum infundatur tepidum, ad omnem dolorem stomachi ex frigida causa inungatur ex confessione electuarij, Et aceti, ad lentigines faciei Et ad omnes superfluitates eius remouendas, accipe cerussam Et camphoram Et electuarij in quantitate illorum duorum, Et conficias cum aceto in modum unguenti, Et pista in mortario plumbeo uel pistello plumbeo, Et ponatur in uase uitreo per quindecim dies, Et postea in predicto mortario cum pistello eodem moueatur addito aceto, si durum sit, ex eo ungatur facies, omnem enim panum abstergit, Et lentigines.

De Dictamno.

Dictamnus qui alio nomine dicitur fraxinella, quia frondes habet ad modum fraxini, calida Et sicca est in tertio gradu, radix eius est similis cuiusdam herbe simili nomine appellata, que in locis calidis, lapidosis Et siccis precipue reperitur, habet autem precipue ipsa radix uirtutem attrahendi, consumendi

consumendi & dissoluendi uenenū. Contra morsum uenenatorum animalium ipsa herba uel radix trita superponatur. Succus etiā eius cum uino detur, puluis eius cum succo mentæ conficiatur & superponatur & potui detur: Isidorus insuper dicit, quod est tantæ uirtutis, ut ferrum à corpore extrahat, unde & eius pabulo fere peracussæ elciunt sagittas corpori infixas.

De Endiua:

Endiua (quæ alio nomine dicitur scariola) uel lactuca ægrestis, frigida & sicca est in secundo gradu: semina & folia competunt usui medicinæ, & folia etiam usui ciborum competunt. Sed radix nullam habet uirtutem. Folia uiridia maxime sunt efficacie, sicca nullius: uirtutem habet confortandi & alterandi, unde contra oppilationem splenis & epatis ex cholericâ causa prouenienti, ualet contra tertianam duplicem & simplicem, ictericiam & calefactionem epatis, & apostemata calida curant comestæ elixæ uel crudæ. Item sirupus ex decoctione eius & saccharo ualet ad idem. Item succus eius uel sirupus cum rheumbarro datus in quarto uel sexto die materia existēte digesta ualet. Item contra dolorem epatis & calida apostema ualet ipsa herba contrita & superposita, & ad idem ualet succus appositus. Et si non habes folia coque semen herbæ tritum in aqua & pone super eius locum. Albertus dicit, quod aqua endiuæ cum cerussa & aceto est epithima mirabile ad infrigidandum quicquid infrigidari debet.

De Enula.

Enula non scribitur, quia semen non habet, sed plantatur corona eius tota, uel maior pars eius in terra pingui & alte fossa, & bene subacta. Calida & humida est interatio gradu, humida in primo. Cuius duplex est differētia scilicet borulana & campana quæ est maioris efficacie, secundum radices. Colligitur in principio æstatis, radix & sole siccat ne humiditate corrumpatur. Radix in medicinis potest poni per biennium & triennium

annuum potest seruari. Item habet uirtutem leniendi & mundificandi, unde ualet contra neruos ex frigiditate indignatos, contra dolorem spiritalium ex frigida causa detur uinū decoctionis eius, secundum istud: Enula campana reddit præcordia sana. Contra dolorem stomachi ex frigida causa, & contra uentositatem & contra tuſſim frigidam detur uinum decoctionis eius. Puluis cum puluere citamomi delicatis soluit uentositatem spiritaliū. Herba tota decocta in uino & oleo & cataplasmata dolorem spiritalium, iliacum, cholicum & stranguriam soluit. Contra frigidum asma detur farina hordei in qua coctus sit puluis eius. Item nota quod in enula est uirtus rubificatiua, & abstractio ultima.

De Epatica.

Epatica frigida & sicca est in primo gradu. Herba est creſcens in aquosis locis & præcipue lapidosis, habens folia multa terræ ac lapidibus adherentia, uirtutem habet diureticam ex subtili substantia, & infrigidatiam, unde ualet contra oppilationem epatis & splenis ex calida causa, & contra calorem epatis & ictericiam, & ideo detur epaticis. Sirupus ex aqua decoctionis eius addito rheubarbaro in fine decoctionis, optimus est contra ictericiam.

De Eruca.

Eruca calida est & sicca in quarto gradu, domestica maioris efficacitæ quàm syluestris. Semina præcipue competunt medicinæ, secundo folia, uirtutem habet consumendi, & coitū incitandi, decocta cum carnibus ualet ad coitum incitandū, stranguriam & dysenteriam soluit & paralysim. Item in uino decocta & renibus cataplasmata libidinē incitat, peſtini supposita urinam prouocat. Semen eruce & maxime syluestris facit uirgæ erectionem.

De Ebulo.

Ebulus est calidus & siccus in tertio gradu, cortices radicum & turiones præcipue competunt medicinæ. Cortices radiciū

in uere colliguntur, & siccantur ad solem, per annum seruantur, habent autem uirtutem dissoluendi, consumendi & purgandi phlegma, & viscosos humores. Succus eius purgat attrahendo superius & inferius angustiose, unde non debet dari nisi digesta materia & corpore fluxui preparato, ut in alijs uomitiuis medicinis, ualet febris quotidiana diuturna, tertiana ex cholera citrina & uitelina, item epatis oppilationi & ictericie & colica & iliaca & aquam leucophlegmaticorum educit. Vsus eius est ut detur succus eius per se uel in eius decoctione distemperetur alia medicina, uel addatur sirupo uel oxymelli laxatiuis, uel coquatur cum melle ad consumptionem succi. Contra tremorem extremitatum, & arteticam, & leucophlegmaticam fiat balneum ex aqua salsa decoctionis radicum eius, & turionum uel totius herbe.

De Fœniculo.

Fœniculus seritur mense decembri, ianuario, februario et martio, & toto tempore transplantatur. Calidus & siccus est in secundo gradu, uirtutem habet diureticam ex tenuandi grossam uentositatē, comestum post prandiu confert aciebus cructuatiōibus, que fiunt ex indigestione, & hoc facit ex subtili substantia & qualitatibus suis. Semen eius folia, & flores & cortices radicum usui medicinae competunt. Semen colligitur in principio autumnū, & seruatur per tres annos. Cortices radicum colliguntur in principio ueris, & seruantur per medium annū. Contra oppilationem epatis, splenis, stranguriam, dysenteriam, & uitium lapidis ex frigida causa detur ex aqua decoctionis eius. Item fœniculus coctus & comestus ualet contra prædicta. Item eadem aqua uel uinum soluit dolorem stomachi ex frigidityte uel uentositate, & digestionem confortat, idem facit puluis seminis eius. Contra panum oculorum et pruritus succus radicum eius fœniculi in uase aëreo per quindecim dies ad solē ponatur, & more collyrii oculis apponatur.

appohatur. Contra pruritum oculorum certum est experimentū,
cōficiatur aloē optima cum succo fœniculi, & ponatur in uase aeneo
ad solē per quindecim dies, deinde ponatur in oculis more collyrii.

De Flamula.

Flamula est calida & sicca in quarto gradu, flamula quia
uirtutem habet intentionis, est autem similis uirdalle in fo-
lijs & floribus, sed habet flores concavos, uirdidis multe est
efficacie, sed exsiccatate nullius uel modicæ. Ad cantherum siue ig-
nem faciendum conteratur flamula & super locum ponatur & di-
mittatur per diem, & postea inuenitur cutis combusta. Ad aposte-
ma rumpenda quando uersum est ad saniem, & caput est durum,
conteratur cum oleo, & supponatur oleum, ponitur ad relaxatio-
nem ne flamula nimis exiccet.

De Fumoterræ.

Fumus terræ est herba nota, sic dicta, quia generaliter à quo-
dam grossa fumositatē terræ calidum est in primo gradu, sic-
ca in secundo, uirdidis & sicca à quadam magna efficacia. Principia-
liter purgat melancholiā, secundo phlegma salsum & cholera adu-
rtam, et est diuretica, contra scabiem uncias 2 succi eius addito sac-
charo, fiat sirupus, & cum aqua calida detur, ut addantur semina
fœniculi. Item fiat hoc unguentū cum oleo nucum, & ponatur pul-
uis fuliginis subtilis, & conficiatur addito aceto & succo fumiter-
ræ in maiori quātitati quā de alijs, & ungatur patiens in balneo,
optimum est. Et nota quod si succus eius detur ter in septimana, ut
dicimus, optime purgat humores inducentes scabiem. Item herba
fumiterre in uino cocta & posita super locum podagricum mula-
tum ualet.

De Fungo.

Fungi quidam sunt boni, quidam mortiferi, boni sunt parui,
rotundi ad modum pilei, qui in principio ueris apparent,
& in maio deficiunt, nunquam enim isti tales aliquē interfecerunt,

aut multum læserunt subito sed tamen omnes malum generant nutrimentum. Mortiferi autem sunt qui nascuntur iuxta ferrum æruginosum. Alij autem sunt mortiferi licet non statim interficiant, scilicet illi qui nascuntur iuxta alias res putridas, aut iuxta habitationē alicuius reptilis uenenosi, aut iuxta quasdam speciales arbores, quæ in proprietate habent fungos corrumpere, sicut oliua est. Signum autem mortiferi est, quod in superficie eius quedam humiditas viscosa & corrupta est, & quod cito alteratur, & corrumpitur inter manus colligentium fungos. In nostris autem habitationibus inuenitur fungus qui latus est, & spissus aliquod ruboris habens in superficie & in illo rubore habet multas ampullas eleuatas, quarum quedam sunt fractæ, & quedam non. Nam & ille mortalis est, & statim interficiens, & uocatur fungus muscarum, eo quod in læte puluerizatus interficit muscas.

De Fœnugræco.

Fœnugræcum calidum est & siccum, substantiam habet conglutinosa, unde uirtutem habet maturandi & laxandi. Ad apostemata exterius maturandū farina fœnugræci cum uitello ouī cōficiatur, & superponatur, maturat enim & extenuat. Ad maturandum & rumpendum conficiatur cum trebenthina, & superponatur. Herba etiā cocta in oleo superponatur ad maturandum. Ad apostema spiritalium farina fœnugræci in sacculo posita & decocta in aqua cum maluanisco ponatur desuper. Ad apostema stomachi & intestinorum ex farina fœnugræci & aqua prædicta fiant pulles & superponantur.

De Gabusia.

Gabusia sunt de natura caulium & habent formam caulium, donec clausa fuerint, sed postquam clausi sunt folia ipsorum fiunt quasi alba & grossa sicut tunice ceparum, aërem desiderant frigidum, nam in aëre calido uel temperato non clauduntur.

clauduntur, sed aperta remanent sicut caules, terram uero deside-
rant qualem caules, ex eis fiunt composita sicut ex rapis. Item semi-
nantur ut caules.

De Gramine.

Graminis uirtus est stiptica, & uulnery congruatina,
uentris constrictina, uulnery, renum & uesice sanatina,
& doloris splenis mitigatina, & eius succus potui datus
sua proprietate lumbricos occidit, hanc herbam noscunt canes &
eam comedunt quando se purgare uolunt, ut Plinius dicit.

De Gralega.

Gralega dicitur impinguare terram si uiridis uertatur in
ea. Item dicitur quod eius semen mirabiliter facit ouare
gallinas.

De Gentiana.

Gentiana est radix cuiusdam herbe simili nomine appelo-
late, cuius sola radix est medicinalis. In fine ueris colli-
gitur, & exiccata per tres annos seruatur. Nascitur au-
tem frequentius in montibus & in locis umbrosis & humidis, calida
& sicca est in primo gradu, uirtutem habet dissoluendi, consu-
mendi & aperiendi. Vnde diuretica est contra antiquum asma, de-
ter puluis eius cum uino addita aqua hordei succus radice eius ab-
stergit morpheam, & sanat plagas & ulcera corrosina. Bibita eti-
am multum iuuat eum qui cecidit ex alto & collisus est, & ultima
medicina est contra morsum scorpionis, serpentium & uermium ue-
nenatorum, ac canis rabidi, si bibuntur ex ea cum uino duae uncie.

De Gariophylata.

Gariophylata similis est nouellis folijs rabi, seu siaponibus,
& eius redolent folia, calida & sicca est in tertio gradu.
Reccens maioris est efficacite quam exiccata, & seruatur per an-
num, uirtutem habet dissoluendi, consumendi & aperiendi, & di-
citur gariophylata quia odorem habet similem gariophyllis secun-

dum saporem uel effectum. Contra cardiacam passionem in aqua marina & oleo cocta parti anteriori & posteriori superponatur. Ad digestionem confortandam, & dolorem stomachi & intestinorum ex frigidityte uel uentosityte detur uinum decoctionis eius.

De Humulo.

Humulus, id est, liatigo, flos eius propter siccitatem suam conseruatur per longitudinem maximam temporis in uirtute sua, ita uulgaris opinio est quod nunquam putrescit, & est acuti odoris & fortis, & est calidum & siccum, dissoluit uiscositatum & incisiuus, & conseruat à putredine liquores quibus admiscetur.

De Hyoscyamo.

Hioscyamus est frigidus in tertio gradu, semen eius est cuiusdam herbe quæ casilago uocatur siue deuscaballinus. Seminum autem triplex est diuersitas, est enim album, rubrum & nigrum. Album & rubrum competunt medicine, nigrum uero mortale est. Nota quod si hyoscyamus debet recipi per os interius, ponendum est semen, si exterius herba: & semen maioris est efficacitæ, uirtutem habet somniferam, cōstringendi & mortificandi. Ad somnum prouocandum in acuta agitudine fiat fomentum ex aqua decoctionis eius herbe circa frontem & tempora, & pedes, fiat etiam ablutio, postea fiat hoc emplastrum, puluis seminis subtilis cum albumine oui & lacte mulieris puellam nutriendis & modico aceto, & fronti & temporibus apponatur. Item ad lachrymas cōstringendas fiat idem emplastrum ex ipsa. Contra dyssenteriam fiat emplastrum ex ipsa herba & superponatur, dolorem eius tollit. Contra dolorem dentium semina super carbones ponantur, & pateriens sumum per os accipiat & teneat super aquam, & apparebunt quasi uermes supernatantes. Semen superpositum denti & in causa

in causa calida dolorem tollit, & nota quod per decem annos
seruatur.

De Hissopo.

Hissopus est calidus & siccus in tertio gradu. Habet virtutem secundum folia & flores, non secundum radices, diuretica est dissoluendi, consumendi & attrahendi. Contra frigidam tussim ualet uinum decoctionis eius & ficum siccarum. Item uinum decoctionis eius & seminis feniculi, dolorem stomachi & intestinorum tollit; fomentum factum ex aqua decoctionis eius matricem a superfluitatibus mundificat, & abstergit. Idem faciunt suppositorum ex puluere eius & oleo mustelino. Puluis eius uel ipsa herba in testa calefacta & superposita capiti per se uel in sacculo ualet contra frigidum catarrhum, & casum uisus. Contra unam fit gargarismus ex aceto decoctionis eius. Item ipsa herba in uino decocta & cataplasmata tollit dolorem ex uentositate.

De Iruncijs.

Iruncij & saluāda eadem est herba, multum spinosa, de quorum radicibus fit cincibarum, hoc modo, in duabus libris mellis, & una irunciorum mundatorū ponantur piperis libra uel dimidia & due zinziberis uel medietas piperis tantum, hoc modo lauentur iruncij & abijciatur lignū deinde minutum incendantur, & posito melle ad ignem, & optime despumato ponantur in coiruncij et zinziber sine piper, & usque ad spissitudinem congruam bulliant. Et si in fine decoctionis addatur puluis seminis cruce & pincit erit optimum ad coitum & membri etc.

Alionem.

De Aro

De Aro.



Rus qui alio nomine dicitur barba Iouis, alias barbaron uel pes uituli, calida & sicca est in secundo gradu. In locis siccis & humidis montuosis & planis inuenitur, in hyeme & aestate magnam habet efficaciam secundum folia, maiorem secundum radices, maximam secundum quasdam tuberositates quæ colliguntur, scinduntur & deficcantur, uirtutem habet dissoluendi, relaxandi & extenuandi. Contra tumorem aurium herba ipsa cum tuberositatibus decoquatur in uino & oleo, addito cymino, & fiat emplastrum, auribus superponatur. Contra frigida apostemata ipsa herba tota cum tuberositate & axungia ursinateratur, & postmodum in testa calefacta superponatur. Contra scrofolas nouellas herba ipsa cum axungia ueteri & squilla uel axungia ursina si potest haberi teratur, & superponatur & liberabitur, si recens fuerint. Ad faciem depurandam, & cutim subtiliandam ex tuberositatibus deficcatis fiat puluis subtilis & cum aqua rosata conficiatur, & ponatur ad solem donec aqua consumatur. Et ita fiat ter uel quater uel amplius ex illo puluere solo, uel cum aqua rosata, puluis eius carnem superfluum corrodit.

De Irīde.



Ris sine gladiolus, cuius folia sunt similia ensi, cum floribus purpureis uel albis. Nam iris purpurea habet florem, aut album, & sunt eiusdem uirtutis, radice tantum uiuunt in medicinis, in fine ueris colligitur & siccatur, per duos annos seruatur, calida & sicca est in secundo gradu, uirtutem habet diureticam, unde dissoluit & aperit. Contra uitium spirituum & contra oppilationem splenis, epatis, renum ac uesicæ, & dolorem ex uentrositate unum decoctionis ireos iuuat. Puluis eius leniter superfluum carnem corrodit. Ad panum oculorum fiat collyrium ex puluere eius, & aqua rosata.

De Liquiritia

De Liquiritia.

Liquiritia est radix cuiusdam herbe, que desiderat terram bene solutam, & precipue sabulum, ut in eo facile multas & longas producat radices, quæ si plantatur facilliter comprehendit, & circa se multum pullulat, & forte si basia eius adhuc tenera flectatur ad terram & operiatur convertetur in radicem, sicut accidit in menta, ruta & gramine, calida & humida est temperate. Eligenda est non nimis grossa, nec multum tenuis, interiorus crocea, non puluerisabilis, nigra uero & alba est abijcienda, succus eiusdem est efficacie & etiam fortioris, qui hoc modo fit; Cum uiridis est bene conteratur, & in aqua bulliat & decoquatur usque ad consumptionem ferè, postea exprimatur, ualet contra omnia uitia pectoris. Decoctio eius ualet contra tussim, & ad idem ualet electuarium confectum ex succo liquiritia & melle. Item liquiritia masticata & sub lingua retenta sitim & asperitatem lingue & gutturis mitigat.

De Lingua arietis.

Lingua arietis (que plantago uocatur) frigida & sicca est, folia eius sicca consolidant optime uulnera & ulcera, & ad hoc nihil est melius ea, ut dicit Dioscor. Et mirabile uidetur, quod si bibatur succus trium radicum eius tribus uncijis uini aliquando curat tertianam. Et quatuor radicum succus cum quatuor uncijis uini bibatur, aliquando curat quartanam. Item dicit Dioscor. quod sanat uulnera canis rabidi. Hydropicos inuat, ueneno repugnat, eius succus lumbricos necat, & uehementer eius solutione uentris mitigat, menstrua constringit, & tumores apostematum in principio repercutit & dissipat, gingiua tumidas & sanguineas reprimit, & sanat.

De Lilio.

Lilium plantatur mense octobri, septembri, nouembri in terra pingui & bene subacta. Nam accipiuntur spici sine bulbi

eius uirides, uel sicci ponuntur per unam spannā, uel unum pedem, quod est melius separati sicut fit de alijs. Item dicit Aristot. quod si hasta lilij quando nondum apertū est semen sine flos eius flectatur in terram, ita quod cepa non radiceatur & cooperiatur terra, in fra paucos dies emittet in qualibet nodo hasta cepam paruulā sicut sunt bulli eius. Calidum & humidū est. Aliud est domesticum, aliud syluestre. Sed syluestre aliud gerit florem purpureum, quod efficacius est, aliud croceum habet colorem. Domesticū autem cū axungia ueteri tritum uel cum oleo coctum & superpositum frigidum apostema maturat. Contra splenis duritiem radix lilij in multa quantitate cum branca ursina & radice misce, ponatur in uino & oleo per decem dies, & postea coletur & colatura addita cera & oleo, & fiat unguentum. Ad faciem colorandam accipe tuberositates radices lilij agrestis & sicca, & puluerē inde fac & distempera cum aqua rosacea & desiccetur, quo facto ter uel quater illum puluerē solum & cum aqua rosacea cōfectum ducas super faciem. Item abluendo mandabit faciem & renouabit contractionē rugarum. Item folia eius si trita cum oleo apponantur quia uirtus eius mitigatiua est. Item educit purgationem menstrualement, quia est aperitiua ex nentositate, & est tumoris repressiua. Et ideo ualet contra apostemata ex uentositate, si radix eius trita cum oleo sæpius apponatur. Plinius dicit, quod cepæ cum uino decoctæ & oleo admixto clauos pedum & nodos solunt, pilosq; locis adustis reddunt, in uino etiam coctæ addito melle uenis præcisus subueniunt, folia ipsius cocta in uino uulnera sanant. Ex floribus eius fit oleū, & aqua sicut ex rosas, & sunt uere eiusdem uirtutis cum oleo & aqua rosata.

De Lingua auis.

Lingua auis calida et sicca est in primo gradu, folia habet parua et acuta lingue auis similia. Viridis multæ est efficacitæ, exiccata nullius. Virtutem habet incitandi libidinē, & humectandi. Herba ista cū carnibus cocta uel oleo cocta uel sanguine, libidinem incitat,

incitat, ualet etiam decocta, addito saccharo, cōsumptis. Cōtra scabiem autem pectoris datur aqua decoctionis ipsius & addito traganto magis ualet.

De Lapathio.

Lapathum calidū & siccum est in tertio gradu uel in secūdo secundū Auicēn. Est autē triplex lapathum, scilicet acutum acuta habens folia, uirtutem habet dissoluendi & relaxandi, aperiendi & extenuandi. Contra scabiem succus lapathi acuti & oleum mustelinū & pix liquida simul bulliant, postea coletur & colatur & addatur pulvis tartari & fuliginis, & fiat unguentū quod satis cōpetens est scabiosis. Auicenna dicit, quod radix eius cum aceto cocta confert scabiei ulcerose, & impetigini, & eius decoctio cum aqua calida pruritu. Et similiter ipsa met in balneo est optima. Cōtra impetiginem & serpigine fiat decoctio succi lapathi & ex puluere auripigmenti. Ad apostemata maturandū lapathum rotundum tritum & in oleo decoctum uel cum acungia superponatur ad rum pendū, eodem modo superponatur acutum. Contra stranguriam et dysenteriam fiat decoctio lapathi in uino & oleo & pessimi superponatur, urinam prouocat in multa quantitate. Aqua uel uinū decoctionis eius soluit oppilationem splenis & epatis. Contra scrofulas nouellas fiat emplastrū ex lapatho acuto & acungia simul tritis. Contra lumbricos ualet succus eius datus cum m. l. l. Cōtra phlegma abundans in cerebro succus eius cū succo rute in modica quantitate naribus iniiciatur in aëre calido uel balneo. Item lapathum crudum uel coctum comestum ualet scabiosis.

De Lactuca.

Lactuca feri & transplantari potest ferē toto tempore anni in terra pingui bene subacta per se mixtim cum alijs herbis, & que sata fuerit in autūno, ualiter plantatur mense decembri, circa areas aliarū herbarum que tunc seruntur. Ipsa enim non timet gelu, sed roboratur ex eo, & erit bona post hyemē cū alijs herbis, quousq; semē producat. Sed que de natura paruarū non transpiā-

tantur. Quæ uero sunt ex magnis quæ Romanæ dicuntur, quæ habent alba semina transplantari debent, ut crescant & dulcedinem habeant, multum iuuantur irrigatione tempore siccitatis. Lactuca frigida est et humida tēperate. Alij dicunt quod est calida & humida tēperate, & ideo est melior cæteris herbis, & temperatissima respectu aliarum herbarum, sanguinem generat & lac, & urinam prouocat & choleram extinguit, sanguinis ebullitionem refrigerat, & somnum inducit. Item ualet contra calida apostemata, capitis dolorem de cholera rubra, sanguinem factum amputat cataplasmata. Sed cocta plus quàm cruda sit esui conueniens, quia eius lac calore ignis minuitur, per quod fit somnum inducens, unde fit aperitiua. Sanguinem tamē pessimum generat, idcirco ea affuscentibus fit nocina, quia tenebrositatem oculis facit, & spermatis materiam corrumpit. Sed cum est adhuc tenera ualet multum in febribus elixata uel cruda in aceto cocta, addito croco, soluit oppilationem splenis & epatis. Ad prouocandum somnum semen conficiatur cum lacte mulieris puellam nutrientis & cum albumine oui, & fiat emplastrū super tempora. Item puluis seminis eius cū lacte somnū prouocat. Item facit febricitantibus datus cum aqua calida. Contra calidum apostema conficiatur cum oleo rosato & superaponatur & destruant ipsum. Item cataplasma frondium ipsius habentibus crispilam subuenit. Item semen eius datū in potu saepe pollutionem patienti celeriter succurrit. Item est quedā species lactuce agrestis quæ longiora & strictiora habet folia, subtiliora & asperiora & nimis uiridia, hæc est amara & est maioris caliditatis & siccitatis quàm domestica. Item dicit Plinius, quod est quedam species lactuce sponte nascentis quam caprinam uocant, quæ proiecta in mari protinus necantur pisces, qui sunt in circuitu uicini. Itē est alia species lactuce quæ nascitur in aruis, cuius folia trita cum polenta conferunt uisceribus, & hæc ἀγλαὴ ὀπρίαῖς græcis uocatur. Item est alia species quæ crescit in syluis quā uocant uulgo scaricion

scaricion cuius folia trita cum polenta vulneribus profunt, sanguinem stringunt, & putrescentia vulnera sanant. Et est alia species lactuce habens rotunda folia & breuia, quam multi etiam uocant uulgo acriam. Cuius succum accipitres se alpendo terrā herbam extrahunt, & intingentes oculos, discutiunt obscuritatem, & caliginem cū senescunt. Cuius herbe succus sanat omnia uitia oculorum, & maxime quando ei lac mulierum admiscetur. Serpentum morsibus & scorpionum ictibus medetur. Si succus eius cum uino potetur & folia trita super uulnus emplastreutur, omnem enim inflatationem discutiunt & compefcit.

De Lentisco.

Lentiscus calide & sicce complexionis est, uirtutem habet constringendi & consolidandi. Contra fluxum menstruum & dysenteriam & uomitum ex debilitate uirtutis continet. fasciculi parui facti cum folijs decoquantur in aceto, & pectini & renibus cataplasma factum superponatur. Contra uomitum super furculam pectoris. Alius usus contra prædictas tenacitates, lentisci bulliant usq; ad aceti consumptionem, deinde siccetur, & fiat inde puluis, & detur in cibis & potibus. Contra ulcerationem uirgæ puluis factus ex folijs eius super testam calidam de siccatis & puluerizatis ulcera consolidat & saniem consumit, sed non debet poni nisi quando est sanies. Contra ulcerationem oris lingue & labiorum in febre acuta, fiat decoctio eius foliorū in aceto, & patiens sepe gargarizet.

De Laureola.

Laureola est herba multum laxatiua, calida & sicca est in secundo gradu. Cuius fructus siue semen eius, est rotundum, subruffum ad quantitatem piperis, quod est adhuc magis laxatiuum quā laureola, & tamen ipsa herba multum est laxatiua, & purgat multum phlegma & uiscosos humores, principaliter à reuotis partibus & iuncturis membrorum secundo melancholicam.

unde ualet ischiadicis, arteticis & podagricis. Item cōtra apoplexiam & paralysim. Vsus enim eius est cum alijs medicinis in oxymelle & similibus, datur etiam in apozematibus per se non datur, quoniam habet naturam ulcerandi intestina, ex nimio suo acumine. Si tamen ea per se uti uolumus decoctionem eius danus, ad dīto gummi arabico, & mastiche, ut malitia eius exprimatur, nō autē eis est danda nisi eis qui difficiles sunt ad soluendū, & carnosum uentrem & intestina habentibus, eiusdem uirtutis est semen eius.

De Lappa.

Lappa est herba que habet in summitatibus capitella uestibus ualde adherentia. Lappæ multe sunt species omnes medicinales. Nam Plinius dicit, quod ictibus scorpionum medentur, nec feriunt hominem, si inunctus fuerit succo eius. Decoctio radice eius confirmat dentes, si tepida in ore teneatur, semen eius multa uitia stomachi curat, reijicientibus sanguinē prodest, dyssenteria subuenit. Nam radix cum uino fīsit, & folia adiecto sale solunt.

De Libystico.

Libysticum est calida & sicca in secundo gradu. Semen non herba uel radix in medicinis ponatur, uirtutem habet diureticam aperiendi & extenuandi, unde uinum decoctionis eius contra oppilationem splenis & epatis ualet, contra dolorem stomachi, & intestinorum ex uentositate prouenientem aqua decoctionis eius ualet. Puluis etiam eius cum puluere cymini datus ad prædicta ualet.

De Melonibus.

Melones desiderant talem terram & aërem qualem citrullis, sed minus pinguem & minus stercoreatam, ut saporiosiores & solidiores fiant, & citius maturentur, & eodem modo & tempore plantari debent, & cum nati sunt irrigari non audent. Ex his quidem sunt longi qui comeduntur maturi, scilicet cum incipiunt

piunt redolere & crocei fieri. Ex quibus grossi qui habent semina ualde parua sunt ceteris melonum generibus meliores. Alij uero sunt subtiles, uirides ualde longi, & quasi omnes curuati, & uocantur melanzuli, qui comeduntur acerbis sicut citrulli, & sunt eiusdem saporis, sed sunt minus frigidi magisque digestibiles, & ideo meliores citrullis esse dicuntur. Melones sunt frigidi & humidi in secundo gradu, & qui dulces sunt temperate & frigidi. Auicenna dicit, quod radix melonis eodem modo est uomitua, quo dictum est de radice citrulli, & cucumeris. Oportet autem utentem melonibus, ut melo precedat aliquod aliud cibarium, ne nauseam faciat. Sed Isaac dicit, quod eo commesto oportet aliquantulum expectare, donec sit digestum, antequam alius sumatur cibus. Item dicit Auicenna, quod melo est tarde digestionis, nisi quando comeditur cum eo quod est interius eius, & ipsius nutrimentum est, & humor eius est conuenientior quam citrulli & cucumeres. Sed cum melo corrumpitur in stomacho conuertitur ad naturam uenenosam, oportet ergo ut cum grauat extrahatur uelociter. Et de his que iuuant post eorum commestionem in cholericis sunt exicata, marathrum, mastiche. Phlegmatici uero accipiant oxymel, zinziber conductum aut zinziber solum, aut diacuminum & purum uinum bibant. Semen autem melonum mundatum urinam prouocat, tenes & uescicam mundificat ab arenis & lapidibus.

De Meliloto.

Melilotum calidum & siccum est in primo gradu, herba est cuius semen simili nomine appellatur, & dicitur etiam corona regis, quia formatur ad modum semicirculi. Semen cum ipsis corticibus in medicinis ponitur, quia admodum paruum est & coherens, quod uix separari potest. Viridem habet confortandi ex aromaticitate, & diureticam ex subtili substantia, uinum decoctionis eius digestionem confortat, uentositatem excludit, opilationem

tionem uesciæ & renum aperit. Semen eius in brodio & cibis positum eos boni saporis & odoriferos facit.

De Mercuriali.

Mercurialis frigida & humida est in primo gradu. Viscosam habet substantiā, unde lenificando e ducit cholera m ab epate, stomacho & intestinis. Datur autē succus eius cum saccharo non coctus, quia nim laxandi amittit ex parte si coquatur.

De Malua.

Malua frigida & humida est in secundo gradu. Cuius duplex est differentia, scilicet domestica quæ subtiliorē & frigidiorē habet humiditatem, & est sylvestris quæ dicitur uulgo maluauiscus & bismalua crescens altius, quæ minus est frigida, & habet substantiam viscosam. Contra calidum apostema in principio folia maluæ terantur, & superponantur ad maturandum, & terantur cum axungia porcina recenti, & super tegula calefacta ponantur, hoc etiam ualet contra duritiem splenis & epatis. Fomentum ex aqua decoctionis circa pedes ad prouocandum somnum in acutis febribus multum ualet. Malua cocta & comesta uentrem soluit, ualet etiam in febribus propter constipationē uentris, ex qua etiam aqua cōpetens fiat chyltere, maluauiscus plus mollicat & maturat, secundum folia sua, & magis radix cum axungia trita aliquantulum calefacta apostematata maturat superposita, & duritiem mollicat. Herba etiam cocta cum radice usq; ad consumptionem aquæ apparebit quedam viscositas, quæ superposita apostematibus ipsa maturat, & duritiem remollit et relaxat, & ex aqua addita cera & oleo fit unguentum competens ad prædicta. Aqua decoctionis seminis eius & maluæ ualet cōtra tussim siccam, cōfert etiam heclicis. Semina etiam sacellata in oleo decocta duritiem soluit & mundificat. Isidorus & Plinius præterea dicūt, quod si aliquis se inunxerit succo maluæ admixto cum oleo puncturis apum

apum ledi non poterit, nec patietur in membris inunctis puncturam, neq; morsum scorpionum nec aranea.

De Menta.

Menta est calida & sicca in secundo gradu, cuius tres sunt species, est enim quedam domestica, quæ proprie hortulana dicitur, & hæc mediocriter calefacit, & confortat, & alia est sylvestris quæ mentastrum dicitur & magis calefacit. Et est menta quæ longiora, latiora, acutiora habet folia, & hæc menta romana vel sarracena vocatur, vulgariter herba sanctæ marie dicitur, et hæc magis diuretica est quam alia. Menta domestica est herba facile se multiplicans, & cito de terra pullulans, & ascendens & cū hastula in terram reflexa, & si ab humo lecta fuerit convertitur in radicem, & cito ex se novam producit prolem. Hæc esui magis quàm medicine compent, & viridis & exiccata magnæ efficacis est, debet autem siccare in loco umbroso, & per annum in multa efficacia servantur. Virtutem habet dissolvendi ex proprijs qualitatibus, et confortandi ex aromaticitate. Contra fœtorem oris & putredinem gingivarum & dentium abluatur os & gingivæ ex aceto decoctionis eius mente hortulane, deinde fricentur ex pulvere mente sicca vel cum menta sicca. Ad appetitum confortandum, quando impeditur ex frigidis humoribus in ore stomachi existentibus, fiat salsamentum ex aceto & menta, & modico cynamomo seu etiam pipere. Contra vomitum ex debilitate virtutis continuae factum vel ex frigida causa, fiat decoctio mente in aqua salsamentina & aceto, & sponsia intincta ori stomachi superponatur, & etiam ipsam mentam coctam patiens comedat. Contra sin-copim ex debilitate ex febre vel sine febre, siue ex materia siue ex quacumq; causa conteratur menta, cum aceto & modico vino, & si sit sine febre, si cū febre solo aceto, & in eo pone panem assum, & aliquantulum dimittatur ut bumeſcet & applicetur naribus, & ex eo fricentur labia, dentes, gingivæ & tempora, & ligetur su-

per uenas pulsátiles temporum, & brachiorum patiens etiam misceat & humositate transfuset. Contra coagulationē lactis fasci- culi coquantur in uino & oleo, & māmills cataplasmentur. Et nota cum aliqua medicina datur contra uenenum, debet dari cum succo mentæ, uel cum uino decoctionis eius, si non habeas succum.

Contra uenenum solus succus mentæ romane uel uinum decoctionis uel succus cum melle commixtus ualet. Item ualet contra oppilationem splenis & epatis & uiarum urinalium ex frigido humore, & ex calido siue febre. Succus etiam datus cum melle lumbricos interficit, auribus instillatus uermes necat decocta in uino & oleo. Herba ipsa & cataplasmata soluit duritiem apostematum frigidorum. Mentastrum & carice & salina decoquantur in uino, & detur patienti. Contra frigidam tussim uinum decoctionis ipsorum. Item eius fomentum infrigidatam matricem calefacit & mundificat. Sacellatio facta ex puluere eius frigidum rheuma capitis constringit. Et nota quod menta romana pro hortulana poni potest.

De Mandragora.

Mandragora frigida & sicca est, scilicet eius excessus non determinatur ab autoribus. Cuius due sunt species scilicet masculus & femina, & utraq; indifferenter uiuunt, & quidem ut Auicenna & alij dicunt feminam esse formatam ad modum femine, & masculum ad modum uiri, quod falsum est, sed masculus habet folia longiora, femina uero latiora. Quidam tamen operantur tales incisiones, ut decipiant mulieres. Radicum autem cortices competunt principaliter usui medicine, secundo poma, tertio folia. Cortex radice collatus per quatuor annos seruetur in magna efficacia, uirtutem habet constringendi, infrigidandi, somnū inducendi in acutis febribus. Ad somni prouocationem puluis corticis eius conficiatur cum lacte mulieris puellam nutriendis, & albumine oui & superponatur fronti

fronti & tēporibus. Contra dolorē capitis ex caliditate folia ipsius trita super tempora ponantur, inungatur etiam oleo mādragorato, quod sic fit: poma mandragoræ trita in oleo communi diu macerentur, postea fiat aliquantulum decoctio, & coletur, & illud postea erit oleum mandragoratum, quod ualet ad somnum prouocandum & dolorem capitis ex caliditate, si frons & tempora inungantur, & calorem febrilem reprimat. Item ipsius oleum repercutit materiam apostematam calidorum in principio, fructus etiam uel folia cataplasmentur supra, uel saltem puluis eius cum succo alicuius herbe. Contra fluxum uentris ex impetu cholerae ex predicto oleo uenter & tota spina unguatur & inijciatur modicum cum aliquo leui clinstere. Auicenna dicit, quod maculae fricate cum folijs eius delectant leuigines. Item statim facit somnum, & posita in uino inebriat ueementius. Cura eorum et omnium nocuentiorum mādragoræ est cum butyro, melle & uomitu. Item nota quod publice prædicatur mandragoram habere uirtutem impregnandi mulieres steriles, si ex ea comedant, quod uerum non est, nisi forsan comedant cum sterilitas esset ex superflua matricis caliditate, tunc enim reduceretur ad temperamentum matrix, ut semen uiri non aduratur in ea.

De Meu.

Meu calidum & siccum est in secundo gradu, herba est cuius semen simili nomine appellatur, quæ præcipue medicinae competit, per duos annos potest seruari, uirtutem habet diureticam ex subtili substantia sua, nulli uel aqua decoctionis eius ualet contra oppilationem splenis & epatis ex frigida causa, & stranguariam dissoluit, aqua uero competentius potest dari in esca inuenibus, uinum in hyeme senibus, puluis meu cum semine feniculi in cibo uel potu datus uentositatem intestinorum & stomachi excludit, & digestionem confortat.

De Marrubio.

Marrubium calida & sicca est in tertio gradu, quæ alio nomine dicitur vulgariter prafum, folia eius præcipue competunt medicinæ, secundario cortices & radices, herba suffensa in umbroso loco per annum seruat: virtutem habet consumendi & dissoluedi ex qualitatibus, dissoluedi & aperiendi ex amaritudine. Contra vitium pectoris scilicet asma ex frigido & viscoso humore detur diaprasum, vel fiat electuarium ex una parte sua, & quinta mellis distillati, & fiat decoctio aliquantula usque ad spissitudinem, & postea ponatur pulvis draganti & gummi arabici & liquoris, quod erit optimum contra vitium pectoris, vel saltem pulvis eius conficiatur cum melle distillato, addito pulvere liquiritiæ. Contra tussim valet decoctio eius & ficum siccarum. Contra stranguriam & dysenteriam detur vinum decoctionis eius, & ficum siccarum, fiat etiam emplastrum ex ipsa herba cocta in vino & oleo supra renes & pectinem. Item valet contra cholicam ex frigida causa. Contra hamorrhoides inflatas & influentes fiat eucarisma ex aqua salsa & vino decoctionis eius, & postea suppositorium ex pulvere eius confectum cum melle, vel fiat decoctio pulueris vel succi eius cum oleo mustelino & bombix superponatur. Contra lumbricos detur pulvis eius confectus cum melle. Contra vermes aurium succus eius auribus iniiciatur. Contra splenis vitium cortices radicum cum ipsa herba macerentur per 15 dies in vino & oleo, postmodum fiat decoctio & coletur, & colaturæ addatur cera & oleum & fiat unguentum.

De Maiorana.

Maiorana calida & sicca est in secundo gradu, alio nomine dicitur eseron, cuius flos & folia competunt medicinæ. Colligitur in æstate cum floribus, & in umbroso loco siccatur, & per annum seruat, virtutem habet confortandi ex aromaticitate, dissoluedi & consumendi ex qualitatibus & etiam mundificandi.

Pulvis

Pulsis maiorana in cibo datur uel uinum decoctionis eius, stomachum in frigidum calefacit, & digestionem confortat, naribus appositae cerebrum confortat. Flores & folia in testa calefacta & in saculo posita & loco dolenti superposita dolorem ex uentositate prouenientem soluit. Item capiti superposita ualet contra rheuma capitis. Item nota quod mures insidiantur radicibus eius, inde medicinam querentes.

De Napo.



Apus omnem ferè aerem patitur, terram desiderat pinguem, & in solo sicco & tenui & prope riuum & deflexo & sabuloso melius nascitur loco. Proprietas napi in rapam, & e conuerso transmutatur, sed ut optime proficiat subactum. solum stercoreatumq; & uersatum querit, & in illis locis optime prouenit in quibus segetes eo anno fuerunt. Si spissi sunt nimis intervalles aliquos, ut alij roborentur, quos in locis uacuis transferre poteris, seruntur circa finem Iulij & toto tempore mensis Augusti, si pluuie defuerint, irrigatione iuuantur, possunt etià commodè serri inter milium & panicum maxime serotanium, in secunda sarculatione ipsius sarculatione iuuantur napus & rapa, ex napis nobilioris saporis sunt illi, qui sunt longi & ferè rugosi, non grossi, multas radices habentes sed unam tantum acutam & rectam. Ex napis sunt optima composita cum raphano & modico sale, aceto, melle & sinapi & speciebus odoriferis, & sine speciebus possunt fieri satis bonae. Calidi sunt in secundo gradu & multum nutrant, sed dura digeruntur, mollem & inflatam minus tamen quam rapae faciunt carnem, qui si in aqua coquantur & illa cicta in alia recoquantur duritia eius substantiae temperatur, & mediocriter inter bonum & malum generant nutrimentum, qui bene cocti non sunt difficile digeruntur, uentositatem faciunt, & in uenis & poris oppilationem. Idcirco utiles sunt si bis coquantur, & utraq; aqua proiecta in alia recoquantur, cum pinguisima carne.

De Nasturtio.

Nasturtium calidū & siccum est in quarto gradu, semen eius præcipue competit usui medicine, per quinq; annos seruatur, herba etiam uiridis multæ est efficacia, sicca modice: uirtutem habet consumendi, dissoluendi ex qualitatibus suis. Contra paralysim linguæ cum oppilantur nerui & replentur ex humiditatibus, ut solet accidere in acutis febribus, semē nasturtij masticetur & superponatur lingue. Contra paralysim aliorum membrorum semen eius in saculo positum, & in uino coctū membro dolenti superpositum ipsa herba decocta cum carnibus & comesta ualet contra humiditatem superfluam cerebri, & in lethargo prouocetur sternutatio ex puluere seminis nasturtij naribus appposito. Contra relaxationem uuæ, fiat gargarismus ex aceto decoctionis eius & siccum siccaturum. Contra iliacam passionem calidam & ex frigida causa semen eius in saculo positum etiam in uino decocto superponatur. Ad idem ualet, & ad stranguriam, herba ipsa decocta in uino & oleo superposita. Contra tenasmon ex humore conglutinoso cum annus eminet puluis superponatur ano, renes etiam inungantur melle & superspergatur puluis seminis & cimini & colophonie.

De Nenuphare.

Nenuphar est frigida & humida in secundo gradu, herba est lata habens folia, que in aquosis inueniuntur locis. Cuius duplex est differētia, una purpureos habēs flores, & alia croceos, que nō est adeo bona, flos cōpetit usui medicine, in sepiēbri colligitur, & per duos annos in multa efficacia seruatur. Ex floribus fit sirupus præcipue contra acutas febres, & pro distemperato in caliditate. Flores coquantur in aqua addito saccharo, & fiat sirupus, contra dolorem capitis ex caliditate. Saraceni ponunt in aqua per noctem unam & mane talem aquam cum floribus naribus applicant.

De Napello


De Napello.

Napellus est napus marinus, in littore maris crescens, & est uenenum pessimum & perniciosum, quod in summo caliditatis & siccitatis est, limum delet maculas cutis, etiam cum in potus sumitur rectificatum studio medicine, ualet contra lepram. Est autem uenenum homini bibere ultra dimidiam unciam, & minus hoc interficit hominem, & quod miraculosum est, ut quidam dicunt, mus paruulus qui pascitur & inuenitur iuxta ipsum & illi mus est theriaca contra uenenum ipsius napelli.

De Nigella.

Nigella calida & sicca est in tertio gradu, semen est cuiusdam herbe, quae in locis paludosis & inter frumentum reperitur. Semen per decem annos seruat. Est autem rotundum & planum subruffum & subamarum, unde habet uirtutem diureticae ex amaritudine, dissoluendi & consumendi ex suis qualitatibus. Emplastrum factum ex farina nigellae & succo absinthij circa umbilicum, & praecipue pueris, lumbricos necat; maioribus conficiatur cum melle & detur farina nigellae facta cum aceto tepido, & auribus inflata uermes necat. Unguentum autem sic fit, nigellae in multa quantitate fiat decoctio in forti aceto usque ad consumptionem, & ad aliquantulam similitudinem, & tunc addito oleo fiat quasi unguentum, quod optimum est ad scabiem, & impuginem facile tollit.

De Origano.

 **O**rganum calidum & siccum est in tertio gradu. Alio nomine dicitur uulgo gonella. Cuius duplex est differentia, scilicet organum agreste, quod latiora habet folia, sed & fortius operatur, & est domesticum quod in hortis reperitur, & minora habet folia & suauius operatur, & est domesticum quod in hortis reperitur, quod in medicina ponitur. Colligitur autem in tempore productionis florum, debet in medicina poni abiectis stipibus, per annum seruari & in umbra suspenditur, & siccan

Et siccantur folia. Virtutem habet dissoluendi, consumendi et atrahendi. Contra frigidum rheuma capitis folia cum floribus intacta sine liquore bene calefacta in saculo ponantur et saculum capiti superponatur, et patiens cooperiatur pannis, ut caput sudet, vinum decoctionis eius gargarisatum gingivarum et faucium consumit humiditatem. Contra frigidum asma detur vinum decoctionis eius et ficuum siccatum, vel pulvis eius digestionem confortat confectus cum melle detur cum aqua calida, vinum decoctionis eius digestionem confortat, dolorem stomachi et intestinorum excludit. Item fasciculi facti ex herba ipsius decocti in vino et renibus superpositi stranguriam et dysenteriam solvunt.

De Porris.

Porri sustinent ferè omnem aërem, et terram desiderant mediocriter solutam, ut optime proficiant, et pinguem et stercoratam. Seruntur autem in locis calidis et temperato proximis mense Decembri et mense Ianuario, et Februario et Martio in temperatis et frigidis cum terra fuerit ad equalitatem redacta. Hæc autem satio fit aut sola aut in alijs herbis mixtim in terra optime culta, et desuper latamine cooperta. Hæc semina sunt spissa spargenda, deinde euelluntur grossiores, primo nec aufertur aliquid de ipsarum radicibus cum sulcis plantantur, sed quando cum palis debent plantari abscinduntur radices et summas foliorum, et plantantur mense Aprili et Maio per totum mensem Iunij, sed plantari possunt mense Iulio, Augusto, Septembri et Octobri, et erunt utiles in sequenti mense Martio, et Aprilii. Nec in plantatione porrorum querenda est mollis terra, sed mediocris est optima, et satis bona est illa quæ fuerit ferè sicca. Fit autem duobus modis porrorum plantatio, uno modo subtilis, ut Etoniæ moris est, ut scilicet per unam completam spannam unus sulcus ab altero distet, et sint ab inuicem in sulco iacentes positi quaternis separatis digitis, et cū sequens sulcus terra trahitur super porros et

Tos & pedibus molliter conculeatur. Secundo aut modo palo plantantur, scilicet ut optime pastinatis & dispositis arcis fiant foramina cum palo grosso, sicut ut lancea & concava per unam spannam, & ultra uno semisse distantia, in quibus ponuntur preparatae porrectae, foramina uero replentur, aut quicquid terrae in eis ponitur, sed elapsis tribus septimanis cum herba in eis nascitur sarculantur, & herbis mundantur. Et quod porri sic plantati sint meliores alijs, nec possunt facile surtim euelli, sed hic modus magis laboriosus existit. Item hoc modo plantantur optime inter cepas iam quasi grossas, & euulsis cepis sarculantur & inveniuntur optime provenire, cum euellentur, aliqui in uno loco relinquuntur & pro seminibus reseruantur. Cuius quidem semina possunt per triennium illa suspensa seruari, calida et sicca est in tertio gradu, secundum cibum illa dabilis est, nocet enim stomacho faciens inflationem ac uentositatem, & cum sui acumine nervos eius mordet, habet etiam proprietatem faciem nigrum melancholice generantium, qui ad caput saliens uisui tenebrositatem facit, atque somnia terribilia & formidulosa inducit, unde caueant ab ipso cholericis, maniacis, & oppilationem in capite habentes. Sed diligentes eos comedere accipiant post eos lactucas, & portulacas, endiuas, & similia, ut eorum calor temperetur ab istis, aut elixentur. Deinde bis aut ter lauentur & esui postea dentur, ualent tamen secundum medicinam, crudi enim comesti pulmonem à grossis mundificant humoribus, & oppilationem epatis aperiunt. Item succus porricum aceto, oleo & thure naribus immixtus sanguinem ex eis fluentem stringit, eis scilicet qui frigide sunt naturae. Item in aure distillatus dolorem ex frigide & humiditate factum placat. Item porrum crudum cataplasmatum super morsum serpentis bene prodest. Item coctum cum oleo amygdalino conditum uenerem suscitatur. Plinius autem dicit, quod porrum contritum cum melle emplastratum super uulnera, sanat ea. Cuminum bibitus succus eius lumborum dolorem soluit,

cum sale mixtum vulnere cito claudit & sanat, duritias relaxat & rupturas cito consolidat. Item porrum crudum comestum ualet contra ebrietatem, & stimulat uenerem. Item solo odore fugat serpentes, & scorpiones. Item ualet contra dolorem dentium, & eorum interficit uermes, sed aciem oculorum hebetat, stomachum grauat, suum creat, sanguinem incendit & inflamat, si ex eo nimium comedatur. Semen porri siccus est & fortioris actionis, de quo tres drachmæ potui datæ cum duabus seminis alij mire sanguinem de pectore screantibus fluentem stringit.

De Papauere.

Papauer feritur mense septembri in locis calidis & siccis, temperatis uero & frigidis mense ianuario, februario & martio & nouembri potest etiam cum alijs herbis feri, & est frigidum & siccum in primo gradu, cuius duplex est differentia scilicet album & nigrum. Album frigidum & humidum, nigrum frigidum & siccum, & magis fortificat. Semen eius collectum per decem annos seruatur, habet autem uirtutem inducendi somnum leniendi & mortificandi. Ad somnum prouocandum fiat emplastrum ex semine utriusque, uel alterius cum lacte mulieris & albumine oui circa tempora. Mulieres Salernitanæ dant pueris puluerem seminis papaueris albi cum propria lacte. Semen autem papaueris nigri non debet dari, quia magis mortificat. Contra calida apostemata in principio & contra calefactionem epatis semen papaueris uel ipsa herba trita conficiatur cum oleo rosarum & superponatur. Contra siccitatem membrorum, ut est in hæctica & in alijs infirmitatibus oleum uiolatum calefiat aliquantulum, & puluis papaueris albi conficitur cum eo, & inungatur spina per totum, idem contra siccitatem pectoris multum ualet. Dicunt Plinius, Dioscorides & Macrobius quod ex succo foliorum capitulorum eius fit opium, unde somnus febricitantibus prouocatur, quod cum cautela dari debet, quia multum

multum oppilat, infrigidat & mortificat, & maxime nigrum papauer.

De Peucedano.

PeuCEDANUS est herba quæ alio nomine dicitur uermiculus porcinus, quæ calida & sicca est. Et uinum decoctionis eius ualet contra stranguriam, dyssenteriam & oppilationem splenis & epatis. Herba eius etiam decocta in uino et oleo & cataplasma ta spleni et epati duritiem eorū remollit. Contra frigidos humores in spiritalibus existentes, detur aqua decoctionis hordei, & si fuerit multū frigidum detur uinū decoctionis eius & succi liquiritiæ.

De Petroselino.

PETROSELINUM feri potest mense decembri, februario, martio & aprili, & transplantari fere toto tempore anni solum et cum alijs herbis simul: semina eius per quinque annos possunt seruari. Est autem calidum & siccum in secundo gradu, diureticū est, & in euidens urinā & menstrua prouocans, uentositatem & inflationem dissoluens, & præcipue semen eius. Galenus dicit, quod cataplasma tum super pustulas, scabiem & morpheam mire mundificat, unde confert hydropicis, periodicam febrem patientibus, renū dolorem ac uescicæ placat, & corporis poros uiasq; rarificat, & humores ex tenuando cum sudore proijcit, & urinam, epar & uulnera mundificat, oppilationem eorum aperit, & apostemata eorum curat, maxime quæ sunt in renibus, uentositatem colicæ passionis dissoluit, tritum & in uulnam immixtum menstrua prouocat, secundinam & mortuum fœtum educit, & expellit etiam potui datus, mundificat fœtus ab humoribus grossis & viscosis.

De Psyllio.

PSYLLIUM frigidū & humidū est in quarto gradu, herba est, cuius semē simili nomine appellatur, semen in medicina debet poni, in æstate colligitur, per duos annos potest seruari. Habet autē uirtutē infrigidandi & humectandi. Cōtra ariditatē lingue in acutis

febris semen in subtilissimo panno ligetur, & in aqua infundatur, & tali aqua illiniatur lingua, prius tamen abrasa cum cultello lignico. Contra siccitatem spiritualium & constrictionem ventris in acutis febribus ponatur psyllium in aqua & demittatur aliquantulum, deinde aqua abiecta illa psyllium detur cum frigida in sirupo. Etiam contra acutas febres competenter psyllium ponitur; & multa fiat decoctio, & postquam gutta adheret taciæ, quæ cito adheret propter viscositatem ipsius psyllij. Contra dysenteriam comburatur in aliqua testa, & pulvis inde factus cum ovo sorbili vel melius cum aqua rosata detur, si fiat vitio superiorum intestinorum. Si vero vitio inferiorum cum anathanasia pulvis eius superponatur: ad idem valet emplastrum ex pulvere eius cum albumine oui, & modico aceto & aqua rosata super pectinem, & renes vel super umbilicum, si sit vitio superiorum. Contra fluxum sanguinis ex naribus valet idem emplastrum super frontem & tempora positum, vel scutellum factum ex pulvere eius ex succo sanguinarie naribus imponatur. Contra calida apostemata saculus plenus ex semine psyllij prodest. Item sua frigidityte & humiditate cõservat camphoram, quia camphora nimis est subtilis substantiæ.

De Polipodio.

Polipodium calida est in quarto gradu, siccum in secundo, herba est similis filici, quæ crescit super quercus, muscos & lapides, sed quod crescit in quercubus melius est. Radix eius collecta & aliquantulum mundata, & ad solem per unum diem exiccata per biennium in multa efficacia cõservatur. Illa autem quæ fracta inferius apparet arida, abiicienda est. Habet virtutē dissolventi & consumendi & purgandi principaliter phlegma & melancholiam, & maxime à stomacho & intestinis, & est parum laxativa. Et nota quod in decoctione polipodij debet poni aliud exclusivum ventositatis ut anisum, foeniculus vel cymminum, quia polipodium solum mutat humores in ventositatem. Item utimur eo
in apo

in apozematibus & confectionibus & in iure galline uel alterius carnis, & datus etiam puluerem ipsius ad laxandū. & ualet quotidianæ & tertianæ, ex cholera uetellina & citrina soluit etiam opilationem epatis ex grossis & uiscosis humoribus: febri etiā quartanæ confert & iliakis & cholericis & habentibus plegma mucilaginofum intestinis utiliter medetur. Contra quotidianā & illiā cam passionem & alopeciam & dolorem articularum & ad conseruationem sanitatis talis fit usus, contrahatur polipodium unc. 1. uel 2. ad plus si sit multum laxatum, & fiat decoctio eius in aqua cū prunis & uolis, addito semine foeniculi & anisi in multa quantitate & colatum mane uel sero datur patienti.

De Pastinaca.

Pastinaca scribitur mense Decembri, Ianuario, Februario, & Martio in terra pingui, alte fossa & soluta, & optime pastinata. Alia est syluestris, alia domestica, & utraq; in radice duri est nutrimenti, & minus quā rapa nutrit, habet autem aliquid acuminis unde est extenuans & diaphoresim faciens. Ideoq; urinam & menstrua prouocat, habet etiam aliquātulum inflammationis, unde coitus iuuatus, quæ in frequēti usu laudabilem generat sanguinem. Igitur ut temperetur bis in aqua clixari oportet, & aqua eiecta, tertio coque. Pastinaca syluestris dicitur alio nomine daucus asininus, & domestica daucus creticus, eorum radix secundum Isaac calida in medio secundi gradus, & humida in medio primi, & folia et flores secundum aliquos sunt calida & sicca in tertio gradu, & una pro alio in medicinis ponitur, quia sunt ferme eiusdē uirtutis, sed domestica melior est. Item est quedam pastinaca rubea, quæ cruda potest comedi, & cocta cum napis optima est composita, & rubicundo colore decorata, quæ seritur ut alia pastinaca. Pastinaca syluestris habet efficaciam præcipue secundum folia & secundum flores, modicam aut nullam secundum radices. Hec herba debet colligi cum flores producit abiectis radicibus, &

in umbroso loco siccari, & per annum seruatur, virtutē habet dissoluendi, attrahendi ex qualitatibus, & diureticā ex subtili substantia. Contra frigidum rheuma sacelletur caput ex puluere factio ex ipsa herba bene calefacta. Ad dolorem stomachi ex uentositate uel frigidityte & contra stranguriam & dyssenteriam & iliacam passionem datur uinum decoctionis eius, & herba in multa quantitate in uino & oleo decocta, super locum dolentem ponatur. Contra stranguriam & dyssenteriam & uitium lapidis, datur uinum decoctionis seminis eius & saxiphragæ. Contra oppilationem splenis & epatis ex frigida causa, & contra hydroposum fiat sirupus ex succo foeniculi & decoctionis eius. Contra duritiem splenis, et epatis ponatur ipsa herba in multa quantitate in uino et oleo, maceretur ita per 10 dies, in decimo die coquatur usq; redigatur in oleum, et exprimatur herba bene et coletur, et colatura postea ponatur ad ignem, et imponatur cera, et fiat cerotum quod contra prædicta et contra talia apostemata est multum conueniens.

De Portulaca.

Portulaca quocunq; serē tempore seminatur. Nasquitur ad ueniente calore, et præcipue nascitur mense Aprili, Maio et Iunio. Potest etiam feri per se cum puluere mixta, et inter caules optime prouenit, et inter cepas et porrum, et in uincis congrue seminatur. Terram tamen ualde pingue desiderat, ut optime conualescat, ubi semel sata fuerit quolibet anno sequenti nascetur, et maxime si ibidem ad aliquam maturitatem prouenit, multum leditur nimia siccitate aeris, nisi frequēti irrigatione iuuetur, et sub umbris arborum non facit cespites. Eius quidem sunt due species. Est enim quedam portulaca ualde lata producens folia que Roma nasci benuentana dicitur, que multum est humida, sed insipida, et est alia portulaca communis parua producens folia, et hæc minus est humida, sed plus sapida, sed si inter alias herbas spisse seminatis seratur in cespites non poterit dilatari. Portulaca frigida est

in tertio

in tertio gradu, in secundo humida. Viridis est multae efficacie, ex-
siccata non tantum, virtutem habet leniendi stomachum, humectandi
et in frigidandi, optimus cibus est febricitantibus cruda vel co-
cta. Contra constrictionem ventris coquantur cum pruinis in aqua
et comedat patiens pruna et portulacas, et postea bibat aquam,
non quod portulaca conuenienter cum diureticis ponitur. Item por-
tulaca aliquid ponticitatis habet, et ideo confortat stomachum et
intestina, et ualet contra uulnera in renibus et uescica nascentibus.
Valet etiam fluxui sanguinis, et undecumq; manatum fuerit ipsum
stringit. Item si in capite uel in frontibus uel temporibus inunga-
tur dolorem et calorem auferit. Item ualet cōmēsta contra dyssen-
teriam, et confert cholericas egestionem habentibus. Auicenna di-
cit, quod ipsa sua proprietate eradicat verrucas, si ex ea confricen-
tur et delet stuporem dentium, abscedit desiderium coitus, tamen in
complexione calida et sicca addit in coitum.

De Papyro.

Papyrus dicitur quasi pabulum, πυρ, id est, ignis, quia desicca-
tus ad nutrimentum ignis in lucernis et lampadibus est ualde
aptus, est enim herba exterius ualde plana, habens interius medul-
lam albam, bibulam et porosam, et nascitur in locis aquosis, et dici-
tur uulgariter apud nos iuncus. Siccatur enim et excoiatur parum
remanente de cortice in uno latere, ut medulla substat, et quanto
minus habet de cortice tanto clarius ardet in lampade, et facilius
inflammat, et ex eo sunt sportule pulchrae, et ex eo sunt in ali-
quibus locis uasa et naues, uidelicet in Memphis et India, ut dicit
Plinius, et haec testantur historiae Alexandri. De papyris etiam sunt
chartae in quibus scribitur. Item ex eis sunt sportulae et pulchra se-
xtoria, et uaria utensilia, et ligantur ex eis uela nauium, et quidam
ex eis faciunt uestimenta. Et dicitur Plinius, quod eius medulla multum ua-
let ad aquam de auribus extrahendam, quia eam naturaliter imbi-
bit, et ad se trahit, et ideo cum papyro aqua de uno extrahitur.

De Pulegio

De Pulegio.

Pvlegium calida & sicca est in tertio gradu. Colligitur tempore florum, & in umbra siccatur, & per annum servatur. Folia cum floribus, abiectis stipitibus in medicinis ponuntur. Virtutem habet assumendi & dissoluendi. Satellatio capiti facta ex pulegio, calefacta in testa sine liquore, valet contra frigidum rheuma, gargarismus factus ex decoctione pulegij & aceto & ficuum siccarum valet contra frigidam tussim, quæ est ex glutinoso vel frigido humore. Item vinum decoctionis eius valet contra dolorem stomachi & intestinorum ex uentositate vel frigidityte factum. Item emplastrum ex eodem factum in uino coctum & superpositum valet ad idem. Item fomentum factum ex aqua decoctionis eius, humiditatem matricis desiccatur, & inluam coarctat: & ideo hac fomentatione mulieres Salernitanæ multum utuntur.

De Rapa.

Rapa in omni aëre habitabili prouenit, & desiderat terram solutam ac pinguem: & adeo solutam quod ferè in puluerem sit redacta, ut optime conualeseat. Seritur semen eius, ne nimis spisse spergatur, cum puluere mixtum circa finem Iulij & usque ad medium mensem Augusti, uel parum post, & etiam per totum mensem Augusti, in principio Septembris, in locis calidis & siccis, & præcipue cum terra fuerit rorida per pluiam præcedentem. Si rare seratur magis grandescit: & ideo ubi nimis spissa plantula eius nate fuerint, cum aliquod robur acceperint euellantur aliqua, ut ceteræ roborentur, & in locis uacuis transferantur, uel abijciantur. Frequenti sarculatione & herbarum liberatione multum inuantur. Seritur in agris nudis, & in stipulis etiam egregie. Seritur si optime fuerint exarata & solo operta, semine eius operiendum est ne nimium mergatur in terra. Possunt etiam conuenienter feri inter panicum & milium serotinum, quæ cum panicum & milium sublata sunt sarculari debebunt. Letantur agro patenti & ualde

valde leditur umbris, quod si tanta fuerit aeris siccitas ut tempore congruo feri non possint, potest in aliquo irrigabili loco & etiam umbroso spisse feri, ut caules, deinde cum conuenerint plantæ eius, & pluujs terra fuerit madefacta, transferri poterunt circa finem augusti, & usq; ad medium mensem septembris in terra optime culta. Colliguntur mense octobri, & quæ pulchriores erunt sublatis frondibus plantentur, ut folia sequenti æstate producant. Ex rapis fiunt composita cum aqua ut pro coquina tempore hyemis & quas dragexime habeantur, hoc modo: Rapa optime lauentur, deinde crudæ componantur in uase de solo ad solum, & in quolibet solo seminetur sal mixtū seminib; fœniculorū, & satureia, uel sal tantū, ultimo pōderentur et seruabūtur per octo dies et dimittātur, deinde ponatur aqua frigida tantū, quod cooperiātur, & sic seruabuntur per totū annū. Itē fiunt cōposita cū aceto et raphano, sinapi, fœniculis & sale hoc modo, uidelicet in quantitate duarū cōmunū sitularū accipiat de rapis, una libra raphani uel plus si bene fortes habere uolueris, & una libra sinapis, & dimidia libra fœniculi, et tres libræ mellis, & una libra salis, & raphani incidatur subtiliter per longum & pistentur minutatim & cum illis semina & sal misceantur, mel liquefiat & cum sinapi distemperatio cum optimo aceto circa medietatem unius situlæ misceatur. Deinde rapis uel napis uel radicibus rubeis & pastinacis & piris & pomis si uolueris congruo modo coctis & optime infrigidatis & diuisis fiat solum de predictis & seminetur desuper rapbanum cum seminibus & sale prius posito sinapi usq; ad equalitatem, deinde fiat aliud solum & ponantur sinapis et semina & sic fiat usq; ad complementum & seruentur. Rapa secundum Isaac calida est in secundo gradu, multum plus cæteris herbis nutrit, dure tamen digeritur, mollem & inflatam carnem propter sui uentositatem & inflationem facit, proinde coitū susciuat, quæ si in aqua coquatur et illa eiecta in alia re coquatur, duritia eius substantiæ temperatur, et mediocriter inter

bonū et malū nutriet. *Quæ* ut bene cocta est, difficile digeritur, mēto sitatem generat, et in poris opilationem facit, idcirco utilis est & bis cocta et utraq; aqua proiecta recoquatur, cum pinguisima carne. Præterea secundum medicinam est congrua podagris, si in eius iure pedes eorum lauentur.

De Raphano.



Raphanum non feritur, quia semen nō habet, sed plantatur corona recens tota uel media, uel sunt de radicibus eius parua frusta, & plantatur mense nouembri & decembri, ianuario, februario & martio. Terram desiderat profunde fossam, solutam, pinguem & optime pastinatum, sicut ceteræ herbæ quarum radices grossas & longas fieri optamus. Raphano præcipue utimur ad faciendum cōposita de rapis. Raphanum calidum & siccum est in secundo gradu, radix enim magis competit usui medicine, uiridis & exiccata, sed magis uiridis, uirtutem habet incidendi & dissoluendi, & ex eo fit compentens oxymel hoc modo. Cortex radicum aliquantulum teratur, & dimittatur bi duo uel tri duo in aceto, postmodum addatur ei tertia pars mellis, & tamen oxymel ualet contra quartanam & quotidianam, nisi sit de phlegmate salso, si frigidi humores & indigesti sunt stomacho. Cortices radicum raphani per fusas mele & in aceto comedat patiens usq; ad saturitatem, postmodum bibat aquam calidam & digitis in ore misis, uel penna uel iuncea oleo uomitus prouocetur. Contra duritiem splenis & epatis herba ipsa decocta uino & oleo cataplasmetur, peccini etiam cataplasmata & stranguriam dissoluit. De proprietatibus eius est quod si frustum raphani ponatur super scorpionem moritur. Et ideo dicit Democritus, quod qui habet manum infectam maturato semine raphani, sine suo nocumēto tractat serpentes. Hermes etiam tradit, quod si succus raphani misceatur cum succo lumbricorum terræ concussorum, & per pannum expressorum, & in ipso extinguitur gladius,

us, ferrum sicut plumbum incidet gladius ille. Et nota quod rapum dicitur esse vitibus inimicum, & dicitur quod si prope seratur natura discordante refugit, ut Palladius agricoltor affirmat.

De Radice.

Radix est herba cuius radice simili nomine appellatur. Cœli statu nebuloso letatur, licet in omni aëre proveniat, amat terram pinguem, solutam, diu subactam & profunde fossam, toffam & glaream reformidat. Seritur in mense iunio & iulio locis temperatis & siccis. Serendæ sunt radices spacijs gradibus, & alte fossis, melius proveniunt in arenis. Serantur post novâ pluviâ, nisi forte possunt irrigari. Quod satum est statim debet operiri levi sarculo. Letamen non est ingerendū sed potius palcæ, quia fumigose fiunt. Suaviores fiunt si aqua salsa frequenter irrigentur. Radices fœminini generis esse putantur, quæ minus acres sunt, habent latiora folia, & cum incunditate uirentia, ex his ergo semina colligimus, maiores fieri creduntur si sublati folijs omnibus & solo tenui calidissimo sepe terris operiantur, unde optime plantantur in sulcis, ut terra sæpius circa eas possit amplius cumulari. Si ex nimis acris dulces fieri uelis semina die ac nocte melle maccrabis. Calidū & sic cum est in secundo gradu, minus quàm rapa nutrit, propter suū acumen, quod est fortius acumine rapæ, nutrimentū tamen eius est grossius durumq; stomacho & indigestioni noxiū, & inconueniens oculis, dentibus & omnibus uulneribus & doloribus, sumpta secū dum cibum, sed secundum medicinam conuenit. Est enim lauatiua renum, & uesciæ & grossis humoribus, & urinam prouocat, & manducata lapides frangit, & si cocta comedatur tussis ex frigida & humida causa subuenit, & secundum cibum cōmesta torsionem & inflationem generet, & stomacho sit illaudabilis, quod testatur ructus putridus, qui ex ea fit maxime ante cibū. Illa enim quæ ieiunis esui datur eleuat cibū, & cohibet ne ad locū decoctionis descendat, unde fit causa indurandæ digestionis, et prouocandæ uomitus,

maxime eis qui naturaliter uentositatē in stomacho habent. Sed post cibū accepta minorē agit uentositatē superius ascendentiē, & cum sua gravitate ad inferiora descendit, deponitq; cibū ad locū digestiōis, et digerit, ut oportet, proinde uolētes eam pro uomitu accipere, accipiat ante cibū. Itē habet uirtutē similē raphano, & cōtra cāsdē causas et eodē modo datur, sed nō est adeo efficax, ut raphanum.

De Ruta.

Ruta feritur mense Augusto, & melius propagatur de abruptis ramusculis in terram positis, & si summitas alicuius ramusculi eius incuruati in terram statim in terra fixa radicator & difficilime arcescit. Hec herba, ut Plinius dicit, odit frigidam hyemem et imbris humorē, siccis gaudet temporibus. Terra lateritia uel cinere uult nutriri, ideo diligit sicū quod melius sub eo uel iuxta eum quā alibi cōualescit, uerno autē tempore transplantatur, aut in mense Septembri, & assiduae irrigetur, si non habet imbrem. Si permittatur florere, arcescit antiquata & lignescit, si rami eius bis omni anno terra usq; ad folia non operiantur. Quando autem indurata est & lignea facta, nō bene pullulat nisi abscindatur iuxta terram seu radices. Tunc enim renouatis ramis redit ad eam iuuentus. Calida & sicca est in secūdo gradu. Cuius duplex est discretio scilicet domestica & syluestris, quæ ῥῆϋα βοῦν ἄγριον dicitur, folia & semina competunt medicine usui. Semina possunt per quinque annos seruari. Folia siccata per annum, uirtutē habent diureticam, dissoluendi & consumendi. Contra cephaliam & epilepsiam in balneo iniiciatur parū succi eius calefacti per nares, quod phlegma & cerebrum mundificat. Item uinum decoctionis eius ualet ad idem. Contra defecum uisus ex fumositatē collecta in dolio ponatur cum uino ruta, & patiens tali uino utatur. Item cum aqua rosata mixta & super oculos lippos aut sanguinolentos posita, mirabiliter eos sanat & mundat. Contra dolorem dentium ruta cocta cum uino cataplasmetur super locum dolentē: uel aliter, accipe fructum

Item eius & exure aliquantulum ad ignem & concassatè eius cauterisa, & satis confert. Contra frigiditatem stomachi, & eius paralysim & aliorum membrorum detur uinum decoctionis eius & radicis fœniculi, uel puluis eius cum succo. Item contra stranguriam & dyssenteriam ruta in uino cocta & oleo pœlini cataplasmetur. Contra tenasmon ex frigida causa, decoquatur in uino, & fiat iyr̃ x̃et̃ĩc̃ uel calefiat bonum uinum, & fundatur super rutam, & pœtiens recipiat sumum. Ad menstrua promouenda & secundinam & factum mortuum educendum, detur triphera magna cum succo rutæ. Idem operatur succus eius solus per os receptus, aut pessariatus, aut teneritates eius in oleo frixe & superposite. Contra exteriorem dolorem ex concussione uel alia causa, ruta calefacta sine aliquo liquore superponatur. Contra lippitudinem & dolorem oculorum, puluis cynini cum succo eius cõficiatur, & in eo bombix intincta super oculos ponatur. Ruta etiam bibita ualet contra uenum bibitum, & morsum uenenatorum animalium, & etiam cataplasmata. Et nota si quis esset totus circumdatus ruta uiridi, secare posset transire ad basiliscum. Eius odore de hortis fugantur serpentes, & omnia uenenoſa, & ideo plantatur cõuenienter in locis ubi sunt aluearia apum. Item succo rutæ liniiti à scorpionibus, araneis, uespis, & apibus, non punguntur.

De Rubula.

Rubula desiderat terram solutam & pinguem, ut optime proveniat, & in mediocriter pingui prouenit: quæ cum uangis alte sodienda est mense Octobri & Nouembri, & sequenti mense Februario, Martio, uel Aprili. Seritur spissa ut frumentum uel spelta, & fiunt areolæ sicut in hortis uel quaterni ut in seminatione frumenti ubi rastris semen aperiendum est. Et ab omnibus herbis & radicibus maxime gramine optime liberentur cum uangatur, & cum areolæ fiunt, deinde refecatur quotiens herbe nascuntur in eam manibus uel sarculo. Deinde in Augusto semina cum nigra fuerint

colliguntur cum tota herba & bene siccata seruantur ad sumū. Et postea mense Decembri, Octobri, uel mense Nouembri fodiuntur sulci ex ipsa terra, areæ modicū operiuntur, deinde sequenti æstate runcatur quotiens in ea herbe nascūtur, & mense Augusti iterum ut dictum est semina colliguntur, & ipsius herbe radices, si placet effossæ terra paulatim sub radicibus colliguntur, & in sole siccantur, sed melius est quod usq; ad sequentem annum dimittantur in terra, ut grossiores fiant & meliores, cauando iterum sulcos & operiendo areas ut dictum est. Cum radices siccate fuerint, circuli uerberantur ut rumpantur & à terra & à puluere liberentur, & clare fiant, & si de ipsis fiat puluis, plus ualebit. Et nota quod terra ubi ponitur rubula solo aratro bene submerso fodi potest.

De Spinachia.

Spinachia optime seritur mense Septēbri & Octobri pro hyeme & quadragesima sequente. Item mense Decembri in locis calidis Ianuario, Febuario, & Martio, pro mense Aprili & Maio, & alijs etiam mensibus potest feri. Seritur autem & sola in areis & cum alijs herbis mixta in terra pingui & bene pastinata, cū colligitur si una uice inciditur medietas cessatis & alia uice alia medietas diu durabit utilitas eius. Frigida est & humida in fine primi gradus, uentrem humectat, & ualet gulæ dolēti de sanguine & cholera rubea, & melior est stomacho quàm atriplex.

De Solatro.

Solatrium, græcis est σέλινος, frigidum & siccum est, aliquantulum diureticum, uirides secundum folia & flores multæ sunt efficacie, exiccatum nullius. Virtutem habet infrigidandi, contra oppilationē splenis & epatis, & maxime contra icteritiam, quando oppilata est pars superior cistis fellis, succus eius detur in potu, aut fiat sirupus ex saccharo & succo eius, uel quod melius est, dentur lib. 2. succi eius cum unc. rheubarbari. Contra apostemata in stomacho & in testinis & in epate detur succus eius cum aqua hordei

bordei. Contra calefactionem epatis pecia intincta in succo eius superponatur, uel quod melius erit, si cum succo eius addatur acetum uel agresta, uel oleum rosatum. Contra calidam podagram herba ipsa sapius superponatur. Contra calida apostemata in principio ad repercussionem materiei herba ipsa trita superponatur.

De Semperuiua.

Semperuiua est herba sic dicta, quia semper uiridis reperitur, frigida est in secundo gradu, sicca in primo, uiridis multa est efficacia, exiccata nullius, uirtutē habet infrigidandi, plagellae intinctae ex succo eius & aceto uel agresta & epati epitumata multum ualent contra calefactionem eius, & contra dolorem ex frigida causa. Item herba ipsa trita & superposita ualet contra calida apostemata in principio ad repercussionem materiei. Contra ustras ex igne uel aqua fit unguentum ex succo eius, oleo rosato & cera, sed non debet poni in primis quatuor diebus, sed calida apponatur ut fumi tantum fiat euaporatio, unde prius unguimus sapone & similibus, deinde unguento praedicto. Contra fluxum sanguinis qui fit per ebullitionē eius in epate & in renibus, in estate plagellae in succo eius & aquae rosatae intinctae frigidae fronti & temporibus superponantur & gutturi.

De Satyrion.

Satyrion dicitur esse apium syluestre, & est calidū & siccum in tertio gradu, uirtutem habet attrahendi à remotis partibus, unde testiculi eius cum melle confecti coitum prouocant, melius tamen si fiat confectio ex eis & dactylis & pistacijs & melle. Item succus eius cum melle datus prodest arteticis.

De Sponfa solis.

Sponfa solis, cicborea, incuba, & solsequium, herba ipsa commesta ualet contra uenenum si sit ex morfu. Item succus eius superpositus ualet ad oppilationem epatis ex frigida causa. Item ualet etiam contra calefactionem eiusdem.

De Siler

De Silermontano:

Silermontanum, siue ut uulgo officinae uocant, fileseos, calidum est & siccum in secundo gradu. Semen eius collatum per tres annos potest seruari. Semē ponitur in medicinis, & habet uirtutē diureticam dissoluendi & consumendi & attrahendi. Contra asma ex frigida causa detur uinum decoctionis eius & ficum siccarum, uel detur puluis eius cum ficibus siccis & assatis. Contra oppilationē epatis, renum & uesicæ, stranguriam & dyssenteriam detur uinum decoctionis eius.

De Saxifragia:

Saxifragia calida & sicca est in tertio gradu. Semen eius herbae simili nomine appellatur, magnæ efficacis est, & dicitur etiam caput purgium, quia ipsum à phlegmate purgat, uiam desiccatur, & rheuma prohibet, & stomachū mundificat; uinum decoctionis eius & rosarum cōtra prædicta gargarizetur. Contra scabiem & pediculos unguentū factū ex puluere eius & acetō ualeat. Item ualeat cōtra paralysim si ex eo fiat inunctio. Semen pulueris eius cum melle datus lumbricos necat.

De Scilla.

Scilla calida & sicca est in secundo gradu, herba est similis capulæ, unde tuberosa magis cōpetit medicinæ, quam herba. Si sola reperitur mortifera est. Habet autem uirtutem diureticam, unde ualeat ad digestionem materiæ tam in quotidiana quam in quartana, ualeat etiam contra oppilationem splenis & epatis & contra dolorem iliacam & articularum, ut testatur Isaac. Contra dictas passionēs talis fit usus, scilla diuidatur per medium, & tot tunicæ ab inferiori parte abijciantur quot ab exteriori, & tot in medio reseruentur, exteriores debent abijci, quia uenenosæ sunt et multū calidæ, interiores similiter abijciantur, quia mortiferae sunt ex nimia frigidiitate, mediæ tunicæ sunt temperatæ. Vnde istarum fiat decoctio in furno pasta inuolutarum, postea fiat deco-

- Etio in aceto & in colatura addatur mel. Si uis ut oxymel fortius
- operetur scilla non fiat decoctio in pasta, sed tantum in aceto. Con
- tra omnem dolorem exteriorum partium ex frigida causa ualet.

De Sinapi.

- **S**inapis scribitur ante hyemem & post, & terram pinguem de
- siderat si rara seratur melior efficitur, quod si nimis spissa est
- poterunt aliquæ plantulæ inde transferri, & alibi transplantari.
- Hæc uerba ita se multiplicat, quod ubi semel scribitur, uix locus ille
- ab ea postea liberatur, & ubi semen eius cadit protinus uirct. Cali
- dum & siccum est in medio quarti gradus, habet uirtutem dissoluē
- di, attrahendi & extenuandi, nō herba, sed semen, quod colle ctū est
- per quinq; annos potest seruari. Cōtra paralysim linguae semen eius
- masticaū & sub lingua retentum, ualet. Contra paralysim aliorum
- membrorū ponatur in saculo & decoquatur in uino, & super locū
- dolentem ponatur, & præcipue in principio ægritudinis. Puluis
- eius naribus impositus sternutationem prouocat, & cerebrū a su
- perfluitatibus mundificat. Contra antiquum asma ex glutinoso hu
- more detur uinum decoctionis eius et ficum siccātū. Contra oppi
- lationem splenis & epatis & leucophlegmatiam decoquatur in a
- qua cum radice feniculi, aqua colata addatur mel, & talis confe
- ctio detur contra splenis duritiem. Herba ipsa cum axungia porci
- na bene trita superponatur. Fomentū factum ex aqua decoctionis
- eius menstrua educit. Item herba ipsa decocta in uino & cataplas
- mata dysenteriam, & stranguriam soluit. Vinum decoctionis semi
- nis eius & dragantū, humiditatē uue, cerebri & sancium exicat,
- dragantum ponitur ne uehementer exurat & excoriet. Pithago
- ras autem ultra omnes herbas sinapim cōmendat. Vnde Plinius dicit
- de ipsa quod humores grossos & viscosos extenuat, & punctu
- ras serpentum & scorpionum istius addito aceto sanat, fungorum
- uenenâ superat, dentium dolorem mitigat, ad cerebrum penetrat,
- & ipsam mirabiliter purgat, frangit lapidem, & menstruis imo

perat, appetitum excitat, & stomachum confortat, epilepticos iuuat, & hydropicos curat, & lethargicos excitat & eos multum iuuat. Capillos mundat, & eorum casum compefcit, incongruos aurium sonos & tinnitos tollit, & oculorum caliginem detergit, paralyticis subuenit, quia poros aperit & humorem prementem neruos diffoluit & consumit. Et dicit, quod maior est uirtus in semine quam in herba.

De Scutio.

Scutium & culiculus agrestis idem sunt, calidū et siccū est in secundo gradu. Semen, succus et folia competunt usui medicinae. Contra paralysim linguae semen eius masticatum in ore diu sub lingua teneatur. Et si aliqua in parte corporis fuerit, folia cocta in uino cataplasmentur. Contra lethargia puluis seminis eius naribus insuffletur. Item fiat decoctio seminis triti ex succi rute agrestis in fortissimo aceto, et ex ipso fricentur posteriores partes capitis, tamen prius rasae. Fomentatio ex folijs decoctis in uino et oleo si pectini et nigrae superponatur meatus prouocat urinales.

De Scordione.

Scordion, idest, allium agreste, est calidū & siccum in tertio gradu. Solus flos eius competit medicinae, aqua uel uinum decoctionis eius spiritalia mundificat à phlegmate & ualet contra dolorem stomachi & intestinorum ex uentositate, & contra oppilationem splenis & epatis ex frigida causa. Item stranguriam & dyssenteriam soluit.

De Asparago.

Asparagus calidus est in tertio gradu, frutex & semen competunt medicinae, frutices tenerriimi cocti scilicet cū carminibus siue cum aqua ualent contra oppilationem splenis & epatis, stranguriam, & dyssenteriam. Item contra dolorem stomachi & intestinorum & contra iliacam passionem ualet. Item uini decoctionis eius ualet contra praedicta.

De Silymbrio.

Silymbrium calidū et siccū est in tertio gradu, aliud est domesticū, aliud sylvestre quod calamentū dicitur, virtutem habet diureticā consumendi & dissoluendi. Contra vitium pectoris fiant pulles ex farina hordei & aqua, addito pulvere eius, & detur patienti. Contra frigidum rheuma folia eius in uase sine aliquo liquore torrefacta & in sacculo posita capiti superponantur. Vinum decoctionis eius ualet contra dolorem stomachi & intestinorum ex frigidityte, & contra oppilationē splenis & epatis, & urinales uias aperit. Item herba in uino decocta & cataplasmata ualet contra dolorē stomachi ex uentositate, mēstrua etiā adducit, & matricē mundificat, fomentatio eius conceptū adiuvat.

De Saluia.

Saluia platur plātulis aut ramulis iuuentibus mense Octobri, Nouembri, Februario & Martio. Calida est in primo gradu, sicca in secundo. Sola folia competunt medicine, uirida & sicca per annū seruantur. Alia dicitur domestica, alia sylvestris, quæ dicitur eupatoriū, domestica magis cōsumit & fortificat, sylvestris magis est diaforetica. Vinum decoctionis saluie ualet cōtra paralysim, et epilepsiam in uino decocta & cataplasmata super partē paralyticā multū ualet, contra stranguriam, et dysenteriam mundificat matricem. Item in balsamento conuenienter ponitur.

De Scabiosa.

Scabiosa calida et sicca est in secūdo gradu, sicca nullius est efficacitæ. Succus eius cum oleo & aceto bulliant usque ad spissitudinem aliquantulū. Et hoc unguentum aliquantulum ualet cōtra scabiem, balneum ex aqua decoctionis eius ualet contra alopeciam, succus eius ualet ad idem, & lumbricos necat, & auribus cum oleo iniectus eas mundificat, fumus uini decoctionis eius ualet contra hæmorrhoides.

De Senetione.

Senetion calida est & sicca in secundo gradu. Alio nomine dicitur nasturtium, aquaticum, cocta in aqua uel cum carnibus spiritualia mundificat. Fomentum ex aqua salsa decoctionis eius ualet ad iliacam passionem, ad stranguriam & dyssenteriam in uino etiam decocta & cataplasmata ad idem ualet.

De Serpentaria.

Serpentaria, columbina, dragantea idem sunt. Dicitur autem serpentina siue dragantea, quia hasta eius in modum serpentis maculis repleta. Calida & sicca est in tertio gradu. Radix eius per frusta minuta diuiditur & siccatur & puluerizatur, & per pannum cribellatur, & tunc conficiatur cum aqua, & ad solem siccetur, & ex tali unguento cum aqua rosata uel sine facies illiniatur, ipsam enim reddit nitentem & claram, pannum etiam depomit. Item si puluis eius conficiatur cum sapone, & fistule imponatur in tantum foramen eius dilatat, ut inde os fractum uel putrefactum extrahi possit, puluis etiam eius cum calce uiua confectus & aceto fortissimo, optimus est ad cancerum, ita ut pars tertia sit calcis. Dioscorides dicit, quod ipsa odore suo serpentes fugat, nec leditur corpus a serpente si eius succo corpus inunctum fuerit.

De Serpillo.

Serpillum calidum est & siccum in secundo gradu, & aliud domesticum, aliud syluestre. Domesticum ramos per terram diffundit. Syluestre crescit in longum & altum, flores & solia competunt medicine, que in rudiolla calefacta & in saculo posita, & capiti superposita, ualet contra frigidum rheuma capitis. Vinum decoctionis eius & succus liquiritie ualet contra tussim, & contra dolorem stomachi ex uentositate. Item uinum decoctionis eius & anisinalet contra dolorem stomachi. Item fomentum ex aqua decoctionis ualet ad stranguriam & dyssenteriam, & mundat matricem &

cem &

et calefacit et confortat. Vinum decoctionis eius stomachum in frigidum et par et splenem calefacit.

De Satureia.

Satureia calida et sicca est in secundo gradu. Seritur mense Decembri et Martio mixtim cum alijs herbis. Et sola fieri potest. Puls ex farina et aqua eiusque pulvere spiritualia mundificat, pulvis etiam confectus ualet ad idem. Dioscorides dicit, quod usus satureie est conueniens ad conseruationem sanitatis, et ponitur in cibis. Albumasar dicit, quod proprietas eius est expellere uentositatem et inflationes et torsiones, et digerere cibum, et expellit superfluitates stomachi, et prouocat menhem et menstrua, et acuat usum debilitatum ab humiditate mala.

De Sclarea.

Sclarea seritur mense Decembri, Ianuario, Febuario, Martio, et Aprili. Talem desiderat terram qualē alie herbe communes. Optima herba est et est perpetua, quia postquam est in ordinibus transplantata, sicut cepe plantatur cum fecerit semen et maturum collectum fuerit, si incidatur per tres uel quatuor digitos supra terram renouescit, et pulcherrima efficitur in autumno. Et si incidatur super arefuit, et nihilominus in Septembri pullulat, uel in estate sequenti sicut feniculus, et optime uiuit in umbra.

De Scalonijs.

Scalonie plantantur mense Febuario, sicut allia per se in areis, et in areis aliarum herbarum, et unaquęque facit multas filias, et maxime si terra fuerit bene pinguis cum plantatur. Item dicit, quod si spicula allei ponatur in cepa factis in ea foraminibus in quibus ipsius spicula possit poni, et sub terra plantentur sicut scalonie. Sunt autem de natura ceparum, sed sunt minus humide, appetitum confortant et maliciam ciborum uenenosorum emendant, no

cent uisui & dolorem capitis efficiunt, & fœtorē oris inducunt, & non competunt habentibus calidas complexionēs, sed cum carnibus pinguibus edi possunt, quia malitiam ipsarum emendant.

De Tetracta.

Tetracta, id est, herba iudaica, calida & sicca est in tertio gradu. Vinum decoctionis eius digestionem procurat, & dolorem, cōfortat stomachum & intestinorum dolorem ex acetositate curat. Crispelle ex eo & farina & aqua facit, naturalem calorem confortant, urinam promouant. Emplastrū ex ipsa herba decocta in aqua stranguriam soluit. Item fomentum ex aqua decoctionis eius matricem calefacit & mundificat.

De Thapsia.

Thapsia est calida & sicca in tertio gradu, per tres annos seruatur, & inuenitur in Arabia, India, & Calabria. In uonitiuis medicinis ponitur. Cautē poni debet. Si autem inflationem inde fieri contingit, fricetur cum panno aceto infuso, uel pars tumens iungatur cum populeo & aceto addito.

De Tapsa.

Tapsa est herba tunicanorum contrita, facit enim inflare faciem & corpus ac si esset leprosus, & curatur ut hic cum succo semperuine.

De Tapso barbato.

Tapsus barbatus calidus & siccus est. Fomentatio ex uino decoctionis eius contra hæmorrhoidas ualet, ad idem ualet si anus patientis inde post affellationem tergatur. Valet etiam eius decoctio in aqua ad tenasmon & contra fluxum uentris.

De Testiculo uulpis.

Testiculus uulpis est bona & dulcis in gustu, facit autem in uino sumptus appetitum coitus, & adiuuat ad ipsum, & est calidus & humidus, & est species satyriæ.

De Testi

De Testiculo canis.

Testiculus canis est alia species satyria, & est in folijs & stipite similis testiculis vulpis, & radix ipsius est duorum modorum, habet enim unum globum superius, & alterum inferius, & unus est mollis, alter durus & plenus, & in illo est humiditas superflua. Et si ante coitum masculus sumat maiorem testem, id quod concipitur ex coitu erit frequenter masculus. Si autem foemina sumat minorem & concipiet, fiet magis foemina, dicitur autem quod maior auget coitum, minor uero abscidit ipsum, & sic uterq; amborum destruit operationem alterius, & hoc dicit Albertus de plantis.

De Thimo.

Thimus est herba ualde aromatica, cuius flos dicitur epithimum, & est flos medicinalis, habet enim uirtutem purgandi melancholiam, & pblegma, & ideo ualet contra quartanā & alias melancholicas passionēs, & ex eo debemus accuere medicinas, non ipsum per se dare, quia naturam habet inducendi sincopim & angustiam praecordiorum.

De Viola.

Viola est frigida & humida, de uiolis fit saccharum uiolaceum. Sirupus autem uiolaceus fit deinde de uiridibus & siccis. Saccharum uiolaceum fit eodem modo quo rosaceum. Sirupus sic fit, uiole in aqua decoquantur, & ex colatura & saccharo fit sirupus. Si autem ex ipsarum succo & saccharo fieret, melior esset. Oleum uiolatum ualet interius receptum contra diaphragmā laboris totius corporis. Item inunctio ipsius facta super frontem & tempora remouet dolorem frontis ex calore factum. Viole habent uirtutem leniendi, humectandi, infrigidandi, laxandi, sed parum sunt laxatiue, & purgant principaliter cholera rubeam, unde ualet feбри tertianae, & contra distemperantiā epatis & in calore & contra oppilationē epatis & icteritiam. Contra defectum appetitus

appetitus ex cholera. Item uiole contrite posite super calida apostemata in principio conferunt, idem facit ipsa herba. Fomentatio ex aqua decoctionis ipsius herbe facta secundum pedes & frontem in acutis ægritudinibus somnū prouocat. Sirupus uiolaceus est magis coquendus quam roscarius alioquin cito corrumpetur.

De Virga pastoris.

Virga pastoris est carduus sylvestris, & est frigida & sicca, solum folia eius competunt medicine uiridia & sicca, sed uiridia maioris sunt efficacie, uirtutem habet constringendi repellendi & infrigidandi. Emplastrum ex puluere eius & aceto & albumine oui super peccinē & renes ualet, & contra fluxum uentris. Puluis etiam datus in ouo sorbili ad idem ualet, & ad profluuium mulieris. Item ad idem ualet fomentatio ex aqua decoctionis eius. Trita ualet ad calida apostemata in principio ut ad erysipelam, & cataplasmata capiti abraſo ualet contra phrenesim & dolorem ex calida causa. Item hæc herba multum est consolidatiua recentium uulnerrum. Semina & uermiculos que sunt in carduis super radices siccatis querunt auicule & cantant cum dantur eis. Isidorus dicit, quod radix eius in aqua decocta cupiditatem potatoribus administrat. Item quodatrici utilissimus est carduus, & iuuat mulieres ut filios masculos generent.

De Volubili.

Volubilis est herba inuoluens se super plantas proximas. Est autem parum calida, sed multum sicca, quod ostendit eius tortura. Quædam autem species eius que uocatur funis pauperū, & hæc terrestris est & aquea. Habens ex terreſtritate sua constrictionem, & ex aquositate mundificationem & lenitionem, folia autem eius sunt consolidatiua uulnerrum magnorum, nec est eis par in illo effectu, coquantur autem in uino & emplastreantur super eam aceto, sunt etiam medicina adustionis ignis, Est etiam alia species

Species que dicitur volubilis maior, & lac ipsius abradit pilos, & interficit pediculos.

De Vrtica.

Vrtica dicitur, quia tactus eius corpus adurit. Est enim ignee nature, ut dicit Macrobius. hæc duplex est, nam quædã est pungens, & quædam mortua, quæ non pungit, & eius folia sunt albiora & molliora et magis rosâda, & utraq; est medicinalis, nam succus eius cum uino bibitus ualet contra istericiã et cõtra colicam passionem, cum melle curat antiquam tussim & mundat pulmonẽ & ventris inflationẽ, & tumorem sedat. Folia eius cum sale contrita vulnera sordida mundant et curant. Similiter morsum canis atq; caneros sanat. Radix eius contrita in uino & coctâ in oleo ualet contra tumorem splenis. Succus eius fluxũ sanguinis de naribus sistit, semen eius cum uino bibitum præcipue mixtum melle et pipere mouet uenerem, uentrem mollit si comedatur, & præcipue mense martio cum oleo cocta.

De Viiriolo.

Vitriolum quod alio nomine dicitur parietaria, est herba calida & sicca in tertio gradu, & dicitur nitriolum quia ex eo optime nitra mûdantur. Exiccata nullius est efficacitæ, viridis multæ. Virtutem habet diaforeticam et extenuatam. Contra frigiditatem stomachi & intestinorum & eorundem dolorem, & contra stranguriam & dyssenteriam parietaria calefacta in testa sine aliquo liquore superponatur loco dolenti, uel etiam decocta in uino albo aliquantulum acido cum fursure. Contra stranguriam & dyssenteriam coquatur in aqua salsa & oleo & pectinicataplasinetur. Cocta & cõmestâ multum ualet contra dolorem stomachi ex frigiditate uel uentositate. Item contrita aliquantulum calefacta cum uino & fursure tumorem minuit.

Libri Sexti finis.

PET· DE CRE·

SCIENTIIS, DE PRATIS ET
nemoribus, Liber VII.



POST QUAM in libris superioribus sufficienter dixi de cultu campestrum agrorum, vinearum, arborum & hortorum, quæ multam requirunt industriam, dicā nunc de pratis & nemoribus, quæ non tantam querunt doctrinam, sed ferè sponte idonea proveniunt à natura, & primo de pratis, quare creata fuerint, & qualem aërem, terram, aquam, & situm desiderant, ad ampliore copiam & ubertatem herbarum, & qualiter fiant, & qualiter procurentur & renouentur, & de fœno quod est eius fructus qualiter colligatur, & conservetur, & de utilitate ipsius.

Qualiter prata creata fuerint, & qualem aërem, terram & aquam desiderant.

Caput I.



PRATA fuerunt à natura diuiniq; mandato creata, ut terra quæ primo nuda fuit uestiretur & ornaretur. Et ut ipsarum herbarum tam virides quam siccae nutrimentum cōueniens animalibus herbis utentibus præstent. Nascuntur autem in ipsis diuersarum herbarum genera, ex diuersitate humorum in superficie terræ contentorum, quam quisdam sagax natura, quæ nusquam in necessarijs deficit, operata est, propter diuersitatem animalium nutriendorum ex eis, quorum appetitus in omnibus est diuersus. Aërem uero desiderant temperatum, aut frigiditati & humiditati proximum, si enim superflua fuerit in loco rigiditas erunt ibi perpetuo nives & glacies, quæ omnino impediunt generationem herbarum. Et similiter si caliditas aut siccitas

siccitas superflua fuerit omnem vigorem consumit, nisi ei succurratur irrigatione frequenti. Terram desiderat pingue ad herbarum copiam, uerum si non fuerit multa pinguedinis saporosiores & magis odoriferas & subtiliores creabit herbas. Si fuerit nimis macra, modicas aut nullas producit, talis enim terra & similiter salsa uel amara sua imbecillitate aut malitia se uestire non potest. Aqua competens magis pratis est aqua pluuialis que calida coruscatione descendit. Et similiter aqua mense aprili & maio subtilis descendit, et quecumq; in estate de caelo provenit bona est, dumtamen gelida non existat ex natura grandinis liquefacta. Secundi meriti est aqua lacualis, que clara, calida & pinguis est. Tertio aqua fluminum. Ultimo aqua fontium, & quanto magis a suo elongatur principio, tanta melior, quia minus frigiditatis in se habet. Prata desiderant suum depressum ubi continuo sit humor inclusus, uerum si adeo sit profundus talis locus quod ibi quasi semper aqua operiat superficiem terrae, non erit aptus ad aliquas herbas, sed erit accedens ad naturam paludis, producetq; iuncos & pannias, quadrellum, & similes herbas paludales grossas, insipidas, aquaticas, & fere omnibus animalibus inutiles. Et si fuerit adeo eminens quod irrigari non possit, facile siccitatem & ariditatem patietur, nisi fuerit in alpibus et locis frigidis, in talibus enim locis et si paucas proferunt herbas subtiles tamen sapidas et odoriferas ferunt, felix autem prati positio est, que super se riuum fluentem habeat, quo possit quotiens opus fuerit irrigari.

Qualiter prata fiunt & procurantur & renouantur, Cap. I I.

PRata quidem naturaliter proueniunt ubicumq; terra solis radijs illustratur, & fiunt etiam opere manuali, aut ex locis agrestibus nemorosis, aut ex campestribus agris. Et primo quidem modo extirpandus est locus mense septembri uel octobri, & impedimentis omnibus liberandus, non solum spinis & uirgultis, sed etiam herbis latioribus & solidis, deinde

cum frequenter excultus fuerit, ac multa aratione solutus, submotus lapidibus & glebis confractis stercoretur luna crescente, recenti letamine. Ab ungulis iumentorum, summa intentione seruetur in tactus, præcipue cum humescit, ne inæquale solum reddant multis locis impressa uestigia. Si uero ex campestribus locis fiant æquandus est omnis locus, & glebis confractis, tam huic quam superiori semen uiciæ cū foeni semine spargendus est. Rigari uero antequam durum solum fuerit non debet, ne eius ætatem minus solidam materia superflui corrumpat humoris. Qui uero uolunt quibusdam annis habere pratum, & alijs segetes, etiam ex terris macris cum irrigatione optime faciunt, hoc modo, immittunt in agrum aquam turbidam, ut ex terra noua sulci repleantur, & ager æquetur, & fiet optimum pratum sine herbarum satione, et si taliter dimittatur per quatuor uel quinq; annos, & postea aratur omni anno usque ad quinq; uel sex, poterit congrue de frumento serri, & melius si post duos annos genus segetis transmutetur. Qui autem uolunt uno anno habere frumentum, & sequenti pratum conuenienter hoc modo procurant, immittunt enim aquam in agro extracta blada ibiq; dimittunt in æstate, & in autumno, si æris fuerit siccitas, sequenti uero æstate cum foenum secauerint terram arrumpunt, & secunda & tertia uice arant, & seminant. Sed si etiam uolunt granum habere non arant, nisi circa finem Augusti extracto gramine, & tunc arant, secundo reiterant & seminant, & tamen bonū frumentum ibi prouenit. Et quidam omni anno seminant, & tamē herbam graminis foeni secā colligunt, hoc modo, scilicet quod existente frumento in campis uel statim post extractionem eius, mittunt aquam in agrum potius claram quam turbidam, & à pecore custodiunt, deinde gramen cū stipula secant, & hyeme animalibus præbent, quæ herbas secernunt, & de stipulis sibi lectum & finum faciunt, stipula autem & herba secata, arant semel, & bis, & tertio seminant, & ibi bonum frumentum nascitur. Procuratur autē ut ex pratis eucl-

lantur

lentur omnia impedimenta quot nascuntur in eis, & etiam herbe pratis incongrue, precipue post magnas pluias que terram adeo mollicauerint, quod herbe nocine radicibus euellantur. Plurimum etiam confert pratis si tempore hyemali recenti fimentur letamine ad ubertatē herbarū, amplius si statim cū secata fuerint copiose irrigentur ter aut quat er fructificabunt in anno, sed cum uetusta fuerint musco cooperta radantur, ad muscum autem necandū, ait Palladius, sepe cinerem ingerendum. Quod si sterilis omnino factus est locus aretur pluries, & denuo equatus formet pratum.

Qualiter fœnum colligatur & conseruetur, &
de utilitatibus eius, Cap. III.

Secanda sunt prata cum herbe ad debitum augmentū peruenierint, floresq; cōpleuerint, nam si maturius, antequam ad easum florum & foliorum & siccitatem peruenierint secantur, erit fœnum aquosum, non præbens solidum nutrimentum equis & bobus laborem tollerantibus, & si nimis fuerit maturum calore & humiditate naturali consumptis, erit insipidum & modicum, & abominabile nutrimentum animalibus præbens. Sunt autem secanda tempore sereno cum aëris caliditas & siccitas duratura speratur, secatum uero in pratis dimittendū est per unum uel duos dies antequam uoluatur, deinde uoluendum & conuenienter siccandum, demum colligendum, portandum & reponendum sub tectis, quibus deficientibus sub diuo ponatur, taliter præparatum, ut aqua in illud intrare nequeat, quod si eo nouiter in pratis secato pluvia superuenierit antequam uoluatur modicū uel nihil leditur. Sed, ut ait Palladius, post pluiam nō debet conueri antequā pars ipsius summa siccetur, siue iam fuerit siue non fuerit reuolutum. Si uero eo reuoluto superueniat, omnino destruitur, nullius utilitatis fœnum erit. Et toto anno seruetur, quod etiam per biennium seruari commode poterit, & bobus, equis, asinis & quibusdā alijs animalibus nutrimentum congruum præbet, ut possint sustinere labo-

res, qui eis propter necessitates hominum iniungantur. Quibus uero tempore niuium subuenit, quo de terra nutrimentum sumere nequeunt. Si quod fœnum subtile, frondosum, odoriferum & laudabile fuerit, erit quasi annona solum animalibus, tam calido quam frigido tempore sufficiens ad laborem. Si uero fuerit fœnū grossum, paludale aut nimis mature uel serò secatum, non erit sufficiens animalibus multum laborem tollerantibus, nisi eis annonæ auxilio alia quando succurratur, uel nisi tempore magni frigoris in quo animalia non laborant & omne pabulum auidius appetunt.

SECUNDA PARS LIBRI HVIVS DE
nemoribus & primo de his quæ naturaliter
proveniunt.



DICO in primis, quod nemora uel naturaliter proueniunt, uel hominum industria instituantur, & quæ à natura producuntur, fiunt ex humore & semine in matrice terræ cõtentis, quæ uirtute coelestis erumpunt ad superficiem terræ, & eriguntur in stipites diuersarum plantarum, secundum diuersitatem humoris, seminis, & locorum, in quibus proueniunt, fiunt etiam sine hominis ministerio ex seminibus, quæ à propinquis arboribus in terram decidunt, aut ab aëribus uel fluminibus de longe feruntur. In alpius uero naturaliter nascuntur siluæ pinorum maximarum & phagoriam, castanearum, quercuum, cedrorū & similium, in locis uero depressis & paludosis sponte nascuntur salices, populi, & alni, cannæ syluestres, uindictæ, & similes plantæ. In pluribus autem locis nascuntur spineta, & arbores parue, tortuose & infinitæ spinetæ diuersorum generum, & piri et mali sorbi, ulmi fraxini, populi & similes arbores, & quantopinguior erit terra tanto proceriores proueniunt arbores, in macra uero & salsa uel amara nascuntur spineta, & arbores

arbores parue, tortuose, spinose, scabiose & hysside. Hæc autem nemora procutanda sunt diuersimode. Nam ea in quibus sunt castaneæ, piri, mali & similes arbores fructum ferentes extirpanda & purganda sunt ab omnibus spinetis, & plantis extraneis. Et fructiferae arbores rarificande, ubi nimis spissæ fuerint, & incidende in altiori loco, quam bestie attingere possunt, & ex plantis domesticis & nobilibus inferende secundum doctrinam traditam in libro secundo cum de insitionibus locutus sui. Ea uero quæ alijs arboribus & spinetis occupata sunt si arbores nobiles & pulchras habuerint ædificijs & alijs operibus aptas similiter sunt extirpanda, & ubi nimis spissa fuerint sublatis turpioribus lignis rarificanda paulisper ut omnis humor conuertatur totaliter in substantiam meliorum. Ea uero in quibus sunt arbores igni solummodo cõgrue non sunt mouenda nisi forte spinis purgentur & tribulis, quæ quolibet quinto aut sexto uel rarioribus annis sunt incidenda, & ligna ad focum paranda.

De nemoribus quæ hominum industria fiunt, Caput IIII.

Quicquid nemus seu syluam plantare uel serere, consideres primo situm & naturam terræ in qua facere syluam conuenit, & ubiq; tales conferat arbores quæ illi loco conueniant, & tantum uotum instituentis adimpleant. Nam si sunt in altis alpibus aut earum uallibus, si quidem soluta terra est, congrue recipiet plantas & semina castanearum, quæ ad minus 40 pedibus ab inuicem distare debebunt. Si uero terra cretosa uel lapidosa in talibus locis extitit, ei competunt præcipue quercus, rover & cerrus. Quod si talis terra fuerit in montibus calidis, remotis ab alpibus amygdala ei conuenienter aptantur. Quod si loca sint pingua congrue recipient piraria & pomaria, & in locis calidis oliuetum & siccetum & malorum granatorum syluam, in frigidis uero & temperatis uellanas coctanas & mespila; si uero locus fuerit humidus

humidus & depressus, solutus, cōuenientius recipiet salicetum, albarctum, alnium, & populum. Et si cyetosus talis locus extiterit, ei conueniet ulmetum, fraxinetum, opulus & rouer. Quod si locus marinus arenosus & fere sterilis extiterit, desiderabit pinetum, & in calidis climatibus palmam sceminam & masculum. Institutuntur autem prædicta omnia uel ex plantis aliunde translatis, uel semini bus satis, aut manu in congruis locis plantatis, non tamen ignores quod castanee 40 pedibus ad minus quaq; uersum distare debent, ut in ramis possint congrue dilatari & plurimū fructum ferre, quercus uero non minus distare conueniet, quia naturaliter plurimum per latera se diffundit, rouer & cerrus uiginti pedibus aut paucioribus distare sufficiet. Hæc enim tria genera arborum glaudem ferunt, quæ cibus optimus est porcorum. Piraria uero & pomaria 20 pedibus uel usq; ad 30 distabunt. Olinetum, ficus, malagranata, auellane, coctana & nespila 12 uel usq; ad 20 pedes distare poterunt. Salicetum uero aut propter perticas minimas aut propter naturam ædificiorum plantatur. Primo quidem modo decem pedibus ab inuicem distent, secundo uero per duos uel tres aut quatuor pedes distare sufficiet, quia eius spissitudo in altum procubarbit rectitudinem & augmentum. Populus autē & alnus qui non multum diffundunt se, in altum uero naturaliter extolluntur, non sunt rare ponendæ. Sed albarus utilior est si ingrossetur in stipite, propter assides quæ multis operibus congrue ex ipso sunt, & propterea ramos plurimum per latera spargit. Ideoq; non inconuenienter usq; ad uiginti pedes uel amplius separate plantetur, quæ etiam ex quibusdam ramis aliquid corticis habentibus summa facilitate nascetur, possunt etiā spissæ poni ut ramos faciant subtiles & longos, ulmus autē oplus & fraxinus non incongrue spissæ rareq; poni possunt, quia tam grossæ quàm subtiles & longæ tales arbores diuersis operibus adaptantur. Pinus uero & palma circa triginta pedes distare ab inuicem satis congrue possunt. De singulis autem arborum

arborum generibus prædictorum plene tractatum est in libro quinto, prout disponuntur in campestribus agris, nunc uero prout ex eis nemora sunt & syluæ breuiter de ipsis tetigisse sufficiat.

PET· DE CRE-

SCENTIIS, DE VIRIDARIIS ET
rebus delectabilibus ex arboribus,
herbis & fructu ipsorum,

LIBER VIII.



In superioribus libris tractatum est de arboribus & herbis secundum quod utilia corpori humano existunt. Nunc uero de eisdem dicendum est, secundum quod animæ rationali delectationem afferunt, & consequenter corporis salutem cōseruant, quia complexio corporis animi semper adheret affectui.

De uiridarijs herbarum paruis, Cap. I.



Viridaria quedam ex herbis tātum, quedam ex arboribus, quedam ex utroq; fieri possunt, & quæ de herbis solummodo sunt desiderant terram macram et solidam, ut herbas subtiles capillares creare possint, quæ maxime usum delectant. Oportet igitur locum qui ad uiridarium tale paratur primo bene liberari ab herbis & radicibus adulterinis & magnis, quod uix fieri poterit, nisi primum effosis radicibus optime planetur locus, & ubiq; fortiter infundatur aqua feruentissima ut reliquæ radicum & seminum in terra latentium germinare nullatenus ualeant, & deinde cespīte macro subtilis graminis totus locus impleatur & ipsi cespītes fortissime comprimantur ligneis malleis & conculcentur grammīna pedibus, donec uix de ipsis aliquid appareat, & tunc eam paulatim erumpent capillariter & superficiem admodum pan-

E b ni ui

ni uiridis operient. Sit autem locus uiridarij quadratus tantæ mensuræ quod sufficiat his qui in eo stare debebunt, in circuitu uero eius herbe aromaticæ omnium generum plantentur, ut sunt ruta, salvia, basilicon, maiorana, menta, & similes, & similiter omnis generis flores, sicut uiola, liliū, rosa, gladiolus & similia. Inter quas herbas & cespitem planum sit cespis eleuatiō, & quasi per modum sedilium aptatus. florens & amœnus, in cespite etiam contra tēam solis plantandæ sunt arbores aut uites deducendæ, ex quarum frondibus quasi protectus cespis umbram habeat delectabilem & refrigerantem, in arboribus autem illis plus queritur umbra quam fructus, & ideo non curetur de eorum fossura & simatione quæ cespiti nocumentum afferrent. Cauendum est autem in his ne sint arbores nimis spissæ aut plurimæ secundum numerū, quoniam ablatio auræ sanitatem corrumpit, & ideo uiridarium liberum aërē desiderat, & superflua umbra infirmitates generat. Amplius non sint arbores malæ sicut nux & quedam aliæ, sed sint dulces, aromaticæ in flore, & iucundæ in umbra, sicut sunt uites, piri, mali, malapunicæ, lauri, cypressi & huiusmodi. Post cespitem sit magna herbarum medicinalium & aromaticarum diuersitas, cum non modo delectet ex odore secundum olfactum, sed & flores diuersitate reficiunt uisum, in quibus ruta pluribus locis admisceatur, eo quod pulchre est uiriditatis, & ipsa sua amaritudine fugat extra uiridaria animalia uenenosa. In medio aut cespitis nihil sit arborum, sed potius ipsa planicies libero gaudeat aëre & sincero, quia ille aër salubrior est, & etiā aranearum telæ extēso de ramo arborum ad ramum impediret & insiceret uultus transeuntium, si arbores in medio uiridarij siue cespitis plantatas haberet. Si aut possibile sit sōs purissimus deriuetur in mediū, quia ipsius puritas multā affert iucunditatē. Ad aquilonē & etiā ad orientē uiridarium sit patulū, propter illorum uentorum sanitatem & puritatem. Ad oppositos aut uentos scilicet meridionalē & occidentalem sit clausum, propter eorum uentorum turbulentiam, impuritatem et infirmitatem.

nitatem, quamvis etiam aquilonaris impediatur fructus, nro tamen modo conseruat spiritus, & sanitatem custodit, delectatio enim queritur in uiridario & non fructus.

De uiridarijs mediocribus & mediocrium personarum, Cap. II.

Secundū facultates & dignitatē mediocrū personarum mensuretur spaciū terre uiridario deputandæ, uidelicet duo uel tria aut quatuor uel plura iugera, cingatur fossatis & sepiibus spinarū uel rosarū, & desuper fiat seps de malis spinicis, in calidis locis, & in frigidis de nucleis seu prunis uel malis citonij. Itē aretur, & ligonibus plantetur undiq; locus, deinde funiculo uniuersus signetur locus, ubi arbores sunt plantande, plantentur in eis acies pirorū, & malorū & palmarū, in locis calidis & citoniorum. Item mororū, ceruiforum, & prunorū & similium arborum nobilium, ut ficū, nucleorū, amygdalorum, citoniorū, & similium, unū quodq; uidelicet genus in suo ordine. D'stent aut ordines uiginti pedibus ad minus, aut pluribus pro domini uolūtate, in acie d'stent arbores ab inuicē magnæ uiginti pedibus, parue decē. Inter arbores ab inuicem in aciebus plantari poterunt uites nobiles diuersorū generum quæ delectationē & utilitatem afferent, ligon'sentur acies arborū & uites melius conualescunt, & uniuersa spacia deputentur pratis, atq; sæpe de ipsis adulterina siue magnæ euellentur herbæ. Secantur bis in anno, prata uiridarij, ut pulchriora permaneāt, plā'tentur & formētur arbores, ut supra libro quinto dictū est per ordinē de unoquoq; genere. Itē fiant in eo pergularia in conuenientiori parte ad modum domus uel papilionis formata.

De Viridarijs regum & aliorum illustrium & diuitum dominorum, Cap. III.

Quoniam tales personæ propter eorum diuitias & potentiam possunt in huiusmodi uiridarijs, rebus integris siue satisfacere uoluntati, nec deest eis plerumq; industria

bb 2 ordi

ordinandi, sciant quod uiridarium multam delectationem habens hoc modo facere possunt. Eligant igitur planum locum non paludosum, neque impeditum ab insufflatione bonorum uentorum, in quo sit fons per loca fluens. Sit autem locus 20 iugerum aut plurimum pro domini uoluntate, cingatur muris conuenienter altis, plantetur in eo ex parte septentrionis nemus arborum diuersarum, in quo fugiant & lateant animalia syluestria in uiridario posita, ex parte uero meridiei fiat palatium speciosum, in quo rex uel regina morentur cum uoluerint graues cogitationes effugere. Ab hac enim parte faciet est uo tempore umbram uiridario, & ipsius fenestrae ad uiridarii temperatum habebunt aspectum, non feruore solis infectum. In eo fiant in aliqua parte uiridaria supradicta. Fiant etiam in eodem piscine, in qua diuersa genera piscium nutrantur. Atque etiam terrestria ut lepores, cerui, capreoli, cuniculi, & similia, rapacia ponantur in eo supra quasdam arbutulas prope palatium positas. Fiat sicut domus quaedam tectum & parietes habens de folio rameo spissae reticulatus. In qua ponantur phasiani, perdices, philomenae, merulae, carduini, fumelli, & omnia genera aucularum canentium. Sint autem acies arborum uiridarii a palatio ad nemus non extransuerso, ut facilius de palatio uideantur quaecumque agunt animalia quae in uiridario posita sunt. Fiant etiam in dicto uiridario palatium cum caminatis & cameris de solis arboribus, in quo possunt rex & regina cum baronibus & dominabus esse tempore non pluuioso: huiusmodi autem palatium fieri commode poterit tali modo. Mensurentur & signentur spacia uniuersa caminate & camerarum, & in locis parietum plantentur arbores fructiferae, si placet quae facile crescant, ut sunt cerasa & mali, uel, quod melius est, plantentur salices uel ulmi, & tam insitionibus quam palis & perticis & uinculis per plures annos eorum procuretur augmentum in tantum, ut parietes & tectum ex eis fiat. Velocius uero & facilius poterit palatium siue domus praedicta fieri de lignamine succo & undique circa ipsum

ipsum plantari nites & uniuersum ad ficiu[m] operi. Poterunt etiam in ipso uiridario fieri tentoria magna de lignamine sicc[o] uel arboribus uiridibus & uitis operiri. Atq[ue] etiam multam affert delectationem si in uiridario fiant insitiones mirabiles, & diuersæ in eisdem arboribus, quas diligens uiridarij cultor facile scire poterit ex his quæ infra in eodem libro dicentur. Propterea scire oportet quod omnia genera arborum & herbaru[m] in tali uiridario sunt ponenda unumquodq[ue] separatim ab alio, & distinctum ne aliquæ inueniatur habere defectum. In tali autem uiridaria non semper delectetur rex, sed aliquando cum serijs necessarijsq[ue] satisfecerit rebus, renouetur in eo, glorificans deum excelsu[m], qui omnium bonorum delecta[i]o[n]em aut[em] principiu[m] est & causa.

De his quæ ad delectationem fieri possunt
in munitionibus curiarum & uiridario-
riorum, Caput IIII.

Circa tumbas & curias siue circa uiridaria congrue fieri possunt munitiones ex arboribus uiridibus, siueles munitionibus murorum seu palangate uel stricte cum turribus, modo in summitate riparum cingentium locum, liberatum optime ab omnibus spinis & arboribus uetustis, profunde plantentur salices uel populi, si solum competat eis, uel ulmi si diligant talem terram spisse per unum pedē, uel minus, & linea recte ducta. Hæc cum optime conualuerint incidantur iuxta terram, & sequenti anno surculorum proles per loca lineæ quaternis digitis in spissentur, & cum palis perticis & uinculis sursum directe ducant donec augmentum 8 uel 10 pedum susceperint in ea altitudine, cum alie qualiter ingrossate fuerint incidantur, infra locum uero munitionis per quinque pedes uel circa similes plantæ tempore priorum primarum ponantur 10 pedibus æque distantes, quæ cum in prædicta fuerint altitudine incidantur, & cum auxilio perticarū uersus proximās & uersus posteriores plicentur plantas & exteriores, simi-

liter circa eas, & sic totiens quolibet anno fiat donec quasi cratis quedam sortis effecta sit, super quam possint homines secure morari, deinde pars exterior dimittatur augeri ad modum muri super cuius forium positi, quæ in altitudine congrua quolibet anno incidi cum forma merlorum super mures positorum poterit, & tali modo teneri. Circa talem munitionem in angulis, & alibi si placuerit poterunt quatuor arbores plantari, & sursum directe cōduci, & singulis 10 pedibus incidi, et uersus seipsas plicari cum auxilio perticarum, & uelut solaria ex eisdem fieri, & iterum in altum extolli, & eodem modo formari, & tandem desuper plicari admodum tecti domorum, uel cum merlis formari, supra ianuam uero optime stabit domus, & ante ipsam solarium arborum prædictarum. In cuius etiam siue uiridarijs fieri potest domus cum columnis uiridibus ipsæ iam grossis optime transplantatis, & trabibus super ipsis affixis & tecto canarum uel palearum opertis, dum tamen aliquis ramus ex singulis columnis emineat supra tectum, qui ipsam columnam semper ab ariditate tucatur, & domum ipsam mirabiliter ab aestu seruare defendat.

De his quæ in campestribus agris ad delectationem fieri possunt, Cap. v.



In agris plurimum delectat pulcher ipsorum situs, quod non sint plures deformes agelli. Sed magna quantitas in unum sine interuallo redacta directos habens confines. Et ideo procurare debet diligens paterfamilias prope suos agros potius quam alibi emere, & in alijs partibus agellos uendere, & cum uicinis permutare partes superfluas, & tortuosas agrorum, & sinum agrum cum uicino rectificare, & omnem locum fossatis & sepiibus spinorum uiridum cum arboribus convenientibus permixtam aquæ distantibus cingere, atq; fossata parua scolatoria quæ in planis necessaria sunt intrinseca recte formare, quantum possibile est, seruata semper utilitate agrorum, delectationem enim utilitas præcedere debet.

debet in agris: licet in uiridarijs oppositum sit seruandum, & ideo quaecumq; in eis maiorem frugum pollicentur uberta: em sunt meliora, & magis eligenda. Atq; etiam procuretur pro posse quod per agros aquarum rui decurrant, quibus possint cum opus fuerit irrigari, & ab eis cum necessarium sit auerti, per spaciosos agros formentur etiam itinera congrua, quibus patres familias eques & pedes & coloni cum plaustris & bobus cōmode accedere possint, ad omnes partes agrorum, hæc enim omnia plurimum cum utilitate delectant.

De his quæ circa uites & fructus ipsarum delectationem præbent, Cap. vi.

Plurimum delectat habere pulchra uineta in planis siue in parvis mōtibus orienti expōita, diuersorū generum uasferentia, & ideo diligenter procuret dominus ea in congruo situ plantare, & in locis pinguib; in arboribus & pergularijs ea formare, in exilib; uero iuxta solum in directis aciebus disponere, atq; plurium generum bonorum uas in his conferere, institutionesq; mirabiles in eisdem experiri, quæ ab antiquis sapientibus, & præcipue Palladio, posse fieri prædicantur, quarū unus modus est, ut plantetur uitis iuxta cerasum uel aliam arborē, & cum optime apprehenderit & cōualuerit perforetur arbor acuta terebra, & per foramen uitis ducatur, & luto ab utraq; parte obturetur foramen, ne sol aut pluuia uel uentus consolidationem impediat. Deinde cum lignū uitis optimè cū ligno arboris unū fuerit, iuxta corticem arboris incidatur uitis, ut deinceps succo arboris nutriatur, sic enim uas fertur tēpore fructū arborū maturari. Est quidē modus faciendi uitē & uinam thetiacā aut muscatā uel gariophylatam uel laxatā, uel alterius qualitatē, quod sic fit. Sarcmentū quod pangendū est in una parte scindatur, & sublata medulla loco eius thetiaca uel muscus puluis gariophylorum uel alterius rei ponatur, & terre mandetur, uinculo diligenter astrictum, quo factio una quæ nascetur.

nasceatur uirtutem eius quod in uite positum est tenebit. Sane si sarmentum de hac uite sumetur & plantetur materni medicaminis potentiam non tenebit. Oportebit autem theriacae uel alterius rei asinum dua infusione senescentis succi uim reiterare. Sed in hoc idem breuius fieri posse puto, si in initio maturitatis uariū scindatur sarmentum uicæ pendentis, & medicamine immisso ligetur. Est quædam pulchra species uicæ quæ granis interioribus caret, quæ Græcis duntoribus sic, recitante Palladio, fit. Sarmentum quod obruendum est quantum placebit in terra debemus tantum findere, ut omni medulla subtrahita ac diligenter exculpta membra iterum diuise partis adunare & uinculo dimissa constringere, & deponere. Vinculi autem de papyro asserunt esse faciendū, & sic in humida ponendū, diligentius quidem sarmentum reuinctum quantum excisum est inter scyllæ bulbū demergunt, cuius beneficio asserunt sata omnia comprehendere posse facilius. Alij tempore quo uites putant sarmentum frugiferum putata uitis in ipsa uite quam possant de alto sublata medulla excuant non diuisim, & calamo affixo alligant, ne possit inuerti, tunc τρωαδὴ quod Græci sic appellant in excauata parte suffundunt ex aqua prius ad sapæ pinguedinem resolutum. Et hoc transactis octo diebus semper renouant, donec uitis germi-
na nouella procedant. Ut uites botriones ferant albos & nigros, sic fieri Græci asserunt: si uicinæ sunt uites alba & nigra cum putantur sarmenta utriusq; sic diuisa inter se cōiunge, ut medios utriusq; oculos æquando possis reddere unitati. Tunc papyro stricto ligabis, & molli, atq; humida terra linire curabis, & interiectis trinis diebus adaquare, donec germen nouæ frondis crumpat, & sic tempore poteris hoc genus efficere per plura sarmenta. Quidam expertus mihi asseruit se inseruisse surculum album & nigrū in una uite continuatis summitatibus gemmarum, corticula tantum gemmarū de medio sublata, & optime comprehendisse. Vel potest hoc fieri exceptis duobus surculis, & diuisis iunctis oculis diuisis simul
& optime

Optime ligatis tanquā sit unus furculus inferatur, uel duabus gemis clausis & conueniē s cū modica quantitate ligni, & in loco gemme insertis. Plurimū etiam delectat habere uina diuersorū colorum & saporū, & ideo diligens paterfamilias semper ne quasdam col ligat uinas, ut uinum habeat acerbū, quasdam bene maturas, ut potens, quasdam nimis maturas, ut dulce faciat etiam uina diuersorū colorum cum rebus colorantibus & saporum non corrumpentibus, faciat etiam ea diuersorū saporum cum rebus odoriferis, & saporē nouū tribuentibus, in quibus delectetur odor & gustus, quæ in aliqua parte mixti in caldario ad ignem mittantur, & demittantur donec optime uinū in illo sapore uel odore infectū fuerit. Et tunc in uas in quo sit simile uinū, uel alterius generis immittatur, seruetur usui mox futurum. Bonum est etiam habere uina medicinalia quibus utatur corpus, cuius ad aliquam aegritudinē facile sit declinans. Hoc quidem fiet cū medicina simplices uel composite contra illam aegritudinem habentes uirtutē prædicto modo miscbuntur uino. Procura ret etiam semper habere in domo agrestiū, sapam, uinas passas, acetum & similia, quæ facias secundum modos supra in libro quarto notatos, multum enim delectat animum tam pro se quā pro amicis, quæ appetit facile inuenire. Si botrio postquam defloruerit mittatur in uasculum terreum uel utreum paruum tamen, ex toto botrione dicitur fieri unum granum,

De his quæ circa arbores delectatio nem augent, Cap. vii.

In his quæ patremfamilias delectant, est habere in locis suis copiam bonarū arborum, & generum diuersorū, & ideo procurare debet ubi cunq; inueni arbores nobiles afferentes fructus inde ad loca sua transferre, & plantare siue in serere de eisdem, & non inordinate, ut ferē omnes fac iūt, eas disponas, sed in congruis ordinibus, uidelicet magnarū arborum genera

C c rare

rare, ut in ramis dilatarı possint, & superfluis umbris nō cōsumant fertilitatem agrorū, eas uero quę parue natura proueniūt spissiorē res ponere potest, & unūquodq; genus formare secundum naturā ipsius maiores à partibus septentrionis & occidentis ponere debet, minores uero ab oriente & meridie, hoc enim modo frumenta quę patenti campo letantur minorem sentient lesionē, propterea incisiones facient mirabiles & diuersas, in eodem uel diuersis truncis, quę ualde admirabiles se ostendunt, his qui experimenta in talibus probant, nam infinitorū pirorum & malorū genera, citoniorum et sorbarum & similium in eodem trunco inseri possunt. Inseritur etiam malus in salice & populo, & uitis in ulmo & moro. Itē si persicus inseratur in spinam uel phaginā proueniūt maiora & meliora alijs. Et si amygdalus & persicus coniunctis oculis inserantur in pruno erunt eorū poma carnem persicorum habentia, & ipsorū ossa mutabuntur in amygdalarum naturam. Morus etiam inseri potest in ulmo, sed magnę parturit infelicitatis augmenta. Afferit Martialis candida genera in malis puniceis fieri si argille & crete quartā partem gypsi misceas & toto tricennio hoc genus terrę radicibus eius adiungas, idem dicit mirę magnitudinis eius poma fieri, si olla fictilis obruatur circa arborem punici, & in ea ramus cum flore claudatur, ne resiliat ligatus ad palum. Tunc cooperta olla contra aquā quę minatur incurfus autūno patefacta, suę magnitudinis exhibebit poma. Sed etiam mense maio & iunio posse fieri cōmodius affirmatur. Varro autem aliter specificat modū dicens: Si mala punica immatura cū hæreant in sua uirga, demerseris in ollam sine fundo, eamq; si posueris in terram & operueris circa ramos ne extrinsecus spiritus afflet, ea non modo integra eximi, sed etiam maiora quā in arbore unquam penderint. Ut uarios fructus ficus exhibeat, ramos duos nigre & albę ita inter se uinculo constringes ac torques ut germina miscere cogantur, sic obruti & stercorati & humibus adiuti, ubi prodire cęperint, germinantes oculos aliqua adiunctione

unctione conglutina, tunc germen adunatum parturiet duos colores quos unitate divides & diuisione coniungas. Rosas nondū patefactas hoc modo seruabis, in canna uiridi stante scissa recludas, ita ut patiaris coire scissuram, & eo tempore cannam recidas, quo rosas uirides habere uolueris. Aliqui olla rudi conditas ac bene munitas sub diuo obruunt & reseruāt. Cerasa ut sine ossibus nascantur, sic asserit Martialis, arborē teneram ad duos pedes recides, & eā usq; ad radicem fines, medullā partis utriusq; abraderē ferro curabis, & statim utraq; partes uinculo stringes, & oblinis fimo summam partē et laterū diuisuras & post annū solidatur dicta cicatrix, in hanc arborē surculos qui adhuc fructū non attulerint inferes, & ex his sine ossibus poma nascētur. Si ramus paruus cerasi scindatur & loco medullā ponatur scamonea, fructus illius rami eo anno laxandū uirtutem acquirit. Affirmantibus Græcis persicus serpiā nascitur, si ossa eius obruas, & post septem dies ubi patefieri coeperit apertis his nucleos tollas, & hos cinnabari inscribas, mox ligatis simul cum suis ossibus obruas diligētius adherentes. Sine ossibus persica fiunt si persicus & salix prope plantentur, deinde inclinato salice admodū arcus perforetur in medio, et per foramen persici plāta ponatur, & cera uel luto perfecte obturetur foramen, & usq; super ipsum terra cumuletur, & cum anno uel biennio transacto persici & salicis lignum unitum fuerit, sub arcu salicis persicus incidatur, ut ex solo salicis humore alatur.

De delectationibus hortorum,

Cap. VIII.

Quoniam multū delectat hortum bene dispositum & industria sufficienti cultū habere. Ideo pater familias diligenter procuret habere hortū in solo pingui et solato. Cuiusmodi uelutrum si fieri potest per spacia decliua desinat, ut possit irrigari tempore magni aestus, ibi omnia genera herbarū bonarū tā cōestibilibū quā medicinaliū nutriat, unumquodq; secundū q. requirit natura

eius, in arcis rectis & cum extenso fune & latitudinis modo forma
tis æqualiter prout in hoc sexto plene traditum est. Fimium in eo
semper habeat abundanter, ne propter macredinem tædio conspicuam
cientem afficiat. Et ut plenius delectetur, res muscicatas operetur in
eo, possunt enim in eis quedam naturalis fieri, quæ quibusdam mi-
raculosa uidentur, nam si capr. n. stercor. s. baccam subtiliter subula
excaueris, & in eam semen lactucæ, nasturtij, erucæ, radices me-
miseris, & tunc inuolutam fimo baccam terræ optime cultæ breui
scrobe demergeris: Raffenus nritur in radicem, cætera semina in
summo, lactuca pariter emergent, prosiliunt, singulorum sapore
seruato. Si plura semina porrorum in unum ligata deposueris gran-
dis ex omnibus nascetur porrus. item si capiti eius rapæ semen im-
mitas sine ferro, & pangis multum increfcere fertur, uel plantas
semina in unum strictum foramen posita, omnium pullatio in unum
grande porrum concrefcet. Si aqua in patenti uasculo sub cucu-
mere uel citrullo aut cucurbita ponas in flore tales fiant. Aliqui
florem cucumeris cum uiticulæ suæ capite absciso canna inserunt,
cui prius omnes nodos perforauerunt ibi cucumer nascetur nimia
longitudine tensus. Oleam sic metunt si iuxta posueris uelut arcus
plicetur. Si eius florem sicut in uete sua est in forma fictili claueris,
ac ligaueris qualis uultus formam hominis uel animalis habuerit, ta-
lem cucumer s. figuram præstabit. Hec enim omnia Virgilius, Mar-
tialis afferunt. Rē mirandā de omo Martialis. affirmat, quod modo
purpureos modo albos flores modo roseos afferat. Et si ex eo semi-
ne frequenter seratur modo in serpillum modo in sisymbrium mute-
tur. Hermetes autem dicit, quod cucurbita in cineribus ossium huma-
norum plantata & oleo rigata nono die habet fructum. Et quod mira-
bile est, semina quæ in uase cucurbite sunt, in sublimi nata faciunt
cucurbitas longas & exiles, quæ autem in medio eius nascuntur, fa-
ciunt grossas, & quæ in profundo iacent, faciunt latas.

Pet.

PET· DE CRE-

SCENTIIS, DE RE PECVARIA

& omnibus animalibus que in rure
nutriuntur, LIBER IX.



IN superioribus libris dictum est de cultura agro-
rum, vinearum, hortorum, arborum, pratorum et
nemorum, & de omni utilitate ipsorum, & etiam
de his que ad delectationē spectant tam in urbi-
bus quam in mirabilibus ex herbis et arboribus ar-
tificiose agendis, in hoc autē nono libro dicitur de animalibus que
propter utilitatem & delectationem nutriuntur in rure. Verum ne
antiquitas ignoretur, sciendum est (ut ait Varro egregius philoso-
phus) quod primis tēporibus fuerint animalia semper que natura
liter vivebant ex his rebus quas inculta terra ferebat, ex hac uita in
secundam descenderunt, agriculturam uidelicet & pastoriam, &
propter utilitatem coeperunt colere agros, & fructus percipe-
re, plantare arbores utiles & colligere fructus: item deprende-
re animalia, concludere & mansuafacere ipsa. Et primo coeperunt
oues propter utilitatem & facilitatem, hæ namque maxime natura
quiete sunt, ad uitam hominum aptissime ad cibum enim lac & ca-
sam competunt, ad uestitum uero pelles et lana: Deinde autem coe-
perunt & domesticauerūt animalia cetera que humano generi uti-
lia esse perpenderunt, & ad hæc ex omnibus generibus domestica-
tis multa siluestria esse affirmantur in locis diuersis. Nam in Phrygia
multi dicuntur esse ouium ferarum greges. In Samotrace capre. In
Italia multas esse sues feræ nemini est ignotum. In Dardania, Me-
dia & Thracia multi boues feræ. Asini feræ in Phrygia et Caonia.
Equi feræ in Hispania citiore. Dicā itaq; de animalibus nutriendis
que scire potui ex doctrina prudentium antiquorum & experientia neo-

tericorium. Et quia non omnes per omnia, sed certi & per certa peritiores uel minus periti inueniuntur. Supplementum huius operis relinquo uiris maxime expertis in talibus, nam ut ait Philosophus, experientia facit artē, & plenius ea cui naturalis ratio est annexa. Verum quia inter cetera animalia equus censetur nobilior & magis necessarius regibus & alijs principibus tempore bellorum & pacis, & ceteris, dicam primo de ipsis plenius, de ceteris sub compendio quibus de genere equorum dicta multa poterunt aptari, propter afinitatem nature ipsorum.

De etate equorum & equarum, Caput I.

G Reges equorum & equarum qui habere uoluerit primum, ut ait Varro, spectare oportet etatem, uideat ne sint minores trium annorum, maiores decem annorum. Aetas cognoscitur equorum & fere omnium quae ungulas indiuisas habent, & etiam cornuta sunt, ut idem ait, & similiter Pallad. quod equus in triginta mensibus primum dentes medios dicit amittere, duos superiores, & totidem proximos, & primis cecidis, totidem inferiores incipientes quartum agere annum eijciunt, & totidem proximos, & primi cecidi renascuntur. Quinto anno incipiente amittunt similiter alios quatuor scilicet duos superiores, & duos inferiores praedictis proximos, qui renascentes sexto anno implere incipiunt. Septimo omnes habere solent relatos & completos. Cum autem sint maiores cuius etatis sint intelligi negant posse, praeterquam cum dentes sint facti plicati & supercilia cana, & sub eius lacus, id est, comacuitas, quod cum aparuerit dicitur habere annos se decem. Vir autem prudens & expertus nostris temporibus ait, quod equus habet duodecim dentes, scilicet sex superiores, & sex inferiores, qui omnes sunt anteriores, cum quibus cognoscuntur etates & tempora equorum, deinde habent scalones, & post illos habent molares. Et potest esse quod quidam equi plures habent, & tunc dentes sunt

sunt dupli, & potest esse quod equus eiciat ex his aliquos, & amplius non renascuntur, & non nocet equo nisi ad pascendum, quoniam ipsi per dentes anteriores pascuntur. Et ideo erit minoris praecij, & masticare equorum est per dentes molares, dentes aut primi quos ibi mittant sunt duo superiores, & duo inferiores, qui uocantur primus morsus, & uocatur pullus primus morsus, quod quidam dicit fieri secundo anno, & postea mutat alios quattuor dentes proximos, scilicet duos superiores, & duos inferiores, qui uocantur medij, id est, secundus morsus, & tunc uocatur pullus secundus morsus deinde mutat alios quattuor, scilicet duos superiores, & duos inferiores, qui uocantur quadrati, id est, tertius morsus, & quando pullus nascitur cum anterioribus nascitur, & postea nascuntur scalones, & quando isti scalones nascuntur nimis longi adeo quod equum impediunt annonam molere & impinguare, propter quod marischalebi quos uocant, scalones refecant, & quando pullus factus est equus dentes eius fiunt rariores, & capita dentium fiunt nigra & elongantur, & per aliquos annos stabili cani, & cum incipit senescere color dentium reuertitur ad albedinem, et transit ad colorem mellis, & post hoc fiunt albi ut color pulueris, et fiunt longiores. Sed ipsa dentium longitudo est aliquando per naturam absque senectute, propter quam causam refecantur senibus dentes, ut iuuenes esse credantur.

De forma bonarum equarum & admissarij & qualiter teneri debent, Cap. II.

Formam esse oportet, ut ait Varro, magnitudine media, quia nec uastitas nec exiles decet esse equas, clunibus ac uentribus latis; equos quos propter admissuram uelis habere legere oportet amplo corpore, formosos, nulla parte corporis incongruos, equorum pecus pascendum in pratis, potissimum herba in stabulis ac praeseptibus arido feno cum pepererint hordeo adiecto, bis in die, data aqua. Horum facturae ini-

tium admiſſionis facere oportet ab æquinoctio uerno ad ſolſticiũ, ut partus idoneo tempore fiat, ſcilicet multarum herbarum, ut māter habeat abundantiam lactis. Ex hoc enim corpus et membra pulli grandiora ſient. Duodecimo enim menſe, die decimo naſci dicuntur qui ante ipſum tempus naſcuntur inutiles exiſtūt. Admitti oportet cum tempus anni uenerit bis in die ſcilicet mane et ueſpere, ſed alternis diebus equa alligata celerius admittūtur, neq; equi fruſtra cupiditate impulſi, ſemen eiſciunt. Satis autem concepſiſſe ſignificatum cum ſe defendunt. Si faſtidium ſaliendi eſt ſcyllæ mediũ contemrunt cum aqua ad mellis ſpiſſitudinem tum natura equæ cum ea tangunt, et poſtea cum eadem nares equi. Sciendum etiam quod equus debet gigni à ſtellione quem gnaragnum uocamus uulgariter, diligenter cuſtodito, parum uel nihil equitato, et cum minimo labore poterit, quia quanto magis cupiuerit equam, tanto plus et completius ſperma emittet, et maior in uētre matris gignetur pullus. Amplius mater cum fuerit pregnans non nimis pinguis nec nimis macra exiſtat, ſed mediũ teneat, quia ex nimia pinguedine intrinſeca locus pulli arctatur, ut corpus et membra pulli ſufficienter dilatari non poſſint, nimis autē macra non poteſt ſufficientis nutrimentum filio miniſtrare, quia propter macilentus et debilis naſcitur. Iterum, ut ait Palladius, equa pregnans non urgeatur, nec ſanctum frigūſq; tollerat, nec inter ſe locis comprimatur anguſtijs. Item equas generoſas et quæ maſculos nutriunt alternis annis ſubmittere debemus, ut pullis copiam puri lactis infundant, cetera paſſim replenda ſunt. Item dicit quod admiſſarius quinque annorum ad minus eſſe debet, ſed ſemina recte bima concipiet, quæ ſi decennium excedat incers ex ea naſcetur ſoboles. Itē ſcribit Varro, quod equas pregnantes cauere oportet ne laborent pluſculū, neq; frigidis ſint, eo quod alior maxime pregnantibus obest. Ideo in ſtabulis humum aut ab humore prohiberi oportet, clauiſq; habeat hoſtia ac fenestras, et in præſepibus inter ſingulas ponantur longarij, id eſt longa ligna

que eas discernant, ne inter se pugnare possint. Item dicitur pregnas item neq; impleri cibo neq; esurire oportet.

De natura equi & natis qualiter tene- ri debent, Cap. III.

Cum pullus nascitur utile est, quod nascatur in loco petroso et duro & montoso, eo quod ex loco petroso et duro fiunt ungule duriores, ex loco montoso fiunt crura meliora, propter exercitum eundem superius & deorsum natus pullus per bona pascua matrem sequatur duobus annis, non amplius, eo quod tunc naturaliter incipit se habere ad coitum, & uolens matrem uel aliam equam ascendere & ascendens deterior redderetur, & de facili possit in aliqua parte laedi, uerum si sine matre ac ceteris equis stare usq; ad triennium posset in pascuis plurimum sibi confortet ad crurium & totius corporis salutem. Quinque mensium pullis factis cum reuertuntur ad stabulum dandam farinam hordeaceam molliorem, & fursures & si quid aliud terra natum libenter edent, ut ait Varro anniculis iam factis dandum hordeum & fursures donec erunt lactantes, nec prius bienniosum remouendi a lacte, doneq; stant cum matribus interdum tangendi sunt manibus ne cum seiuncti erunt exterrantur, eadem enim causa ibi frenos suspendentes ut simul consuecant hominum uidere facies & frenorum audire strepitum.

De captione & domatione equi, Cap. IIII.

Cum pullus est duorum annorum laqueari debet molliter, laqueo grosso & forti de lano composito, eo quod lana propter suam molliciem ad hoc habet. hoc est lino uel canabi. Debet autem laqueari recenti uel nubilo tempore, nam si tempore calido infusa captione nimium laborent, possent facile laedi. ipso autem capto & laqueato ad societatem cuiusdam equi domesticum ducatur. Tam enim saluberrime conducitur, quia similia sunt. Ibis gaudent. Varro autem dicit, meliorem fieri equum qui triennio completo domatur, a quo tempore dar. farrago, id est, farina, solet.

De que

quæ propter purgationem equino pecori maxime necessaria est, quod diebus decem fieri debet, nec pati ullum aliū cibum gustare. Ab undecimo uero die usq; ad quartumdecimū diem & decem diebus ultra dandū hordeum quotidie adijcientem minutatim, deinde mediocriter extergendū & extrahendum, & cum sudarit oleo perungendū. Si frigus erit, faciendus in stabulo ignis erit, ad domandū binis retinis de forti corio, & humili præsepio alligetur, ne propter suam sæuitiam fractis retinis lædatur in cruribus, uel alia sui parte, & donec in sua perseverauerit sæuitia semper sui similis domiti societatem obtineat, & cum manu sæpe tangatur leniter & suauiter, nec unquam cum eo grauitur indignetur domans, ne ob indignationem uitū aliquod sibi assumat, sed enim cum magna perseuerantia lenitatis mansuescat, donec mansuetus efficiatur, ut delectet, & pedes lauari & percuti patiatur admodum ferrandi. Imponendus est etiam super eum bis in die puer aut ter uel pluries.

De custodia equorum, Cap. v.

E Quo talis præbeatur custodia, capistrum factū de corio forti, primo in equi capite imponatur, & binis retinis alligetur præsepio, ut superius est expressum, & eius pedes anteriores pedicæ de lana factæ uinculentur, & uni pedum posteriorum alligetur, ne ante ire aliquo modo possit, inde quidem fit pro sanitate crurium conseruanda. Locus præterea ubi equus moratur bene mundus existat in die, nocte uero fiat eidem lectus de palea uel grossiori sæno usq; ad genua pro quiete, summo mane inde tollatur & tergatur eius dorsum & crura & omnia membra equi, decenti tersorio, deinde pro potu ducatur ad aquam paruo passu, teneatur autē equus tam mane quàm sero usq; ad genua uel paulo supra spacio trium horarum in aqua dulci frigida uel marina, eo quod aquæ naturaliter equis conueniunt, uel propter frigiditatem dulcis, uel siccitatem marine coartando humores descendentes ad crura quæ sunt agri tudinū causæ. Postea uero cum equus redit ad stabulum non intret

nullo modo donec eius crura tergantur & desiccantur ab aqua, quia fumositas stabuli ex sua caliditate solet adducere gallas & malos humores cruribus madefactis. Est etiam utile ualde quod equus assidue comedat in terra iuxta pedes anteriores, ut uix possit foenum ore capere, ita quod collum cogatur extendere pro cibo sumendo, quia ex hoc collum efficitur gracilius & pulchrius. Comedat equus iuuenis fœnum, herbam, hordeum, auenâ, speltam & similia, nam fœnum & herbâ propter humiditatem ipsorum uentrem & corpus totum dilatant & augment. Cum uero fiunt in completa ætate comedat etiam paleas hordei, ex quibus non superflue impinguatur, sed in competētibus carnibus retinetur, & sic potest securius fatigari, nam equus esse debet nec nimis pinguis, nec nimis macer, sed medius inter ea. Si enim fuerit nimis pinguis, humores superflui facile ad crura descendunt, & aegritudines creant, quæ solent in equorū cruribus euenire, & præcipue accidit eis facile cum subito aliquibus laboribus uexantur, ex nimia uero macie deficiunt uires eius, & red datur turpior ad uidendū, equus præterea perfectæ ætatis in ueris tēpore circa messem herbas solum comedat ad purgandū, nō foris, sed sub tecto permanēs, grosso tegmine laneo coopertus, ne ex frigidityte herbarū infrigidetur, uel morbos grauiore incurrat. Aqua præterea pro potuequi aliquantulū salita sit suauiter, currens uel parū turbata eo, quod tales aquæ sunt calidæ & grosse, ideoq; nutritiores et magis cōgruæ sunt equorū corporibus. Nam quāto aqua frigidior & uelocior est in motu, tātō minus equū nutrit & reficit. Ferrari debet equus ferris sibi conuenientibus rotundis admodum ungulæ lenibus, & ungulis in circuitu strictis, & bene adherentibus nam leuitas ferri reddit equum agilem ad leuandum pedes, & ipsius strictura ungulas maiores & fortiores facit. Equus præterea sudatus uel fortiter calefactus non debet aliquid comedere uel portare, donec copius uel paulisper ductus à sudore & calore fuerit liberatus. Est sciendū quod insueta equitatio serotina nocet equo

sed matutina plurimū cōmēdatur . Oportet præterea equū habere continue cooperturam lineam tempore calido, propter muscas, & laneam, tempore frigido, propter frigus. Et nota, quod propter sanitatem equi seruandam, de uena colli consueta quater est phlebotomandus in anno, scilicet uere, æstate, autumnō & hyeme. Notandum est etiam quod equus bene & diligenter custoditur, & moderate, ut conuenit equitatus, ut in plurimum circa spaciū 20 annorum ualidus perscuerat.

De doctrīna & morigeratione equi, Cap. vi.

IN equi morigeratione primum adhibeatur ei frenū leuissimum & ualde debile, cuius morsus sit melle uel alio dulci liquore perunctus, nam tale frenum facilius & acceptabilius sustinebit, & propter dulcedinem ipsum libentius iterato recipiet, & postquam frenum sine difficultate recipiet, aliquibus diebus mane & sero ducatur ad manum, donec optime ductorem sequatur. Deinde absq; strepitu sine sella quā suauius & leuius potest fieri potum equitetur paulisper, & paruo passu, & à dextris & sinistris sæpe uoluitur: & si oportuerit pedester cum aliquibus antecedit, & omni die per loca plana non saxosa mane tempestiue usq; ad mediam tertiam equitetur: cum uero spacio unius mensis sine sella fuerit equitatus, eidem sella suauiter & sine strepitu imponatur, & cum ea ducatur leuiter, donec tempus uenerit hyemalis. Cum autem equitator equum ascenderit, eum non moueat, donec sibi pānos aptauerit, nam equus ex hoc quietius sum assumit ad modum equitantis, post hoc autem frigido tempore accedente modus instruendi equitalis sequatur, uidelicet quod equitator faciat ipsum per agros aratos summo mane moderate trotare, ut uulgo loquitur, tam à dextris quā à sinistris sæpe uoluendo habena freni dextera per unum pollicem ex trāsuerso curtiorē alia existente, quia equus naturaliter est promior ad sinistram, & si expedierit mutet sibi frenum fortius, adeo quod pro uelle facile teneatur. Trotare iubeo

re iubeo equum per terram aratam & non aratam & per equalē & inaequalē, ut assuescat pedes et curra leuius eleuare, & idem fiat per loca arenosa eadem ratione, & cum bene trotare sciuerit per eadem loca, & eadem hora breuiori saltu quo poterit calopoeatur, hoc autem nō fiat nisi semel in die, nam ex superfluitate calopandi saepe retrogradi fiunt. Obseruet etiā equitator in principio cursus & in trotando, & calopando, ut manibus teneat freni habenas, inferius iuxta dorsum, itaq; equus paulatim citruando collum caput inclinet in tantum quod os semper deferat iuxta pectus, ex hoc enim clarius uidet gressus suos, & melius ad utraq; partem uoluitur, & facilius retinetur ad libitum equitantis, praeterea considerari & cognosci debet durities & mollities oris equi, & secundum eius duritiē & mollitiem imponatur eidē frenum, quorū multa sunt genera, nam sunt ualde leuia, & quaedam minus, & quaedam sunt asperima & durissima, quaedam minus & quaedam media inter praedicta, sed ipsorū formas scribere omitto quia nota sunt apud frenorū artifices, nec possunt sic apte scribi, quemadmodū possunt oculata si de uideri. Est etiam plurimum utile per ciuitates equitare frequenter et praecipue ubi ars exercetur fabrilis, uel sit strepitus uel tumultus. Ex hoc enim desunt esse pavidus, & securitatem atq; audaciam sumit, quod si praedicta loca transire trepidat, non cogatur acriter calcaribus, aut uirge uerberibus, sed leue uerberare blandiendo ducatur. Oportet etiā saepe ascēdere equū & de ipso descēdere leuiter, ut assuescat in ascēsu et descēsu stare pacifice et quiete. Et praedicta omnia seruāda sunt donec dētes equi perfecte fuerint immutati, quod fit per spat.ū quinq; completorū annorū, mutatis dentibus q̄ salubrius poterit sibi de maxilla inferiori quatuor extripētū dētes, duo uidelicet ex parte una, & totidē ex altera, qui scalioncs & plani nūcupātū a pluribus, freni morsu cōtinue aduersantes, et ante q̄ frenū imponatur eidē permittantur uulnera solidari paulisper, & tūc frenū bene sibi adhibeatur. Et nota quod os eq̄ debet esse nec ni

nis durū, nec nimis molle, sed mediū inter ea. Item nota quod equus propter dictam dentium extirpationē sit pinguior, eo quod ex hoc amittit ferociam et furorē, post extirpationem dentū equitetur, ut dixi remouendo eum ad saltus paruos, & saepe obuiādo ut assuescat intrare in eos, & discedere ab eisdem. Cum frenum inuentum est conueniens equo, non mutetur, ne ipsa mutatione os deuascentur equi. Et curetur summo mane, semel qualibet hebdomada peruiam bene planam circa spatū quartæ partis milliarij unius in principio, & deinde usq; ad unū milliare cursus poterit augmentari & amplius, si placebit. Et est sciendū, quod quanto frequētius moderate curatur tanto sit celerior & agilior, propter usum. Est tamē contrariū frequentato usui currendi, quod equus ex hoc sit flagrantior defacili, & impatiens, si nimis festinatur ad cursum, & suæ assuetæ affrenationis maximā partē perdit. Sciendū est etiam quod postq̃ equus perfecte doctus & consuetus fuerit affrenādi, equitator frequenter ipsum debet facere calopare, currere, & salire, moderate tamen, quia longa quies desidīa parit equo, & ea in quibus fuerat instructus facile obliuiscetur. Quæ dicta sunt de instructione equorum locū habent in equis ad rem militarem pertinentibus tantum, nam alij deputantur ad uecturā, alij ad admissurā, alij ad cursurā, ut qui ad prædicta parantur, alij ad quadrigam, qui diuersimode sunt ad sua officia instruendi. Item quidā equos habere uolūt placidos et quietos, & tales castrādi sunt, quia dēptis testiculis quietiores sūt.

De cognitione pulchritudinis equorū, Cap. vii.

Equus pulcher habet corpus magnum & longum & suæ longitudini proportionaliter omnia mēbra respondent. Caput eius sit gracile, siccū & conuenienter longum, & magnum & laceratum, habeat nares inflatas & magnas, oculos grossos uel non occultos, auriculas paruas & aspidæas deferat. Collum habcat longū & gracile, uelut caput, crines paucos & planos, pectus grossum, & quasi rotundū, dorsum curuū & quasi planum, lumbos

lumbos rotundos grossos, costas grossas & bouinas, uentrem longum, anchas lōgas & densas, crinem longū & amplum. Caudam habeat longam cum paucis & planis crinibus. Cropas latas & bene carnosas. Garecta satis ampla et sicca. Falces habeat curuas, ut ceruus. Crura bene ampla & pilosa, iūcturas crurū grossas et curtas ut bos, ungulas pedum amplas, duras & cōcauas, prout decet. Sit etiam equus altior aliquātulum in parte posteriori quā in anteriori, ut ceruus, collū deferat eleuatū, & sit in eo grossities circa pectus. De pilo diuersi diuersa sentiunt, se d pluribus uidetur quod bouinis sturus super omnibus est laudāus. Sciendū est deniq; quod pulchritudo equi melius potest cognosci in macie quā pinguedine equi existente.

De signis bonitatis equorum, Cap. viii.

Melior equorum est ille qui habet uisum amplum, & acute uidet in longinquum, & habet quadratum corpus & fortes aures, & longas comas, & curtas gambas de retro, & subtile musellū, & caput fastum, et suauis pilos, et amplas grappas, & collum grossum, & comedit bene. Equus habens nares magnas & inflatas, & oculos grossos, non concavos, auditu naturaliter reperitur: equus habens os magnum maxillas graciles, & maderas, & collum longum & gracile uersus caput, ad frenandum est habilis. Equus habens costas grossas, ut bouinas & uentrē amplum pendentem laboriosus & sufferens indicatur. Equus habens garecta quae uulgo uocant ampla & extensa, & falces extensas & curtas, quod garecta interius respiciant in gressu celer & agilis debet esse. Equus habens garecta curta, & facies extensas & anchas firmas debet naturaliter ambulare. Equus habens iūcturas crurium naturaliter grossas, & pastoralia curta uelut bouina fortis esse censetur. Equus tenens ad se truncum caudae stricte inter coxas, fortis & sufferens est, ut in pluribus sed nō celer. Equus habens crura & iūcturas crurū satis pilosas, & pilos in eis dē lōgos, laboriosus
 existit.

existit, sed agilis non de facili reperitur. Equus habens clunem longam & amplam, & anchas longas & extensas, qui sit altior posterius quam antérieur, uelox in longo cursu, ut in pluribus reperitur.

De signis malitix & utilitate equorum, Caput IX.

Equus habens maxillas grossas & collum curtum non facili affrenatur decenter. Equus habens albas ungulas uniuersas uix uel nunquam duos pedes habebit. Equus habens auriculas pendentes et magnas, oculos concavos lentus & remissus existit. Quando supremum nasi equi est multum crassum, non potest respirare per nares, & ideo minus ualet, quando equus uidet in die & non in nocte dimidiatur pretium eius, hoc autem cognoscitur si ducis equum in nocte ad rem quam timet in die & tunc non timet, & quando non mouet pedes in die, sicut in nocte. Si oculi equi sunt albi minoratur ualde pretium eius, quia dum ad niuem uel locum frigidum non uidet, sed in loco non lucido & tempore calido bene uidet. Equus iactans aures suas retrorsum in omni tempore minoris est pretij, quia surdus est. Quando equus non hinnit neque clamat nec aliquem sonum cum ore facit surdus est. Equus habens durum collum & ipsum est semper extensum, & cum ambulat non leuat caput & non mouet ad collum ad dexteram uel sinistram est pessimi uitij, & est magnum periculum equi antibus, quia non potest uolui pro uoluntate eius, ideoque pro milite non est bonus. Equus cui uadunt gēua intra ut arcus, parui est pretij, quia pessime uadit. Equus cuius anteriora crura torquentur, ut arcus, teneri non debet cum sit pauci ualoris. Equus cuius anteriora crura mouere uidentur semper malorum est morum. Equus leuans caudam superius & inferius mali est uitij. Equus cui semper est inflatio super genu breui non poterit ire. Si equo uidetur inflatio duas uel pedibus antecr. bus uel postremis in sua operatione non nocet.

et, & dicunt quod si in pedibus anterioribus est inflatio dura seu
 rus est, quod aliud malum non descendit ad ea. Equus habens in om
 nibus pedibus rapas, & non potest curari, minoris est pretij,
 quia turpioris apparitionis existit. Equus cuius pili de iuncturis re
 uersantur & in sursum in sua operatione, & non leditur, & ungu
 la eius fortiores existunt. Si equus mouet pedes alio modo quam
 alij equi, leditur in sua operatione, ideoq; minuitur pretium eius.
 Si unus pedum de retro cundo alium tangit multum in sua operati
 one nocet eidem. Si testiculi equi sunt multum magni turpior est, &
 in operatione nocent. Et si eius uirga semper est pendens turpior
 est, & non est ab honesto homine equitandus. Morpheæ, id est, al
 bedo in collo mustellino uel supra oculos turpiorem facit equum,
 sed in operatione non ledit.

De egritudinibus equorum & cura eorum, Cap. X.

Niso superius de pulchritudine & bonitate equorum, ui
 dendum est de egritudinibus & morbis eisdem uenientia
 bus tam naturaliter quam accidentaliter. Et primo de his
 quæ eis obueniunt per naturam, quæ quandoq; defectu uel occasione
 ne aliqua minuit, uel augmentat, auget tamen raro, ut tamen na
 scitur, habens maxillam inferiorem superiore longiorem & simi
 lia. Et quando nascitur cum aliqua superfluitate in pedibus uel ali
 qua corporis parte, quæ murus uel callum dicitur uulgariter, qui
 murus sine corio efficitur. Et quandoq; accidit quod in aliqua par
 te corporis quæ murus uel callum dicitur sunt superfluitates
 carniū, uelut glandule subtus corium. Minuit uero cum nascitur
 habens oculum uel auriculam aut nares alij in nares, uel habens
 unam archam alia curtiorem, unde totum crus aliquibus minuitur.
 Præterea natura & fallit quando equus nascitur obliquis cruribus
 tam in anteriori parte quam posteriori, simili modo de ungulis &
 pedibus, qui quandoq; naturaliter obliquantur, & quandoq; na
 scitur

scitur cum zardis & garectis & gallis in cruribus proueniētibus, ex patre uel matre habentibus eas. Est enim zarda quædam inflatio ad modum oui uel maior uel minor, quæ tam in parte inferiori quam exteriori nascitur in garectis. Galla est quædam tumefactio ad modum parue uiscæ magna ut nux, quæ circa iuncturas crurū iuxta ungulas generatur. Cura. In prædictis morbis qui nascuntur equo in uentre matris ex defectu nature, non potest medicina congrua inueniri, nam cum equus nascitur obliquis cruribus posterioribus, ita quod ipsa crura obliquantur interius percutiendo uel inuentus ferrendo unum pedem ad alium in egressu equo in parte interiori coxarum iuxta testiculos ferris ad hoc decentibus decoquatur, faciendo ex transuerso tres lineas in utraq; parte coxarum, deinde quotidie more solito equitetur. Tunc enim in suis gressibus una coxa uel alia fricabitur, & ex frequenti tactu coxarum exoriabitur per cocturam, uelut plaga, ex quo equus crebros ardores sentiens perget apertius solito. simili modo fiat in cruribus anterioribus faciēdo cocturas prædictas interius in lacertis obliquis ungulis uel pedibus, hoc remedium inuenitur, nam ferrando equū frequenter possunt unguli aptari decenter, et ad modū rotunditatis ferri dirigī quoquo modo. Solet etiam equus aliquando infirmari de uno pede ad alium propter maciei debilitatem cui potest adiuncta pinguedine subueniri.

De infirmitate muri curanda, Cap. x i.

Contra infirmitatē muri dico, quod illa superfluitas carniū quam prædixi usq; ad superficiem corij cautius incidatur, deinde si locus nervosus non fuerit ferris rotundis calesactis decenter coquatur. Si uero locus fuerit nervosus resalgarū puluerizatum pondere unius careni super aspergatur aut plus uel minus ponatur, ut expedire uidebitur. Nam resalgarum uelut ignis corrodit, deinde corrosis muri radicibus funditus intro mittatur in uulnere stuppa in oī albumine madefacta, ex ea totū impleatur uel


nus & ad tertium diem mutetur semel in die, ab inde in antea pro solidatione festina accipiat calx uiua & tantundem mollis & simul misceantur & ponatur in aliquo panniculo incendatur lento igne donec ex eo fiant carbones, & puluerizentur subtiliter, et in uulnere ponatur cum stuppa inuoluta in dicto puluere mane & sero, donec carnes fuerint solidate, semper prius abluto uulnere cum uino forti aliquantulum calefacto in defecto resalgarum ponatur cum calce uiua tartari, auripigmentum et uerderamus puluerizata simul equali pondere ter uel quater, donec radices muri fuerint convenienter coctuse, prius optime abluto uulnere cum aceto, qui puluis est minus uio lentus alio supradicto, sed uix aut nunquam ibidem pili nascuntur, sed de his nascendis aliquid infra scribetur.

De glandulis & serophulis, Cap. XII.


DE ceteris superfluitatibus carnis que nascuntur inter corium & carnes que dicuntur uulgariter glandulae siue testudines siue serophulae, dico quod scisso corio per longum nisi est aliqua glandularum extrahatur manibus, eam prius ungulis excarnando, uel scisso corio super aspergatur puluis calcis resalgarum tritum, uel ferro candenti coquatur, uel super aspergatur puluis calcis uiuae, auripigmenti & tartari quam in proximo capitulo muri dixi, deinde utatur cura in Cap. muri scripta. Si uero post praedictam incisionem uel excarnationem aliqua uena prorupit in sanguinem costringatur hoc modo, accipiantur thuris duae partes, & tertia aloes epaticae et puluerizata subtiliter cum oui albumine agitentur, & misceantur, & cum pilis leporum ponatur in uena, ad idem ualeat gypsum cum calce tritum, et cum granulis uuarum. Item ualeat ad idem stercus equi recens mixtum cum creta, & cum aceto fortissimo agitata. Et nota quod praedicta super uenam constringenda posita non debent usque ad diem secundum uel tertium remoueri. Item sciendum est quod salubrius est praedictas glandulas destruere super dictis pulueribus corio prius scisso per longum, quam uisione uel manu extractione, si locus necrosus uel uenenosus existant.

Et 2 De

De ægritudinibus accidentibus equis,
& cura eorum, Cap. XIII.

 Vpra dictum est de morbis et ægritudinibus naturalibus, sequitur tractatus accidentalium, dicam ergo primo quæ accident eis in capite, & intra corpus, secundo de his quæ accident eis in capite, & in tergo. Tercio de his morbis quæ accident eis in membris, à pedibus supra. Quarto de lesionibus ungularum & pedum.


De infirmitate, quæ uulgariter dicitur uermis, & cura ipsius, Cap. XIII.

 Acc infirmitas euenit equo in pectore prope cor, et in coxis prope testiculos, ex malis humoribus calidis congregatis in quibusdam glandulis quas habet in pectore & in coxis, qui concurrunt ad loca illa, propter aliquem dolorem ibi accidentaliter uenientem, deinde descendunt ad crura, & in eis faciunt inflationes, & ea crebris ulceribus perforant, & quandoque occasione uermis prædicti fiunt in equi corpore, præcipue in capite diuersa ulcera, plurimū tamen parua, ipsum caput inflatis, et quandoque per nares faciunt emittere humores uelut aquam, & tunc dicitur uermis uolatiuus. Cognoscitur autem hæc ægritudo ex inflatione quæ fit ex dictis humoribus in locis prædictis, & ex ulceribus quæ dicti humores faciunt cum exire conantur. Curatur autem hac uia: Cum dictæ glandule tumesceri uel plus solito augmentari uidentur, statim de consueta uena colli iuxta caput & in utraque parte pectoris uel coxarum cōsuetis uenis usque, serè ad debilitatem equi minuatur, & superflui euacuentur humores, deinde ponantur decentes setones in pectore uel in coxis, qui humores assidue attrahunt per crebram et congruam agitationem setonum, ex ali enim agitatione fit dolor, & inde propter dolorem exeunt humores, nec ad crura descendunt, dicti uero setones agitari non debent nisi duobus diebus elapsis, deinde mane & sero quotidie agitentur in tantum, quod duo iuuenes

iunenes fatigentur, equo prius paruo passo, non modicum equitato, deinde non cesset equus die qualibet fatigari, & caue ne comedat herbas, de rebus alijs adeo parū sumat, quod uix uires retineat & in locis frigidis in nocte quiescat. Si uero glādula illa uel uermis per supradictas curas non decreseat, sed per abundantiam humores tumefacientes superflue grauent tibias: tunc ille glandule uel uermis extrahatur hoc modo, scindatur corium & caro per longum usque ad inuentionem glandularum uel uermis, deinde uero ille glandule unguis excarnētur, & extra manibus extirpētur, ita quod ipsis nihil ibi remaneat, uermis aut glādulis radicibus extirpatis, exstirpa mūda & albumine oui infusa, uulnus totaliter impleatur, & uulnus suatur, ne stuppa possit exire, quod si uulnus sit in pectore ligetur ante pectus pectia linea, propter uentum, deinde uulnus usque ad diem tertiam mutari non debet. Sed ab inde semper bis in die mutetur, stuppa madefacta cum oleo & albumine oui agitato, uulnere tamē prius cum uino abluto, & o diebus talis adhibeatur cura. Postea uero bis in die abluatur uulnus cum uino aliquantulum calefacto, & intromittatur in uulnus, stuppa in tali puluere inuoluta, ut in muri cap. dicitur, quod sit de melle & calce nina, & predicto utatur puluere donec uulnus fuerit solidatū, setonibus nihilominus agitatīs, & equo quotidie fatigato, ut superius est expressum, nota tamen quod equus equitari non debet usque ad diem tertium, postquam uermis fuerit extirpatus, sed postea sic curet die qualibet, ut predicti. Aliud medicamen fortius ad dictum uermem omnino tollendum scisso corio per longum & carnibus usque ad denudationem uermis, ut dixi resalgatum bene tritum & puluerisatum ponatur super uermem predicto, postmodum bombyce os uulneris sanatur, ne resalgarum possit exire, quod uermem in nouem diebus potenter corrodit quo corroso uel destructo curetur uulnus, ut superius est expressum. Si predictis omnibus humores constringi uel exiccare non possunt, quin ad crura descendant foramina uelut uescicae paruas uel ul

cera facientes, tunc statim ferro rotundo in capite illa uel ulcera uel uesciæ funditus decoquatur, prius coquendo magnā uenā pectoris extransuerso, quæ tendit à loco uermis inferius usq; ad pedem, postea uero decoctis foraminibus crurium, ut dixi, super aspergatur in lateribus calx uiua solummodo in die bis separata prius coctura foraminum ibi facta. Quod si ex uerme remansit crus inflatum, tali subueniatur cura, ponantur sanguisugæ ad crurium inflationes ab aso prius loco tumefactio uel etiam toto crure, deinde sanguine quantum poterit cum sanguisugis extracto, totum crus cum aceto et creta alba simul agitata emplastreitur, uel teneatur in aqua frigida quotidie mane & sero, & hæc fiant donec crura gracilia reddantur. Contra uermem uolatuum, ut humores à capite subtrahantur, de ambabus consuetis uenis temporum sufficienter minuatur sanguis, deinde setones sub gutture imponantur, & agitentur, & nutriantur, & equietur, & in loco teneatur, & omnia fiant, ut supra in alio uerme dixi. Si uero uermis uolatiuus in hemoagrâ conuertatur, quod sæpe accidit, danda sunt ei calida panno laneo, capite cooperto & in loco calido, pro quiete morante, ne fatigetur aliquo modo, & semper comedat calida ut scænum & auenum, quia hic morbus frigidus est, sed ex eo raro euadet.

De morbo qui auticax uulgariter nominatur, & cura eius, Cap. xv.

 Accidit aliquando quod illa glandula dicta quæ circa cor extat et in tantum augetur propter humores ad eum decursos more solito non descendentes ad crura, quod augmentatio & inflatio eius facit apostemata, quod quia propinquum est cordi crudeliter aduersatur ei, et hæc infirmitas auticax uulgariter à pluribus antiquorum uocatur. Cura. Cum dicta glandula uideatur cum furore subito augmentari uel plus solito ingrosari, absq; mora de pectore radicibus extirpetur, ut in cura uermis supra expressum, & cum sit cordi propinqua, cautissime & cum summa diligentia

lignitia extirpetur. Si uero in extirpatione uel excarnatione ipsius aperiatur aliqua uena, & prorumpat in sanguinem, tunc statim capiatur & stricta manibus filo serica stricte ligetur, quod si propter sanguinis abundantiam uena capi non posset, ponantur in uulnere medicine stringentes sanguinem scripte supra de cura glādularū.

De cognitione strangulionis & cura eius,

Cap. XVI.

Sunt et alie aliquot glandule circa caput equi quarū alie que sunt sub gutture, que accidentaliter augentur propter humores equi infrigidati ad eas de capite descendentes, ex quarum augmentatione totum guttur inflatur, & constringuntur meatus flatus excurrentes per guttur, propter quod equus uix respirare potest. Cura. Cum dicte glandule uidentur subito crescere, uel plus solito augeri statim setones duces sub equi gutture imponantur, & mane ac sero sufficienter ducantur, ponatur etiam in equi capite lanex cooperta & guttur pluries ungatur butyro, præcipue strangulionis locus; & in loco calido teneatur. Si uero dicte glandule per setonum agitationem non detumescant, extirpentur radicitus, & uulnera curentur, ut in cura uermis prædixi. Sed in appositione resalgaris diligens adhibeatur cautela, quia immoderate ponatur, nimium carnes corrodit.

De morbo uuularum & cura eius,

Cap. XVII.

Sunt & alie glandule que nascuntur inter caput & collum sub utraq; parte maxillarum que similiter augentur ex fluxu rheumatis à capite, coarctantes adeò meatus gutturalis, quod equus uix poterit comedere uel potare, & hæc agritudo uocatur uuula. Cui nisi succurratur instanter subito morietur. Cura. Cum dicte glandule subito uidentur augeri & tumesceri uelut oua coarctantes gutturis arterias ferro decenter calido in cuspide decoquantur,

decoquantur, uel acuta lancea cunctius incidantur, uel quod melius est, modo dicto in uerme tantū ex una parte quātum in alia si exire uidebitur, & uulnus eodem modo curetur, & nisi medicinae praedictae succurratur respirare impeditur et moritur.

De doloribus & ipsorum curis, Cap. xvi. ii.

Dolores accidunt equis multis modis, primo ex superfluitate humorum malorum in uenis sanguinis interclusorum: secundo ex uentositate ingrediente in corpus equi calefacti per poros, uel orta in intestinis ex humoribus uiscosis in eis exstetibus: tertio ex superflua cōmestione hordei uel alterius similis tumefacti in stomacho seu uentre, quarto ex superflua retentione urinae uesicam inflantis, sit etiam, sed raro, ex nimia potatione aquae frigidissimae, cum equus fuerit multum calefactus. Cura, Si dolor sit ex superfluitate humorū uel sanguinis, quod cognoscitur quia torquetur & mouentur ilia sine tumefactione aliqua, & frequenter cadit in terram & iacet & uenae plus solito tumescunt, statim à uena cingularia quae est prope cingula ab utraq; parte sanguis minuitur. Et ex quacurq; parte corporis sanguis haberi potest usq; ferè ad debilitatē corporis minuitur, deinde ducatur ad manū paruo passu, nec comedat neq; bibat, donec ex toto cessauerit dolor. Dolor ex uentositate cognoscitur, quia dolet intra corpus, & habet cōtinue ilia tumefacta, & ferè totum corpus plus solito tumefactum. Cum haec apparent, canolus unus de canna quā gro sior poterit inuenire lōgitudine unius palmi unctus oleo superponatur in aliu equi, pro parte maiori, & optime ligetur cū aliquo spacio in capite caudae, ne possit extra exire, deinde statim cū festinantia equitetur diu, trotando uel ambulando uersus montuosa, & si tempus frigidum fuerit cooperta lancea teneatur coopertus: & cum manibus oleo unctus fricentur ilia fortiter, ex his enim calefit equus & per canolum extra uentositatem emittit, deinde dàda sunt ei calida pro cōmestione & potu, bibat enim aquam cum cymino & semine faeniculi co-

Et coctum equali mensura in bona quantitate, cū fuerit aliquantulū
 infrigidata & farina tritici ei admixta, & tam diu sitiat quo ad
 huiusmodi aquā bibat, similiter comedat calida, & moretur in loco
 calido tegmine laneo coopertus. Si autē dolor fuerit ex superflua cō
 mēstione hordei uel alterius similis tumefacti in uentre equi uel sto
 macho, quod cognoscitur quia uentrem habet durum & ilia tume
 facta, fiat decoctio malue, mercurialis, brancche ursine, niolarum,
 peritarie, & aliarū herbarum laxatiuarū in aqua, & addatur de
 melle sale & oleo & furfure tritici & tepesacti aponatur in quodā
 uentriculo habente canolum de cāna conuenienter longū & gros
 sum ad modum clysterij, et per illud instrumentū mittatur dicta de
 coctio in uentrem equi per anum, & tunc quādo mittitur stet equus
 ualde altior posterius quā antea, & aqua immissa oppiletur cō
 grue anus, ne aqua possit exire, postea uero ligno rotundo bene po
 lito uenter ducatur à duobus hominibus existētibz ab utraq; parte,
 qui à parte anteriori incipiant & usq; posterius premendo uentrē
 ducant, eo prius unctio cū oleo, uel re aliā liquida unctiuosa, postquā
 autē uenter bene fuerit ductus deoppiletur anus, & per loca montu
 osa equitetur paruo passu continue, donec egerit omnia quæ in uen
 tre sibi missa fuerint, & de alijs magnā partē, & sic dolor cessabit.
 Si uero dolor fuerit ex retentione urine uescicæ infantis, quod co
 gnoscitur, quia sub uētre uel circa loca uirgæ aliquantulum tumere
 uidetur, & sepe se iaciat in terrā, tunc accipiantur senationes, cur
 tania, peritaria & radices asparagi quantitate equali, & simul co
 quantur, & decoctæ cum quodam fascia longa & ampla calide cir
 ca loca uirgæ ponantur, & hoc sepe fiat calefaciendo emplastrum
 cum fuerit infrigidatum. Quod si ex hoc nō prouocatur urina ex
 perimentum tale fiat, uirgæ equi manibus unctis oleo extrahatur,
 oleoq; fricetur, deinde teratur aliquantulum piperis cum oleo, &
 inter foramen uirgæ auriculari digito imponatur, uel quod melius
 est nices triti aliquantulum coctum oleo imponatur, quod si hoc


non profuerit, equus cum quadā equa per stabulum libere permittatur abire, sicq; necessario provocabitur ad urinā. Et nota quod hoc remedium de iumento quod dixi ad omnes dolores atile reperitur, quia uoluntas coitus ualde naturam corroborat & confortat.

De morbo infunditi & cura eius, Cap. XIX.


Hic morbus accidit equo ex superflua cōmestione uel potatione, ex quibus sanguis superflue augmētatur, & ad crura descendēs per ipsa spargitur & impedit gressus eius. Item accidit ex immoderato labore faciente sanguinē & humores ad crura & pedes descendere, gressus eius impediētes, ex quo ungulae mutari coguntur, nisi succurratur eidem. Accidit etiam quandoq; propter dolores ex nimio labore & calefactione ueniētes & humores ad crura descendere facientes, & hęc agritudo uulgariter infusio nominatur. Cura. Cum equus uidetur uno uel duobus aut pluribus pedibus claudicare & ingressu crura grauitē mouere, in sua etiam reuolutione grauitē se habere, ea enim sunt infunditi signa, si est pinguis & etatis perfectę, potus eidem ad eius libitum præbeatur, & postea de ambob. tēporibus & singulis crurib. de uenis solitis usq; ad debilitatem corporis minuatur, deinde in aqua frigida currētī usq; ad uentrem equi ponatur, uelociter & assidue teneatur in ea, nec aliquid comedat donec integer fuerit liberatus. Si uero fuerit inuenis aut mater, non detur ei potus prædictus, sed in tantū cū freno in aëre frigido teneatur, quod collum & caput cogatur extēdere quantum potest, deinde rotundi lapides grossitudinis pugili sufficiens pedibus equi supponantur, ac si ei fieret cubile ad stratum, nam ex assidua appositione lapidum rotundorū pedes & crura in motu exsiliūt, ex quo nervi crurium indignati propter humores grauitatem expellunt, sed prius panno lineo in aqua infuso sit cooperitus, nec comedat neq; bibat, nec in sole moretur, donec fuerit ad statum primū reductus. Et nota, quod hęc agritudo parū uel nihil nocet iuuenibus equis, nam ex ea ipsorum tibię ingrossantur.

De mora

De morbo pulcini siue mulsiui & cura eius, Caput XX.

 Egritudo ista fit ex calore liquefaciente pinguedinē, que oppilat pulmonis arterias taliter quod equus uix respirare potest. Et cognoscitur quia fit narium magna sufflatio & iliorū crebra pulsatio, & hæc egritudo pulsuius uulgariter appellatur. Cura. Fiat potio de gariophyllis, nucibus muscatis, zingibere, galanga, equali pondere, cymino, semine fœniculi, equali pondere puluerizatis cum bono uino, & addatur crocus in cōgrua quātitate, & tot uitella ouorū quanta est quātitas predictorū, & dicta potio ponatur in quodam cornu bouino, & equo tenenti artificialiter os apertū, & caput aliū sine freno propinquetur. Ita quod in guttur eius descendat, equi capite spacio unius horæ suspēso, ut potio in intestina descendat, deinde ducatur ad manum uel breui equitetur passu, ne ipsam uomere possit, qui per unū diem uel noctē nihil comedat, ut dicta potio non impediatur exequi suū effectum, die uero secunda comedat recentes herbas, uel cānarum frondes aut sabcis uel frigidarum herbarū, ut potionis tēperetur calor, ex dicta namque cura liberatur equus, si passio recens existat. Si uero fuerit antiquata, incurabilis esse censetur, tamen hoc modo curari tētetur: Vtraque ilia duabus lineis una super aliam ab utroque capite coquantur, ut coarctatione ignis iliorū pulsatio minuatur, nares etiā decēter per longum scindantur, ut leuius aërem attrahat & emittat, uel tempore uindemiarum cibetur uuis maturis, uel dulci mīsto potetur. Et sic curabitur à pulcina.

De morbo infestati & cura eius, Caput XXI.

 Ccīdit etiam hæc egritudo cum equus sudauit uel superflue calefactus ponitur in loco frigido uel uentoso, nā per poros aptos uetus per os & mēbra sub ntrat, unde sequitur neruorū attractio, parū tumoris habēs, dolores inducēs, ac impe-

Ff 2 diēs

diēs gressus equi, & vocatur hæc agritudo equi vulgariter infestus, quæ cognoscitur quia equus uidetur habere collū parū extensum ita quod digitis nix potest capi uel astringi, & in suo motu uelut infunditus impedire uidetur & eius oculi lacrimantur. Cura. Tūc ponatur in loco calido, deinde aliquod uini lapides fiant calidissimi prout potest, & ponantur in terra sub equi uentre, prius tamen sit coopertus de panno lane longo & lato in tantum, quod in qualibet parte satis super totam equi personam, cuius medium stet super dorsum equi, & extremitates ab utraq; parte dorsum pendeant, quæ à duobus hominibus inferius teneantur, & dicti lapides paulatim et sepe aspergantur aqua calida, donec totum corpus & membra equi redacta fuerint in sudorē, & tunc inuoluatur equus in dicto panno, & cinguletur, et sic tam diu teneatur quod sudor cesset, & tūc butyro uel oleo calido, uel aliquo alio liquido unctuosissimo sepe in die singula equi crura fricentur, uel fiat decoctio paleæ frumentati, aristarum, alij, cineris & maluarum, & cum ipsa decoctione tantum calida quantum pati potest, crura, & specialiter nerui, madefiant, & semper in loco calido teneatur, & pro comestione utatur eibis calidis, donec ad statum pristinum reducatur.

De morbo scalamati & cura eius, Cap. XXII.

Inc infirmitas interiora equi desiccet, et corpus macerat, & finitū eius plusq̃ hominis foetere facit, & accidit eis ex diuturna macie, proveniente ex paucis cibo exhibito, & multo labore calefaciente, ac membra exiccante, adeo quod non potest impinguari, neq; assumere carnes, nec etiam comedere curat. Cura. In hac agritudine quæ scalamatus vulgariter dicitur, instandum est uniuersaliter, ut corpus equi humectetur, fiat ergo decoctio herbarum uiolariæ, perietariæ, maluæ & surfuris hordei, quib. bene decoctis, coletur, & in hac aqua ponatur butyrū in bona quantitate, & pondus septem drachmarū cassiæ fistulæ liquæ factæ, ac cum instructo supra scripto admodū clysterij parū calida immittatur in anū equi,

equi, & fiat per omnia ut in capitulo dolorum supra dixi, eo excepto, quod hec aqua tenenda est quantum potest in equi uentre, postea fiat de vitellis ouorum, croco & oleo violarum, agitata decenter cum bono uino albo, & ponatur in corno bouino, & bis uel ter ei detur, ut dictū est in tractatu pulcini. Aliud experimentum: equus in stabulo solus ponatur, & per duos aut tres dies nihil comedat neq; bibat, postea detur ei ad comedendum lardum, uel carnes porcine salite ad libitum eius, nam ipsa propter famem & lardi salsedinem libenter comedet, & detur statim ei ad bibendum aqua calida quantum uolet, deinde equitetur paulisper donec uentrem de predictis euacuet, quo euacuato detur ei frumentū bene mūdum, et tū pauco sale coctum, & ad solem siccatum, uel aliter, bis in die at equam bibat, nam tale granum adeo nutrit & reficit, quod equus ex eo facile impinguatur.

De morbo aragalcī & cura eius, Cap. xxiii

Hæc infirmitas aragalcus uulgar ter dicitur, fit in equi uentre adducens ei torsiones, & in testinis rugitum faciens, equum emittere indigesta cogens stercora, & liquida, uelut aquam, quādo nix potest equus aliquid comedere quā emittat anteq̃ digeratur in uentre eius, quæ quādoq; accidit ex comestione bordei uel alterius similis rei comestæ neq; digestæ, aliquando ex potatione aque frigide, post comestione bordē facta sine aliquo interuallo, & aliquādo propter festinum cursum seu galoppum factū statim post aquam pro uelle ab equo potatam, quæ agitur in uisceribus propter cursum, fit etiam aliquando ex nimia inflatione corporis equi, dolorem habentis, ex quibus causis equus debilitatur in tantum, quod uix potest à cruribus sustineri. Cura. Cum uidetur equus bis uel ter stercus lōge emittere, uelut aquam & bordē indigestum, statim auferatur ei frenum & sella & liber per pascua dimittatur abire, donec fuerit cōstipatus, nec ante moueri debet, quia motus uentrem agit, & facit ut cibum emittat antequam digestus exstat. Item quantum

potest caueatur à potu, nā in hac ægritudine aqua ei nocet, propter liquiditatem ipsius. Quādoq; etiam ex dicta ægritudine infunde tur equus, & tunc curetur ut in dicto morbo docetur.

De cimona & cura eius, Cap. XXIII.

Ist alia ægritudo quæ cimona uocatur uulgariter, quæ accidit cum equus diu stetit in frigidatus in capite, in qua fluxus rheumatis fit per nares continue, uelut aqua, fit etiam aliquando ex infirmitate quæ uermis uolatiuus dicitur, unde sequitur ut equus per nares fere totā capitis humiditatem emittat. Cura. Fiant equo in capite cooperta, & semper in loco calido teneatur, & pro cibo calida dētur. Prodesse solet assidue paruas pascere herbas, quia cum pro ea extirpanda diu teneatur caput depressum maxima pars ipsorum humorum per nares discurrit. Valet etiam si fumus peciarum uel bombicis per nares ad cerebrum mittatur, nam humores antiquitus coagulatos dissoluit. Sed ut plurimum hæc infirmitas incurabilis reperitur.

De frigiditate capitis & cura eius, Cap. XXV.

Capitis frigiditas dolorē equo facit in capite, & sternutatio nes, & tussim adducit & prouocat guttur, quæ leuiter accidit cū equus in stabulo satis calido ponitur, et postea subito ad frigidum uēum producit, & plurimū quæ ex alijs frigiditatibus occasione aliqua iam recepta unde equus tussire aliquādo cogitur, & potationis atq; comestionis partē maximā perdit. Cura. Cū oculi equi uidebūtur paululū inflati, & aliquādo lachrimantes, aures frigide, status nariū frigidus, & illic plus solito comedere et bibere satis minus, et tussire ac sternutare sæpius frigiditas capitis esse cēsetur, propter quam coquentur glandule quæ mule uocantur, existentes inter collum & caput sub maxillis cum ferro cuspido glāndulas perforante, & similiter coquentur in medio frontis ut humores frigi-

di calefacti extrinsecus uaporare cogantur. Setones etiam ei sub gutture ponantur, ut per eas humores uiam habeat exeundi. Tene-
at insuper lanceam coopertam in capite, ac decenter fiat inter auri-
culas fricatio cum butyro. Ad idem ualet oleum laurinum in pecia
linea positum, et morsu freni decenter ligatum, equo semper cum
freno bibente. Et idem operatur sauiua in freno ligata, ad idem ua-
let fumus panni linei combusti, per nares receptus. Item ualet frum-
mentum bene coctum positum in sacculo calidum, quantum pati po-
terit, et in capite equi ligatum ita quod positus ore et naribus inter
sacculum per nares fumum recipiat, et de grano comedat ualet,
cui proderit si dictum frumentum coquatur cum pulegio et sau-
na. Item ualet si pecia stricte ligetur ad bacculum, et sapone saraceni-
co liniatur et quantum commode potest mittatur leuiter inter na-
res, et post paulum extrahatur, quia ex hoc equus sternutabit, et
humores frigidos et liquidos uelut aquam emittet. Item ualet bu-
tyrum cum oleo laurino mixtum, et positum inter nares. Item ab omnibus
caueatur frigidis et utatur calidis et assidue bibat aquam coctam et
calidam, ut in doloribus capitulo continetur, et sic poterit liberari.

De morbo qui auticax uulgariter nominatur &
cura eius, Cap. xxvi.

Accidit aliquando quod ex dicta aegritudine capitis humores
descendant ad oculos, facientes eos lachrumare, uel in eis
panum uel turbulentiam, ac ruborem uel caliginem, propter que
non ualet equus, ut decet respicere uel uidere. Cura. Si oculi lachri-
mantur fiat strictionum de olibano et mastiche pulverizatis, et cum
oui albumine agitata super una pecia quatuor digitis lato positis
et longa, que posita super frontem sub temporibus possit ligari,
abrado tamen prius loco, ubi strictionum poni debet, et in tantum di-
mittatur eis strictionum, quod oculi desierint lachrimari, et quando
lauari uoluerit cum aqua calida et oleo, uel alia re unctiuosa agi-
tata simul eleuetur. Ad idem ualet si ambæ uenæ utr. usq; temporum
utendantur

intendantur cum igne. Si uero caliginati sint oculi astoleti sub ambobus oculis imponatur, quattuor tamen digitis dorsum & sal subtiliter pistus cum quodam canolo in oculo sepius infletur uel insuffletur. Si uero panus in oculo recēs uel antiquus accipe tartarum & sal gēma equali mensura subtilissime trita, bis in die oculis cum cannalo insuffletur, ad idem ualet sal nitidum cum stercore lacertarum tritum, & in oculos sufflatum. Sed cauendum est ne superflue ponatur in eis ne oculi destruantur. Si uero panus uetus fuerit cum pinguedine gallinæ bis uel ter prius ungatur.

De corio & cura eius, Cap. XXVII.

Icto de infirmitatibus quæ accidunt equo in capite, & intra corpus dicendum est de his quæ eueniunt eis iuxta tergum, sit igitur quælibet lesio in equi tergo, rum pens aliquando aliquam partem corij dorsi in tergo, & quandoq; fodens dorsum usq; ad ossa, quæ ex nimia oppresseione selle uel alterius ponderis efficitur, quæ lesio cornus à pluribus nūcupatur. Cura. Folia caulium cum axungia porci trita superponatur, et sella uel pānellum supponatur, ut prematur medicinam super ipsum cornu continue, ad idem ualet scabiosa cum axungia porcina simul trita. Item, ad idem ualet cinis suppositus cum oleo agitato. Item, ad idem fulligo cum sale & oleo agitata. Item, ad idem stercus humanum recens superpositum multum ualet. Et nota quod cornus citius curatur radicitus, si equus equitetur supposito aliquo medicamine prædictorū, & medicinis sepius renouatis deuerso cornu & radicitus extirpato. Locus stuppa minutissime incisa & postea inuoluta in puluere de calce & melle, ut dictum est de uernæ capitulo, impleatur, abluto tamen prius decenter uulnere cum aceto uel cum forti nino aliquantulum calefacto, & hoc fiat bis in die, donec fuerit solidatum. Cauendum tamen est ne aliquod pōdus superponatur in tergo donec carnes uulneris corio fuerint adæquate.

De morbo pulmonis & cura eius,

Cap. XXVIII.

Est et alia lesio in equi dorso faciens inflationes in eo, deinde generat ibidem carnes putrescitas, quæ accidunt ex pressione indecens selle uel alicuius superflui oneris frequentati. Nam talis inflatio cum ueterascit putrefactionem inducit, quandoq; putrefactione antiquata iuncta ossa efficitur quedam coagulatio carnis infectæ, eiciens continue putredinem, uelut aquam, et hic morbus dicitur lesio pulmonis uulgo. Cura. Hic morbus cumcunq; funditus incidatur, postea supponatur stuppa in albumine oui infusa, et usq; ad tertiam diem semel tantum in die mutetur, deinde fiat, ut de cornu dictum est supra. Salubrius uero curatur cum puluere resalgaris, ut in infirmitate uernis dixi, nam sine incisione aliqua medicatur equo dolorem minimo patiente.

De morbo spallatici & cura eius, Cap. XXIX.

Est et alia lesio in tergo, tumefactionem inducens in summitate spallarum equi, faciens quandam callositatem carnum circa spallas equi, superficiem superantem tumefactione supra dicta, eidem antiquitus imminente quæ accidit similiter ex nimia oppressionem, ut dixi, et hæc spallatie dicuntur nomen ex opere sumentes. Cura. Curatur per omnia, ut dictum est in precedenti capitulo de pulmone. Si uero spallatie duræ fuerint, mollificantur cum maluanisco, et canalicibus tritis cum axungia porcina ueteri, additis etiam absinthio, peritaria, et pranca ursina, et simul bene tritis. Et postmodum decoctis in olla et suppositis, hoc autem mollificatum, fiat antequam spallatie incidantur, uel resalgarum superaspargatur, ut dixi.

De diuersis ægritudinibus quæ tergo accidunt, Caput XXX.

Sunt et alie multe lesiones in dorso equi, propter oppressionem prædictam, inepte selle, uel ponderis uel oneris in bu-

meris. Et quādoq; fiunt ex superfluo sanguine, uel humore uelut ne-
 fice paruula plena sanguine putrido, quæ rumpunt corium, & car-
 nem equi in dorso, deinde efficiuntur uulnera paruula siue magna
 quæ omnes dicuntur uulgariter lesiones. Sed est sciendū, quod le-
 siones prædictæ quanto propinquiores sunt ossibus dorſi, tanto de-
 teriores exſtunt, periculum aliquando inferentes. Cura. Omnes
 ferè lesiones quæ tergo acciſiō, habent principium à tumore, unde
 cum principijs ſit obſtandū, ſtatim cum uidetur tumor fieri, in alia
 qua parte dorſi cum raſorio illa tumefactio abradatur, deinde fiat
 emplaſtrum cum farina tritici comminuta decenter, & cum oui al-
 bumine agitur, & ea ſuper linea pecia poſita, ſuper tumefactio-
 nem ponatur: nec remoueatut inde uiolenter emplaſtrum, ſed cum
 leuiter uidebitur tolli poſſe tollatur, & ſi putredo erit ibi congrega-
 ta, corium cum ferro cuſpideo aliquantū calido in parte inferiori
 tumefactionis perforetur, ut inde egrediatur putredo, poſt hoc ne-
 ro ſæpe ungatur in die cū aliquo liquido unctuoſo, ſunt et à quādo
 quidē rupturæ uel excoriationes in dorſo equi ex oppreſſione one-
 ris, ut prædixi, uel occasione alicuius baroli uel carbunculi ex ſuper-
 fluitate ſanguinis generati, quæ illico debent radi, & ſuper aſpergi
 aſidue puluis calcis uiuæ cum melle combuſto, ut in tertio capitulo
 edocetur, ablutis prius uulneribus cum uino calido uel aceto. Et ca-
 ueri debet à ſella, uel alio ſimili ſemper donec liberatus exiſtit. Sci-
 endum eſt tamen quod ubicunq; ſunt tumefactiones in dorſo uel in
 tergo equi, ſubuenire debet cū emplaſtro farina tritici agitata cum
 oui albumine, ut ſupra dixi. Et in omnibus planis leſionibus ſoli-
 dandis ſupponuntur ij pulueres ſcilicet myrtum ſiccum puluerizatum,
 uel goſia leuis puluerizata uel pecia lini combuſta, uel corium
 aptatum combuſtum, uel putredo ligni putrefacti, quæ carolus uo-
 catur, & ſuper omnibus alijs ſupra dictis diſtis puluis de calce &
 melle mirabiliter operatur, ante tamen appoſitionē puluerum præ-
 dictorū leſiones ſemper abluī debent decenter cum uino calido uel
 aceto

aceto. Et ut pili post consolidationem carnum renascantur, testa ouellana uel testitudinis combusta teratur, & cum oleo agitato sempe ungatur, ad idem ualet cartha bombycina, uel bombyx combustus, & cum oleo agitatus. Item nota, quod sal in aqua sufficienter infusum, uel in aceto, quod est melius, multum ualet contra omnem tumefactionem incipientem in dorso.

De morbis qui accidunt in cruribus equi & alijs quibusdam, & de morbo maleferruti & cura eius, Caput xxxiii.

Completo tractatu Lesionum tergi, sequitur de his qui accidunt in cruribus & pedibus & quibusdam alijs membris. Et primo de morbo maleferruti, qui ueniens in lumbis equi dolores in eis uel in renibus equi infert attrahens neruos lumborum & renum incessanter, qui subito accidit ex superfluitate malorum humorum, & aliquando ex frigidityte diu ante assumpta, & sepe accidit propter superfluum & immoderatum pondus in equi tergo improvide positum, unde equus uix potest se ex parte posteriori erigere, uel crura decenter leuare, & hic morbus uulgariter dicitur maleferrutus. Cura. In hac egritudine renes uel lumbi equi patientis optime abradantur, deinde fiat ibi strictor ū tali modo, accipiat pix noualis, uel liquefacta decenter in quadam pelli cula, extendatur ad longitudinem & latitudinem lumborum uel renum, deinde accipiat bolum armenum, armoniacum, pix græca, galbanum, olibanum, mastiche sanguis draconis, galla, equali pondere, & omnia ista terantur & decenter puluerizata super aspergantur super picem prædictam aliquantulum calefactam, & ponatur super renibus patientis, pilis abradis, & inde non moueatur donec leuissime poterit remoueri. Ad idem aliud strictorium melius accipiat consolidamāior, bolum armenum, galbanum, armoniacum, pix græca, mastiche, olibanum, sanguis draconis, sanguis equinus recens uel siccatu, tantum uero domesticæ

picis græcæ, & olibani, quantum de alijs omnibus, & puluerizentur simul uel per se uel cum albumine oui, & bona quantitate farinæ tritici misceantur, & super una pecia forti de lana bene extensa ponantur, & fiat per omnia, ut de precedenti lumbi dixi emplastro. Item ad idem remedium ultimum renes uel lumbi patientis decenti ferro calidissimo coquantur, crebras & multas lineas per longum & ex transuerso faciendo, ab una parte renum, usque ad aliam procedentes, nam supradicta emplastra renes consolidant, humores desiccant, nervos mitigant, & ignis carnes desiccant, attrahit, & coarctat.

De morbo scalamati & cura eius, Cap. XXXII.

Accidit hæc egritudo que uulgo dicitur scalamatus, que mouet uel separat caput anchæ de loco ubi stare naturaliter debet in motu uel cursu equi, cum pes labitur ultra uelle, uel cum uersus terram premitur indirecte. Accidit etiam quando pedes posteriores equi retinis mutilantur. Cura. Ponatur astalata conueniens per unum semissim sub lesio capite anchæ, ut humores ad locum concursi per astalatum uiam habeant exeundi, & locus circum circa manibus sæpe prematur, ut egrediatur putredo, & paruo passu moueatur equus, ut humores facilius exeant propter motum, deinde fiat strictorium tali modo, accipiatur pix naualis & græca, olibanum & mastiche & aliquantulum sanguinis draconis, & tantum de pice nauali quantum de omnibus alijs, & puluerizentur, & cum pice nauali simul omnia liquefiant, & tantum calida quantum pati poterit ponatur in capite anchæ lesæ extensa, & super eam ponatur stuppa minute incisa, ad idem ualet si ponantur in loco lesio setones, qui assidue humores ibi uenientes expellant. Ad idem quod ultimum est remedium locus lesus anchæ tam per longum quam ex transuerso decentibus lineis decoquatur, ut restringantur humores.

De lesione

De lensione spallati & cura eius, Cap. XXXII.

Accidit in spalla Lesio, ut in ancha, ex eisdē causis, & etiam ex ictu calcium alicuius equi, qui curatur eodem modo, ut in ancha, ut in eius lensione prædictum est.

De grauedine pectorali & cura eius, Caput XXXIII.

Accidit item quādoq; quod pectus equi ex superfluo sanguine uel labore uel onere aggrauatur, in tantum quod equus uidetur in motu antierius aliquantulū impediri. Cura. Confecte uene sufficienter ab utraq; parte pectoris minuantur, deinde setones ponantur sub pectore, quibus agitur in die, ut in capitulo uerum dixi, & usq; ad quindecim dies non tollantur ab eo.

De morbo zarde & cura eius, Cap. XXXV.

Icet supra dixerim morbum zarde naturaliter equo cunire, tamen etiā accidentaliter ei contingit, cum immoderate oppressus est & crebris equitatibus festinatur, propter debilitatem & tencritatem ipsorum, citius tamē accidit in cruribus equi superflue impinguati, cum oportet equitando subito satiari, quoniam dissoluuntur ex dictis causis humores superflui, et ad crura descendunt, unde sunt zarde in garetio, ut supra dixi. Cura. Cum equus uidetur in garetio tumescere admodum nuncis uel amplius exterius uel interius, statim subueniatur cum decenti decoctione per longum & obliquum in tumido loco. Alia cura. Zardis decoctis sterces bouinum calidum cum oleo agitatum superponatur, semel tantum non amplius, deinde retinis & prædictis tam antierius quā posterius taliter alligetur, quod equus cocturas ore nullo modo carpere possit, nec ad aliū pedē fricare, nec in aliquo loco duro pedem fricare, ne possint exoriari cocturae, nā per assiduas cocturas plurimū equus auide fricat, uel locū mordet decoctū, & à die decoctionis usq; ad dies 11 erit hoc diligenter seruandum. Excoriato uel separato corio cocturarum, quod in 9. uel in 10 diebus contingit,

Gg 3 equus

equus in aqua frigida velocissima teneatur, à summo mane usq; ad mediam tertiam, ita quod aqua superet & tanget cochluras præfatas, eo uero ab aqua remoto, super lineis cochlurarū pulvis terre subtilissimus uel cinis aspergatur, idem etiam in sero fiat, ut teneatur in aqua ab hora uespertina usq; ad solis occasum, & pulvis superaspergatur, ut dixi, & continuetur hoc omni die & mane & sero, donec ignis fuerit solidatus decenter. Nam aqua uelox & frigida humores deficcatur & ulcera, ignis consolidat & constringit. Et nota, quod in omni cochlura debet equus diligenter sime custodiri, ne cochluram possit mordere, uel in aliquo loco fricare, quia ex nimio pruritu locum dentibus usq; ad nervos & ossa morderet.

De morbo spaneni & cura eius,

Caput xxxv l.

Iste morbus fit circa garectum intrinsecus ex latere garecti paulo inferius à stationem adducens, circa uenam magnam qua dicitur fontanella, trahens humorem per uenā assidue prædictam, unde equus fatigatus cogitur dolere, & hæc lesio contigit equo per omnia, uelut Zarda, que uocatur spanenis. Cura. De prædicta uena trahatur sanguinis tantum, ut per se sanguinem non emittat, deinde tumefactio spaneni per longum & obliquum decentibus lineis decoquatur, fiat per omnia, ut in d. d. Zardæ capitulo continetur.

De morbo tubæ & cura eius,

Caput xxxvii.

Ita ægritudo hæc subtus caput garecti in magno posteriori nervo, aliquam putrefactionem faciens per longitudinem ipsius nervi, indignans continue ipsum & ledens, & quia idem nervus quasi totum corpus equi sustinet, cogitur necessario claudicare. Accidit autem hæc ægritudo cum equus a tate minor equitetur indebite, sæpiusq; contingit

contingit ex onere superfluo impoſito ei, tunc enim propter teneri-
tatem etatis incuruatur nervus, ex quo nominatur turba, ex ope-
re nomen aſſumens. Cura. Cum dictus nervus qui incipit à ca-
pite garecti & inferius tendit iuxta pedes in poſteriori parte crur-
is videtur aliqui d' incurvari, vel plus ſolito ingroſſari, ſtatim ingroſ-
ſatio illa tam per longum quam per obliquum decenter coquatur,
deinde fiat per omnia, ut ſupra de cocturis expreſſi. Et eſt notan-
dum, quod ubicunq; ſunt cocturae in cruribus equi, fieri debent per
longum & obliquum, ſicut pilus equi deſcendit inferius, quia me-
lius cooperiuntur à pilis, & minus apparent quam ſi fierent ex
transverſo, & minus laderent equum, ſi nervus aliquis crurium
tangeretur ab igne.

De ſpinellis & cura eius,

Cap. XXXVIII.

Hic morbus qui ſpinella vocatur, ſit ſubtus garectum in iun-
ctura oſſis eiſdem garecti in utroq; latere, & quandoq; in
uno tantum, creans os ad magnitudinem duellane, vel magis re-
primens iuncturam in tantum, quod equus multotiens cogitur clau-
dicare, & accidit equo his cauſis, quæ ſupra ſæpe dictæ ſunt. Cura.
Diſtæ ſpinellæ ſunt decenter coquendæ atq; curandæ diligenter, ut
prædictæ cocturae in omnibus curantur.

De morbo ſuppreſſi & eius cura,

Caput XXXIX.

Funt in eius cruribus multa & diverſa ſuppreſſa, vel cū mor-
detur vel calce percutitur, vel ipſo de crure percutit rem ali-
quā durā quæ non in tantū nociva quantū: n deſormia ſunt in equo:
Quæ etiā in alijs partibus corporis, non ſolū in cruribus ſæpe ſunt.
Cura. Cū omnia ſuppreſſa incipiant fieri ex quadā calloſitate carni-
um, ex percuffione aliqua adveniente, ſtatim cū fieri videbitur calloſi-
tas abradatur, et accipiatuſ abſimilium perietaria, et brā: a uſina ſci-
licet folia tenera, et terantur ſimul cum axungia porcina veteri, &
coquantur

coquantur, & cocta tantum calida quantum pati poterit super callositatem ponantur, & bene ligentur. Et nota, quod hoc mollificativum multum valet ad omnes inflationes crurum ex percussione aliqua venientes. Item ad eandem callositatem omnino dissipandam valet radix maluanisci & radix lilij & thapsi barbati trita cum axungia, et decocta, cum petia superposita admodum emplastri, & pluries remoueat. Item valet cepe. assatum cum lumbricis terrestribus tritum, & cum oleo communi agitatum, & coctum & calidum superpositum & renouatum in die. Si uero callositas illa fuerit antiquata & dura effecta, ea prius abrasa, sacrificetur minute ad sanguinem, deinde sal tartarum equali pondere subtiliter tritum, super callositatem ponatur, & ligentur stricte, nec usque ad diem tertium dissoluantur, & tunc dissoluta locus ungatur butyro uel aliquo unctioso. Item ad idem omnium usque duriciem decoctum & mundatum calidum super callositatem abrasam ponatur, admodum placentule, & ligetur usque ad diem tertium, non mouetur si uidetur expediens. Item valet sterco caprini cataplasmatum cum farina bordet, & creata in aceto fortissimo agitata, & postea superpositum admodum emplastri. Si uero callositas illa dura non decreseat, sed suppressum redigatur antiquum, decentibus cocturis, quod est ultimum remedium, succurratur.

De attractione & cura eius,

Caput XL.



Item & alia egritudo in parte cruri anteriori tumefaciens & indignans nervum, & faciens claudicare, que facile accidit equo in cursu, in motu, cum pes posterior percutit nervum anterioris cruris, que passio attractio vocatur uulgo. Cura. Cum nervus predictus tumescit, statim de uena consueta que est parum super genua in parte anteriori minuatur, deinde fiat hoc mollificativum ualens contra indignationem & tumorem nervorum, accipiat scenum græcum & semen lini, scylla, centaurea & radices maluanisci, equali mensura, & cum axungia ueteri porcina decenter

decenter terantur, & simul incorporentur, postea bullient & semper agitentur cum spatula, & sufficienter cocta ponantur calida super longitudinem nervi lesi, & cum fascia lata ligentur, & bis remouentur in die. Ad idem etiam ualet satis cepe assatum cum terrestribus lumbricis & limacijs & butyro liquefacto simul agitata, & usq; ad spissitudinem decoquantur, & semper agitentur cum spatula, ut fiat sicut unguentum, & de ipso abrasio pilis ter in die nervus lesus per longum ungatur. Si uero cruris attractio sit uetusta phlebotometur de consueta uena, quae posita est inter iuncturam et pedem ex latere interiori, & fiant postea medicinae quas supra narraui. Si dicta medicamina per aliquos dies parum uel nihil proficiant. Tunc nervo lesio & circumquaq; abrasio fiat strictionum de puluere rubeo uel albumine oui & farina, ut docui in Cap. male ferrati. Crus ubi lesio est cum canabo uel lino & praedicto strictione inuoluendo, nec inde remoueaturs usque ad nouem dies, & postea cum aliqua calida strictionum à crure caute leuetur, & nervus ungatur cum aliquo unguento, & si praedicta omnia non profuerint cocturis decentibus succurratur.

De morbo scortilati & cura eius,

Caput XLI.



Cecidit quandoq; quod iunctura cruris iuxta pedes leditur ex percussione, quam facit in aliquo loco duro, uel ex precipitatione eius in cursu uel motu, aut quia quandoq; pes indirecte premitur uersus terram, quae passio uulgariter dicitur scortilatus. Cura. Fiant pulues de fursure tritici & aceto forti ad spissitudinem bulli, aut agitata decenter & calida quantum pati poterit ponantur super locum lesum, & cum pecia congrua bene ligentur, in quolibet die saepius remoueaturs. Si uero iunctura tumefacta patitur indignationem nervorum, fiat emplastrum foenigræci, seminis lini & scyllæ & aliorum, ut in precedenti capitulo dixi. Sed si occasione scortilati praedicti os à suo loco mouetur,

Hb

pes

pes equi seclusus claudicantis eleuetur in altum, & cum equi cauda ligetur, deinde ducatur ad manum uersus loca montuosa, quia ex necessaria oppressione iunctura uersus terram os disjunctum alit quod ab alio uel aliquo modo motu instanter ad suum locum reuertitur, sicut debet, sed tamen prius fieri debet mollificatiuum, quod praedixi. Accidit quandoque quod unum os ab alio sic disjungitur, quod uix aut nunquam commode ad suum locum potest reduci, ex quo iunctura tumescere cogitur inflatione durissima cui coactura beneficio succurri oportet. Nota quod omnium curarum notatarum superius, coactura ignis ultimum est remedium.

De lisione spini uel ligni & cura eius,

Caput XLII.



Onitigit aliquando quod spina uel lignum intrant in iuncturas pedum, uel genua uel in aliam partem cruris, & inter carnes remanet, propter quod uulnus uel totum crus tumescit, & maxime si neruum tangat, unde cogitur claudicare. Cura. Abradatur undique circa ipsum pili, & superlinis trita capita lacertarum, aliquantulum trita ponantur super uulnus, & cum pecia fasciatur. Ad idem ualent radices arundinis, & radices diuamni tritae & superpositae. Idem faciunt limacia cum butyro tritae & coctae & postea superpositae, quae saepe renouatae lignum uel spinam infixam carni mirabile exteriora deducunt. Et nota, quod ad omnem inflationem mollè & recenter factam, quaesit praeter naturam ex percussione aliqua in genibus, uel iuncturis, uel in aliqua parte crurium, satis ualet decoctio mixturae supra scriptae, uidelicet accipiat peritariae, absinthij, brancae ursinae de folijs quod deterimum est, & cum axungia porcina ueteri tamdiu terantur, donec optime misceantur, & postea in aliquo uase bulliant, continue agitata & cocta & calida quantum pati poterit super loco laeso ponantur, & cum pecia fascientur, & saepius remoueat.

De gal

De gallis & cura ipsorum,
Cap XLIII.

Iunt galle naturaliter iuxta iuncturas & sepe accidenta-
liter ex fumositate fimi stabuli, cruribus madefactis, ex
quo humores facile dissoluantur: sunt etiam quandoque in
equo iuvene ex superfluo equitatu. Cura. Sunt aliqui qui curare uo-
lentes gallas, & cum lauceta scindunt coriū, & deinde gallas tra-
hant, uel resalgarium intus ponūt, quod malum est, quia talis locus
nimis nervosus existit, & ideo in tantum dolor augetur, quod super-
flui humores ad locū concurrunt, ideoque melius est, ut equus gallo-
sus usque ad genua mane & sero in aqua frigidissima & uelocissima
teneatur, iuncturae quod galle minuantur propter coarctationem aque
frigidae, deinde circa iuncturā gallarū, fiant tā per longū quā per ob-
liquū cocturae decētes, & postea curētur, ut pluries est expressum.

De garpis & cura eorum, Cap. XLIII.

Funt garpe in iuncturis crurium circa pedes, & in parte po-
steriori rumpentes sibi corium, & carnes ex transuerso in-
cidentes, & quandoque per longam sepe proijcientes, per scissuras
putredinem uelut aquam, ardere equum assidue affligentes, quae ac-
cidunt ex superfluitate maiorū humorū ad crura descendentū. Cura.
Pili iuncturae sunt depilandi prius hoc modo: Accipiantur calcei uine
tres partes, & antipigmeti quarta, quae trita decēter cū aqua cali-
dissima agitentur, & tādū coquantur, quod pēna immissa subito de-
piletur. Et lesa iunctura garparum ex ea tantum calida quantum
pati poterit inūgatur, & spatio unius horae dimittatur ibidem. Po-
stea uero cum aqua calida locus garparum lauetur, ut pili cadant in
totum, quibus euulsis lauentur garpe cū decoctione maluarū & fur-
furū & ipsorum substantia cū panno ligentur circum circa iunctu-
ras, & ibi dimittantur, a sero usque ad mane, & ecceuerso. Postea uero
fiat unguentū de seuo arietis, cera et resina aequali mēsurā, et inuicē
decēter bulliūt, et assidue agitētur, et de tali unguento aliquāulū bis

in die garpæ ungantur cum penna gallinæ, & hoc unguento utatur donec scissuræ & rupturæ garparum fuerint solidatæ. semperq; caueatur ab omni sorde & aqua. Cum autem fuerit soliditatæ ablaquetur & incidetur uena magna sursum in coxa interius, ut in spænenæ cap. dixi. Sanguine autem, ut decet, detracto, garpæ coquantur, & cocturæ curentur, ut dictum est supra. Sciendum est tamen quod garparum infirmitas raro perfecte curatur.

De crepatijs & cura eorum, Cap. XLV.

Flunt similiter agritudines inter iuncturâ cruris & ungulam, corium rumpeutes & carnem, ad similitudinem scabiei, aliquando putredinem emittentes, & ex ardore multotiens equum dolere facientes, quæ solent euenire pluries ex fumositatē stabuli, cruribus madefactis. Cura. Curentur ut dictum est in capitulo præcedenti, excepto quod uena magna non laqueatur nec crepatione eis coctis aliquibus sunt coquendi, in præcedenti tamen capite additur quod euulsis prius pilis, modo præscripto hoc unguento utatur: Accipiat de fuligine de uiridi ramo, de auripigmento, & tantum de melle liquido, ut de omnibus supradictis: quæ trita & simul agitata usq; ad spissitudinē decoquantur, & misceatur cum eis aliquantulum calcis uinæ. semperq; misceantur cum spatula, donec fiat unguentum de quo aliquantulum calido bis in die ungantur crepatia, ipsis prius ablutis cum uino albo, & aliquantulum calefacto, cauendo semper eas à sordibus, ut prædixi. Hoc enim unguentum crepatias mirabiliter consolidat & constringit. Ad idem ualet satis frictio fortis & frequens crepatiarum, cum puerili urina. Item ualet si equus patiens diu teneatur in aqua marina, sit etiam quædam alia crepatia longa & magna ex transuerso in bulcfs inter carnem uinam & ungulam, quæ deterior est alijs, et magis equos affligit, quæ nō curatur unguentis nec alijs medicaminibus, nisi cocturis, et ideo ipsa crepatia in extremitatibus suis cū ferro in capite rotundo funditus

ditus est coquenda, nam beneficio ignis ipsa crepatia non potest augeri, scilicet minui.

De cancro & cura eius, Cap. XLVI.

Cancer fit iuxta iuncturas crurium circa pedes, & quandoq; in alijs partibus crurium uel corporis ueniens ex aliquo uulnere ibi facto, & postmodum per negligentiam cura equis habens uulnus in iunctura prædicta equitatur per turpitudines aut aquas. Cura. In quacumq; parte sit corporis, hoc modo curatur: Accipiatursuccus asphodelorum in bona quantitate, & agitetur diu, cum duabus partibus calcis uiuæ, & tertia auripigmenti subtiliter triti, deinde ponatur in quodā uase fictili oppilato, postmodum ne fumus uel uapor inde possit exire, & tantum dimittatur bullire ac coqui, quod in puluerem redigatur, & de tali puluere ponatur in uulnere. Mortificato cancro curetur uulnus cum albu mine oui, & alijs, ut superius continetur, ablato semper prius cancro cum aceto. Signum autē mortificationis canceri est, cum uulnus circumquaq; tumescit. Ad idem ualet sterqus humanū puluerizatum & mixtum cum tartaro combustum æquali mensura. Item ualet ad idem tartarum combustum cum sale minime mixtum, & superpositum. Item aliud medicamen melius mortificans cancerum, allium bene tritum cum pipere & pyrethro, & aliquantulum axungie porcinæ tritis adiunxerit mittatur in uulnus canceri, & stricte ligetur, & bis in die mutetur donec cancer mortificetur, deinde curetur uulnus, ut dixi. Et nota, quod prædictæ medicinae sunt bonæ in locis neruosis, & in arterijs undiq; intricatis & uenis, nam in talibus locis non est utendum cocturis, sed in carnosissimis eis uti nullatenus est uitandum, imò cum cocturis facilius curatur in ipsis.

De fistula & cura eius, Cap. XLVII.

Si uulnus prædictum canceri, et ipse cancer antiquetur & non curetur, conuertitur in fistulam, quæ est deterior & difficilior ad curandum, sed solent curari aliquando cum

H b 3 asphodelo

asphodelorum puluere, immiscendo eidem tantum de puluere auripigmenti, quantum de calce uiua, ut uiolentior fiat. Item aliud ad sanandum uiolentius fistulam, accipiat calx uiua & tantundem auripigmenti, quæ puluerizata decenter agitentur cum succis alijs, cepæ & ebuli, equali mensura & sufficiens bulliant in melle liquido, & aceto, & agitentur continue donec fiat argentum, de quo mittatur in fistulam, bis in die uulnere cum aceto fortissimo prius abluto. Item aliud uiolentius omnibus alijs prædictis resalgarū puluerizatum, ad idem accipiat auripigmentum uiride rannum, calx uiua, equali pondere & de atramento & pyrethro cum aceto & melle aliquantulum decoquantur, & semper agitentur, & de illo magdalcones bis in die mittatur in fistulam donec mortificata erit, abluto semper uulnere cum aceto fortissimo. Est autem signū mortificationis eius quando tumescit & rubet, mortificata uero fistula curetur, ut in alijs uulnerebus continetur. Si uero in locis carnosissimis creatur fistula, fiat per omnia ut in cura canceris continetur.

De morbo malpitiō & cura eius, Cap. XLVIII.

Item & alia ægritudo quæ uulgariter dicitur malpitiō, quæ fit proprie in bulletis unguarum equi, ut carnes uiuæ unguntur ungulis, quæ uelut infusio impedit gressus equi: et quandoq; in uno pedum, & quandoq; transit ad omnes, si non curetur instanter, & quandoq; facit ulcera euenire in lingua equi, accidit autem de leui ex malis humoribus ad ipsum locum decursis, & sæpius ex stabuli sumositate, pedibus ab aqua & sordibus non siccatis. Cura. Primo equi patientis ungulæ usq; ad subtilitatem præparentur. Deinde diligenter senecta ferrea bullesia pendis usq; quasi ad unum ungulæ adhibetur, ut bullesia possit undiq; uaporare: deinde ab utraq; parte bullesie sic phlebotometur, ut inde euacuentur humores ad locum cōcurssi: uel cum ferreo cuspideo ab utraq; parte funditus decoquatur, & semper caueatur a sordibus ab aqua, & nō debet fatigari. Postea uero fiant pulles de siccata

fure & aceto, que in simul bulliant, & continue agitentur, que idem tum calida quantum pati poterit super quadam pecia bene ampla extendatur, & circa pedem lesum ponatur, & bis in die mutetur. Et ab herbarum cōmestione caueatur omnino, & etiam de alijs rebus parum comedat, donec fuerit liberatus. Nam herbe ceteraq; cibaria multa humores augmentant.

De furma, id est, furmelli & cura eius,

Cap. XLIX.

Item autem quedam infirmitas que furma vulgariter dicitur, inter iuncturam pedis & pedem, super coronā prope in pastura, que accidit ex percussione mala, in aliquo duro loco, & etiam occasione mala & indecenter impedita solent sepius euenire, que n si cum adhuc sit recens curetur efficitur super os durissimum cum ueterascit, extendens se aliquantulum super coronam, cui uniuersaliter subueniendum est, siue sit recens, siue fuerit antiquatum, ut predictum est in cura suppressi. Et nota, quod hæc infirmitas plurimum impedit gressus equi, quia locus ubi furma oritur neruosus & plenus uenis & arterijs undiq; intricatus.

De ægrotudinibus pedum & ungularū, Cap. L.

Completo tractatu de lesionibus membrorum equi & cru-
rium, restat uidere & dicere de infirmitatibus ungulo-
rum pedum, & primo de fica que fit in equi ungula siue
pedis ungula, usq; ad tuellum intrinsecum per medium scindens.
Et quandoq; incipit in corona pedis, & incedit per longum inse-
rius usq; ad extremitatem ungule uel pedis, emittens aliquando ni-
lum sanguinem per scissuram. Accidit autem cum equus est ex le-
sione tuelli intus ungulam existentis. Cum hæc infirmitas initium
& caput habeat à tuello, & quandoq; accidit cū equus est iuuenis
propter ungule teneritatē. Nam percutiendo uel acriter premēdo
in aliquo loco duro leditur tuellus tenerrimus, ut prædixi, propter
que claudicat equus, cū sepius equitatur. Cura. Inquiratur radices
fica

fici uersus tuellum iuxta coronam pedis inter uiuum & mortuū unguli, cum rosuecta, & desuper incidatur donec ungula incipiat sanguinare: deinde accipiat serpens & ad minutum incisus, abiectis cauda & capite in quodam uase, oleo cōmuni pleno decoquatur in tantū, quod carnes serpentis in oleo liqueant, et ab ossibus separantur, & de his fiat unguentum, ex quo aliquantulum calefacto radices ficæ bis in die ungantur, donec mortificetur fica, & ungula in statum pristinum iterum ducatur. Semperq; cauendum est ne pes patiens à sordibus uel aqua tangatur, & quod equus herbas ullo modo comedat.

De morbo superpositæ & cura eius,
Caput Li.

Fit hæc lesio quæ superposita dicitur inter carnem & ungulam, faciens rupturam carnis ibidem, sed si antiquatur sepe cancer efficitur, & accidit cum casu equi pes ponitur super aliū pedem. Cura. Statim cum uulnus sit occasione prædicta, incidatur rosuecta tantum de ungula circa uulnus, quod ungula carnem uiuam non premat, nec tangat eandem, nam si premereetur consolidatio impediretur omnino. Abscisa autē ungula circumquaq; ablutoq; uulnere cum uino calido uel aceto curetur, & consolidetur uulnus, ut in præcedenti capitulo continetur. Semperq; caueatur uulnus à sordibus & aqua, donec fuerit solidatum. Si uero per negligentiam redigatur in cancerum, curatur ut in capitulo canceri continetur, si autem cōuertatur in fistulā, curatur ut in capitulo fistulæ cōtinetur.

De infusione descendente ad ungulas, Caput Lii.

Accidit aliquando quod equi infusio non curata, descendit ad pedes sub ungulis, cui si recens est, succurrantur hoc modo. Extremitates ungulæ in parte anteriori rosuecta parua cauentur funditus, donec uena magna quæ illuc tendit rosuecta rumpatur, & sanguis fluat usq; ferè, ad debilitatem equi. Et si expediret

si expediret in alijs pedibus claudicantibus idem fiat, post extracti onem scilicet sanguinis impleatur unguis sale minuto, & super ipsum ponatur stappa in aceto perfusa, deinde ligetur fascia, nec dissolva tur usque ad diem secundum, deinde curetur unguis cum pulvere gal lę uel myrti uel lentisci, bis in die abluto semper ungere prius cum aceto, et à sordibus & aqua caueatur, donec fuerit liberatus.

De dissolutiua ungularum & cura eius,

Caput LIII.



Iuero humores decursi ad pedes actione infusionis iam dictę inter ungulas ex incongrua cura fuerint antiquati, oportet pedes claudicantes penitus desolari, ut humores & sanguis ibidem inclusi euacuentur in totum, incidatur ergo subtus ungula circa extremitatē ungule rossecta, deinde molēter extremi tates ungule extirpentur extrinsecus, & stappa in albumine oui suf ficienter infusa ponatur in unguis, & pes totus optime fasciatur, & sic dimittatur usque ad diē sequentiē. Postea uero aceto fortissimo ali quātulum calido abluatur unguis, & de sale minuto et tartaro implea tur et supponatur et superspergatur de pulvere gallę, myrti aut lē tisci, qui carnes consolidant & humores cōstringuntur, abluto sem per prius cum aceto ungere. Et talis curatio fiat usque ad carnū con solidationem, & ungule renationē, & semper caueatur pes latus à sordibus & ab aqua. Ad idem aliud unguentum utendū post appo sitionem salis & tartari, consolidationem carnis probibens flu xum humoris. Accipiat puluis olibani, mysticis & picis gręce, & aliquantulum sanguinis draconis misceatur, cum cera noualiquę facta, & tantundem de seuo arietis, & bulliant simul, ut fiat ungen tum. Calido utatur in cura predicta. Et nota quod multe sunt infir mitates in quibus oportet ungulas desolari, in quibus omnibus est prædicta cura utendum. Item ad humectandum singulas ungulas ut leuius præparentur, accipiantur malua, perietaria, fiorfur & se num, & omnia in simul bulliant, & agitentur continue, ac de ipsa

coctione sufficienter calida ungula cum pecia inuoluantur.

De mutatione ungularum & cura eius,

Caput LIII.

Saepe accidit quod desidia marischalci humores concursi ad pedes & diu inclusitantur inter ungulam antiquantur, à tuello intrinseco separantur, exeundi uiam quarentes. Accidit etiam aliquando quod ungula penitus & subito separatur à tuello, & cadit propter furorem multorum humorum ad ungulam discursorum, & quandoque paulatim ungula se diuidit à tuello, & nascitur sequens noua ungula separantem quod accidit propter paucitatem humorum, cui sic subueniatur. Cura. Statim cum rosue sit circum circa uetus ungula inciditur aliquantulum, ubi iungitur cum nouella, ita quod uetus ungula dura nouam non premat, nec in aliquo laedat, deinde accipiantur duae partes seu arietis & tertia cereae, bulliant simul agitando, & addendo aliquantulum olei, donec fiat unguentum, de quo aliquantulum calido bis in die noua ungula ungatur. Et nota quod hoc unguentum ualet ad renouationem & augmentationem omnium ungularum, sed caueatur semper à sordibus & ab aqua. Ungula uero quae subito diuiditur à tuello et cadit, incurabilis creditur, sed talis cura probetur. Accipiantur pix graeca, olibanum, mastiche, bolus, sanguis draconis, & galbanum aequali mensura puluerizata subtiliter cum duabus partibus seu arietis, & tertia cereae agitando coquantur, deinde pannus lineus infundatur in eis, & de tali panno fiat capellum seu subcellare ad modum tuelli, in quo tuellus ponatur, & bis in die extracto capello tuellus abluatur cum aceto fortissimo tepesfacto, & iterum in capellum mittatur, & est ualde cauendum, ne tuellus ab aliquo duro tangatur, & quandoque equus propter ungulae amissionem recte stare non potest, & tunc fiat eidem stratum de longis paleis super quo pro uelle quiescat; & quia graue & tedium esset equo semper iacere, accipiantur sortis pecia panni, uel sortificetur cum cingulis, & in capitibus optime ligetur.

ligetur cū funibus, à medietate corporis usq; ad pectus sub eo ponatur, & funes ligentur ad trabes, taliter quod equus pedibus terram tãgat, & sustineatur ab eis, & in tantū eleuetur. Et nota quod hoc artificio potest equus iuuari, quando propter aliquod impedimentum recte stare non potest.

De diuersis inclauaturis & cura eorū, Cap. l.v.

Fit quedam species inclauaturæ ledens funditus tuellū intrinsecum, sit & alia, quæ transit inter tuellum & ungulam, intrinsecus tuellū minus ledens. Fit etiam tertium, non ledens tuellum in aliquo, sed uinam ungulam attingit & ledit. Prima species satis periculosa est pedi, quia tuellum ledit, quæ est quedam tenebritas osis ad modū ungulæ factæ, ungulam nutrienda, & radicem ungulæ in se tenens. Cura. Si tuellus fuerit funditus nimis læsus, subuenitur ei salubriter, cū ungulæ dissolutione. Si uero fuerit parū ledens, discooperiatur cū ferro instrumento, sola ungula circa uulnus & in tantū circum circa læsionē de ungula funditus incidatur, quod læsio attingat & discooperiatur decenter. Quo discooperita subilicetur ungula sola circa læsionem, in tantū quod spacium conueniens sit inter læsionem & ungulam, ita quod ipsa non premat, nec adhæreat læsioni. Quo facto uulnus cum stuppa & albumine oui implicatur, deinde curetur uulnus cū sale minuto, & aceto forti, & puluere gallæ ac myrti aut lentisci, ut dictū est in Cap. præcedenti. Si uero clauellus inter tuellū & ungulam transferit minus periculosus existit, quia tuellus non leditur nisi ex latere. Sic autem curatur inclauatura prius usq; ad uulū funditus detegatur, incidendo per longum ungulam, & ampliando circa uulnus decenter, & circūcidatur ungula læsioni propinqua, ut uulncri nō cohæreat ullo modo. Inclauatura autem discoopta uulnus abluatur, cum forti aceto & implicatur de sale minuto, & cooperiatur cū stuppa in aceto posita, & cū pecia fasciatur & curetur læsio bis in die, ut supra narrari. Si uero sit tertia species quæ non ledit tuellum, sed uinū ungulam tangit &

ledit, fiat aminino idem, ut in secunda specie dixi, adiungitur tamen ei, quod discooperta prius inclauatura decenter exterius ungula incidatur usq; ad lesionem clauellæ, ut nihil turpitudinis uel alterius rei inter lesionem modo aliquo retinetur. Et nota quod omnes aliæ inclauaturæ quæ nō tangunt neq; lædunt tuellum intrinsecum, possunt leuiter curari, attentis prius lesionibus prout debet, hoc modo seu uel cera uel oleū uel aliud unctuosum calida cum sale uel tartaro tritis fortiter mittatur in uulnus. Item ualet albugo cum oleo agitata. Item ualet ad idem albumen oui cum aceto & oleo agitatum. Et nota, quod omnes lesiones pedum & ungularum, quæ accidunt occasione clauelli uel ligni uel alterius rei intrantis in uellum ungula, antequam ungula uel pes tangatur inclauatura, inquiratur ut conuenit. Fiant etiam pulres de fursure seu & maluis, quæ omnia bulliant cum aceto usq; ad spissitudinem, & calida quantum pati poterit in quadam pecia posita super pedem lēsum ligentur, & sic a sero usq; ad mane uel e contrario dimittantur. Nam hæc dolorē mitigant, & poros ungulæ temperant & humectant, ut facilius ungula incidatur, semperq; ab equitatu aqua & sordibus caueatur. Accidit etiam aliquando inclauatura ex imperitia medicantis quæ non bene attingitur, nec curatur. Vnde contingit quod putredo lesionis inclusa inter ungulam facit sibi uiam inter carnem & ungulam, ut exterius egrediatur rumpens carnem super pedem, ibiq; efficitur quoddam uulnus emittens pulredinem, quod uulnus curari debet, ut scilicet in capite eodem dixi. Inclauatura tamen iterum requiratur & attingatur usq; ad uiuum, deinde curetur ut in alijs clauaturis dixi.

De morbo qui dicitur ficus & cura eius,

Caput LVI.



Accidit quandoq; quod pes ledatur subtus ungulam in medio solæ ex ferro uel alia re dura intrantem usq; ad tuellum, ex quo tuellus leditur, ex qua lesione cū ungula non inciditur

inciditur circumquaq; ut debet, nascitur super tuello quedam caran's superfluitas, que superat sole superficiem ficus uulgariter nominatur. Cura. Prius de ungula que circa uulnus incidatur in tantum quod fiat conueniens spaciū inter solam pedis & ficum. postea usq; sole superficiem incidatur ficus, extracto sanguine, spōgia marina super ficum ligetur, ut ipsa ficus usq; ad tuellū funditus corrodatur, & sponsia non moueatur donec ficus fuerit in totum corrosus. postea uero curetur lesio, ut dictum est in alijs lesionibus pedum. In defectu tamē sponsie ualet puluis asphodelorum uel rei alterius corrosiue, predictio resalgari excepto, quod immoderate uiolentum existit. Et est cauendum ne ibi costura omnino fiet, nam tuellus propter tencritudinem suam posset taliter lēdi quod ungula diuideretur ab ipso.

De generalibus ægritudinibus equorum.

Caput LVII.

Equus claudicans de pede anteriori, si nō premit terram nisi cum puncta pedis in ungula patitur. Equus claudicans si non plicat postica uel iuncturas, circa iuncturas est lesio. Si equus claudicans antierius in reuolutione à dextris uel à sinistris fit claudicator, in spatulis dolor existit, si equus posterius claudicans in sua reuolutione fit claudicator, in ancha fit passio. Si equus portans dorsum depressum uersus terrā facit passus ingressu minutos & crebros, pectoris lesione grauatur. Si equus antierius claudicans, cum quiescit ponit pedem claudicantem ante alium subsistens super posteriorem, non sustineat se nisi in puncto pedis posterioris & in suo motu iuncturam non plicat, in iunctura est lesio. Si equus habens anticar, flatum narium emittat frigidū, & habeat oculos quotidie lacrimantes quasi mortuus indicatur, equus habens infirmitatē cimorre uel uermis uolatiui in capite emittens per nares humores cōtinuē uelut aquam pinguem & frigidam uexuat. Si equus habens infirmitatem aragaci, emittat in tantū per

stercora liquefacta, quod nihil in eius uentre fini remaneat, & per effusionem non cessat infirmitas, in proximo morietur. Si equus habens ægritudinem umularū subito & uiliter redigitur in sudorem, & membra eius omnia tremant, nō uidetur euadere posse. Si equus habens ægritudinem frigiditatis, caput inflatum, & habet oculos tumidos, & caput defert ualde deorsum pendens extremitates auricularum pendentes & frigiditas, & nares etiam frigidas, nec aut nunquam euadet. Si equus patiens morbum strangulonis cum diffcultate aut sonitu narium, aut gutturis spiritum emittat, & totū guttur inflatumq; difficilime liberatur.

De mulis, Cap. LVIII.



I quem mulorum genus creare delectat, equam magni corporis solidis ossibus, & forma egregia debet eligere, in qua non uelocitatem, sed robur exquirat, eius ætas à quadriennio usq; ad decennium existat. Ex equo & asina uel asino & equa muli creantur, sed generosius nullum est huiusmodi animal, quàm quod ex asino & equa nascetur. Admissarius ergo asinus sit huiusmodi, corpore amplo & solido, musculofo, strictis & fortibus membris, nigri uel murini coloris aut rubei, qui tamen si discolores pilos in palpebris aut auribus gerit, uariabit sobolis plurimum colorem: minor trichnio, maior decennio, non debet admitti. Si asinus uisam equam fastidit, ostensam prius asinam donec uoluptas sollicitetur postea subducimus. Et tunc equam incitata libido non spernet & raptus illecebris sui generis in permixtione consentiet alieni. Ætas muli cognosci, ut equorū dicitur. Si nascentur & morantur in montibus ungulæ duræ fiant, si uero in palustribus aut uliginosis nati sunt ungulas habent molles, & ideo tales cum anniculi sunt debent à matre repelli, & per minores asperos pasci, ut eorum ungulæ durefiant, & ne itineris laborum in etate tenera soliditate contemnenti, mensibus duodecim ut equi, moratur in uentre matris.

Accidunt

Accidunt illis egritudines aliquæ, sicut equis, quæ cognosci & curari possunt, ut satis plene dictum est in tractatu equorum.

De asinis, Caput LIX.

Asinorum genus qui uult facere bonum, primo uidendū est ut mares foeminasq; bona etate sumat, firmas omnibus partibus corporis, amplo semineo bono, ex his locis in quibus optimi existunt. Horum genera sunt duo, unū ferum quod uocant o nagros, in Phrygia & Licaonia, ubi sunt greges multi feri, alterum mansuetum, ut sunt in Italia omnes. Ad seminationem o nagri idonei eligendi sunt, masculus & foemina. E fero fit mansuetus facile, e mansueto ferus nunquam, semper enim similes parentibus nascuntur. Comode pascuntur farre & fursuribus hordeatylis, admittuntur ante solstitium æstiuū ut in eodem tempore alternis annis pariant, 12 enim mense conceptum semen reddunt pregnantes. Opere alleuiandæ sunt pregnantes ex labore, cō quod nationē deteriore reddi; mares uero labori alleuiandi non sunt, cō quod remissione laborum deteriores fiunt, in pastu ferē eadem seruanda sunt quæ in equis. Remouendi à matre proximo anno, noctibus pasciantur esse cum eis, & leuiter campistris laqueati habeantur iuncti, tertio anno domari incipiunt & instrui ad eas res quas quisq; eos uult habere in usu, nam aliqui eos non eligunt nisi ad hoc ut onera portant, alij ut molas ducant, nonnulli eos ad uehendum disponunt, & plerique ad arandum ubi leuis est terra. Accidunt eis aliquæ egritudines quæ cognosci & curari possunt, ut in equis curantur.

De bubulis & grege bouum quales debent esse tauri & uaccæ. Caput LX.

In bubulo genere gradus etatū quatuor esse dicuntur, prima uulgarū, secunda iumentorū, tertia bonū, quarta uctulorum. Qui gregē armentorū curare uult, obseruare debet primum, ut sint uaccæ ad fructus serēdos etatis potius integræ quam imperfectæ

imperfectæ, bene compositæ, ut omnia membra sint grossa, inuicem sibi respondeant, altissima forma corporum, uteri capacis & longi, lata fronte, oculis nigris & gradibus, pulchris cornibus, & præcipue nigris, pilosis auribus, compressis malis, pallearijs maximis, apertis naribus, ecrucibus grossis & longis, & collo latis cruribus nigris & paruis, cauda profusa usq; ad calces, in inferiori parte frequentibus pilis subcrispis, rectis genibus, uirgulis breuibus, & paribus, corio ad tactum non aspero neq; duro, sed grosso, potissimum nigro, inde rubeo, tertio caluo, quarto albo. Mollissimus enim hic est, primus durissimus. Ceterum mediæ ætatis, maxime triennæ, quia usq; ad decennium fœtus procedit, ex his utilior. Tauri cognoscuntur his signis, ut sint alti atq; uigentibus membris, ætatis mediæ, & magis qui in iuuentute minor est, quam qui declinant ad senium, parua facie, paruis cornibus, tortosa uastaq; ceruice, uentre substricto, & qui ex his orti sunt respōdent ad parentum speciem, ex quibus regionibus nati sunt, refert, meliores enim in una, detiores inueniuntur in alia, ut experientia docet.

Qualiter uaccæ ad tauros submitti debent,

Caput LXI.

In armentis hyeme maritima, estate opaca & frigida paremus montana maxime, quia melius frutecis & inter nascente herba saturantur, quamvis circa flumios recte propter amœna loca pascantur: fœturæ tamen aquis tepidioribus adiuuantur, unde utilius habentur ubi pluuialis aqua tepentes format lacunas, ut ait Palladius. Stabula utilia sunt saxo uel glareis aut arena uel lapidibus strata, de uexa aliquantulum, ut elabi possit humor. Parti meridiane aduersa, propter flatos glaciales, quibus aliquis obfistere debet obiectis. Cavere oportet ne aut angustus stent aut feriantur aut concurrant, & quia eas estate tabam concitare solent & bestiolæ quædam minutæ sub cauda, ne concitentur, inelaudantur septis. His substerni oportet frōdes uel stramē, aliud uē in cubi

in cubilia, quo mollius quiescāt, æstate ad aquā bis appellande sunt in die, sed hyeme semel, cum parere cœperint quod fieri solci mēse aprili, iuxta stabulū pabulum seruari oportet integrum, quod regredientes degustare possint, ut sufficere possint tributo laboris & lātis, fastidiose enim propter partū fiunt. Et providendū quo recipiant se ne frigidus locus sit, alior enim & fames eas macrescere cogit, & nocte lactantes cum matribus non cubent, obteruntur enim, ad eas mane adigi oportet, ut cum redierint a pastu. Custos diligēs debet uetulis & sterilibus amotis reparare nouellas & steriles atrō & laboribus deputare. Si quæ amiserunt uitulos, eis supponere oportet eos, quibus non satis præbent matres.

Qualiter & quando uaccæ submitti debent, Caput LXII.

Propter facturā hoc seruare debere ait Varro, ante admissuram per unū mensem cibo & potu se nō impleant, quia æstimatur facilius macræ cōcipere. Cōtra tauri duobus mēsisibus ante admissurā herba, palea & sceno debent fieri pleniores, & secerni a fœminis, deinde in gregem redigi mense maio circa finem uel toto iunio & initio iulij, secundū Palladium, ut quæ tunc cōcipiunt temperatissimo tempore anni pariāt. Vacca cum decē mēsisibus sunt pregnantes, ante binam ætatem eis taurus non debet admitti, ut trienne pariāt. Afferunt græci si mares creare uolueris sinistrū tauri in coitu ligandum testiculū, si fœminas dextrū, eo quod semen dexter generet masculum, sinister fœminam. Tauri diu ante admissuram sunt abstinendi, ut cum tempus erit admittendi acrius in causas feruoris incumbant, sexaginta uaccis duo tauri secundum Varronem, sed Palladius ait quod quindecim uaccæ sufficiunt uni tauro. Si abundātia pabuli est in regione qua pascimus potest annis omnibus in factura uaccæ submitti, sed si decēt sunt alternis annis oneranda, maxime si alicui operi consueuerunt seruire.

Kk

Qualiter

Qualiter uituli debent teneri, & quando
castrari & domari, Cap. LXIII.

Cum creuerint uituli leuanda sunt matres, pabulo uiridi obijciendo in præsepis. Item his ut ferè in omnibus stabulis lapides subternendi sunt, uel quid aliud ne ungulae putrescant, ab æquinotio autūnali unā pascuntur cum matribus. Castrare nō debent ante biennium, quia difficulter si ante feceris se recipiūt, qui autem postea castrantur duri & inutiles fiunt. Castrantur autē secundum modū Palladij sic: alligato enim uitulo, ac deiecto testiculo, scissa pelle clauduntur, ignitis securibus aut dolabris, uel quod est melius formato ad hoc ferramento, ut gladij similitudinem teneat, ita enim circa ipsam regulam ferri acies imprimatur, unōq; ictu moram doloris beneficio celeritatis assumit, & uestis uenis & pellibus à sanguinis fluxu cicatrix quodāmodo cum ipso uulnere nata defenditur. Vulnere uero castratorum cinere sarmenti & spuma liniuntur argenti. A potu castratus abstineatur, & cibis pascatur eximij & sequente triduo ei præbeantur arborū teneræ summitates, & fruteta mollia, & herbe uiridis coma. Pice etiam liquida mixto cinere putouel sine, ferro ignito castrantur, sed si cum ferro acuto ignitus fiat non est necessaria præsens cura. Semestribus uitalis dētur surfures tritici & farina hordei, & tenera herba, & ut bibant mane & uespere curentur. Circa finem martij uel aprilis initium domandi sunt boues trimi, nam post quinquennū domari non possunt, ætatis darditia repugnante. Capite ergo statim domentur, qui quidem prius cum teneri sunt frequēti manus attractione māsuescant, sed stabulum noui boues largioribus spacijs habere debent, ad stabula ducantur, quorum si nimia fuerit asperitas uno die atq; nocte uinculis & ieiunij uincentur seu mitigentur. Tunc appellationibus & illecebris oblatoium non à latere neq; à tergo pertrahet, sed à fronte accedens bubulcus, ad mulceat nares & terra pertractet, si tamen ne aliquē calce uel cornu percutiat, quod uitiū si in primor

primordijs affectauerit obinebit. Aliqui eos inter se iungūt & docent eos onera leniora portare, & quod utile est si arationi parandas subactio prius solo exercendi sunt in arena. Quos ad uecturā parat fac primū: nania ducere plaustra, & si possis per uicū aut oppidum ubi sit strepitus ducas, & quē feceris dextrum fac etiam sinistrum, & sic laboranti requies erit. Vbi terra leuis est non fortibus bobus, sed uaccis & asinis uti possumus. Et in leui plaustro similiter & ad molam olei facile, ut nouus labor adhuc tenera colla nō quasset. Expediōr autē domandi ratio est, si asperum bonē mansueto & ualido boue iungas, quo ostendēte facile ad omnia cogetur officia. Si post domitiam decumbet in sulco non afficiatur igne uel uerbere sed potius cum decumbit pedes eius ita ligentur uinculis, ut nō possit progredi aut stare uel pascere quo factio siti uel fame lassatus carebit hoc uitio.

De bobus qualiter debent emi & de cognitione xtatis eorum, Cap. LXIII.

IN bobus emendis hæc signa expectentur, ut sint nouelli, quadratis & grandibus mēbris, solidi corporis, musculis ubiq; surgentibus, magnis auribus, lata fronte, & crispā, labijs oculisq; migrātib; cornib; robustis, ac sine curuaturæ prauitate, limatis patulis narib; & summa ceruice coriosa atq; cōpacta, palea ribus largis & genua circa fluētib; pectore grād; armis robustis, uentre non paruo, porrectis lateribus, latis lūib; dorso recto et plano crurib; solidis et neruosis, & breuib; ungulis, magnis caudis, lōgis & sciosis, pilo totius corporis denso et breui, rubei maxime coloris & fusci. Melius autē boues et de uicinis locis cōparabimus, qui nō illa soli aut aëris uarietate terrētur, uel si hoc deest de locis similibus ad similia trāferemus. Aliud est enim ante omnia curādū, ut uir. b. ad trahēdū cōparētur æquales, ne ualētior. b. robur alteri procuret exercitū, in mor. b. autē hæc cōsideranda sunt, sicut arguti, māsuetti, hor tamēta timētes, clamores ei uerbena, cibū appetētes. Sed si regionis

tio patitur nullus cibus est melior quam uiride pabulum, ubi uero deest, ex ordine ministretur quo pabuli copia, & laboris coget accessio. Tenendi sunt boues in talibus stabulis, ut de uaccis dictum est supra, uidelicet stratis & bene clausis, ut pedes ungulae conseruentur illesi, ac ipsi defendi possint a zentalis, mustis & tabaribus. Aetas ipsorum cognoscitur quando mutant dentes anteriores post annum completum ante decem uel octo menses, deinde post sex menses successive mutant proximis, donec in tribus annis mutauerint omnes, & tunc in bono statu existunt in quo perseuerant usque ad decem uel duodecim annos, & uiuunt usque ad quatuordecim uel quindecim annos, & cum sunt in statu dentes habent, pulchros longos & aequales, & cum senescunt minorantur & denigrantur ac corroduntur.

De infirmitatibus bouum & cura ipsorum, Caput LXV.

Sciendum est quod egritudines multe accidunt bobus, quarum una est, quod in capitibus ipsorum multiplicatur rheuma, quae uulgariter dicitur gutta robea. Et fit ex superflua commestione, & potu, proprie nimis humidarum herbarum, ex nimia requie & aeris humiditate superflua. Et cognoscitur quia inflatur eorum uultus & oculi. Ex quo bos moritur, si non curetur, sed curatur, quia statim phlebotomandus est bos infirmus, de uena quae est sub lingua, scilicet quod duae glandulae quae sunt ibi figuntur in pluribus locis cum puncta cutelli bene incidentis, ita quod multus egrediatur sanguis, & cum thure fiat fumigium ad nares eius. Item accidunt eis febres ex immoderato labore aut calore. Et morborum causae in bobus, ut ait Varro, haec fere sunt quod laerant propter aestus, aut propter frigora, aut propter nimium laborem, uel e contra, propter nullam exercitationem, aut si cum exercueris statim sine intervallo cibum aut potum de deris. Et cognoscuntur cum febriunt, quia sunt calidi tantum & maxime in lingua & auribus, & anhelitus ipsorum est spissus & calidus

Et alidus. Quibus subueniri debet cum regimine frigidus, scilicet quod à labore omnino cessent, & in loco frigidus teneantur, de frigidibus salicum & vitis cooperti, comedant frondes salicum, & frigidas herbas & hordeum in frigidatū, & si uidebuntur nimis repleti de ipsorum sanguine minuatur. Item bibant aquam malorum acrium & prunorum & ipsa mala & pruna edant, uel secundum Varronem curetur hic morbus, quod perfunditur aqua & perungitur oleo & uino tepesfacto, & sustinetur cibo & iniicitur aliquid ne frigidus cedat sitienti aqua frigida, datur, si hoc non proficiat, demittit sanguis maxime à capite. Item oppilatur & ingrossatur splen ipsorum de quo non liberantur sed diu sic infirmi existant. Et cognoscuntur quod bulliunt siue tussunt & maxime cū trotare conantur. Item inflantur boues constipatione uel uentositate in ipsorum uentribus generata, & cognoscuntur quod si manu uel digito superfluo uellis, quæ sunt iuxta posteriores anchas percutiuntur, sonat ut tympanum uel usu inflati apparèt & dolore torquentur, & quandoq; in terram se prosternūt & libenter iacent. Curantur autem cum clysteri uel canulo, de quibus dictum est supra cum tractabatur de doloribus equorum, uel cum manu pueri oleo uncta extrahantur feces, uel incidatur uena caude cū acuto cultello, per quatuor digitos longe ab ano de subis. Item leditur in collo ex nimia oppressione indecentis iugis, & maxime cum plume ceciderint super collum. Et quandoq; fit ibi ruptura propter humores ibi conuersos quæ curatur cum medicinis consolidatiuis carnium, & generatiuis cutis stipitis in curis ægritudinum equorum in pluribus locis & etiam cum alijs quibus mariscalci bouum utuntur, & præcipue cum unctione agrippæ intrantibus in pedibus ipsorum, uel alibi casualiter ex quibus claudicare coguntur, & curantur ut extrahatur quod intrauit in pedem uel in aliam partem, cum radicibus arundinis tritis, uel cum radicibus dictamni superpositis, & pecia fastiatis, uel cum alijs medicinis de lesione spinæ scriptis in tractatu equorum,

Et curantur ut plene dictū est ibi. Vt accidunt eis multe alie egritudines occulte Et alique manifeste, Et laxitudines que proueniūt ex nimio labore atq; calore, que cognoscuntur ex eo quod nō comedūt, uel solitū modū comedēdi mutant, et libenter iacent, Et ex calore linguā extrahūt, Et multe alie mutationes possunt in eis uideri ab his qui eos sanos Et incolumes cognouerunt. Ioues autem sani fortes Et agiles cognoscuntur, quia facile se mouent cum tanguntur uel punguntur, Et habent membra grossa, Et auriculas eleuatas, pulchri Et fortes aut generaliter cognoscuntur si omnia membra grossa sunt, Et sibi inuicē bene respondent, possunt etiam alie infirmitates accidere bobus, quas cognoscere possunt Et curare nouerunt optimi marischalci boum, qui multis annis in talibus sunt experti. Ego autem ea que fere scire potui fideliter scripsi.

De diuersitate & uarietate boum & uaccarum
& de omni utilitate ipsorum,
Caput LXVI.

EX genere boum aliqui sunt nigri, magni, fortes Et quasi indomiti, qui bubuli uocantur, non bene habiles ad plaustra Et aratro, sed in trabendis per terram magnis ponderibus exercentur, ligati artificialiter quibusdam cathenis, libenter morantur in aquis. Eorum coria non sunt adeo bona, ut aliorum boum, licet ualde grossa sunt. Et eorum carnes nimis melancholicæ sunt, Et ideo non multum bonæ, neq; boni saporis, Et licet crude satis sint pulchre, tamen coctæ turpes efficiuntur. Item alij sunt boues quibus communiter utimur, quorum quidam sunt maiores qui proprie locis planis conueniunt, quidam minores qui magis proprie exercentur in montibus: Et quidam sunt in magnitudine ac paruitate mediij, qui utrisq; conueniunt locis. Amplius quidam sunt minores, quorum carnes temperatæ complexionis sunt, ideo humano corpori nutrimentum bonum præstant, Et in eo robur Et sanitatem conseruant. Alij sunt a tatis perfectæ, qui proprie propter

propter eorum vires sunt laboribus deputandi, eorum coria pro so-
leis calciamentorum sunt optima, & eorum carnes mediocriter
melancholicæ nō multum conuenientes, nisi habentibus stomachum
fortem & calidum, & in his qui grauibz laboribus exercentur,
sunt & alij senes qui ad labores sunt pigri, & minus utiles quā
perfecti, eorum carnes nimis melancholicæ & indigestibiles iudi-
cantur, sed eorum coria bona sunt, & præcipue si sunt grossa cor-
nua boum sunt pectinibus apta, ossa taxillis, & paruorum culte-
lorum manubrijs & eorum fœcus stercorendis agris & arboribus
ac vineis, & imbuedis gernarijs & quibusdam uasibus & canis-
stris. Item uaccarum quædam sunt magnæ uel mediæ, quæ ab omni-
bus hominibus tenentur propter utilitatem generandorum & nu-
triendorum uitulorum & boum, qui plaustris & aratris humano
generi necessarijs deputantur. Quarum carnes & coria sunt simi-
lia masculinis, sed earum lac licet ad esum & caseum bonus sit, non
tamen eis tollendus sed pro nutrimento uitulorum, quorum uita ue-
res & augmentum optatur, matribz dimittendus, Aliæ uero uaccæ
sunt paruæ, quæ solū propter lac & caseum retinētur, & idco post
partum quindecim diebus elapsis occidendi sunt uituli & esui ho-
minum deputandæ, quorum carnes temperatæ ac digestibiles uale-
de sunt, & optime his qui in quiete morantur. Lac uero & caseus
satis humano esui competunt, licet non adeo perfecti ut bouina
exstant. Eligendæ autem sunt tales uaccæ quæ non nimis paruæ
sunt, & ubera magna habent.

De ouibus quales emi & eligi debent, & de
cognitione sanitatis ipsarum ac infir-
mitatis, Cap. LXXII.



Ves bonæ cognoscuntur ab ætate, si neque uetula
sunt, neque mera agnæ, nam alere nondam pos-
sunt, nec dare fructum. Sed ea melior ætas est quam
sequitur spes, quam ea, quam mors. Item cognoscitur à formâ,
nam

nam ouem esse oportet corpore amplo, que lana multa sit & molli, nullis altis & densis toto corpore, maxime circa cervicem & cololum, ventrem quoque, ut habeat pilosum esse oportet. Cruribus humilibus, caudis prolixis, in Italia, sed in Siria breuibus. Item cognoscuntur ex progenie si agnos solent procurare formosas. Sanitas & infirmitas eorum cognoscitur, nam si aperiantur eorum oculi & uene sint rubicundæ & subtiles, sunt sanæ. Si albæ uel rubicundæ & grossæ sunt infirmæ. Item si capite in pelli colli & ante tractæ uix trahi possunt sunt sanæ, sed si sequitur facile, sunt infirmæ. Item si manu capiuntur in scabinâ prope anchas & stringuntur, nec flectuntur sunt sanæ & fortes, si flectuntur sunt infirmæ. Item si aucter uadunt per uiam, sunt sanæ. Si moleste capite inclinato sunt aegræ.

Qualiter debent teneri & pasceri ac in quibus locis, Caput LXVIII.

DE pastione primum uidendum est, ut per totum annum recte pascantur intus & foris. In stabulo idoneo sint, non uentofo, quod magis ad orientem quam ad meridiem spectet, ubi stent solum oportet esse uirgultis aut paleis aut alijs straminibus stratum atque decliuum, ut mundari ac purum fieri ab humiditate igrine facile possit, non enim solum ea uligo lanas corrumpit ouium, sed etiam ungulas scabras fieri cogit: cum aliquot dies steterint, subijcere oportet aliam uirgula uel paleas, quo melius requiescant, purioresque sint, libentius enim ita pascuntur. Faciendum quoque infirmis, & his qui agnos paruos habent secreta septa ab alijs, quo eas recludere possis, hæc autem magis in uillaticis gregibus sunt seruanda, nam in his que pascuntur in saltibus, custodes secum portant crates aut retia, quibus cohortes in solitudine faciant, ceteraque utensilia, longe enim & late & uarie in diuersis locis pasci solent. Pascua ouili generi utilia sunt que uel in noualibus uel in pratis siccioribus excitantur. Palustria uero noxia sunt, & syluestria dam-
nosa

minosa, sal uero crebro oblatas in canalib. debet pecoris lenare frigidum: nam per hyemem si penuria est fœni uel palcæ, uicia uel facilius uictus ulmi uel fraxineis seruatis frondibus præbeatur. Aestiuis autem mensibus pascuntur sub lucis initio, cum gram n' teneri suauitatē roris mixtura comedat, quarta hora calefcente potus puri fluminis præbeatur, uel putei aut fontis: medios solis ardores aut uallis aut arbor umbrosa declinet, deinde cum ardor infringitur & solum primò umbræ uespertini & hora roris humefcit gregem renocemus ad pascua. Providendum est in hoc genere ut pabuli ubertate saturentur, & longe pascuntur à sentibus quæ etiam lanam diminuunt, & corpus incidunt, sed canicularibus & æstiuis diebus ita pascendæ sunt oues ut capita gregis auertantur semper à solis obiectu. Hyeme autem uel uere nō solutis gelicidijs ad pascua prodire nō debent, nam pruinosa herba huic generi morbos creat, & tantum semel aquare sufficiet. Cum messes sunt factæ teneantur in stipulis, quod est utile duabus ex causis, nam & caduca spica saturantur, & obtritis stramentis & stercoratiorem faciunt in annum sequentem, & segetes meliores. Per totam æstatem aurora surgente festinanter mulgeantur, ne solitum pastum perdant, & cum dies incaluerit, ducantur ut calor solis aut uētus urens non possit nocere eis. In uespere autem tam diu foris sint, quod recuperent pastum quem perdidērunt in die, & cum redierint semper prospiciatur ne sint calidæ cum in ouilibus includuntur. Si autem magnus feruor fuerit eant in proximis pascuis, ne si longius abierint non possint recurrere ad umbracula, nec pastores sinant eas importune aggregare tempore caloris si semper moderate dispergant, & cum adducantur calidæ non mulgeantur. Cum aurora apparuerit, mox agniculi ducantur ex umbraculis, ubi solici e custodiuntur, cum uiderint mane telas aranearum oncratas aqua non permittant pascere. Si feruor fuerit & pluuia ceciderit, non sinantur iacere, sed ad celsiora ducantur ubi tangantur à uento semperq;

LI moucantur

moveantur. Cavendæ autem sunt ab herbis, in quas venit arena. Et dicit pastor expertus, quod mense Aprili, Maio, Iunio, & Iulio non sunt dimittendæ multum pascere, ne nimium impinguentur, sed mense Septembri, Octobri & Novembri post mediam tertiam sunt tota die dimittendæ in pascuis, ut impinguentur quantum possint, autumno debiles pretio quoque mutantur, ne imbecilliores eas hybernæ tempus assumat.

Quando debeant submitti arietibus, & qualiter, & quanto tempore sint pregnantæ, & quales debent esse arietes, & quot oves sufficiunt uni, Cap. LXXIX.

Mense Aprili prima est arietum admissura, ut agnos iam maturos inueniat tempus. Hybernus: fit etiam mense Iunio, & etiam si fiat in mense Iulio nati ante hyemem conualescunt. Secunda fit admissura post medium mensem Octobris, ut pariant circa principium ueris, nascentibus herbis. Aristotiles asserit, si masculos creare uelis admissuræ tempore statum septembris eligendum, & contra eum uentum greges pascendos. Si feminas generare uelis, austri captandos statum, & in eum pascua dirigenda. Aliqui duobus mēsis ante arietes à coitu reuocant, & faciem libidinis auget delectatio uoluptatis. Quidā eo re sine discretionē permittunt, ut ei per totum annum foetura non desit, quamdiu admissura sit, eadem aqua uti oportet, quia commutatio aquæ & laniam uariam, & corrumpit uterum, ut ait Varro. Cum oves conciperint arietes secernendi sunt, quia cum sunt molesti obfunt, nec oportet pati minores quàm bimas saliri neque, natum ex his idoneum est, nec non ipsæ fiunt deteriores. Ovis pregnantis est centum quinquaginta diebus, itaque admissura fieri debet tali tempore, quod partus nascatur circa finem autumnī. Cum autem est modice temperatus, & primitus oritur herba imbribus prioribus euocata, eligendi sunt arietes candidissimi in regionibus illis, in quibus sunt oves albæ. Itē mollibus

mollihus lanis, in quibus non solum corporis splendor considerandus est, sed etiam lingua, quæ si maculis fuscatur, varietatem reddit in sobole, & si nigra est, nigros creat. De albo quoque nascetur coloris alterius, de nigris nunquam potest alius creari, ut ait Columella. Eligemus autem arietē altum, procerū, ventre promisso & lanis candidis tecto, cauda longissima & lata, curtis cornibus, pronis ad rostrum lana, apertis auribus, amplo pectore, scapulis & clunibus latis, uelleris depressi, fronte lata, magnis testibus, ætatis primæ quæ tamen usque ad octo annos utiliter posui sufficere. Fœmina debet buna submitti, quæ usque ad quinquennium fœtura necessaria est, anno septimo deficit. Item ex progenie animaduertatur aries si agnos procreat formosos, centum ouibus unus aries sufficere fertur, & quolibet sunt centenaria tot arietes sufficere, ait Varro.

Qualiter debent tondi & qualiter signari & quando, Caput LXX.

Mense Aprili locis calidis tondeantur oves, & serotini fœtus signentur, temperatis uero mense Maio celebranda est tonsura, & præcipue cum sudare incipiunt, quando cunque id fiat ab æquinoctio uerno ad solstitium, ut ait Varro, sed tonsas oves hoc modo inuabis: Succum decoctum lupini, feces uini ueteris, eisque miscebis amurcam, quibus in unum corpus redactis, tonsas oves linire curabis, post triduum, si mare uicinum est, littori mergantur extremo. Si uero alijs locis pascimus, aqua cœlestis cum sale paululum decocta sub diuo debet. Totum tonfarum & uncta membra diluere, hoc enim modo si curatur pecus anno toto, nec scabrum fieri dicitur, & prolixas lanas creare fertur, & molles, sed tribus diebus per annum lotas oves oleo & uino ungere oportebit. Propter serpentes, qui plerumque sub præsepibus latent, cedrum uel galbanum uel mulierum capillos, aut ceruinum cornu frequenter utamus, sed quæ in tonsura plagam

accipit, his locis pice liquida liniatur, quidam in anno bis tondent, ut in Hispania, ac semestres faciunt tonsuras.

De cognitione ætatis ouium, Cap. LXXI.

Dentes ouium mutantur post unum annum & dimidiam, scilicet duo anteriores, & postea per sex menses mutantur duo proximi, & postea mutant ceteros, ita quod cunctantur in tribus annis uel quatuor ad plus, & donec sint inæquales sunt iuvenes, quando æquales sunt in statu quando discalescunt, & minuantur, & corrumpuntur sunt senes, & tunc in usus earum fit bñsus gressus, & stant in bono statu usque ad octo annos, & quedam usque ad decem, si copiose pascantur, sed quæ famem patiuntur necessario cito senescunt.

Quando & qualiter debent mulgi & casei fieri, Caput LXXII.

Vsq; ad festum sancte Michaelis bis in die mulguntur oues, & postea semel lac elici potest, ne nimis pingues cum arietibus mutantur, ne importuno tempore factus emitant, sed post coniunctionem arietum ut pingues fiant custodiantur, ut hora congrua ducantur ad pascua, & custodiantur per totam ætatem, festinanter mulgeantur aurora surgente, ut hora congrua ducantur ad pascua, omnes silentium teneant dum mulgeant oues, excepto magistro qui tantum necessaria loquatur. Cascum coagulamus sincero lacte, coagulatis agni uel hœdi ad pellicula, quæ solet pullorum uentribus adherere, uel agrestis cardui floribus, uel lacte ficulneo, cui serum debet omne deduci, ut ex ponderibus uregatur: ubi corperit solidari opato loco ponatur, aut frigido, & pressus subinde ad rectis pro acquisita soliditate ponderibus trito & torrefacto sale debet aspergi, & iam durior uehementius premi potest. Post aliquos dies solidatæ iam formulæ statuatur, ita per cratices ne inuicem se unaqueque contingat, sit autem loco clauso, & à uentis remoto, ut ténertudinem & pinguedinem seruet.

Vitia

Vitia casei sunt, si aut siccus aut fistulosus est, quod evenit, si aut parum prematur, aut nimium salis accipiat, aut calore solis utatur, Item recenti caseo cōficiendo aliqui uirides nucleos pincos terunt, atq; sic lacte mixto congelant, aliqui cuminum tritum frequenter colatum congelant, quaecumq; etiam sapore uelis efficere, poteris adiectione quod elegeris cōdimentis seu piperis cuiuscumq; pigmenti.

De morbo ouium & cura eius, Cap. LXXIII.

Nascitur eis gossū sub gula ex fluxu humorū à capite descendentiū, & perforatur ibi pellis, & inde quasi aqua paulatim egreditur, & curantur. Item patiuntur grossitiem splenis, & inflantur, & hoc saepe de mense Maio & Aprili ex multitudine sanguinis grossi & viscosi, ex quo saepe subito moriuntur, & confert eis unum stectum, ut uulgo uocant, duorum digitorum, ponetur inter nares, & facere quod multū egrediatur sanguis, ex quo quaedam liberantur, & quaedam nibilominus moriuntur. Item patiuntur febres quae cognosci & curari possunt, ut dictum est de febribus in tractatu bouum, possunt etiam eis aliae accidere egritudines, quas cognoscere & curare pastores nouerunt expertissimi, qui eorum temporum in sola custodia ouium exercentur, in talibus solummodo student.

De agnis qualiter teneri debent, & quomodo castrari, Caput LXXIIII.

Um nascuntur agni unaquaq; septimāna per mensem saldetur eis, deinde postea omni tēpore quant ad decima die. Quando autem separantur à matribus, mox tondentur propter pediculos, uel quia melius crescunt, & unaquaq; hebdomada saldetur eisdem, circa natiuitatem domini unguuntur cum matribus, ut hoc de agnis Palladius dicit. Varro autem ait: Cum parere incipiunt oues, pastores eos inijciunt in castrabula, quae ad

eam rem habent seclusa, ibiq; agnos recenter natos ad ignem apponunt, & per biduum aut triduum retinent cum matribus dum cognoscunt matrē, & pabulo se saturant, deinde cum matres ad pastum cum grege prodeunt, retinent agnos, qui cum creati ad uesterum fuerint, aluntur lacte, & rursus secernuntur noctu à matribus ne cōculcentur. Hoc idem faciunt mane antequam matres ad pabulum exeāt, ut agni fiant saturi lacte circiter decem dies, cū præterierint pabulo affigunt, & ad eos alligant libro & corice, aut qua alia re leni distantes, ne tota die cursantes inter se teneri debent aliquod mēbroyum. Si ad matris māmā nō accedent ad mouere oportet, & labra agni ungere butyro, aut adipe suillo, & oī facere labra lacte diebus post paucis, obijcere his uitiam mollitam, aut herbam tenerā anteq̃ exeant pastum, & cum reuertuntur & sic nutriuntur quo ad facti sunt quadrimestres, interea matres eorū his temporibus nō mulgēt donec depulsi sunt agni à matribus. Diligentia est adhūc bēda, ne de siderio senescant, itaq; delinendū in nutritatu pabuli bonitate, & à frigore & aestu nē quid laborent curandū. Cū obliuione iam lactis non desiderant matrem, tum deniq; compellendi in gregem ouium.

De utilitate ouium & agnorum,

Caput lxxv.

Nutritas ouium magna est, nam ex pilis earum fiunt indumenta necessaria & delectabilia ad hominū salutem & uitam, qui quanto sunt subtiliores, tanto meliores & maioris pretij, ex pellibus cum pilis fiunt pellicæ pannorum tempore frigoris oportunæ, & ex ipsis depilatis fiunt calciamenta, & carni ipsarum lac adiunctū est conueniens, & satis salubre, qui quanto recentior est, tanto melior est, & quanto spissior, tanto amplioris est nutrimenti. Et ipsius aquositas quæ est serum est solutius uentris & choleram educit ab eo. Caseus autem qui ex eo fit nutrimentum est corporis humani, qui quanto recentior est, tanto melior est, & quanto uetustior & durior tanto peior, & qui ex eo est nimis

est nimis salitus vel nimis viscosus vel nimis frangibilis non est bonus, ut ait Rasis, sed ille bonus est qui tenet medium inter utrumque. Caro autem huius pecoris est indelectabilis saporis & humida nimis, atque inconueniens est nisi forte uilioribus rusticis affectis, qui continuis laboribus exercentur, agnorum uero caro satis est conueniens cum fuerit à lacte remota, sed castratorum optima, nutrimentum bonum & multum præbens, si annalis fuerit ut ait Auicenna. Sed si eam ætatem excesserit fit deterior, & quanto uetustior, tanto peior, & ad digerendum durior. Pelles autem & lana agnorum sunt optimæ, atque ad opus mentum humani corporis aptiores quam matrum.

De capris, hircis & hircidis, qualiter debent eligi, & quanto tempore sint pregnantes
& de ipsarum utilitate & ætate,
Caput LXXVI.



Vi caprinum gregem constituere uult, in eligendo animaduertere oportet, primo ætatem, ut eam pareat quæ iam ferre possit fructum, & de his eam potius quæ diutius, nouella quam uetis utilior est. In forma uidendum, ut sint formæ magnæ, corpus leue, crebro pilo, submento duas ut mammillas pensiles habeant, quia hæc fecundiores sunt, ubere grandiore sint, & lac multum & pingue habeant. Hircus cum similibus submento mammillis, gurgulione longi, breui plenæque ceruice, auribus flexis & grandibus, paruo capite, nigro, spisso & longo capillo. Ad incundas foeminas ante annum congruus est hircus, non autem durat ultra decennium, ex capris meliores sunt quæ bis pariunt, ex his potissimum mares sunt eligendi ad admittendas. Hirci pecori stabula meliores sunt quæ spectant ad hibernos solis ortus, quæ lapide aut teste sunt strata, ut caprile minus sit uisginosum

aut

aut lutulentum. Item substrictantur uirgulis, ne obliantur teneri,
 & pasci hoc pecus debet quasi ouillum, sed habet propria quædam
 quod potius syluestribus saltibus delectantur quàm pratis, studio-
 se enim de agrestibus saltibus pascuntur, atq; in locis cultis uirgulta
 carpunt, itaq; à carpendo capræ dicuntur, ideoq; in lege locationis
 fundi excipi solet, ne colonus capram in fundo pascat: post autum-
 num exigunt in gregem hircos, quia quæ concipit post quartum men-
 sem reddit tempore uerno, hæc di cum trimestres sunt facti submit-
 tuntur, & in grege incipiunt esse, satis magnum putant esse circi-
 ter quinquagenas, eo quod capræ lasciuæ sunt, & se dispergunt, cõ-
 tra oues se congregant ac condesant in locum unum. Singulis de-
 cem capris singuli sufficiunt hirci, ultra octo annos seruandæ non
 sunt, nam hoc genus longiori sterilescit ætate. Sanas capras nemo
 promittit, nunquam enim sine febre sunt (ut ait Varro.) Accidit
 etiam sæpe ut in corporibus uulnerentur, quibus subueniendum est,
 eo quod inter se cornibus pugnant, ac etiam spissis spinosis locis pa-
 scuntur, quibus subueniendum est, ut in curis uulnerum equorum
 dictum est plerisq; capitulis. Vtilitas caprarum est præcipue in pel-
 le & lacte ac hædis, nam & ex ipsarum pellibus fiunt optima cal-
 ciamenta, & equorum selle operiuntur, lac ipsarum multum est &
 humano corpori optimum, & præcipue non coagulatum, parum ca-
 seitatis habens, & qui ex eo fit caseus non est adeo laudabilis ut o-
 uium, earum carnes nimie siccitatis ad digerendum duræ existunt,
 ideoq; male. Sed hædorum carnes sunt oportune ad salutem
 & delectationem, & præcipue lactatum, & ex ipso-
 rum pellibus fiunt optime chartæ, ac delicata cal-
 ciamenta, his conuenientia, qui uolu-
 ptuose uiuere cupiunt.

De scrophis

De scrophis, uernibus. & suis, quales debent eligi,
& qualiter teneri, & quanto tempore sunt pregnantes.
& de ipsarum sanitate & utilitate, Cap. lxxvii.

Verres eligendi sunt uasti & amplius corporis, sed rotundi
potius quam longi, ventre & clunibus magnis, rostro bre-
ui, ceruice glandulis spissis, minus coloris potius quam uarij.
Libidinosi ammiculi qui usque ad quadriennium in re facinas possunt.
Scrophas uero longi lateris debemus eligere, & quibus ad sustinen-
dum foeturae onus se magnus uenter effundat, cetera uernibus simi-
lia. Sed in regionibus frigidis depressi nigrique pilisimi, in tepidis
qualescunque sint nihil refert. Item ex bona progenie ut porcos mul-
tos pariat, hoc genus in omnibus locis haberi potest, melius tamen
agris palustribus quam siccis, praecipue ubi arborum fructuosior syl-
ua suppetit, quae subinde maturis fructibus alterna per annum muta-
tione succurrat, locis maxime graminae nosis & cannarum radicibus nu-
truntur. Sed deficientibus alimentis per hiemem praebenda sunt pa-
bula glandium, castanearum, & similium, uel faba uel hordeum uel
frumentum. Haec enim non solummodo pinguedinem efficiunt, sed etiam
carni uicundum saporem addunt. Aestate mane & antequam
aestus incipiat subgunt in locum umbrosum, maxime ubi sit aqua,
post meridiem rursus lento seruire pascuntur, hyberno tempore
non prius exgunt pastum quam pruina euanuit, & liquefacta est
glacies. Porci gregat in more aliorum pecudum claudendi non sunt,
sed aras sub portibus facimus, quibus mater unaqueque claudan-
tur, quae ara super ori sint parte delecta, ut libere numerum pastor
exploret, & oppressis à matre foetibus saepe subueniat subiraben-
do. Curabit autem ut foetus proprios cum unaqueque praeludat, plus
uero quam octo (ut Columella dicit) nutriri non debet. Paliadio
autem sex sufficere uidetur, quia licet plures ualeat educare, tamen
in aere numero onerata ante tempus deficiat. Varro ait, quot tot
porcos parere potest, quod manus habet, si in nus parcat esse por-

centum

tenum. In quo illud antiquissimū fuisse scribitur, quod sus Acneæ La-
min. triginta porcos peperit albos, nutricari octo porci paruuli pos-
sunt primo, incremento facto à porcis dimidia pars remoueri, quia
neq; mater sufficienter potest lac præbere, neq; generati roborari.
Ad facturam uerres duobus mensibus ante secernendū sunt, optimū
admissuræ tempus à fauonio ad æquinoctium uernū, id est, Kal. fe-
bruarij, ad diem 12 martij, ita enim cōtingit ut æstate pariant, qua-
tuor enim mensibus est pregnans, & tunc pariat cum pabulo abun-
dat terra. Neq; minores admittendæ, quàm annicula, melius uiginti
menses expectare, ut bimæ pariant. Cum coeperint, dicitur hoc fac-
ere usq; ad septimum annū recte. In luto uolūt inter libenter, quæ
illorū requies est, ut lauatio hominis. Cum omnes coeperint rursus
segregunt uerres, uerres octo mēsum incipit salire, idq; usq; ad qua-
drimum recte facere potest, deinde saginatus peruenit ad lanium.
Sus usq; adeo pinguedine crescere solet, ut se ipsa stans sustinere nō
possit neq; progredi usquā. Nam in Lusitania fertur sus esse occisus,
qui fuit inuentus uiginti tribus pōdo, id est, quingentis septuaginta
quinq; libris, eiusq; suis à cute ad os pedem & tres digitos fuisse, lar-
dum cū carne uno pede & tribus digitis grossum, ut ait Varro. Ad-
d et etiam se in Arcad: auidisse suem, qui pæ pinguedine non modo
furgere non posset, sed etiam in cam murem nidum fecisse & pepe-
risset mures. Fecunditas scrophæ perpenditur, quia in primo par-
tu agit, non muliū in reliquis mutat. Subulci binis mensibus por-
cos sinunt cum matribus, deinde cum iam pasci possunt secernunt.
Porci nati hyeme fiūt exiles, propter frigora, & quia matres asper-
nantur eos, propter exiguitatem lactis, quia ex hoc dentibus sauciā-
tur ab eis earum mamme: dū sus est earum annus bisariā, quia bis
pariunt in anno, quaternis mensibus fert uentrē, binis nutrit. Aram
facere oportet circiter trium pedum altam & latam amplius pau-
lo ea altitudine abs terra, ne dum uelit exire pregnans abortet, ala-
titudinis modus sit ut subulcus facile circūspicere possit, ne quis por-
cellus

cellus à matre opprimatur, & ut facile pregnare possit cubile in aris hostium esse debet, & limen inferius altum palmipedale ad est, uno pede & palmo, ne porcelli ex ara cum mater prodit transire possint. Quotienscunq; aras subulcus purgat, totiens arenam mittere oportet, aut quid aliud quod exugat humorem, & cum peperit largiori cibatu sustentet, quo facilius lac suppeditare possit, in quibus hordei circiter binas libras aqua madefactas dare solent, mane & vespere, si alia quæ obijciant non habuerint. Scrophæ bis in die lactis causa bibant, cum porci à mamma depulsi sunt, si fundus ministrat dare solent uinaceæ ac scropei ex uuis, à partu decem diebus proximis non producant ex aris matrem, nisi propter potum elapsis decem diebus sinunt exire pastum in proximum locum uille, crebro redditu lacte alere possint porcos. Cum creuerint secuntur matrem ad pastum, denique secernunt à matribus ac seorsum pascunt nutrices subulcus assuescere debet, ut omnia faciant ad buccinam primo cum incluserunt cum buccinatum est aperiant, et exire possint in eum locum ubi hordeum effusum sit in longitudine, sic enim minus disperit quam in acervos posuim. Et plures facilius accedunt, idcirco ad buccinam conuenire dicuntur, ne syluestri loco dispersi pereant. Castratur uerres comode anniculi, nec minores quam semestres, quo facto nomen mui datur, & pro uerribus dicuntur maiales, de sanitate suum unum solum exempli causa dicam, porcis lactantibus si scrophæ lac suppeditare non potest, triticum frustum dare oportet, crudum enim soluit aluum, uel hordeum obijci ex aqua, quoad fiant trimestres, in centum scrophis decem uerres satis esse putantur, utilitas porcorum est, quia earum carnes ad cibum competunt recentes & siccae, & optima pro calciametis, et corulardus est optimus in cœdiendis omnibus cibis, et eorum adeps optimus pro calciametis cœseruandis, & in pluribus unguentis ad curandas ægitudines oportunus. Itē est alia utilitas, quod uinctis immisi nec dum turgentibus. & exacta uindemia gramine persecuto uertunt solū, postea relicta sossoris diligena mutantur.

De canibus quales debent eligi, & qualiter teneri & instrui & de ipsorum utilitate,

Caput LXXVIII.

Canis est custos eius pecoris, qui eo comite indigent, ad se defendendum, in quo genere sunt maxime oves & capre, eas enim lupus captare solet, cui canes apponimus defensores, in suillo pecore sunt qui se defendunt, ut fures, uerres, maiales, & scrophæ. Canum genera sunt duo, unum uenaticum pertinens ad feras, alterum quod custodiæ causa paratur, pertinens ad pastores, de quo dicere intendo. Ad formam huius artis primum ætate idonea parandi sunt, nam catuli et senes nec sibi nec ouibus sunt præsidio, & lupis nonnunquam prædæ fiunt. Debent esse formosi, magnitudine ampla, oculis nigricantibus, naribus cõgyuentibus, labris subnigris, aut rubicundis, mento suppresso, & ex eo natis duobus dentibus dextra & sinistra paulo eminentibus superioribus, directis potius quam tortis, habentes acutos dentes, labro tectis, capitibus & auriculis magnis ac latis, id est, plicatis, grossis cervicibus, ac collo, internodijs articulorum longis, pedibus magnis & altis, digitis discretis & unguis duris neque curuis, corpore suppresso spina neque eminula, id est, sima, neque curua, cauda grossa, latratu graui, biati magno, colore potissimum leonino, femina uero debent esse mæmose, papillis æqualibus. Cauendum est ne à lancis, neue à uenatoribus canes emas. Nam alij ad pecus sequendum inertes, sicut alteri si uiderint leporem aut ceruum cum potius quàm oves sequuntur, quare à pastoribus emptus melior est, qui oves sequi consuevit, aut qui sine consuetudine fuerit, canis enim non facile aliquid assuescit: facilius bene pascendi cum grege sunt, ne propter famem uolens quærere cibum à grege recedat: morticina ouis carnes non patiuntur pasci, ne ductu sapore minus se abstinere neant, sed dentur eis ossa bene conculsa, nam ex his dentes fiunt firmiores, & os magis patulum, propterea quod uelocius ducantur male, acioresque fiunt, propter

pter medullarum saporem. In die eibum capiant ubi pascuntur, ne-
 sperere ubi stabulantur. Catula tribus mensibus solent esse pregnan-
 tes, in partu, si plures sunt, eligere oportet quos habere uelis, reli-
 quos abicere: quanto pauciores relinquuntur, tanto in alendo me-
 iores fiunt. Item subternatur eis aliquid quo molliori cubili facili-
 us educantur. Catuli diebus uiginti uidere incipiunt, duobus mensi-
 bus primis à partu non disiunguntur, à matribus educunt eos in u-
 num locum. Item consuefaciant ut alligari possint primum leuibus
 uinculis, quæ si abrodere conantur, ne illud consuecant facere, uer-
 beribus eos deterrere solent. Quidam nucibus Græcis in aqua tri-
 tis perungunt aures, & inter digitos, eò quod muscæ & ricini pu-
 lices ibi stare solent, quod si non fiat ea exulecerentur: ne uulneretur
 & à bestiis, imponuntur eis collaria ferri, habentia sub se leue co-
 rium, clauus infixum, ne collo noceat duritia ferri. Numerus ca-
 num pro pecore multitudine solet parari, sed in regionibus sylue-
 stribus remotis à uillis ubi bestiae male sunt multo requiruntur plu-
 res, nam in uillatico grege sufficit unus scilicet masculus, alter fœ-
 mina, eò quod simul sunt assiduiiores, & idem cum altero sit acrior,
 & si alter æger est ne sine cane grex sit, quos consuefaciant nocte
 uigilare, & in die clausos dormire.

De pastoribus quot & quales debent esse,

Caput LXXIX.



Ad maiores pecudes necessarij sunt etate perfecta, ad mi-
 nores parui quandoq; sufficiunt. Et qui in collibus uersan-
 tur firmiores requiruntur, quam qui in fundo quotidie
 ad uillam redeant, itaq; in salibus licet uidere iuuentutem, & tam-
 ferè armatam, cum in fundis non modo puer: sed etiam puellæ pa-
 scant in die, pascere greges simul communiter omnes oportet. Per
 noctem ad suum gregem queng; oportet. Maior natu & cæteris
 peritior esse debet magister pectoris, eiq; omnes alij parere debet,
 itaq; tamen oportet cum alijs etate præcellere, ne propter senectū

tem minus sustinere posset labores, præsertim dum conueniunt forme hominum, difficultatem ac montium arduitatem et asperitatem facile ferant, quod pati necessitate habent qui greges sequuntur, præsertim cum conueniunt formæ hominum armentitios atq; capri nos, quibus rupes ac sylvæ ad pabulandum conueniunt. Formæ hominum legende sunt ut sint firmi, & sequi possint, & ueloces, mobiles, expeditis membris, qui non solum pecus sequi possint, sed etiam à bestiis ac prædombus defendere, qui onera extollere iniuncta possint, qui excurrere, qui iaculari valeant. Non omnes ad hanc rem apti sunt, magistrū providere oportet, ut sequantur omnia instrumenta, quæ pecori & pastoribus opus sint, maxime ad uictum hominum, & ad medicinam pecudum, ad quam rem habent iumenta bassuaria domini, alij equas, alij mulos uel asinos, aut alia quæ onus dorso ferre possunt, qui in fundo perpetuo manent, facile habent conservari in ulla quæ pastoribus necessaria faciant, his autem qui in saltibus & syluestribus locis pascant mulieres adiungere oportet, quæ greges sequantur, ac cibaria pastoribus expediant, eosq; assiduiores faciant. Magister pecoris sine literis idoneus non est, eo quod rationes dominicas conficere, nec aliud quicquam ratione facere potest. Pastorum numerus esse debet secundū multitudinem pecudum, genus earū, & diuersitatē locorū pastionis, & uendentium agnos, & facientium caseos, uel non maior uel minor talis & tantus qui omnia oportuna huic operi possit cōmode explicare.

De leporarijs & leporibus cæterisq; animalibus feris includendis, Cap. LXXX.

Leporarium est locus clausus, in quo clauduntur lepores & capreoli, & cerui, & cuniculi, cæteraq; animalia non rapacia. fera tamen, sic antiquitus appellatus, eo quod lepores, præcipue includebantur in eo, sed omnium horum custodia incrementū & pastio aperta & nota est, ideo breuiter explicanda, itaq; septa ex materijs circa locū magnū uel parū, secundū optio-

nem uel possibilitatem domini fiat, ad cō alta uel cōpasta quod neq;
 lupus neq; alia bestia intrare possit, neq; desuper transilire, ibi q;
 oportet esse latebras in uirgultis & herbis, ubi lepores interdum
 delitescant, & arbores patulis ramis, qui a uile conatum impedi-
 ant, in quo si lepores mares uel foeminas paucos intromiseris breui
 tempore locus implebitur, tanta est fecunditas huius quadrupē-
 dis. Sæpe enim cū catulos habent recentes, alios in uentre reperiri
 tur habere, itaq; quis scire uolet masculum à foemina discernere (ut
 Archadius scribit) naturæ foramina debet inspicere, nam sine duo
 masculus unum, foemina duo inueniuntur habere, si caute &
 subtiliter inspicatur. Sed leporū tria genera ferè sunt, unum Itali-
 cum, pedibus primis humilibus, posterioribus altis, superiore par-
 te bassa, nētre albo, auribus longis, qui lepus dicitur cū pregnans
 sit tunc concipere. In Gallia transalpina, & Macedonia fiunt per
 magni, in Italia & Hispania, mediocres. Item in Gallia reperiuntur
 alij alterius generis toti candidi. Tertiij generis est quod in Hispania
 & in Prouincia & in partibus Lombardæ sibi coherētibus na-
 scitur, similis nostro lepori ex quadam parte, sed humilis, quē cum-
 culum appellant. Lepus dicitur ab eo, quia leui pede ambulat: cuni-
 culi ab eo quod sub terra cuniculos ipsi facere solent, ubi lateant in
 agris, nemoribus & pratis & uineis. Apros habere posse in lepo-
 rario & capreolos & ceruos non est dubium.

De piscinis & piscibus includendis, Cap. LXXXI.

Qui piscinas habere desiderat, primū eligere oportet locū
 conuenientē, qui nullo tempore aqua careat, non enim
 alijs possunt durare locis, sed piscinarū quedā sunt par-
 uæ, quedā magnæ, quedā mediocres: & uerū quedā sunt fontanæ,
 quedā stagnæ, quedā marinæ, & quedā etiam fluuiales. Si parue
 sicut manantur septis ex lignis uel uiminibus aut lapidibus constru-
 ctis ne lodria uel aliud animal nocēs intrare possit, et uimina aut ui-
 tes super eā tēdantur, quibus aues terreātur rapaces in eisq; ponantur
 pisces

piscēs illi aquæ convenientes, ex his qui inueniuntur in partibus illis, nam quidam libentius stant in fontium uel fluuiorum aquis, alij in stagnis & lacubus, nonnulli delectantur marina, sit autem parua piscina profunda in quantum à fossoribus profundari possit, sed in magnis piscinis commodè stare possunt. Quod si marina fuerit aqua de mari educta omnia genera marinorum piscium natura paruorum possunt in ea seruari. Si piscinam magnam habere uolueris, oportet ipsam fieri ex magno lacu uel stagno in quo sunt aquæ plurimæ congregatæ, uel ac pluuijs aut fontibus, uel in ea flumen fluentibus, uel etiam aqua marina, quod in pluribus evenit locis, quod si ex ipso lacu uel stagno aqua per aliquam partem exeat, ibi claudatur taliter quod impediatur piscium exitus, & non aquæ, quod si ex aqua dulci consistat, poterunt in ea poni ac seruari omnia genera piscium, tam magnorum quàm paruorum, in talibus aquis uimentium. Sunt & aliqui marini pisces qui ad aquam dulcem accedentes delectantur in ea, & tales similiter poterunt in dulci piscina seruari. Si uero fuerint ex aqua marina, in ea ponantur omnia genera piscium marinorum, si sit ualde profunda, nisi sit piscis maximus, ut balena quæ nullo loco nisi maris pelago claudi potest, si uero modicæ magnitudinis sit piscina, ex his quæ dicta sunt facile potest haberi doctrina, quales pisces possunt in ea includi. Piscinæ utilitas magna, quia ex paucis piscibus inclusis brevi tempore habentur plures, ex quibus plures uendi possunt, & plures ad escam haberi.

De Pauonibus, Caput LXXXII.

COm: leto tractatu animalium quadrupedum nutriendorum ac piscium, de bipedibus & cæteris uolatilibus est dicendum. Et primo de pauonibus qui suo decore nobiliores sunt cæteris, quos nutrire, ut egregie ait Palladius, facile est, nisi furens aut animalia inimica formides, qui per agros uagantur, plerumq; sponte se pascunt pullosq; educunt, alij sumas uestire arbores

arbores petunt, una his cura debetur ut incubantes per agrum foeminas quæ hoc passim faciunt à uulpe custodias. Idcoq; in breuib; insulis melius nutriuntur, uni masculo quinq; foemine sufficiunt, quod seruandum est (ut ait Varro) si ad fructum spectes, nam tunc pauciores debent esse mares quam foemine. Si ad delectationem cōtra, formosior enim est masculus. Masculi oua & pullos suos persequuntur, uelut alienigenas, priusquam illis cristarum nascantur insignia. Ab idibus februarij calere incipiunt, faba leuiter torrefacta incutitur ad libidinem, si eis quinto quoq; die tepida prebeat. Cupiditatem coeundi masculus confitetur quotiens circa se amictum caudæ gemmantis incuruat cum stridore percurrent. Si oua pauonum gallinis supponantur, excusantur matres, tribus uicibus ab incubatione per annum factus edunt. Primus partus quinq; ouorum, secundus quatuor, tertius trium uel duorum esse consuevit. Sed electæ, si hoc placuerit, gallinæ sint quæ primo incremento lunæ nouem diebus habeant noua oua supposita, quinq; pauonia, cætera sui generis, decima die omnia gallinacia subtrahantur, & alia gallinacia recentia totidem supponantur, ut triginta diebus possint cum pauoninis aperiri ouis. Oua autem pauonū contra gallinæ subiecta sæpe manu eō uertantur, quia hoc ipsa facere uix ualebit, unamq; partem oui notabis, ut conuertisse cognoscas, maiores gallinas oportet eligere, nam minoribus pauciora suppones. Cubilia debent eis fieri sub testio discretæ, & à terra eleuata, ut neq; serpens neq; bestia accedere ad ea possit, (ut ait Varro) præterea locum ante se purum habere debet cubile, quo ad pastum exeant diebus aptis, nam utrumq; locū purum esse uolunt hæ uolucres. Itaq; pastore earum cū uacillo circumire oportet ac stercus tollere natos, si ad unam transferre à pluribus uelis, quindecim uni nutriti sufficiunt, primis diebus far horæ dei aspersum omnino pullis dabitur, uel undecunq; cocto pulicula & refrigerata. Postea adijcietur porrum concisum uel caseus rectus sed expressus, nam serum pullis nocet, locustæ etiam in pedibus

bus ablatis præbentur. Ita pascendi sunt usq; ad unum mensem, de inde hordeum poteris præbere solenniter. Trigesimoquinto tamē die postquam nati sunt in agrum tutum eijci possunt, comitante nutrice pascendi, cuius singultura nocant ad illā. Pituitates uero & cruditates his remedijs submouebis, quibus gallina curatur, maximum illis periculum est cum incipit crista produci, nam patiuntur languores, sicut infantes cum dentes eis nascuntur, utilitas ipsorū est, carnes satis bonæ sunt, sed ad digerendum duræ, masculorum penne sunt pulchræ, ideoq; puellis prosertis & alijs ornamentis aptæ.

De Phasianis, Cap. LXXXIII.

IN phasianis nutriendis hoc seruandum est, ut nouelli ad creandos foetus parentur, id est, anno superiori sunt editi, iueteres enim foecundi esse non possunt. Incunt fœminas mense martio uel aprili, duab. fœminis unus masculus sufficit, semel in anno foetus creat, uigesimus ferè ovis pariendi ordo cœcluditur. Gallinæ his melius incubabūt, ita ut 15 phasiani oua nutrix omnia oia cooperiat, cetera sui generis supponātur, in supponēdo de luna & diebus quæ sunt de alijs dicta scriuemus. Trigesimus dies maturos pullos in lumen mittet, sed per quindecim dies discreto toto ac consperso uino refrigerato leuiter hordei farre pascuntur, deinde triticum & locustas præbebis & oua formicæ. Sane ab aqua prohibeantur accessu, ne eos pituita concludat, quod si pituita patianatur cum pice liquida rostra eorum debebis assidue perfricare, uel sicut gallinis auferre. Eorum carnes sunt optime.

De Anseribus, Cap. LXXXIII.

ANser aquam herbamq; desiderat, nec sine ipsis facile sustinetur, locis confitis inimicus est, quia sata & morsu ledit & stercore polluit, præstat plumas, quas autumnu uellamus & uere, uni masculo tres fœminæ sufficiunt. Si defu flumens, lacus

ana formetur, si herba non suppetit, trifolium, scænum græcum, agrestia incuba, lactuculas pro alimēto seremus. Albi fecundiores sunt, uarij uel susci minus, quia de agresti genere ad domesticū transierunt, incubant à Kal. martij usq; ad solsticiū æstiuum. Circa 15 oia uni anseri sufficiunt, incubant 30 diebus. Melius tamē est quod gallinis oia supponas, quia plus parient, parituræ ad aram producantur, cum semel hoc feceris consuetudinē fronte tenebunt, si galinis anseris oia supponas ne noceant suppositis subijciatur urtica. Semine papaueris primis decem diebus pascende sunt intus, postea foras eas poterimus educere, ubi urtica non fuerit, cuius formidū aculeos, & præcipue in prat: & piscinas aut paludes. Aras eis faciunt supra terram in qua non inducāt plus uicenos pullos, easq; aras provideant ne habeant humorē, & molle habeant substramen, ex palca. Studendum est ne accedere ad eos possint mustelæ, nec aliæ bestiolæ quæ noceant, ut ait Varro, quatuor mensibus bene saginantur, nam melius in tenera ætate pinguescunt, potentiū dabitur ter in die, late uagantur & ideo prohibeatur licentia, obscuro loco claudantur & calido, sic etiam maiores obscuro loco pinguescunt, nam paruuli sæpe die tricesimo saginantur, melius si ad satietatem milium præbeamus infusum inter anserum cibaria. Omne legumen præstari potest excepto eruo. A lupis & uulpibus rapiuntur, & ideo ab eis custodiendæ sunt. Utilitas anserum est quia carnes pulloꝝ si sunt pingues & quatuor mensium non excesserunt ætatem à pluribus appetuntur, & eorum pennæ molles optime sunt pro leatib, & duræ alarum scriptoribus competunt & sagittis.

De Anatibus, Cap. LXXXV.



Nates sunt de natura anserum & eodem modo nutriuntur, ut anseres. Libenter comedunt herbam anatinam quæ in superficie aquæ stantis ex solis adustione oritur, omnia repulsa & uermes & omnia turpia libenter accipiunt & glutunt.

¶ **Utilitas**

Vtilitas ipsarum est præcipue in pennis & carnibus etiam illarum
& pullorum earum utimur, licet satis sint indigestibiles & viscosæ.

De gallinis & gallis ac ipsarum pullis quales ha-
beri & qualiter teneri expedit,

Caput LXXXVI.

Qui perfectas vult habere gallinas, eligere debet socum-
das, plerumq; rubicundas pluma, nigris pennis, impari-
bus digitis, magnis capitibus, cristâ erectâ, amplâ. Hæ ce-
nim ad partem sunt aptiores. Galli sint lacertosi, rubenti cristâ, ro-
stro breui, plene acuto, oculis raris aut nigris, palca rubea, collo
nario, aut aureolo, femoribus pilosis, cruribus brevibus, ungulis lon-
gis, caudis magnis, frequentibus pennis, uociferantes sæpe, in cer-
tamine pertinaces, & qui animalia quæ nocent gallinis non modo
pertimescunt, sed etiam pro gallinis propugnent. Si ducentas alere
uelis locus septus parandus est, in quo due caueæ coniunctæ sunt,
quæ uersus orientem spectent, & sint longitudinis circiter decem
pedû, latitudinis paulo minus, in altitudine paulo humiliores: una-
quæq; habeat fenestra tripedali uno pede altiore, ex uiminibus
factam raris, ita ut lumē præbeant multum, neq; per eas quicquam
intrare possit, quod nocere solet gallinis, inter ipsas duas sit hostiû
quo gallinarius curator earum ire posset: in caueis crebræ perticæ
tractæ sint, ut omnes possint sustinere gallinas. Cōtra singulas per-
ticas in pariete sint cubicula carû. Adsit quoq; sicut dixi, uestibulum
septum, in quo diuturno tempore esse possint, & in puluere noluta-
ri, dicta cubilia sint exculpta in parietibus, aut affixa firmiter, mo-
tus enim cum incubant nocet, in cubilibus cum parturierint palca
substerni debet, & cum peperint tollas substramē, & recens aliud
subijce, eo quod pulices & alia nasci solent, quæ gallinas quiescere
non patiuntur, ob quā rem oua ut inæqualiter maturescunt aut cor-
rumpuntur. Quæ uelis incubet, negant plus 25 oua incubare oportere

ere, quamvis propter fecunditatem peperit plura. Palladius an-
tem & mulieres nostræ ultra 17 uel 19 ova non supponunt. Fer-
tur tamen quod in quibusdam mundi partibus inveniuntur homines
qui furnos adeo temperate calefaciunt, quod eorum calor æqualis
est calere gallinæ cubantis, atq; in uno furno seu clibano ponūt mul-
titudinem pennarum parvarum, & mille gallinacea ova, post 20
dies nascuntur ac extra profiliunt. Optimum esse partum ab æqui-
noctio uerno ad autumnale, itaq; quæ antea uel post nata sunt non
sunt supponenda, & gallinæ quæ rostra aut ungues nō habent acu-
tos incubare debent, aliæ in concipiendo & ouando potius quam
incubando occupatæ esse cōuenit. Aptissime ad partum sunt anni-
cula aut bime incubantes includere oportet, ut die & nocte incu-
bent, præterquàm mane & uespere cum cibus & potio eis datur,
oportet ut curator circueat diebus aliquot interpositis, & ova uer-
tat, ut æqualiter calefiant, ova si plena atq; utilia sint nec ne aduer-
tere potes si dimiseris in aquam quod inane est natæ, plenum desi-
dit, quod intelligere potes si concutias. Uem si ad lucem substule-
ris, quod perlucet inane est. Oua oblonga acuta masculos, rotun-
da fæminas tribuunt, insuper ponenda ova obseruant ut sint nume-
ro imparia ova quæ incubantur. Habeant semen pulli nec ne cura-
tor quatrinduo postquàm incuba re cœperit intelligere potest si con-
tra lumen tenuerit, & purū quod uniusmodi animaduertit esse eij-
cere debet, ac aliud subijcere. Excussos pullos subducere debet ex
singulis nidis, & subijcere excussos pullos ei quæ habeant paucos,
ab æq; si reliqua ova sunt pauciora tollere debet, & subijcere illis
quæ nōdum excuderunt, et minus habent triginta: hunc enim gre-
gem maiorem non faciendū, ait Varro, diebus 15 primis pullis de-
bet obijci puluis, ne rostris noceat terra dura, eisq; milium optimum
& lolium & grana minutatritici satis competunt, sed gallinarum
pabula sunt quibus præcipue delectantur, uermiculi, triticeum, &
ferè omnia grana, & præcipue dandū est eis lolium, quod eis com-

petit, & hoc est humano corpori inimicū. Vinatiæ cibo sterilesunt,
 & hordeo semicocto parere saepe cogitur, & reddūt oua maiora,
 ut Palladius ait. Pulli parui proferendi sunt ad solem, & sterquilini-
 um, ut in eo volitari possint, quod ita validiores fiunt. Cum iam
 pennas habebunt consuefaciendi sunt, ut unam aut duas secentur
 gallinas, ut cæteræ potius ad pariendum sint expeditæ, quàm in nu-
 tritu occupatæ. Incubare oportet incipere secundū nouam lunā,
 eò quod plura quæ ante incubant non succedunt, diebus ferè 20 ex-
 cudent. Circa caueas gallinarum incendendū est cornu, nesciens
 accedat, cuius odore solent interire. Multas à uulpibus & quibus-
 dam alijs animalibus noxijs patiuntur insidias, idcoq; circa loca in
 quibus uersantur extirpanda & remouenda sunt omnia, in quibus
 uulpes latere possunt ad ponendas insidias. In nocte claudantur in
 caueis optime circumquaq; & septis, nec permittantur foras in no-
 cte iacere, fertur enim quod uulpis subdola intuetur eas, quantum-
 cūq; in alto existentes loco, ut uideant oculos eius lucentes, ut fac-
 culas, & cauda quasi baculo quodam minatur eis, ut sic perterritæ
 cadant & eas rapiat. Patiuntur etiam insidias miluorum, & qua-
 riundam aliarum rapacium auium, & præcipue aquilarum, contra
 quas tendantur funes uel uites seu uitæbæ, supra loca in quibus die
 morantur. Capiantur etiam uulpes taliolis, uel alijs artibus & mil-
 ui retibus, fisco uel laqueis. Pituita his nasci solet, quæ alba pellicu-
 la linguam uestit extremam, hæc leuiter unguibus uellitur, & locus
 cinere tangitur, & allio trito plaga mundata aspergitur. Item allei
 spica trita cum oleo sancibus infertur, staphisagria etiam prodest,
 si cibis assidue misceatur. Si amarum lupinum comedant sub oculis
 suis ipsa grana procedunt, ut ait Palladius, quæ nisi acu leuiter aper-
 tis pelliculis auferantur, oculos extinguunt, portulacæ succus forin-
 secus & mulieris lacte curari eas affirmant, uel arimomaco sale, cui
 mel & cyminum æqualiter misceantur, pediculis etiam plurimū mo-
 lestatur, & præcipue cū incubant, quos perimit staphisagria pari-

ter infusa cum uino, & amari lupini aqua, si penetrat secreta pen-
narum. Vtilitas gallinarum est, quia ex ipsis nascuntur oua, quæ
nutriant corpus humanū multū & subito, quibus utimur in cibarijs
infinitis, quæ optime seruari possunt diu si perfricantur sale minuto
aut muria per tres horas, deinde abluantur, & surfure ac paleis
recōdantur, uel semper teneantur in sale, ut quidā dicūt. Nē ex eis na-
scuntur pulli, qui cū sunt adhuc teneri sunt ad cibū optimi, & si cas-
strātur fiunt capones, qui melius ceteris pullis pinguescūt, & sunt
laudabilis nutrimenti. Caro etiā ipsarū gallinarum bona est, si adhuc
iuuēnes sunt & pingues, penne etiā ipsarū culcitris imponuntur.

De columbarijs quales esse debent,

Caput LXXXVII.



Columbaria duobus præcipue possunt fieri modis aut su-
per columnis & parietibus ligneis muro circūdatus lapie-
deo, aut super turri de grosso muro constructa, & utraq;
nidos seu nidorum foramina potest habere. Sed melior est quæ in
turri de muro quam de lignamine cōstruitur, & melius est interius
nidos habere, nam si exterius habet nidos finis ipsarū perditur, qui
magne utilitatis exstet, & earū pulli facile à rapacibus auibus cap-
piuntur. Fiat ergo turris lapidea lata uel angusta secundū domini
uoluntatē ac possibilitatē, nō alta multū, cum parietibus leuigatis ac
de albaui, albo cemento, habens ab omnibus quatuor partibus eius
quasdā breuissimas fenestrellas seu foramina, ut colūbis solūmodo
ad introitū exitūq; sufficiant sub quibus immediate sit circuitus qui-
dam lapideus emnens circū circa, qui ascensum mustelarū & aliarū
nocuarū ferarū impediāt super tectū fenestrā habeat, per quā in-
grediantur columbi, & exant qui libenter ad solē super tecto mor-
rantur. Sini aut cancellata de lapidibus aut lignis ne per ipsam ra-
paces uolucres alis apertis intrare queāt. Nidi formantur interius
quos quidā faciūt rectos, & mediocriter strictos, quidā obliquos
occultantes incumbantes colūbas, quēdā præterea provide faciunt
fenestrellas

fenestrellas latas, & modicum cōcavas seu longas, plures cultellos paruos circa parietes, & tectum affigunt asserentes in his columbas libentius incubare. Sed experimento didici quasdam esse columbas quæ libentius in muro quam cistellis nidificant, quasdam uero contrarium appetere, & iterum quasdam esse libentius in aperto, & super quacunque re cum nido uel sine nido incumbant, & quasdam libentius se occultant. Ideoq; non inutile puto in columbario cuiuscunque generis nidos habere, ut diuersis columbarū affectibus satisfiat, quāuis qui in muro sunt à fimo & sexcupedibus mundenatur facilius, quod crebro fieri expedit eo quod ab eis cum augmentantur plurimum incubantes columbæ lædantur. Est etiam oportu- num quod intra columbarium ponantur trabes in pluribus parti- bus, & præcipue in circuitu, & asides super quibus tempore plu- uiarum & niuium, & tempore superflui æstus columbæ in magna quantitate morari ac quiescere possint. Sic enim à loco proprio non facile deuiant, mundenatur etiam crebro ipsarum locus, & undiq; sit decorus, nam in pulchra domo sicut & homines morantur auia- dius. Et nota quod unumquodq; par tres uel duos ad minus uult ha- bere nidos, licet aliquando augeantur & multiplicentur in tantum quod replent nidos omnes, & solarium atq; trabes, & cætera loca omnia.

Qualiter noua columbaria debent primo mu-
niri columbis, Cap. LXXXVIII.

IN columbarijs nouis columbi senes ponendi nō sunt, nam recedunt & ad propria reuertuntur, sed ponendi sunt iu- uenes cum pennas completas habent, uel quasi cōpletas. Et ex his qui ponuntur meliores sunt saxaroli & post ipsos turgnē, sic à uulgo ex pennarum colore uocati, tales enim in columbarijs melius durare cernuntur quàm cæteri, albi uero uidentur omnino, nam durare non possunt, eo quod ab auibus rapacibus nimis remo- te nidantur, & quanto plures in primis ponentur tanto uelocius im- plebitur

plebitur locus, ponēde sunt præcipue mense Augusto & Septembri, uel etiam Iulio, quia tunc facilius inueniunt cibum in agris propinquis, propter quod non elongantur à columbario, nec perduntur. Mense autem Martio, Aprili uel Maio ponendi non sunt, propter contrariam rationem. Circa quindecim dies ad minus teneantur clausi uel inclusi, erit utilius, quia tunc erunt pinguiores & ad reuertendū peritiores, nam in primis quindecim diebus macra efficiuntur, quia tunc bene uacare ignorant, & cum inclusi morantur. Et postea quibusdam diebus tribuatur eis in columbario copiose bonus cibus & aqua, post dictum tempus aperiantur tempore nubilo uel sereno sed commodius pluuioso, quia tunc exeunt & reuertuntur interius, & non subito euolant ad remota.

Qualiter sunt tenendi ut libentius morentur,
& bene fructificent, Cap. LXXXIX.



Vi nascuntur in columbario uel parui ponuntur in eo non facile recedunt sed uadunt quandoq; ad alia columbaria in quibus inueniunt escam, quando nō præbetur eis in sua nec in agris inueniunt, & ferè omnes postea tēpore quo nō egent esca reuertuntur ad sua, & ad hoc ualet plurimum habere columbarium pulchrum & bonum. Si temporibus quibus non inueniunt escam copiose præbetur eis in sua, quod est cū nix uel fortis est glacies super terram, & mense Aprili & Maio aratis stipulis non recedunt, & plurimos focos edunt. Cibus autem eis conueniens est frumentum, faba, uicia, milica & cetera genera que libenter sumunt sentumq; parijs columbarum detur granorū pars corbis octana diebus singulis, & duplum cum nihil omnino per se inueniūt, potus etiam in columbario detur eis sufficiens, quotiens aquam nisi ualde remotam propter æstum uel glaciem inuenire non possunt, uel ponatur in aliqua re prope columbaria, ad quam descendere queant, itaq; præcipuum & ferè necessarium eis est, quod ipsorum mansio sit prope locum ubi aqua influat, unde & bibere & ubi la-

uari possint, permunde hæ uolucres sunt, ut ait Varro. Optimus est quod de omnibus granis exhibeatur eis, ut sunt frumenta, faba minuta, citrecula, uicia, orobum, milica, hordeum spelta, lolia, & cætera grana, ut uideatur quod libentius appetūt, & id præcipue datur eis, ut auidius ibi morentur, & pluries pariant. Palladius ait, quod fortius frequentat si hordeum torrefactum uel orobum uel fabam sæpe consumant. Dicit etiam, quod nihil expectant nisi ut æstate que maxime pinguescunt triticum uel milium malsa maceratum semper accipiant; Est autem malsa aqua mellis in qua quæcunq; grana mollita sunt eisq; data non recedunt, & alias illic ducunt, ut à non paucis asseritur. Alij autem dicunt non referre an sit mellita esca an non, cum eis datur esca in uespere potius quam in mane, ut in die procurent escam sibi querere, & qui non inueniunt intus inueniant. Nam si daretur in mane non procurarent alibi inuenire, sed tempore minus debet in mane tribuere, ne exeant ad loca in quibus capiuntur, cum certum est alibi non posse inuenire.

De officio pastorum columbarum, Cap. xc.

Pastor columbarum sæpe debet eis mundare locum, & siam reponere qui ad agriculturam est optimus, & si quem inuenerit uulneratum curet, si quem mortuum eiciat. Item si qui sunt nimis feri & bellicosi, ut alios ledant, eos inde remoueat, & in alium locum secretum ab alio se ponat. Si qui pulli donei sunt ad uendendum eos promat, cibum & potum cum opus erit sufficienter eis tribuat. Qui solent saginare columbinos pullos quo pluris uendant, secludunt eos, cum iam sint pluma tecti cibantq; illos pane calido mollificato & masticato uel molli: hyeme bis, æstate ter quolibet die, scilicet mane, meridie & uespere: eos uero qui iam pennas magnas habere incipiunt, relinquunt in nidis, fractis cruribus, matribus nutriendos & impinguandos, uel extrahunt de pennis unius alæ, nam qui ita educantur celerius impinguantur

quano

quàm ceteri, ut ait Varro. Item debet eos curare & tueri ab omnibus nocementis, leduntur enim & capiuntur ab accipitre, miluo, & falcone, & ceteris quibusdam avibus rapacibus, quos occidere potest duabus virgulis viscatis in terra defixis inter se curvatis, cum inter ipsas posuit animal obligatum sic enim ea facile decipere debet & potest. Palladius præterea dicitur oportere rula ramulos pluribus locis suspendere contra animalia inimica. Item leduntur à saginis, mustelis & cættis, & ceteris pluribus animalibus, quæ de rapta autum vivunt, contra quæ debet custos ostium & omnia loca unde intrare possunt optime claudere, & stasas circumquaq; eminentes procurare ne quid superius per parietem repere possit. Item leduntur ab avibus rapacibus tam diurnis quam nocturnis, contra quas claudat custos de nocte fenestram, vel si ea aperta intraerit avis rapax, & ipse audiat spænentum & strepitum columbarum, intret audacter in eam cum lumine, avemq; capiat & occidet, nec curet de exitu columbarum. Aves autem duntur nas cum visco vel parva reticula capiat & occidat, fenestram autem de subsellis cancellet & claudat, ut columbi intrare valeant & exire, non autem avis rapax, quæ solummodo intrat alis apertis. Item molestantur pulli plerumq; sexcupedis quod custos inquirat, & nidum abijciat, aliumq; mundum ponat. Item nascuntur eis uatrioli circa oculos qui excocant eos, maxime mense Augusto. Vendendi sunt aut comedendi cum solo capite sunt infelli. Item recedunt aliquando quia non habent quid edant, contra tribuatur eis: vel quia nimium ab animalibus rapacibus infestantur, aut terrentur, contra quæ vivat ipse custos, ut dixi. Item moriuntur ex senectute, nam ultra octo annos non inveniuntur in columbarijs durare, ut dicunt experti. Item debet custos sæpe ad eos accedere, & quotiens in columbarium intrat aliquam escam modicam secum portare tempore congruo, eosq; semper aliquo certo & consueto modo vocare, ut magis domestici fiant. Item debet custos tegulam figuli pro-

aqua habere in columbario, quæ aſidem habeat ſupra ſe aliquantulum eleuatam, habentem multos & ſpiffos pedes incifos atq; adhærentes, inter quos poſſunt caput ponere, & aquam haurire nec in uas intrare, ut aqua munda permaneat.

De utilitate columbarum, Cap. xci.



Nihil columbis facundius, ut ait Varro, nam diebus 40 cōcipit, parit, incubat, & educit, & hoc ſerè per totum annum faciunt, tantūmodo internallant à bruma ad æquinoſium uernum, pulli naſcuntur bini, qui ubi ſimul accreuerūt, & habent robur cum matribus pariunt, ſed experti noſtri temporis in partibus noſtris dicunt, quod poſt ſex meſes pariunt & nō ante, & donec nūunt quatuor uicibus & quinq; & ſex, & amplius faciunt pullos in anno ſi eſcam inueniant uel habeant abundanter, quod ſi nihil tribuitur ter ad minus pariunt, ſcilicet in æſtate, pullo rum carnes ad eſum ſunt ualde bonæ ac delectabiles, & libenter emuntur. Item ipſorum finius eſt optimus omnibus plantis & ſennibus, & poteſt ſpargi quocunq; tēpore anni quotiens aliquid ſeritur cum ipſo ſemine, ac et à poſtea quodocunq;, & unaquæq; corbis ipſius æquualet ſimi onium quadrapedum uni plantro, nam ex uiginti corbis ſatis commode, ex 25 bene, ex 30 optime impinguatur iugerum frumenti, ſi manibus per agrum ſpargatur æqualiter, & cum ipſo grano tunc ſato uertatur. Et nota quod tria parria columbarum in anno faciunt corbem ſimi, ſi columbaria mdoſ intrinſecos habeant, & quantomagis cibantur in eo tanto plus ſimi recipitur ab eis, quia diutius moratur in ipſo, nec ſemper coguntur extra quærere uictum. Item eſt alia utilitas, ut generaliter prædicatur, quod poſſunt prouincijs cum literis ſub cauda uel ala ligatis ad loca longinqua tranſmitti, ſi de loco ad quē deſtinantur delati ſunt ad locum unde mittuntur. Item refert Palladius, quod neſcio ſi ſit uerum, quod inducunt alios ſi cymino paſcuntur aſidue, uel ſi ſiriciæ arum baſami liquore tangantur.

De turturibus

De turtoribus, Caput xci.

Pro turturibus locum constituendum provide magnum, prout multitudinem alere uelis. Item ut de columbis dictum est, ut habeant ostium ac fenestras & aquam puram, ac parietes munitos testorio, & in eis habeant multos palos infixos, super quibus commode morare possint, & locum paratum congrue in quo pascantur. Cibati obijciunt triticum siccum in cen-
tenos uicenos turtures serè semodium, quotidie purgantur eorum stabula à stercore, ne ledantur, quod quidem seruatur & est bonum ad agrum colendum. Ad saginandum aptissimum tempus est circiter mensem, & cum matres eorum plurimos gignunt pullos in quibus maxime fructus consistit. Aucupatores tamen Lombardie præcipue Cremonæ tota æstate turtures seras rebus capiunt, & in domusculam clausam & quæ lumen habeat includunt, eisq; dant continue aquam puram, & milium quantum sumere uolunt, & usq; serè ad hyemem uel post partem autumnis seruant, sicq; quinquagintas & mille quandoq; congregant, quæ ineffabiliter impinguantur, & sic impinguitas optime uendunt.

De turdis & merulis & perdicibus atq; conturnitibus impinguandis, Cap. xcii.

Qui uult prædictas aues uel alias quæ pingues care ueniunt habere, locum faciat clausum & tegulis uel rete magno coopertum, magnum secundum quantitatem animi-
um quas includere uolet. In hoc tectum aquam uenire oportet per fistulam, & eam per cannales angustos serpere, qui facile ex-
tergi possint, nam si lata diffusa esset aqua inquinaretur facilius & biberetur inutilius, & quæ superat ad potum animi per fistulam exeat, ne luto aues laborent, ostium habere debet humile & angustum, quo custos nix intrare queat, fenestras raras, per quas non uideantur extrinsecæ arbores, aut aues, eo quod earum aspectus ac desiderium macrescere facit uolu-

eres inclusos, tantum luminis locum habere oportet, ut aues uide-
dere possint ubi assidant, ubi cibis, ubi aqua sit circa ostia ac fenestras,
talis sit munificio, ne mus uel mustela uel alia bestia intrare possit.
Circa huius edificij parietes intrinsecus multi sint pali, ubi aues
assidere possint, & etiam pertice inclinatae ex humo ad parietes,
quibus multae perticae adnectantur ex transuerso modicis intervallis
ad speciem cancellorum, cibatu turdorum ponantur offe glomeratae
ex ficis & farre mixto, ceteris tribuantur grana quibus uti consue-
uerunt, & ea praecipue auide sumunt, diebus uiginti antequam tol-
lere uult turdos, largius det cibum & farre subtiliore incipiat ale-
re. Cum opus est ut ex hoc sumantur amario, excludantur idoneae
in minusculum amarium quod est cum maiore coniunctum; ostium lu-
mine illustriore ibi sit, cum numerum habet exclusum quem sumere uult
omnes occidit, hoc ideo in secliso clam debet facere, ne reliqui si ui-
deant terreantur, & ante tempus uenditionis moriantur. Utilitas
& delectatio in his est, quia multi parui precij includuntur, & im-
pinguati care uenient & dominorum cui satisfaciunt ad uotum pro-
se & quibuscumque uoluerint quotienscumque fuerit oportunum.

De sedibus apium & loco ipsis con- gruo, Cap. XCIII.

DE apibus tractaturus dicam primo de ipsarum statione
seu sedibus, de quibus dicit Palladius, quod locari debent
in aliqua horti parte secreta & aprica, & calida, & a
uenis remota. Nam ipsi prohibent pabulum ferre domum (ut ait
Virgilius) non longe ab habitabilibus domibus, ut furum & accessus
hominum fecundumque submoueatur, ubi sit abundantia florum quos
uel in herbis uel fruticibus uel etiam arboribus procreet industria.
Sint autem arbores a septentrionali parte dispositae, fons uel riuus
sit qui formet humiles transcendendo lacunas. \ arro autem dicit, se-
dens earum esse oportere iuxta nullam dominicam, sed potissimum
ubi

ubi non resonent imagines, id est, voces cchi. Hic enim sonus fugæ existimatur earum esse. Item esse debere, dicit, in aëre temperatio, neque æstate nimium calido, neque hyeme nimium frigido, ut spectent potissimum ad hybernos ortus, id est, ad eam partem in qua hyeme sol oritur, quæ propè se loca habeant ea ubi pabulum sit frequens et aqua pura. Virgilius vero addit, quod ante ipsarum hostia frondentes arbores debent esse. Item dicit, quod in aqua quæ ibi stabit iners seu profluit debent conspici transversæ salices et grandia saxa, ut pontibus crebris possint consistere, et alas pandere ad æstivum solem. Iterum ait Palladius, quod podia trinis alia pedibus fabricentur, et opere albario leuigentur, propter lacertarum ceterorumque animalium noxiam, quibus est moris irrepere, et super podia aluearia collocentur, ita quod imbre penetrari non possint. spaciolis inter se distantibus segregata. Item ut Virgilius ait, à loco apum abesse debent oues et hœdi, qui floribus insultant. Item vaccae ne rorem deglutiant, et surgentes alterant herbas. Item abesse debent stelliones et lacerte, ac hyrūdines, ceteraque aves nocivæ, quæ insidiantur et nocent eis. Absit etiam gravis odor coeni et quantum libet aliarum rerum.

De aluearijs qualia esse debent,
Caput xcv.

Aluearia meliora sunt (ut Palladius ait) quæ cortex formant, maxime raptus ex subere, quia non transmittunt nimis frigoris vel caloris. Possunt tamen ex ferulis fieri. Si hec desunt, salicinis nimibus fabricentur, vel ligno caute arboris aut tabulis. Fustilia deterrima sunt, quæ et hyeme gelantur, et æstate feruescunt. Angustus tamen aditus admittat examina propter frigoris iniuriam et caloris. Sane ventis frigidioribus paries altus obsit, aditus omnes solo opponantur hyberno, qui in uno cortice duo vel tres esse debebunt, ea magnitudine quæ ingressu apis magnitudinem non possit excedere. Sic etiam non

xijs animalibus ingressu resistatur angusto, uel si apes uoluerint obsidere exeuntes alio utentur ingressu, nam si aditus non sunt angusti (ut ait Virgilius) frigore mella cogit hyems, eademq; calor liquefacta remittit, utraq; uis apibus pariter metuenda est, sed pro magna parte homines nostri temporis uno solo mediocri utuntur foramine, infra mediam aluei partem. Item debent aluearia esse magna pro magno examine, parua pro paruo, licet in paruo saepius examine emittant, quia duo examina in paruo simul esse non possunt, alta seu longa sint uno pede & dimidio, uel duobus, et lata circa duos semisses aut modicum plus uel minus. Vir autem expertissimus mihi asseruit, quod meliora sunt aluearia quadrata ex tabulis constructa quam rotunda. Et melius, quod iaceant antierius parum decliua quam erecta, quo comode possint acies una super aliam collocari, & haec aluearia fundum ab utraq; capite habere debent taliter dispositum, quod inde possint facile remoueri cum opus erit de melle tolli, fundus anterior habere duo foramina parua, & posterior unum in parte infima debet, per quae ab utraq; parte ingrediantur & egrediantur apes. Retulit etiam se inuenire ipsas ne uis laborare cum aluear interius sit obscurum, quod argumentum est, quod foramina debent esse parua, & rimulae omnes aluei optime sigillatae, ad quod multum facit eorum industria, uidemus enim quod foramina magna circa hycem cera obturant, foramine solo relicto ad formam ipsarum.

De Apibus qualiter nascantur, Cap. xcvi.



Pes nascuntur partim ex apibus, partim ex bubulo corpore putrefacto (ut ait Varro) secundum modum similem. Virgilius ait magistrum Archadium primum huius rei fuisse autorem, & inuenisse modum, eligitur ergo locus angustus, parietibus clausus, angustoque imbrice tecto, habens quatuor oblique fenestras, tum titulus bima quaeritur huic gemine nares & spiritus ori

ori multum reluctanti obstruitur plagisq; perempto tonsa viscera solvuntur per integram pellem, sic positum in loco clauso relinquit, & ramea fragmenta costis subiiciunt, thimum videlicet castiasq; recentes, hoc geritur cum zephyrus primo spirat, antequam prata virescant, & antequam hyrundo veniat, nidumq; suspendat, tunc humor vituli tepesactus aestuat, & apes creat, quæ primo sine pedibus apparent, mox stridentibus pennis miscentur.

Qualiter emi debent, & qualiter deferantur & qualiter inveniuntur, Cap. XC VII.

IN apibus optime sunt parue, varæ rotundæ (ut ait Varro) in emendo emptorem videre oportet valeant an sint egræ. Sanitatis signa si sunt frequentes in examine, & si nitida, & si opus quod faciunt est æquabile ac leue. Minus valentiũ signa sunt pilosæ & horridæ, ut pulcrulæ. Providendũ est ut plena cõparentur aluearia, quã rem uel inspectio uel murmuris magnitudo uel frequentia cõcantis uel remanentis examinis probat. Si transferendæ sunt in alium locum id facere diligenter oportet, & tempora quibus id potissimum facias animaduertendum, & loca quo transferas idonea providendum, tempore uerno potius quam hyberno, nam hyeme difficulter consuecunt trãslata manere, itaq; fugiunt plerumq; si ex bono loco transituleris, & ubi idonea pabulatio non sit fugitiuæ sunt. Ex uicina potius quam longinqua regione transferendæ sunt, ne terreantur aëris nouitate. Si uero sunt longius aduehendæ, collo nocte portentur, nec collocare nec aperire aluearia debemus, nisi uespere instante. Speculemus deinde post triduum ne omnes suas ianuas examine egrediantur, hoc enim signo fugam arripere meditantur, non tamen creduntur fugere, si stercus primogeniti vituli illiniamus oribus nasculorum, ut Pallad. ait: mense aprili: (ut idem ait) locis apertis apes queremus, ac prius quam longe aut prope sint exploremus, rubricam liquidam uel quid aliud tingens breui nasculo geramus infusam, & obseruemus

fontes aut aquas uicinas, tunc dorſa apud bibentium tanguantur illo liquore tinſta feſtucca, & ibidem moremur ſi cito reuerſa fuerint quas tinxi- mus, hoſpitia eorum proxima eſſe cognoſcimus, ſi tarde ſpacio longiore ſubmota quod pro mora temporis extimamus. Ad proxima facile uenies, ad longinqua hoc genere producimur, canne unum internodium cum ſuis recides articulis, & latere aperies, ubi mel exiguum mittes, & iuxta fontē pones cū ad id peruenerint apes atq; ingreſſa fuerint poſt odorem foramen pollice compoſito claudes, & unam tantum patiaris exire, cuius fugam perſequere, ea tibi partem demonſtrabit hoſpitij, cum eam ceperis, non uidere continuo emittes alteram, & ſequeris, ita ſingula ſubinde diſmiſſe te facient uſq; ad locū examinis peruenire. Aliqui mel circa aquas ponunt in uſculo, de quo cum apes aquam deguſtauerint ad commune pabulum pergens alias exhibebit, quarum ſrequētia ſubinde crescente notata uolantium parte uſq; ad examina perſequeris.

Qualiter tenendæ & procurandæ ſunt
apes, Caput xcviii.

Cuſtos apum procurare debet ut circa ipſarum locū ſit abundantia florum, quos uel in herbis uel fruticibus uel arboribus procuret industria, herbas nutriat origanum, thimum, ſatureiam, ſerpillum, uiolas, amaracum, hyacinthum, iris, uel gladiolus dicitur, & narciffus creticus, ceteraſq; herbas ſuauiſ odoris, & floris, in fruticibus quoq; ſint roſæ, lilia, roſmarini, ederae in arboribus, amygdalus, perſicus, pirus, pomiferaeque arbores, quibus nulla amaritudo reſpondet floris uel ſucci. Sylueſtria uero glandifera robora, buxus, terebinthus, lentifcus, cedrus, tilia, pinus, & taxi remoueantur. Supradicta enim dulce mel efficiunt, cetera ſaporem ruſtici mellis præbent, ut Palladius ait. Ea præcipue ſunt ſerenda, ſi pabulum naturale non eſt (ut dicit Varro) quæ maxime ſequentur apes, ut ſunt roſæ, ſerpillum, apiaſtrum, papauer, faba, lens, piſum, cginum, medica, maxime

maxime ualentibus utilissimum est, etenim ab æquinoctio uerno florere incipit, & permanet ad alterum æquinoctium autumnale. Sed apium ad sanitatē aptissimū, ad mellificium thimū, his aquam liquidam unde bibant esse oportet, eaq; propinquam quæ non fluat, uel in aliquem locum influat, ita ut ne profunda ultra duos uel tres digitos sit, in aqua iaceant testæ aut lapilli, super quibus asidere & bibere possint. Diligens habenda cura est, ut aqua pura sit ad bonum mellificium uehemēter prodest, & quia non omnis tempestas gradinum uel pluiarum aut uenti uel frigoris eas ad pastum prodire longius patitur, præparandus est his cubus ne melle cogantur solo uiuere, aut relinquere examinatas alueos. Igitur ficorum pinguium circiter decem pondo decoquantur in aqua congijs sex, quas coctas in offas sæpe apponunt. Alij aquam mulsam in uasculis ut sit prope curant, in qua addunt lanam puram, per quam sugant uno tempore ne potu nimium impleantur, aut incidant in aquam, & singula uasa ponunt ad alueos. Alij uiam passam & ficum cum pistauerint effundunt in sapam, atq; ex eo factas offas apponunt ad quas in hyeme ad pabulū procedere possint. Verno tempore & æstiuo ferè ter in mense mellearius inspicere debet fumigās leuiter eas, & à spurcicijs purgare aluum, & uermiculos eijcere. Præterea ut animaduertas ne reguli plures existāt, inutiles enim sunt propter seditiōes. Nā duo sunt genera ducū, ut Moecen. et Virg. scribūt, niger & uarius qui melior est, debet ergo mellarius interficere nigrum, qui alteri regi seditiosus est, & corrūpit aluum, eo quod fugat aut cum multitudine fugetur, & sic sedabitur apum pugna, ut Virgilius scribit. Mense Maio (ut ait Palladius) incipiunt augeri examina, & in extremis fauorum partibus maiores creantur apiculæ, quas aliqui reges putant. Sed (græcis κῆρυξ dicitur hoc genus apis,) quia requiem concutiunt quiescentis examinis. Nunc papiliones abundant quos necare debemus. Item circa initium à foradibus liberandi sunt aluei, quia tota hyeme eos mouere aut aperire

non possumus, sed hoc die aprico & tepido facienda sunt, ut pen-
 nis maximis aut magnarū quæ habent rigore, uel alio simili omnia
 interiora mundentur, quæ manus non ualebit attingere, tunc rimas
 omnes quæ sunt extrinsecus luto et fimo bubulo mixtis liniantur, &
 insuper genestis & alijs tegumentis ad porticus similiter operia-
 mus, ut à frigore possint & tēpestate defendi. Bonus custos men-
 se Septembri debet aluearia uetusta cognoscere, & plena & gra-
 nia quæ in æstate non adiderunt examina uendere, ac apes occide-
 re, & facere mel eorum eo modo sicut infra suo loco dicitur. Item
 debet custos, ut experti affirmant, tenere in æstate aluearia cū subti-
 libus fragmentis tabularum, paululum eleuata, quo apes uix ingre-
 di & egredi possint, sed non lacertulæ. In hyeme uero cum fimo
 bubulo per optime obturata. Item cum nimis depauperantur mela-
 le, quod cognoscitur uisu si subtus inspiciatur, facto supra partem
 mediā paruo foramine ac per ipsum munda uirgula intermissa ex-
 hibeat eis mel uel pullum assatū, uel alias carnes. Item dicūt, quod
 si alueus pinguis est dimittantur hyeme super sedibus suis, si macer,
 ponatur in medio in loco obscuro, preparato ne mures obsint.

De nocumentis apum & earum cura,

Caput xcix.

Prouidendum est (ut ait Varro) ne infirmiores à ualen-
 tioribus opprimantur, eo enim minuitur fructus, itaq; im-
 becilliores secretas, occiso rege ocioso, subiiciūt alteri re-
 gi. Si crebrius inter se pugnabunt aspergi eas oportet aqua mulsā,
 quo facto non modo desistunt à pugna, sed etiam consortiant se lin-
 gentes, eo magis si melle sunt asperse, propter odorem auidius ap-
 plicant se atq; obstupescunt. Si ex alueo minus frequentes euadunt,
 aut subsidit aliqua pars subsumigandum & prope apponendum
 aliquid bene olentium herbarum, maxime apiasrum & thimum.
 Prouidendum uebementer ne propter æstum aut propter frigus,
 dispareant. Si quando subito imbri in pastu sunt oppressi, aut fri-
 gore

gore subito, quod raro accidit ut decipiantur, guttis offensa, iacent prostrate, colligendum eas in vas aliquod, & reponendum in tecto loco tepido & bono cinere tepido, plus calido quam tepido, efficiendum super eas, & excutiendum leuiter uas & apes, manu non tangas, & ponendū in sole quo reuiuiscant iuxta suos alueos, ut ad domicilia redeant. Si uero aegre sunt, quod his cognoscitur signis (ut Virgilius ait) quod continue est in aegris alius color, horrida macies multum deformat eas, corpora mortuarū extra efferuntur: alie pedibus annexe ignauaeq; ad limina pendent, aut intus in adibus omnes certant, ignauaeq; fame sunt & contracto frigore pigrae, tunc sonus auditur grauior & susurrant, ut in syluis immurmurat auister, & ut mare stridet refluentibus undis, & ut clausis fornacibus rapidus aestuat ignis. Tunc galbaneos incende odores. & etiā cannalibus arundinis melle exhibeas & proderit si gallae contritae saporem admisceas, aut arentes rosas, aut frusta carnis affata praebas, aut uuam passam, aut thimum uel centauream, aut radices herbae, quae rusticis uocatur amello, pone in odorifero bacho, & in canistris ad fores apum. Haec herba cognoscitur, quia in pratis oritur & tollit stipitem uelut syluam, & eius folia plurima circumfunduntur, eius flos est aureus & asper in ore sapor. Eugemus etiam (ut ait Palladius) lacertas & ranas & cetera animalia, quae sunt apibus inimica. Aues etiam crepitaculis terreamus, mense Martio maxime solet apibus morbus incurrere, nam post hyberna ieiunia tithymali & ulmi amari floribus qui prius nascuntur auidius appetentes solutione uentris intereunt, nisi affueris uelocitate remedij. Praebis ergo maligranicum auslero uino grana contrita, & in uasculis refrigerata ponantur. Quod si horridae uidentur, ac contractae corpore, silere & mortuarum corpora frequenter esse ferre, cannalibus ex canna factis mel cum galle puluere uel succe rosae coctum debebis infundere. Ante omnia studebis, ut putres partes fauorum uel uacuas ceras quas aliquo casu examen ad pau-

citatem redactum non ualebit implere, semper recidas acutissimis ferramentis subtiliter, ne pars alia remota fauorum cogat apes domesticilia concussa deferere. Si propter abundantiam florum de melale tantum, sed de prole nihil cogitant, & uideris nimietatem, interiectis ternis diebus, clauso foramine, non eas patiaris exire, ita ad generandum se conferent Nunc circa calend. Aprilis extrandi sunt aluei, ut omnia purgamenta tollantur & sordes, quas tempus contraxit hybernium, & uermiculi & tinea & aranea quibus corrumptur usus fauorum, & papilioncs qui stercore suo uermes faciunt. Modus autem occidendi papiliones est hic (ut Palladius ait) uasculum altum æneum & angustum uespere inter aluearia colloccemus, & in eius fundo lumen ponamus accensum, illuc papiliones conueniunt, & circa lumē uolitant, & angustia uasculi ab igne proximo interire cogentur. Tunc fumus stercoreis bubuli sicci adhibetur, qui aptus est apum saluti, quæ purgatio frequens usque in autumnii tempora celebratur. Hæc omnia cæteraq; efficiet custos castus & sobrius, & alienus ab alueis & cibis acerbis, & odoris immundi, atq; omnibus safasamentis.

De moribus & industria apum, & uita ipsarum, Caput c.

Apes non sunt solitaria natura, ut aquilæ, sed ut homines, nam in his est societas operum & edificiorum, in his ratio atq; ars. Foris pascuntur, intus opus faciunt, nulla horum assidit in loco inquinato, aut eo qui male oleat. Et si quando in aëre dispersæ sint, cymbalis & sonis se reducant in locum unum, regem suum sequuntur quocunq; ierit & fessum subleuant, & si nequit uolare sustollunt, quod cum seruare uolunt, neq; ipsæ sunt ociosæ, nec non oderunt desidēs, itaq; impetum facientes ab se eliciunt fucos, quod hi neq; adiuant, & mel consumunt, quos uociferantes plures persequuntur, & paucæ propter ostium aluei obturant omnia: Ne ueniat inter fauos spiritus omnes ut in exercitu

vivunt, atq; alternis horis dormiunt, & opus faciunt pariter, & ut in colonias mittunt, horumq; duces faciunt quædam aduocem, ut mutatione tube, tunc id faciunt cum inter se signa pacis ac belli habent. Ex malopunico & consparago, cibum capiunt solum, ex olea arbore mel, sed non bonum, duplex ministerium præbetur ex faba, apiastro, cucurbita & brassica cæra, & cibus, item ex malo & pyris sylvestribus, ex papauere cæra & mel, ex nuce græca triplex ministerium fieri dicitur, & ex lapsano cibum mel & cæra. Item ex alijs floribus ita capiunt, ut alia ad singulas res sumant, alia ad plures. Item ex alia re faciunt liquidum mel, ut ex ciccris flore, ex alia e contra spissum, ut rore marino. Sic ex alia mel insuave, ut ex fico, cythso bonum, ex thimo optimum, ut ait Varro. Præterea Virgilius ait, quod ipsæ aulæ & cætera regna fingunt. Sepe etiam errando in duris cotibus attriuere alas, utroq; animum sub fasce dedere, tantus est amor florum, & generandi gloria mellis, licet sint brevis vite, nam ultra septennium non uiuunt, quamuis earum genus materiat immortale.

Quando quare & qualiter exeunt examina,
& quomodo præcitur earum
exitus, Caput CI.

Laxamen exire solet, ut Varro scribit, cum apes natæ prospere sunt multæ, & progeniem incolumem mittere uolunt, ut olim crebro Sabini fecerunt propter multitudinem liberorum, quod duo solent præire signa, unum quod superioribus diebus maxime uespertinis multæ ante foramen, ut uix aliæ ex alijs pendent conglobatæ, alterum quod cum iam uolaturæ sunt, aut etiam inceperunt cōsonant uehementer, ut milites & populi faciunt, cū castra mouēt, quæ primo cū exierunt in cōspectu uolant, reliquas quæ nondū exierūt expectantes, donec omnes cōueniant. Virgilius autem scribit, quod aliquando exeunt ad pugnam, nam sæpe duobus existentibus regibus oritur magna discordia inter eos
& eorum

Et eorum sequaces, quod cognoscitur, quia tunc sonus magnus ad modum tubarum auditur, tunc trepida inter se coeunt, pennisq; consistant, spicula exacutit, rostris aptantq; lacertos, Et circa regem miscentur. Et densantur, magnisq; uocant clamoribus hostem, tunc erumpent Et concurrunt, Et mixtae glomerantur, Et magnus fit sonitus, precipitesq; cadunt densiores grandine Et glande, cum decutitur, ipsi reges per medias acies ingenti animo inter se bellant, fulgentibus alis, nec pugnae cedunt, dum fuga illum aut illum uictor terga dare cogit. Hi motus animorum atq; haec tanta certamina, iam elu exigui pulueris requiescunt, uerū cum ambos duces Et acies reuocaueris, deteriorem ne amplius obsit dede neci, Et meliorem reponere in aula, nam duo sunt genera, melior est aureus, alter horridus. Item exeunt aliquando ob inanem delectationem, ut idem Virgilius scribit, quod cognoscitur, quia per aëra uolando ludunt, quod facile prohibere potes, eripere enim debes regibus alas, ne in altum uolare possint. Palladius autem scribit, quod futura fuga seu exitus examinis praescitur, quoniam per biduum aut triduum ante acriter tumultuantur Et murmurant, quod apposita frequenter aures cognoscitur.

Qualiter examina sunt colligenda & includenda, Caput CII.

Cum custos apum uidet examen exiisse atq; in aëre permanere, statim debet puluerem in eas effundere, Et alicuius rei sonitum fortiter facere, ut territa longe non cant, sed se in aliquo proximo loco suspendant, Et cum uiderit ubi se ponere uolunt, herbas uel ramulos arborum in quibus delectantur in perticam bene ligatos ibi apponat, ut super ipsos se suspendant, Et cum omnes ibi conuenerint, eas in terram deponat, Et alueum super eas collocet, in quem intrabunt, in proprio loco ubi stare debebunt ne sperere collocandum, uel paruum alueum odorifero uino confectum, qui alueolus uocatur, cum pertica ponat in eum locum, ubi se suspendunt

pendunt, uel se integre suspenderūt, in quem per se uel fumo ingre
diuntur, & cum omnes intrauerint deponātur sub uno scamno, spa
ciose forato, & nouus alueus optime purgatus, & odorifero uino
asperfus, & foeniculis uiridibus aut alijs odoriferis herbis, & pau
co melle perfricatus, supra eum apponatur, remoto superiori fun
do aluoli, ut in nouam per se uel beneficio fumi domum intrent,
cum qua uestpere in suo loco ponantur. Quod si iam in aliquo rā
mo se suspenderint incidatur acutissimo ferro, & suauiter depo
natur, & super eum collocetur aluolus, & fiat ut dixi, cum in
bærent uel ramulis uel ad perticam se suspendunt. Quod si exa
men integrum colligere non potes, & quamlibet partem sub al
ueo collocare. Quod si contingeret te regē cum una parte habere,
omnes aliæ particule ad eum ueniant per se ipsas, & si iam in ali
quam arborem perforatam intrauerint ad locum unde intrant &
exeunt admoceatur aluolus, & per aliquod magnum foramen
sub apibus nouiter factum, immittatur fumus, ut in aluolum fugi
ant desuper collocatum, uel in ramusculos ibi appositos, si aluolus
non habetur. Et sic in uer plures uices poterunt omnes haberi.
Vel eadem arbor si subulis est cum ferra recidat acuta desuper,
atq; infra, & ueste munda coopertatollatur, & in nouum alue
olum expellatur, uel per se in sedibus collocetur, aut ex ipsa arbo
re expellantur in totum, & cum se in aliquo ramo suspenderint
uel suspendere uolunt, fiat, ut dictum est de his, quæ sponte rece
dunt. Si autem se suspenderint in herba uel frutice uel alio loco su
pra quem nouus aluolus poni possit, non est aliud agendum, nisi
quod in eo recipiatur, & super podijs uestpere collocetur. Item
si suspenderint se in aliquo alto uel inepto loco, de quo prædictis
modis haberi non possit, excutiantur longissimis perticis, ut in ter
ram cadant, uel incongruo loco se ponant. Custos autem cum ta
lia procurat, ut Palladius scribit, debet esse purus, & ab omni im

mundicia & odore alicuius acredinis, uel alterius mali saporis liber. Item sollicitus & attentus habens semper aluearia noua parata, quibus recipiatur examinum rudis iuuentus. Nam nouellæ apes uagantibus animis, nisi seruentur fugiunt. Exeuntes in adiuto suo morantur uno aut duobus diebus, quæ statim nouis aluearijs excipiendæ sunt, obseruabit autem custos assiduus usq; in octauam uel nonam horam mense præcipue iunio, & cum signa futuræ siccitatis percipiet, quia post has horas non facile fugere aut amigrare consueuerunt, quamuis aliquæ statim & procedere & abire non dubitent. Item cum ad pugnam exierint, & se in ramo uel alio loco suspenderrint puluere uel alia re aspergat, & si uinus uerbis educatione pendebunt, noscat aut unum regem esse omnibus, aut reconciliatis uniuersis manere concordiam. Si uero duo uel plura ubera suspendens se populus imitatur, & discordes esse & tot reges esse quot ubera consistunt. Vbi globos atq; frequentiores uiderit, unctâ manu succo meliloti uel apij reges requirat. Sunt aut paulo maiores, oblongi magis quàm ceteræ apes, rectoribus cruribus, neq; grandioribus pennis, pulchriores & nitidi, leues absq; pilo, n si fronte pleniores, quasi capillum gerunt in uentre, quo tamen non utuntur ad uolatus. Sunt alij fusci atq; hirsuti, quos oportet extinguere & pulchræ orces relinquere, quæ uero frequenter uagentur, cum examinum suis alis seruentur crebris, hoc enim manente nulla discedit. Si non satis magna nascuntur examina duorum uel plurimum nasculorum possumus in unum conferre dulci tamen liquore aspersas apes atq; incusatas tenebimus apposito cibo mellis, exigua tamen respiramina relinquamus aperta. Quod si uelut aluearum cui per aliquam pestem multitudo subducta est populi adfectione reparare, considerabis in alijs abundantibus, cauandum fauorum & extremitates quæ pullos habent, & ubi signum nascituræ regis inueneris, cum sobole sua recedes, & in

aluearium

aluearium ponas. Est autem hoc regis futuri signum inter cetera foramina, quæ pullos habent, unum maius ac longius, uelut uber apparet. Sed tunc transferendæ sunt, quando crasis co-
 operculis ad nascendum maturi capita nituntur exercere, nam si immaturos sustuleris interibunt. Si autem se subitum leuabit exa-
 men, strepitu æris ac testule terretur, tunc ad aluearium redi-
 bit, uel in proxima fronde pendebit & inde in nouam uas her-
 bis consuetis & melle confersum manu attrahatur, uel in trulla,
 & cum in colloco requieuerit, uespere inter alia collocetur.

Quando & qualiter potest apibus de melle tolli, Cap. CIII.

Mense iunio secundum, Palladium, aluearia castrabun-
 tur, quæ matura esse ad mellis reditum signis pluribus
 instruemur, primum si plena sunt, subtile murmur audi-
 mus, nam uacue sedes fauorum, uelut concaua ædificia uoces, quas
 accipiunt in altum extollunt, quare cum murmuris sonus magnus
 & raucus est, agnoscimus non esse idoneas ad metendum crates
 fauorum. Item cum sucos qui sunt apes maiores grandi intentione
 perturbant, iam matura mella testantur. Item secundum Varro-
 nem, signum ex mendorum fauorum est, si intus faciunt globum.
 Item si fauorum foramina obducta sunt, quasi membranis quia
 tunc sunt melle pleni. Castrabuntur autem aluearia matutinis horis
 cum torpent apes, nec caloribus excitantur. Fumus admoventur ex
 galbano & arido fimo bubulo quem in pulmētario, siccis carboni-
 bus conuenit excitari, quod uas ita figuratum sit, ut angusto ore fu-
 mum possit emittere, atque ita cedentibus apibus recidentur mella
 ad examinis pabulum. Hoc tempore pars quinta fauorum dia-
 mittitur. Sane putres aut uitiosi faui de aluarijs auferantur, men-
 se etiam octobri aluearia castrabuntur, modo predicto. Quæ tamen

¶ 2 oportet

oportet inspicere, & si abundantia est demere, si mediocritas, partem mediam pro hyemis inopia relinquere, si uero medietas appareret mellis nil prorsus auferre, sed Varro scribit, quod pars tertia fauorum tantummodo tollatur pro hyeme, reliquam relinquatur, licet plena sint alucaria melle, uerū si metuas duram uenturam hyemem, nil prorsus auferendum, ut Virgilius scribit, uiri autem nostri temporis ualde experti in talibus affirmant, quod mel debet eis accipi semel tantum in anno, & hoc in fine Augusti usque ad medium mensem Septembris, sed cera corrupta tunc est ante, quādocumque auferre potest, ita quod semel mel debet auferri parum uel multum habito respectu ad paucitatem uel multitudinem mellis in alueo exiscentis, & ad paruitatem uel magnitudinem mellis in alueo examinis nutriendis, dummodo ultra quartam partem alicui non tollatur. Modus accipiendi de alucis stantibus est, ut claudatur cum herba foramen unum uel plura si sint, ne apes exire possint, & de subtus cum panno molli uel palea fiat fumus, ut ad partem aluei superiorem ascendant, plicato alueo incidantur faui, cum subtili culethello frequenter in aqua posita, ne cera adhaereat, & ne remanentes ledantur. Si uero alueus iaceat cum subtili ferro in parte incipiunt postrema, absidi superiori annexi faui primo melle implentur, ultimo in anteriori parte laborant, ibique morantur omnes. Ideoque fundus posterior secure aperiri potest, qui sic dispositus esse debet, ut facile aperiatur. Fauis mellis furtiue subtrahis, reponatur fundus in suo loco, apes autem cum hac cognouerint omnes accedunt ad uacuatum locum replendum, & cum ipsum reparauerint, & omnia compleuerint, ad partem anteriorem redeunt, ibique morantur. Ex quo aperte scire potest, quod locum uacuum repleuerunt.

De melle & cera conficiendis, Cap. CIIII.



El ex fauis siue apibus fit hoc modo, ex fauis antequā premantur, tollantur si qua parte sunt corrupti ac pullos habentes, quia malo sapore mel corrumuntur, & cōquasati

faci in munda cista ponantur, & sic dimittantur donec per se paulatim fluxerint, uel etiam aliquo pondere pressi fluxerint. Est mel crudum pulcherrimum, deinde eoquatur mel uel cera: ut infra dicetur. Cum conquassatis & occisis apibus sit hoc modo, mense Septembri; accipiantur alucaria graua uetusta, quæ precedente estate non ediderunt examina, & supra fumum & flammâ palearum alueus modicū teneatur, ut apes superius fugiant uel sibi ales comburant; deinde reuolue coopertorium aluei super terram & uangeta ferrea incide baculos existentes in alueo, & optime cum eadem mel, cera & apes conquassa, deinde reuolue alucum & coopertorium remoue, ipsumq; alucum super strageta mastelli mundissima pone, & uangeta fac in mastellum descendere mel & ceram, quæ postea in forte castula pone, quam cum ligaueris fortiter comprime aliquo instrumento idoneo, uel cum uite magnatorum ligaminis: uel inter duas asidiculas positas, in duabus stangetis in parte inferiori ligatis, uel in una concha posita aside ac ponderibus super ipsa stangeta, uel inter duos baculos quos duo teneant homines, & tertius partem supremam stangete, fortiter torquant, & quod fluxerit, est mel crudum, & si pluries duplicetur stangeta fortius & melius comprimetur, deinde uero quod in tasta remanserit, ponatur ad ignem lentum, in cacabo & sine seruore calefiat, & semper tene manus in uase, ceramq; minutâ apertas, donec mel & non cera erit integre liquefactum, & cum mel ex calore paululum coeperit pūgere manus omnia in tasta repone, iterūq; preme, ut supra: nec est damnosum si non prematur acerrime, ut de melle aliquid remaneat cere admixtum, cū longe minus ualeat mel quam cera, & hoc quod fluxerit mel coctum uocatur, quod in uasculis de bet pom ipsiq; apertis paucis diebus haberi, atq; insummate purgari, donec multū refrigerato calore deferueat. Et nobilius illud erit, quod ante expressionem secundam effluxerit uelut sponte. Cera quæ post fluxum mellis in tasta remansit, siue apes admixtas ha-

beat siue nō, ponatur in cacabo mūdo in quo sit aqua tanta uel plus, ut cera extet, hæc ad ignem teneatur donec sit integre liquefacta, semperq; cum spatula uel aliquo baculo agitetur, & in dicta tasta grossa ponatur, & fortiter comprimatur, ut in simulam habenti ali quid aquæ cedat, ibiq; stet donec sit optime congelata, tunc euellitur & ab omni sorditie quæ sit inter ceram & aquam mundetur & seruetur, & si placuerit, ut pulchrior adhuc fiat, sine aqua iterum liquefiat, & in uase aqua madido cuiuscūq; formæ placuerit iterum reponatur. Quicquid in tasta remanserit abijciatur, & ipsa in aqua calida lauetur, & ad fumum ponatur, & sic diu ualde durabit.

De utilitate apum, Caput c v.

IN apibus utilitas magna consistit, si locum idoneum habeant, & prudenter ac sollicitè procurantur, nam ex paucis breui tempore multa examina fiunt, nisi magna pestis temporis eis obsistat, nam in anno semel etiam bis & plerumq; ter pariunt, & examē emittunt, & sine magnis expensis ac labore tenentur, licet non sint totaliter negligenda, ex quibus cū augmentū recipiunt uetusta quinq; uel sex annorū, quæ parere desierunt, ætate magno precio, quia multā habēt ceram, quæ maxime necessaria est, uendere potes & noua seruare, faciunt etiam ceram quæ maxime necessaria est regibus & prelati, & quibuscūq; personis, ut notum est omnibus, quæ satis magno precio uenditur. Et quod amplius est die noctūq; honorē exhibet æterno regi, item faciūt mel in maxima quantitate quod ualde utile est, tam ad cibū quam ad medicamina infinita. Ad ipsarū utilitatē probandam refert Varro duos fuisse milites in Hispania fratres ex agro Falisco locupletatos, quibus cum à patre relicta essent parua domuscula & agellus nō sane maior iugero uno, circa totam domum aluaria fecisse, & hortū habuisse, & reliquū locū ac spaciū thimo & cithiso semine operuisse ac etiam apibus, hos nunq̃ minus, q̃ dena milia sextaria ex melle recipere esse solitos. Vnde ait Persius. Nec thimo satiat̃ur apes nec frōde capelle.

PET. DE CRE-

SCIENTIIS, DE DIVERSIS ARTI-

bus capiendi animalia fera, Liber X.

PROLOGVS.



ANTIQVI philosophi, quorum intellectus adeo excise illustratus est, ut utilia humano generi cognoscerent, intelligentes quæ cum sub coelo sunt ad utilitatem hominum esse creata subtili cogitarunt ingenio, qualiter animalia aërea, terrestria & aquatica, quæ propter peccatum primi parentis homini nequam quam obedire, capere possent, inueneruntque multas cauernas, quibus homines usi sunt, & suis ingenijs successine infinitas, addiderunt artes pluribus ignotas. Idcirco cuncta quæ scire poterō, in scriptis reducere intendo, primo tractans quibus modis capiantur aues, secundo bestie syluestres, tertio pisces. De quibus autem qualiter capiuntur cum auiibus rapacibus domesticatis, cum retibus, cum laqueis, uisco, balistis, arcubus, & alijs quibusdam modis, & de bestiis qualiter capiuntur cum bestiis domesticatis, cum laqueis, retibus, foueis, & alijs modis. De piscibus etiam quibus modis capiuntur cum retibus, cillis hamo & calce.

De auiibus rapacibus in genere,
Caput primum.

PRudentes antiqui uidentes quasdam aues per aëra uolitantes, alias capere caute laborauerunt, auium rapacium genera domesticare, ut quas per se capere non poterant earum auxilio sibi quærant. Et horum primus inuentor dicitur fuisse rex Dauid, qui diuino intellectu nouit naturā accipitrum & falconū, & eos domesticare ad prædam instruere, & ab agri-
tudinis

itudinibus liberare, post quem alij multi fuerunt, qui plures ipsorum animi rapacium addiderunt.

De accipitre, Caput II.



Accipiter est avis nota, & eius quidam natura est, ut uiuat de raptu aliarū animi, & ideo semper solus & nunquam sociatus incedit, quia in praeda nō cupit habere sodalem & quantum potest ad rapicndum prope terram uolat ne ab auibus quas capere intendit uideri possit. Ab omnibus quibus insidiatur instinctu nature cognoscitur, & cum eum uident aut sentiunt garrunt, fugiunt, & se quantum possunt occultant. Hec avis uelocissimi uolatus est, & ideo nisi statim rapit in principio sui motus, sed postea lentus est eius uolatus, & ideo nisi statim rapiat ab auis, persecutione desistit, & super aliquam arbore adeo sepe indignatus se ponit, quod uix ad dominum uult redire. Inueniuntur autem accipitres in albus quibusdam nidificare, & meliores omnibus sunt, ut fertur qui nascuntur in alpe de Brusia in Sclauonia. Poni etiam nasci dicuntur, qui nascuntur in alpiibus quæ sunt in confinibus Verone & Tridenti. Ex his quidam sunt parui qui communi nomine uocantur accipitres, & quidam magni, qui uocantur astures. Sunt enim de genere accipitrum sicut coruus & graculus eiusdem generis sunt, & canis paruus & magnus, & idem in pluribus animalibus est uidere, & accipitrum quidam sunt maiores & sunt feminae hi qui sunt maioris uigoris, & quidam sunt minores, & uocantur muscheti & sunt masculi, qui pauca utilitatis existunt.

De pulchritudine accipitrum & cognitione bonitatis eorum, Caput III.



Accipitrum pulchritudo cognoscitur si sunt magni, curti, paruū habentes caput, pectus & spallas grossas, & amplas tibias, & pedes magnos & expansos, & pennarū colorem nigrum. Et bonitas quidem cognoscitur qui de nido extrahit

trahit melior est, & à domino raro fugere consuevit, & hic uocatur nidarius, uel qui de nido egressus de ramo in rannum matrem sequitur, qui ramarius uocatur, & optimus esse consuevit, secundi meriti est bis qui postquam de nido uolauit captus fuit raro consuevit antequam pennas in feritate mutaret, qui uocatur sorus, sed qui post tale tempus captus fuit raro cōsuevit cum hominibus uiuere uel morari, si tamen permaneat bonus est, quia in feritate fuit solitus aucupare, & quanto animosior uidetur & audacior per effectum, & meliorum morum tanto ab expertis melior iudicatur.

**Qualiter accipitres nutriuntur & instruuntur,
& quales capiunt aues, & qualiter mutantur, Caput IIII.**



Vtriuque autē nidarij & ramarij bonis auiibus, & carinibus pluries, & in die paulatim in hora ut magis dominum diligant, possunt etiam eis dari oua in parapsidibus fracta & agitata, & in aquam feruentem proiecta, & postea cum digitis simul constricta. Idem fit nisoris à principio, sed cum optime priuati & domestici facti sunt, semel tantum sunt in die pascendi post tertiam, cum digestionem compleuerint, & non ante quod per gorgam euacuatam cognoscitur ab expertis, & si cibis de gorga usq; ad diem sequentem nō descenderet tantundem sine cibo dimittatur. Item potest bis in die cibari secure, si cibum inueneris descendisse de gorga, & quotiens hoc uideris cibare secure poteris, nisi uelis eodem die uel sequenti aucupatum accedere, quia & tunc accipitrem famelicum esse oportet, ut au dius prædam petat, & facilius ad dominum reuertatur. Domesticantur autem si plurimum tenentur in manu, & maxime in aurora tempestiue, & inter multitudinem bonarum, & in rumore molendinorum, & fabrorum, & similibus. Instruuntur uero nidarij & ramarij, nam ceteri sunt in feritate instructi, hoc modo cibetur hora nona bono cibo, & sequenti die teneatur in loco ualde obscuro usq; ad nonā, deinde accipitur

Rr **& portetur**

Et portetur ad locū uenationis, et non dimittatur, primo ad aregas
 tas uel gazas neq; ad perdices, quia nimis sunt fortes, et si eas su-
 perare nō posset debilitaretur eius audacia sed dimittatur quales,
 turdis, et merlis et similibus. Quod si gazas capiat habcas unam
 captam, et ei multas pennas de alis auferas, et quidem in aliquo
 fossato abscondus ante conspectum accipitris eam proijcies, et ibi
 accipiter dimittatur. Capit autem quales et perdices, aregazas
 et glanderas siue gazas et multas alias gazas et aues, ut merlos,
 turdos et passeres, et his similes, mutantur uero quolibet anno,
 nam ponatur mense Martio uel Aprili in gabia magna specialiter
 ad hoc facta, et posita ad solem in loco calido, ueluti iuxta muros
 plage meridionali appositas, et cōpletur mutatio pennarum eius
 in principio Augusti, et in pluribus in medio, et quibusdam in
 fine, et in quibusdam non completur omnino, et ad hoc ualet si be-
 ne pascantur bonis carnibus, et precipue animum et ouorū, ut bene
 impinguentur, tunc enim optime mutant, et quidam dicunt ad hoc
 ualere cibum stellionum et testudonum et lacertarū. Et aliqui con-
 sideranter depilant eos ut noue penna nascantur uelocius, sed hoc
 modo multi iam sunt destructi.

De industrijs et inducendi accipitrem, ut à do-
 mino non recedat, Caput v.

C Aueat dominus accipitris ne aliquo modo ledat eum, sed
 cum uiderit eum natum et uolentē stare super manu, uel
 pertica suauiter tangat ipsum et cum eleuet si pēdet, et
 quantum potest consideret mores et uoluntatem eius, et in omni-
 bus ipsius uoluntatem sequatur. Et semper in manu eum cibet, nec
 sibi in aliquo contradicat, quoniam accipiter est ualde indignantis
 nature: preterea cum morietur, aucupatū nō emittat ipsum, nisi eum
 uiderit bene appetere pradam, et maxime ad regazas et glande-
 ras, nec enim nimis à remotis dimittat, quia cum non potest attin-
 gere auem sepe indignatus recedit, et aliquando in arborem de-
 scendit

secundū, nec ad dominum uult redire. Item non fatigat dominus accipitrem ultra modum, nec sit tantum avidus multitudinem quarum learum uel aliarum auium habere, quod eum destruat uel irasci faciat, sed cum eas ceperit quas uidet accipitrem libenter appetere, sit contentus, & ex ipsa praeda cum cibet, ut sibi suam uenationem sentiat profuisse, & incitetur in amore uenandi.

De xgitudinibus accipitrum & eorum cura, Caput vi.

Accidit accipitri, ut calefiat ultra naturam & complexionem suam in tantum quandoq; ut febricitet, & tunc erit talem calidus, & uidebitur tristis: quod quandoq; eneit ex solis spiritibus inflammatis ex nimio labore, & quandoq; ex humoribus putrefactis in aliqua parte corporis eius. Et tunc si macer est, parum & saepe cibetur ex carnibus pullorum & paruorum auium, à passeribus tamen tunc abstinere melius est, quia multum calidae complexionis existunt. Et dictae carnes dentur sibi in rebus naturaliter frigidis inuolute in seminibus cucurbitarum & cucumerum tritis, aut mullagine folij & similium, uel paulisper coquantur in sirupo uiolato & similibus, & sibi dentur, & ponatur in loco frigido & obscuro super perica pannis lineis inuoluta, in succis frigidis plerumq; irfasis. Et quandoq; in frigidatur & digerere cibū non potest, & tunc similiter est tristis, & tactu frigidus, & color oculorum mutatur ad palliditatem & discolorationem, & tunc teneatur in loco calido, & suauiter in manu portetur, & paulisper quandoq; ad uolandum mittatur, & dentur sibi carnes auū, & praecipue passerū, & pullorū masculorū, et pipionū coctum aliquantulum in rebus calidis, n. l. in uino uel aqua in qua sit salvia uel mēta uel maiorana uel pulegium, & similia, & inuoluantur uel in melle uel in puluere seminum facnicalorū & anisorū aut cymini: ita tamen quod nihil omnino sibi detur nisi prius omnis cibus de gorga eius descenderit, & si macer est, saepius cibetur, si pinguis & nimis & rarius, in utroque

tamen casu temperate cibandus est, donec fuerit liberatus. Quod si nullo modo digerit cibum, sed cum omnino retinet, dicitur experti, accipias cor ranae & liga cum cum uno filo, & mitte cum una penna in gulam eius, & postea trahas filum, & sic passum eijciet. Item accidunt ei sexcupedes, & tunc unge pannum circa eum uolutum cum succo marellae uel absinthij, & sic dimittatur ad solē de mane usque ad tertiam. Item accidunt ei quandoque lumbrici, & tunc da sibi super passum succum foliorum persici, aut puluerem santonici & liberatur. Et quandoque patitur guttam in articulis alae aut coxae, & tunc minue de eius sanguine aperiendo modicum uenam, quae sub ala aut sub coxa existit, cum in ea patitur. Item accidit eis podagra quae prouenit ex descensu humorum guttarum in nodis pedum & digitorum, & tunc curantur cum lactae herbae quae lactiola uocatur, unguendo cum eo eorum pedes, & unguendo ex eo panno lineo & ipsum ponendo super perticam, super qua teneatur accipiter, donec erit rupta podagra, & tunc auferatur pannus & ex seuo inungatur podagra, donec fuerit liberatus.

De asturz, Caput vii.

Astures sunt de natura accipitrum, sicut in tractatu accipitrum dictum est. Et cognitio pulchritudinis & bonitatis eorum est sicut cognitio accipitris: & nascuntur in alpidibus & nemoribus, & domesticantur & instruuntur & nutriuntur sicut accipitres. Capiunt autem perdices & coturnices, phasionos & angutiones & multas similes aues, scilicet annetas, anseres, corniculas, & quasi omnes aues quibus mittuntur, & cuniculos, lepores paruos & magnos, licet eas sine auxilio canum retinere non possunt, feriunt in capreolos paruos & eos impediunt adeo quod canes eos capere possint. Mutantur ut accipitres, & eadem agitudines eis accidere possunt, & eodem modo curantur. Verumtamen fortioris sunt naturae, & ideo non de facili infirmantur & moriuntur, & non requiritur in eis tanta diligentia, & sic non facile accedunt ad omnes.

De falconij

De falconibus, Caput VIII.

Falco est avis nota, quæ de raptu nixit & solus incedit ad prædã, sicut omne uolatile rapax, propter causam in accipitre assignatam. Hæc avis mirabilis uolatus est in principio, medio & fine, quæ sursum rotando conscendit, inferius intuitum figens, & ubi uidet anatem & anserem aut gruem, sicut sagitta clausis alis ad auem cum ungue posteriori lacerandam descendit: quod si eam non tetigerit persequitur fugientem, & sæpe cum auem in fugam conuersam capere non potest, adeò irascitur contra eam, quod post ipsam quodam furore uolitans à domino nimium elongatur, adeò quod non redit ad ipsum. Hæc avis ualde animosa est, & nobilissimi generis. Falcones primo, dicuntur uenisse de monte Gelboë, qui est in partibus Babylonie, & inde uenerunt in Sclauoniam ad palum nudum, deinde sparsi sunt per quosdam alios montes arduos in quibus inueniuntur.

De diuersitate falconum, Cap. IX.

Falconum quidam sunt magni, qui falcones cõmuni nomine dicuntur, & quidam parui qui uocantur Ismerli, & c. magnis quidam sunt nigri, quidam respectiue albi, & quidam rubei, ex coitu prædictorum inuicem generant, uidelicet cum trizolus unius pertica sociã suã cum altera permiscetur, & omnes huiusmodi falcones sunt fœminæ, & eorum matres trizoli siue tricelli uocantur sic dicti, quia simul tres in nido nascuntur, duæ fœminæ & tertius masculus, qui propterea tricellus uocatur, qui nõ sunt tantæ uirtutis ut fœminæ, & sunt ualde minores quàm ipsæ.

De pulchritudine & nobilitate falconum, Caput X.

Pulchritudo & nobilitas falconum cognoscitur si habet caput rotundum, & summitatẽ capitis planũ, & rostrum curuum & grossum, & spallas amplas, pennas alarum subtiles, coxas longas, & tibias curtas & grossas, pedes liuidos,

Rr 3 sparsos.

perfos, & qui talis est ut plurimū bonus erit, licet aliqui satis des-
formes sepe optimi sunt inuenti. Ideoq; falconum bonitas & auda-
cia solo experimento perfecte cognosci potest, ueruntamen eorum
bonitatem & desiderū capiendi aues multum auget magistrorum
suorum industria, & eosdē a bono proposito sepe reuocat impe-
ritia eorundem.

Qualiter nutriuntur, domesticantur & instru-
antur falcones, Cap. xi.

Non sunt tenendi super ligno sed solum super petra rotun-
da & aliquantulum longa, super ea enim magis delectan-
tur instinctu nature & cōsuetudinis eorundē. Qui ex eis
parui sunt, hircina uel pullina carne nutrūtur, precipue cum aues
capere inceperit da ei de prima quam capiet quantū uoluerit, idem
facies de se: uida & tertia, ut ex hoc ad raptum auiū & ad obedi-
endum domino animetur. Deinde uero postea stringe eum cum
uis quod alias aues capiat hoc modo, scortica gallinam & fac tria
purgatoria & da ei madefacta in aqua, & pone eum in loco obse-
ro, & dimitte usq; ad auroram dei, postea calesce eum ad ignem et
uade aucupatum, & non fatiges eum ultra quam uelit, sed solū quā-
tum ipse uult, & auidē desiderat, dimittatur ad aues, sic enim tecum
libenter manebit, & quocunq; ierit ad te redire curabit. Cum inue-
neris falconem tuū audacem & cum incenso desiderio aues cape-
re, diligenter considera statum eius in macie & pinguedine, & in
quo statu cū inueneris in eodē retinere curabis. Nam quidā falcōes
se melius gerunt cū sunt pingues, plures autē & ferē omnes in statu
medio existentes, aliqui licet pauci cum fuerint macriores, & huius-
modi generis, rubei ut plurimū esse dicuntur, & cum primo mittū-
tur ad aues ad minores primo mittuntur, deinde ad mediocres, ul-
timo ad maiores. Si enim primo mitterentur ad magnos & superan-
rentur ab eis, deficiente adhuc potētia & industria quas usu acqū-
runt, inciperēt postea magnas aues & mediocres formidare, sicq;
difficultate

difficiliter nimium resumere audaciā sibi innatā, quam imperitia sui doctoris amiserat. Plurimū etiam confert falconi ad audaciā acquirendam, si cum tenes multū in manu, & des ei carnis pulli, ne hora tertia coxam unam, deinde pone ante ipsam aquam in qua balneetur, postea ponatur ad solem ut siccetur, deinde ponatur in loco obscuro ibiq; usq; ad vesperras dimittatur, deinde teneatur in manu usq; ferē ad primum somnū, postea lumen lucerne vel candelæ coram eo per totam teneatur noctem, & cū matutina uenerit hora aspergatur uino, & teneatur ad ignem. In aurora uero dici aucupatum portetur, & si capiat, quantum uult de praeda sua cibetur. Si uero non capiat detur ei ala una & medīa coxa gallinæ, & in loco ponatur obscuro. Circa mediū febr. falconē in muta pones, & de omnibus carnibus cum cibabis usq; ad unum mensem, postea pones ante ipsum cunctam aquam, prius tamē da ei comedere, & si uides quod non mutat unge carnem quam ei tribuis melle, quod si adhuc non mutat, accipe ranā & fac puluerem & super carnē pone, mutabit. Et cane ne ipsum de muta tollas antequam complete fuerint pennæ eius, & cum de muta acceperis eum ad calorem non teneas, sed plurimū eum in manu tene, nec postea usq; ad 15 dies cum eo aucupatū accedas. Capiunt autē anates, anseres, agirones, grues, & starnas & alias aues. Sed fertur quod si comedunt sanguinem agironis omnino desiderium capiendi grues amittunt. Si uero carnes solum sine sanguine comedant hoc uitū incurrere non creduntur.

De ægritudinibus quæ falconibus accidunt, Cap. XII.



Ccidunt falconibus omnes ægritudines quæ superius accidere accipitri dixi, & eadem sunt signa & cura, quia omnium uolatilium rapacium ferē eadem est natura. Et ideo de his hic tractare non expedit, unum tamen cognoscas quod falcones sunt fortiores naturæ quàm accipitres, & non sic facile infirmantur & moriuntur, si comedant antequam cibus de gorga de-

scende

scenderit. Quidam insuper falconarij multos modos regendi falcones narrant, & alias egritudines eis accidere aliasq; curas necessarias esse, ex quibus aliqua forsitan uera sunt, que per multas experientias approbantur, sed multa ex his que dicunt ratione carent, & sunt potius apparentia quam existentia. Ideoq; si qua hic desunt de cura falconum & auum rapacium, per viros expertos non semel sed pluries longo tempore suppleantur.

De Smerlis, Cap. XIIII.

Smerli sunt de genere & natura falconum, & sunt quasi falcocelli parui, quod apparet per formam corporis et colorem pennarum, quorum aucupatio potius uoluptatis quam utilitatis existit. Caput autem precipue laudulas, & tanti desiderij & animositatis sunt ad eas capiendas quod plerumq; persecuti sunt eas in uillas usq; ad cibarium ardentem, aut in puteum, aut sub mantellis hominum. Item capiunt passeret & alias auiculas paruas, de ipsorum autem doctrina & cura plura non dico, quia per superiora satis sciri potest.

De Gyrfalcis, Caput XIII.

Gyrfalcus est auis rapax maior quam falco, & est magnæ uirtutis & potentie, mirabilisq; audacie, adeo ut inuenti sint aliqui audaci spiritu aquilas insultasse. Capiunt autem omnes aues quantumcūq; magnas, & sunt ferè de natura falconum, quare & præcedens doctrina satis sufficit ad nutriendos gyrfalcos.

De Aquila, Caput XV.

Aquila est similiter auis de raptu uiuens, que propter fortitudinem & audaciam suam uocata est rex auum, nam omnes aues eum timent, sed ipsa nullam. Diuersæ sunt species aquilarum, quedam sunt ualde magnæ, quedam mediocres quedam parue, & iterum quedam sunt nobiliores non appetentes nisi uolatilia & animalia terrestria uiuentia, & quedam quodammodo ignobiles & de generes que appetunt non solum carnes uiuas sed etiam

se d etiam mortuas & pisces mortuos & descendunt super cadaue-
ra asinorum & similia, & tales declinant ad naturam & igno-
bilitatem mliuorum. Aquile domesticantur ab hominibus uidelicet
que parue de nido extracte fuerunt, sed eas que diu in feritate su-
erunt non esset tutum domesticare uelle, quoniam facile propter su-
am audaciam & potentiam grauiter lederent in facie uel alibi in-
struunt. Et domesticantur ut hominibus querant quaslibet aues ma-
gnas, sed precipue ut capiant lepores & cuniculos & capreolos
cum auxilio canū, & qui aquilam uenatum portat, debet esse fortis,
alioquin pondus ipsius sustinere non potest. Et statim dum uidet ca-
nis inuenisse pasturam aquilam consuetam & instructam debet di-
mittere, que semper super canes uolabit, & cum leporem uiderit
subito descendet & capiet eam. Nutritur autem ex omnibus carnia-
bus, & non facile infirmatur, sed cum leporem ceperit pascatur ex
ea pluribus uicibus, ut eas postmodum libentius persequatur. Qui
iuxta nidum aquile habitant unum ex pullis eius accipiunt, & cum
accipiunt timore aquile sint armati, & precipue in eorū capitibus,
& cum pullum habueris ad unum paruū palum eum in aliquo loco
ligabis, hic uociferabit uenienti; mater & pater deferentes eidem
lepores & cuniculos, si erunt in partibus illis, & gallinas & anse-
res que accipere poteris, & habere: ferunt etiam ei quandoq; catu-
las & quandoq; uulpes. Nuper detulerunt filio gallinam cum quib-
usdam pullis existentibus inter pennas matris, qui habiti sine ulla
lesione & nutriti fuerunt.

De Gimo & gimeta, Cap. xv i.



Gimus & gimeta sunt eiusdem nature, et sunt animalia no-
cturna potius quam diurna, quia eorum oculi de nocte
uident melius quam de die. Cum igitur deformia sint &
raro ab alijs animalibus uideantur, mirantur aues in uisione ipsa-
rum, & eas uidere appetunt. Tam animatum brutale, quam ratio-
nale in rebus nouis ac insolitis precipue delectatur. Homines ergo

cernentes alias uolucres circumuolare gimo & gimetæ, & eas cū
auditate plurima intueri, excogitauerunt ingenia quibus eas capi
unt, ut ipse aues capiant, sed ut meditantibus ipsis homines cum fi
seo aut retibus sibi querant, uiuunt autem de quibuslibet carnibus,
& præcipue de muribus & noctuis, & cum bene cibata fuerint cō
petenter ieiunant duobus tribus uel quatuor diebus. Et gimus usq;
ad nouem non leditur, & fœmine meliores sunt masculis, sicut om
ne uolatile rapax, & gimetæ quidem melius tenentur in aliquo co
lumbario uel alio loco sibi simili quam alibi. Et si bene domesticata
fuerint optime capiet mures in domibus existentes, comedunt etiam
lacertas & ranas & omnia carnem habentia.

Qualiter aues retibus capiuntur,

Caput XVII.

Aves cum retibus pluribus capiuntur modis, & uno quidem
modo capiuntur ad Pantheram qua capiuntur annates, et
modus quidem est ut iuxta aliquam paludem facias foueam circa se
decim uel uiginti quinq; brachia longam, & circa decem uel duode
cim brachia latam, uel maiorem si uolueris, tantum cōcanam quod
circa unam spannā aqua habeat, & sit à duobus capitibus longis
acuta in uno angulo, sic quidem fossatus & in alio aliquantulum lō
ga sit casella circa foueam. Sint undiq; spacia plana quanto est re
tium latitudo, deinde fiat sepius circumquaq; ne lupi aut uulpes nec
aliqua animalia nocua intrare possint. & aues in eo loco existen
tes fugare, in predicta fouea ita 12 uel 16 annates domesticæ die
noctiq; morentur in hyme & milia in bona quantitate proijcia
ntur in aquam propter domesticas & syluestres; finiq; domesticæ
syluestribus similes in colore pennarum, circa foueas iuxta ripas
figantur pali quatuor perticarum, quæ rete eleuent, & pali reo
tiarum figantur circa spacia prænarrata, et super ipsam cordā par
uorum palorum totum colligatur rete, & tam ipsum quam stan
gæ sine baculi qui rete leuant & cooperiant optime, finiq; retia
duo

duo magna in utroq; capite coniuncta uel posita sint retia ut aroli coniungunt, quæ quidẽ coopertor ſuocant, quæ cum eleuantur ſimul in altũ cõrugantur admodũ culminis domus paleate, & modus quidem eleuandi caſeſt quod iuxta caſellum eſt furca cum pertica, in cuius capite ſubtili eſt retiarum funis annexus, in groſſo uero eſt ciſta fortis & magna ex terra repleta, quæ ſuo pondere cum uolueris admodum quaſi machine rete eleuabit. Huc confluet multitudo annatarum in noſte per aëra uolantium cum domeſtica uociſerabunt. Cumq; in multa quãtitate deſcendent retia eleuabis & cũ per tica percutiẽdo leuiter retia omnes ſylueſtres in cucullũ retis quod eſt in ſupradicto ſoſſato extenſum expelles. Et domeſtica quæ non timent remanebunt in pantheria, deinde aperies caput cuculli, & facile cum dentibus anates in capite occides, ſic quod una hora mille quandoq; capiuntur.

Modus capiendi grues, Cap. XVIII.

Eſt & aliud ingenium quo grues capiuntur, cygni, ſtarna & anſeres, quod tale eſt: in ripis fluminum ab utraq; parte ſigitur arbor altiſſima, uel due ſimul iunctæ, ut lãgior ſit arbor, habetq; per totum cuniculos ad aſcenſum in ſummitate tirellam, in qua ponitur funus retis. Cuius longitudo eſt ſecundum fluminis latitudinem & arborum diſtantiã, & eius latitudo eſt ut ſuperius eleuata uſq; ad medias deſcendat arbores, deinde homines uſq; à remotis ueniant per glaream fluminis omnes uolucres quas inuenerint expellentes, quæ uolantes à ſplendore aque non diſcedent donec in rete inciderint. Et tunc declinetur rete cum funibus ſuis, & uolucres capiantur. Et modus iſte locum non habet niſi cum tempus fuerit nubilofum & aër obſcurus, alioquin aues eleuata facile à flumine deniarent.

Aliud, Caput XIX.

Item est aliud ingenium quo capiuntur anseres & sturne, quod est tale, tempore hyemis cum ex gelu & sole pulvis est in campis segetum, tenditur in segete in uno sulco, rete unum longum per triginta brachia uel id circa & latum quatuor brachia post tertiam cum in uesperis capere cupis uel in sero, cum uis in mane habere, est autem hoc rete simile uni parieti, habens duas stagias eleuantes longas secundum dimidiam latitudinem retis, & tenditur cum duabus brachetis ut paries, sed disponitur ut per se eleuetur uolenter, quia hoc ipsum rete per se eleuare non posset, cumque totum rete in terra firmatum fuerit totum super coram colligitur. Et tam ipsum quam stagia & bracheta & funis trahens optime ex puluere cooperitur uel herba sicque in uno fossato uel alibi aliquantulum remoto locus coopertus ubi latitet homo qui rete leuare debet: in loco retis sint duae uel plures anseres domesticis syluestribus similes, duobus paliculis alligati, & duo similiter scorticati, ut illuc syluestres confidentius ueniant. Cumque syluestres descenderint in aliqua parte agri ex opposito uadat socius cum capello in capite uel alia re in manu loquatur aliquid, & ut laborare uideatur, alioquin fugerent sicque consideranter & caute perducatur eas ad locum retis, quod facile fiet per uniuersum agrum quantumcumque magnum, si hoc facere caute scies, cumque in rete uideris eas, confidenter loquere socioque dicas ut rete trabat, uerum quia haec avis cautissima est, oportet te omnino cauere ne in mane ad locum retis accedas, quia statim perpederent de rore uel pruina pedibus tuis mota, & fugerent, & ideo cum tendis in sero statim ibi stelloncs pone, & per totam noctem dimitte, sed cum capere uis in sero non est necessaria haec cautela.

Aliud, Caput XX.

Item est aliud ingenium capiendi annates iuxta aquas ubi sabulum est, & est rete simile praedicto, sed est paruum & satis spissum

spissum, & eodem modo tenditur, & sabulo cooperitur, & locus
custoditus est ex aliquare, deinde sabulo cooperitus ut paruum ha-
beat foramen, unde uidere possit, & caucat ne per foramen statum
emittat, cum in loco sunt aues, hic non sunt stelliones necessarij, sed
per totam hyemē ponitur ibi milica & uinacea, ut assuescant aues
locum frequentare. Cum autem ibi stare assueverunt tendas rete,
poterisq; optime locum custodire atq; uiam introitus longam cau-
re, & melogarijs & sabulo desuper cooperire. Item rete uel simi-
le spissius tamen tendi potest optime in arcis uel alijs locis ad capi-
endum columbas, coruos, glandaras, aregazas, landulas & omnes
aues paruas, quæ esca granorum accipiunt, & cum poteris facere
quod ibi uenire ac stare assuescant & postea rete tendere, & lo-
co uel paleis cooperire, & hoc ingenium potest habere tempore ni-
uium, & quolibet alio tempore, & erit esca conueniens spelta, fa-
ba, milica, lolium, & semina uinacea, & similia, ut frumentum mo-
litum & citriculi uel fascoli, & cum eodem rete siue esca poterunt
capi aues in æstate cum tempore magne siccitatis te tenderis iuxta
aguas.

Aliud Caput XXI.

Item est aliud ingenium quo capiuntur cum retibus auie-
um diuersa genera, & præcipue columbi & turtures, &
quedam aliæ mediocris magnitudinis aues, & ferè omnes
auicule parue, falcones etiam & accipitres & omnes ferè rapaces
aues. Modus autem est quod duo retia satis longa & lata omnia-
bus ferè gentibus nota, quæ uulgariter uocantur parietes, tendun-
tur in pratis, uisjs & agris, & iuxta aquas remote ab inuicem ferè,
ut est latitudo ambarum, quarum quolibet habet duos baculos eas
eleuantes, cum trahitur funis communis, quorum longitudo secun-
dum latitudinem retiarum existit, & unum caput cuiuslibet cum
paruo palo in terram firmatur, & in uno capite habent unum fun-
nem communem, qui ad quendam palum communem in terra de-

fixum adnectitur, ab alio capite alium habent funem, qui usq; ad locum aucupatoris quibusdam ramis circumdatum protenditur. Hæc autem retia pro columbis et magnis auibus sunt rara et fortia, pro paruis subtilia atq; spissa, prædicta retia cum sunt terræ affixe iacent in terra elongata ab inuicē, et cum finis trahitur eleuantur & coniuncti flexantur, ac operiunt omnem auem uenientem ad locum qui erat uacuu inter utruq; in hoc spacio uacuo tenentur columbi & turtures aliqui excœcati, uel habentes palpebras super oculos, ne aliquid uideant cū filo ligatas, uel stant ibi aues excorticatæ & ungulam loco crurium qua stant rectæ ut uideantur uiuæ, pro paruis auiculis ponitur ibi gimecta, ad quam uidendam libenter ueniunt, uel tenentur ibi auicula paruo filo ligatæ, ad quas alie parue accedunt. Accipitres etiam & falcones causa rapiendi descendūt. Aucupator aut nusquam expectare debet, quod aliqua auis accedens se in terram deponat, sed cum prope fuerit trahere debet funem, & auem uolantem ad terram prosternere ipsamq; capere.

Aliud, Caput xxii.

Est & aliud genus retis quo auium multa genera capiuntur, maxime cū terra est niue cooperta, quod uulgo uocatur arolus, qui ex duobus retibus non multum magnis, sed spissis & fortibus constat, & in quolibet capite coniunguntur & in terram affiguntur, distantes in partibus medijs, habentes quatuor breues baculos, quibus eleuantur in altum, nec flexantur ad terram cum funis trahitur, sed permanent eleuati, & simul coniuncti cum retibus desuper, admodū turgurij, hoc rete cum omnibus baculis & funibus optime operitur stramine aristarum, uel paleis & in spacio intermedio tenentur continue grana, & cætera cibaria, quæ auibus quæ uenire sperantur sint præcipue grata, cum autē aucupator perpenderit ibi esse auium multitudinem latenter inter domusculam ualde clausam, quæ ibi debet esse propinqua & subito trahat funem, & fortiter ad unum palum in domuscula positum adnectat,

& aues

Et aues capiat. Hoc ingenio capiuntur facile milui Et aquile ceteraq; aues super cadavera descendentes, si cadaver totū uel pars ponatur in medio retis. Item eo capiuntur uulpes, si gallina nocte ponatur in medio, sed huiusmodi rete pro ipsis Et aquilis fortius debet esse.

Aliud, Caput XXIII.

Sunt Et alia retia que uocantur araneae ualde subtilia, ne in aëre facile uideantur, quibus capiuntur multae auiculae cum ponantur erecta in aëre, duabus perticellis adnexo, in locis que auiculae consueverunt transire. Item accipitres his facile capiuntur similiter Et falcones cum circa columbū erecta tenduntur, Et eodem modo ceterae aues rapaces. Sed harum duo sunt genera, nam quedam aranea est simplex, Et uirgulis adeo leuiter aptatur, quod cum tangitur cadit, auemq; inuoluit. Item est alia aranea triplicata ex tribus composita, quarum media est spissa, Et plurimū lata, exteriora duo sunt ualde rara, ac adeo stricta, quod cum sint ad capiendū eleuata ac perticis stantibus foriter adnexae stant extensae, mediaq; mollis Et lapsa, que super funiculum superiorem eleuatur, Et cum auis incidit transuolat ambo retia rara, Et in medio spissa inuoluitur, Et cum eo in sacculo quodam pendet.

Aliud, Caput XXIII.

Sunt Et alia retia quibus capiuntur perdices, que sunt longa Et stricta, in medio quandam caudam admodum sacculi longam habentia. Hoc modo aucupator qui die uenatur, pannum rubeum cum uirgulis ad clipei modum formatum ante se portat per agrum, pergens foraminibus duobus inspicit, Et perdices inquit, cum eas uidet circa ipsas retia tendat, quibusdam palis affixis ad finem retiarum annexis, Et caudam circulis apertam extendit, semper ante se retinens clipeum uersus perdices, quibus extensis se perdicihus appropinquat,

Et is

Et in eandem retiarum paulatim impellit, non solum timore, sed etiam pedibus si opus erit. Qui autem nocte uenatur in sero locum inquit, ubi nocte morantur, & cum aëris integra obscuritas sumperuenerit ad eundem locum cum igne reuertitur. Est autem ignis cum uase sic formato, quod nec ipse uidetur, & aperte uidet spacia uniuersa prope se, & per unum agri sulcum accedit, & per alium reuertitur circa locum in quo perdices reliquit, ut cum eas uiderit ipsas operit cum reti, quod habet apertum in capite perticæ formate ad modum huius negotio oportunum, uel si habet rete supra dictum potest id extendere circa ipsas & impellere ac capere uniuersas.

Aliud, Caput xxv.

Ist & aliud rete quod expegatorium uulgo uocatur, satis magnum, quo capiuntur perdices et quales ac phasiani, et quedam aliæ aues, cum auxilio catuli ad hoc instrumeti, qui aues inquit, quas cum uiderit stat, nec ad eas progreditur, ut expellat. Sed aucupatorem dominum suum retro respicit, et caudam moueat taliter quod ipse aucupator cognoscit aues esse pabulum, ante tamen, et tunc ipse et socius rete trahunt, & aues et catulum operiunt, & sic eas accipiunt. Est et aliud paruum rete in capite perticæ præparatum, ut apertum existat, quo unus solus uitur aucupator, et ad quales solus cum quasi latorio cuius sonus est per omnia similis uoci quales generis femine ad quem ardentem accedunt masculi, prope ipsum quos tunc operit atque capit.

Qualiter aues laqueis capiuntur, Cap. xxvi.

Ist laqueus quo facile capiuntur aues, quæ de raptu uiuunt hoc modo, in loco ubi prope morantur aues rapaces uel aliquæ transiunt, infigitur fortis ab utroque capite arculus, ualde plicatus, prope quem ab una parte firmatur uirgula: in cuius fissura muris canda infigitur, uel ad quem frustum mortuæ carnis onnectitur, seu rana, et ab alia pertica fortiter in terram dimittitur,

tur, habens in capite laqueum & quandam parua cordulam, cum uno sticheto, quo pertica formatur ad arculum, & ad parua in-
 cisuram que fit in capite uirgule minus tenentis & laqueus circa mu-
 rem extenditur, ac cum auis murem uel aliam rem ut exportet tan-
 gitur, pertica dissoluitur ab arculo, ac superius eleuatur cum aue
 rapace, que pedibus uinculatur. Item sunt laquei multi de pilis can-
 de caballini, in uno funiculo eiusdem materie texti, qui tenduntur
 in sulcis frumenti funiculo à terra eleuato, ultra altitudinem auis,
 parum declinis laqueis & apertis, ut auis transiens capite immisso
 capiatur collo, & hoc modo capiuntur perdices in agris, & qua-
 leæ ac pbsiani in semitibus nemorum, per quos transeunt. Aues
 etiam aquatiles eodem modo capiuntur, cum iuxta aquas unde tran-
 seunt laquei tales tenduntur. Columbe etiam & aliæ aues multe
 capiuntur ex eis, cum incubant uel pullos habent, si circa nidum
 ipsorum tenduntur. Item in fabis ac fuscolis seminatis capiuntur
 columbi ac turtures paruis laqueis, qui uulgariter dicuntur scapella-
 le. Huius autem laquei modus est, quod in capitibus parui baculi
 uel melegarij longitudinis unius semis infiguntur subtilissime uir-
 gule, altitudinis spanne unius, & in medio infigitur quedam spi-
 na duorum uel trium digitorum in latitudine longa, hæc scabella
 opodiat ad ripam sulci, nisi aliqua sit in ripa concanitas, taliter
 quod spina iaceat in terra in fovea, & uirgule sint superius eleua-
 te. Iuxta eam ponatur laqueus cum paruulo palo terre affixus, qui
 leuiter apertus ammoueatur uirgulis, & teneatur ab eis, & in spi-
 na infigatur fuscus, uel faba mollis solummodo unum granum,
 quod auis rostro capiat, ac caput eleuans super collum laqueum
 trahat, plicata scabella cum uirgulis, quam sentiens
 territa caput eleuabit & collum
 & laqueo capietur.

Qualiter autes capiuntur uisco,
Caput XXVII.



Ves capiuntur uisco multis modis: uno modo quod inuiscantur uirgule subtilissime iuncorum uel ulmorum, ubi iuncti desunt uirgule, quidam fiunt breues uel longæ respectu habito ad paruitatem uel magnitudinem auium capiendarum ab ipsis. Sed primo debet uiscus temperari, ut sit bene tenax hoc modo, lauetur bene cum aqua temperate calida aperiendo ipsum manibus balneatis, & obusculis mandando. Deinde admisceatur ei modicum olei oliuarum ut non sit adeo durus, quod pennis auium inuiscari non possit, quo facto uirgulis inuoluatur, ita quod unaquæq; uirgula sit undiq; inuoluta in duabus uel trib. partib. eius, tertia sine uisco remaneat, quæ tractari manib. possit. Quod sit tepus adeo frigidum quod congeletur uiscus, temperetur cum oleo nucum. Hæ uirgule parue inuiscate infiguntur leuiter in uirgis pulmonum, quæ sunt pertice magnæ ramis uiridibus arborum, & precipue quercuum fasciata, habentes in capite superiori quatuor aut quinque uirgas, paulisper eleuatas, in quibus affiguntur & paruissimæ uirgule inuiscate, ac ipse palmonus cum fuerit uirgulis inuiscatus coopertus infigitur in terram, in foueola facta in ipsa, ut stet ad formam arboris rectus. Item circa ipsum infiguntur rami arborum, ad quos appenduntur caueæ in quibus sint multe & diuersæ auiculæ segregatim qui cantant & uolitantes per aëra uocant, quæ uocate se ponunt super dicto palmone inuiscato, & capite in uerram corruunt. Item cum magnis uirgulis inuiscatis capiuntur multe magnæ aues, & precipue corni atq; cornices, cum auxilio gummi, hoc modo in locis ubi stare aut unde transire consueuerunt, inciditur in ramulis arbor aliqua, ab alijs arboribus multum distet, sed aliqui rami frondibus nudati relinquuntur in ea, uel aliquæ ponuntur perticæ super eam, in his infiguntur leuiter uirgule magnæ uiscose, ac gummi in terra ponitur in loco paulisper eminenti, ut melius ab auibus uolantibus

libus uideatur. Quam cum aues uiderint uolitant circa ipsum, & uolatu fessa super arborem inuiscatum descendunt, atq; in terram ruunt, quas aucupator pertica persequatur, & eas occidat, nam si manibus capere uellet lederetur ab ipsis. Item uisco capiuntur accipitres, ceteræq; aues rapaces, nam in terram due uel tres infiguntur uirgule inuiscate, modicum distantes, ac uersus seipsas plicatæ in medio quarum ligatur auis aliqua, ut columbus uel pullus uel caro aut mus, pro miluis & quibusdam alijs auibus rapacibus quæ talia petant, ad quæ cum aues uenerint capiuntur cordulis. Item capiuntur uisco passeræ & ceteræ aues parue uel magnæ, si uirgule inuiscate ponantur in locis in quibus cibantur, uel ubi stare consueuerunt. Item capiuntur cordulis seu funiculis inuiscatis regimuli cum ad ficus ueniunt uel ad uinas, & ceteræ aues quæ arborum fructus furantur, si prædicti funiculi suspendantur ante ficus uel alios maturos fructus ad quos uenire assuescunt. Item funiculis longis inuiscatis capiuntur sturni qui ualde gregatim uolant, cum habetur aliquis sturnus ad cuius pedem ligatur funiculus inuiscatus, & in manu tenetur, & dimittitur cum congregatio sturnorum prope uidetur, tunc enim cum funiculo dimissus ad gregem accedit, & cum ipso stricte uolat, multiq; tangentes funiculum inuiscantur, & ad terram simul cum eo ruunt. Item uisco capiuntur annates ceteræq; aues aquaticæ, cum ex eo inuoluitur funis longus ex paucis quibus scoris fiunt compositus, & præcipue sero in lacu uel alio loco, ubi diuine aues sæpe morari consueuerunt. Nam aues per aquam natan- tes in nocte incidunt in funem, super aquam extensum, & capiuntur, & sequenti mane captæ inueniuntur. Sed oportet quod hic uiscus sit taliter temperatus quod ab aqua defendat se.

Qualiter aues capiuntur balistis,

Caput XXVIII.

Qualiter aues capiuntur balistis & arcubus, notum est omnibus, quod sagittantur ubicumq; sint in terra uel arboribus,

Tit. 2 bus,

bus, sed in his obseruande sunt quedam cautele non omnibus nota, quarum una est, quod balistator qui uult anseres uel alias magnas sagittare aues, debet habere bifurcatas sagittas in parte anteriori, ubiq; acutas, que alam quam tangant, aut collum, incidant: nam sola perforatio communis sagitte uel obtusio non lederet auem in tantu, quod remaneret ibidem, sed uulnerata recederet, licet ex uulnere finaliter alibi moriretur. Item debet intuitum cum sagittat dirigere non ad extraneas, sed ad unam que sit in medio duarum uel plurium, ut si contingit sagittam ultra in se progredi quod pterung; contingit, primam uel ultimam feriat, ne in uanum sagittet. Item qui uult in arborem sagittare columbos, pulzones, qui sunt sagitte in capite grosse, debent habere paris ponderis, & cum uult ad auem sagittam amittere, debet cum pede signare locum specialem ubi est, & notare locum in quo est columbus, aut alia auis, & tunc sagittam emittat, si percutit habet quod habere intendit, alias sepe sagitta inuenire non potest, sed eam potest facile inuenire si ad eundem locum uadat, ubi erat cum sagittam emisit, & per eundem locum aliam eiusdem ponderis sagittam emittat, & per se uel per alium uideat, ubi cadit, ibiq; ualde proxime inueniet primam, quam non poterat inuenire. Item qui cum balista uel arcu sagittat debet manum sinistram tenere firmissimam, si uult rectissime sagittare, & est necesse quod habeat balistam uel arcum optimu, & sagittas rectissimas, si recte uoluerit sagittare, qui autem arcum balistarum exercet debet balottas habere equalis ponderis, & bene rotundas. Item capiuntur alijs quibusda modis: uno modo ad breuexellum cum gimecta quo parue capiuntur auiculae, qui omnibus fere notus est. Sed est sciendum quod hoc modo capi possunt non solum cum gimecta, sed etiam cum capite cattae, nam ad ipsum auiculae ueniunt. Item non solum cum breuexello qui ex duabus uirgulis constat, uerum etiam in quacumq; parte uie uel agri si aucupator supra se deferat leue instrumentum ex uinculis frondibusq; confectum

Astridum, quo ualeat occultari, nec est necesse auiculas excitari solo sono folij arboris seueris, ut communiter fit. Nam & cum sono seeminum papaueris inclusarum in cellulis uel alterius rei similis excitari atq; notari possunt: nam & quibuslibet extraneis & inauditis uocibus incitantur, quia mirantur ex eis. Item capiuntur ad breneaxellum, rustici utuntur noctibus ualde obscuris: habent enim faculam quam unus defert declinam prope uirides sepes, in quibus dormiunt, quæ cum excitantur ueniunt ad ignis splendorem, duoq; alij cum baculis eas mactant, sunt autem baculi quidam uelut pale in capitibus breuium perticarum ex paruis contextis uiminibus. Item capiuntur passeret præcipue iuuenes minus sagaces cum saxa seu brechoello, quæ est quedam cauea ex iuncis cõstructa, de qua exire ignorant, cum ad paruos passerum pullos in ea positos ingreditur, nec exire sciunt. Item capiuntur aues in foraminibus columbarijs, cum mustela domesticata in foramen immissa. Item capiuntur cum cista siue plattella præcipue tempore niuium, sic preparata ut ambus mirantibus cadat, in qua grana congrua pro escaponantur. Cui proderit si multa grana sub eis ponantur uel pauca, uelut fila longius extra, quibus producantur ad cistam.

Aliud.

Item cum scarbelle capiuntur porzane in cannosiss uallibus, ubi morantur. Est autem scarbellus instrumentum quoddam ex duobus arcubus ualde plicatis constructus, ab inuicem parum distantibus inter quos modicũ postponitur fructus herbe coche, similis per omnia cœrasis, quem accipere uolunt, & collo stringuntur, sed eius forma pluriũ magistrorũ non potest sic aperte scribi ut plene intelligatur, sicut oculata fide cognosci.

Aliud.

Item capiuntur cum curbaculo tempore niuiũ, quod est quoddam instrumentum ex paucis uirgulis factum, interius conca-

tum, & in parte postrema acutum, habens hostiolum quod in terra iacet coopertū palea, quod cum uno uimine in terram infixio eleuatur, & posterius percutit auem ad escam intrantē, quæ intus est, quā aliunde accipere nequit, cum sit undiq; terra tectū. Item quodam delectabili ingenio capiatur cornix, cum ex ipsis habetur una, nam ipsa duobus ualde breuibus palaxolis ad principium alarum annexis, suprema in terram firmatur, quæ fortiter clamat, ac fugere nititur, aliæq; propinque curant eam inuolare uolentes, ex quibus ipsa unam rostro & ungulis capiat, & retinet, ut capere possis, & eodē modo aregas capi posse asseritur. Item fertur ut aues quæ gustant granum uel milium in fece boni iani & succo cactiæ mace ratum & siccatum uolare non posse, & poterunt in manu capi.

De capiendis bestiis feris, primo qualiter canibus capiuntur, Cap. xxix.

Ispores præcipue capiuntur canibus, ad quos inueniendos necessarij sunt canes, qui segusi uel brachi uocantur, qui quanto subtiliores olfactus, tanto meliores existunt. Item necessarij sunt canes ualde ad cursum agiles qui eos persequuntur & capiant, qui omnes ad hoc instruantur, & eos capiendos inducuntur, cum ex captis aliquid datur eis in cibum. A quibus etiam capiuntur capreoli, & aliquando cerui, præcipue auxilio retiarum magnarum positarum in locis unde fugantur. Item ab eis capiuntur uulpes, licet in fuga sunt ualde sagaces. Item capiuntur cuniculi cum inueniuntur remoti à caneis. Item canibus capiuntur apri ac lupi, sed cum auxilio uenatorum, nam raro soli ad eos præsumunt accedere, nisi sint mastini fortissimi, & audaces. Sed ad apros capiendos necessarij sunt pili fortes in ferro cruciferati, quos uenatores uidentes aprum ad se malo animo uenientem in terrā firmant, & ad aprum dirigunt, qui eo pilo uulneratus usq; ad uenatorem non potest accedere. Et paruus catulus ad hoc instructus per uiam eat, sicq; à canibus occiditur, & similiter ab his qui uenantur eundem.

Item

Item capiuntur cerui cum ab homine vulnerati sagitta uel pilo fugi-
ant, & paruulus catulus ad hoc instructus per uiam sanguinis ex-
euntis ipsam sequitur, donec ceruus semivivus uel mortuus inueni-
tur. Item canibus inveniuntur & capiuntur ericij & quedam alia
animalia similiter capiuntur ab eis.

Qualiter capiuntur retibus, Cap. xxx.

Cum retibus capiuntur cerui ut dictum est, & vulpes, ut
superius dixi cum de reti locutus fui, quod arolus uoca-
tur à vulgo. Lepores etiam facile capiuntur retibus, si in
ea inciderint, sicut & multe alie bestiae ferè.

Qualiter capiuntur laqueis, Cap. xxxi.

Laqueis capiuntur leones aliquando. Item vulpes & lepo-
res cum per a'iqua foramina introire solent in loca clau-
sa. Sed hoc duobus fit modis, uno modo quod laqueus sit
annexus ad aliquam perticam plicatam adco' fortem, quod feram
collo captam in altum eleuet, ac suspendat. Altero modo, in prope
laqueum sit fortis canolus stringens laqueum ferè, caput impediens
etiam ne ipsa laqueum rodere possit.

Qualiter capiuntur taiolis, Cap. xxxii.

Vulpes & lupi precipue capiuntur quadam taiola ferrea,
que circa se multas habet rampiones acutos, & ipsi ha-
bent circa se anulum prope se ubi annexi voluntur, ad
quem annectitur frustum carnis, omniaq; occultata præter car-
nem, in terra firmata iacent. Cum autem lupus carnem dentibus
captam eleuat anulus eleuat rampiones circa caput & collum lu-
pi, qui cum fortius trahit, & recedere nititur fortius stringitur &
tenetur. Item sunt alie taiolae quibus in pedibus sine cruribus, o-
mnes generaliter bestiae capi possunt, quae occultanter in itineri-
bus quibus utuntur, quae sunt talis figure aut formae, quod non nisi
oculata fide intelligi posset. Ideoq; qui eas habere vult, videat ab
his qui eis utuntur, sicut & ego videre volui.

Qualiter

Qualiter capiuntur foueis, Cap. xxxiii.

Foueis hoc modo capiuntur precipue lupi, fit quædam fouea lata, ut magnus puteus & in terra profunda, quod inde exire non possit. Hæc operitur una rotunda crate, quod non totam, sed quasi operiat foueam sub crate in medio alligatur stanga longior cratio, ac rotunda in medio ponitur ligatur anser uel agnus, & paleis operitur uniuersus locus, lupus ueniens & uolens accipere anserem aut agnum, in foueam cadit cum cratio subito reuoluta. Item fouea capitur multitudo aprorum hoc modo, in locis ubi multi uersantur, agellus seritur de milica, quam aliqui saginam uocant, circa agellum construitur fortis & alta sepes, ex uiminibus arborum in una parte relinquitur, apertus introitus esse in opposito sepis depressa iuxta quam extra sit fouea satis profunda. Cum ipsa sagina matura erit ad ipsam uenient multi apri per locum expeditum intrantes, tunc ad locum accedat quodcumque uult etiam sine armis & in loco introitus moretur & clamet, quocumque modo potest rumorem ac strepitum faciat, apri perterriti non inuenientes unde exire ualeant, nisi per locum sepis depressum inde profiliunt omnes extra foueam, quam uidere non poterant intrinsecus existentes. Item pro lupis, uulpibus, leporibus, & ceteris feris ac canibus & porcis intransantibus & dissipantibus uineds, fouea fit hoc modo: fodiatur ampla duabus spannis, & longa quatuor pedibus aut tribus, & circa sex uel septem, octo pedes profundam cum spundis pollitis & rectis in terra solida & uiuente murata in loco, unde sepe fieri ab eis transitus consuevit, hoc operiatur primo ex transuerso de grossis herbis siccatis, & postmodum subtilissima terra. Si herba non sustineat terram ponantur sub ea duo subtiles & fragiles baculi ex transuerso, & herba per longum quam in medio seiuingat, quod si non potes uel non uis facere sic profundam, pone circa eam stangas, uel aspidiculas strictas habentes nulla canicula, seu pirolas acutos infixos, & declines in foueam ac uersus partem

ius partem mediam paulisper plicator, in quos inclusa bestia cum extra salire uoluerit, capite uel oculis in eos percutiet & leditur adeo quod quiescit. Et si eam mori uolueris, in fundo multos acutos palos infigas, uel si aqua multa in ea erit, sufficiens ad mortem ipsius, quia non poterit in qualibet tramite profunda, solummodo quatuor uel quinque pedibus cum auxilio unius rebalce ex uiminibus facta, super una rotunda strangeete facile uolubili firmata, in quolibet capite cum uno uncino fortiter infixio terre, in quibus uoluit rebalca sit: ab uno capite firmata distans a fouea uno semisse, in alia parte in angulis & in medio habeat lapides ponderantes annexos, hec fiet eleuata quasi omnino erecta cum una furcula, cuius inferior pars sit super uno baculo breui, qui sit in medio foueae ex transuerso, super uno paruulo palazolo ab utroque capite qui sit affixus in ripa foueae in parte suprema. Super hoc breui baculo ponatur quedam uirgula per longum foueae, quae sustineat herbam & terram tantummodo atque a bestia pressa descendat, & baculum breuem cum furcula & reblattam cadere faciat, haec rebalca de die super foueam remaneat ne homo transiens in eam ruat, si canis uel sus in eam incidat cum una scabella quae gradus aspidum habeat extrahi poterit.

De quibusdam alijs ingenijs quibus capiuntur bestiae feræ, Caput XXXIIII.

Lephantes capiuntur hoc modo, ipsi cum non habeant genna, iacere non possunt. Ideoque cum dormire uolunt se arboribus acclinant, & quiescunt: uenatores has arbores refecant, sed non perficiunt, ut per se ruerent possint, sed incumben-
 tibus elephantibus cadunt, & cum ipsi ruunt a uenatoribus occiduntur.

De Ursis, Caput XXXV.

Ursi capiuntur hoc modo: homo armatur ferreis armis capite ac undique coopertus, cum solo cutillo acuto ad latus, accedit in syluam uel alium locum ad uersum, ursus erigitur ad

Vultus ad

tur ad hominem armatum, accedit & amplectitur, armatusq; ipsum tunc euaginato cum manu gladio locum cordis urfi perforat, & sic eum occiditur. Vulpes in caueis suis capiuntur hoc modo: habet uenator alueum apum, sed longū plus & minus latum, hic ab uno capite paucis filis ferreis clausus est, ab alio capite habet hostiolum internum ex parte superiori preparatum, ut possit intus eleuari, superius & non extra exire, descēdens hic hostiolum superius eleuatus, permanet cum uirgula parua, hoc instrumentum ponitur in fouea uulpis, cum præsцитum ipsum in ea esse pars hostioli ponitur in parte intrinseca foueae, ceteriq; introitus foueae qui plures esse consueverunt clauduntur optime. Vulpes autem exire uolens, in alueum intrat non putans filis subtilibus impediri sicq; uirgulam secum trahit, & hostiolum cadens, cum cōcludit, quae retro cedens fortius claudicat, firmat, uenator autem quādo cūq; ueniens uel si uult ipsam cum aluco supra puteum uel magnam tinam portat & aperiens hostiolum ipsum ruere facit in tinam. Cuniculi capiuntur sic: uenator sonans & strepitus agens, eos fugat in cuniculos suos concauos, nam ipsi quia pauidi nimum facile fugiunt, ad eorum foueas, ut ibi tutē morentur. Venator autem ponit reticulum apertum, & in terra bene firmatum ante quemlibet introitum, deinde per unum immittit furectum quem domesticum habet rostro clauso, quodam frenello ne aperire possit, ac cuniculos capere & comedere, nec extra exire uelit, hic furectus parum maior mustela horum proprius inimicus, omnes cuniculos extra expellit, sicq; intrant in reticulos & capiuntur.

De muribus capiendis, Caput xxxvi.

Mures multis capiuntur & occiduntur modis, uno modo à muscipulis domesticis, quae tenentur in domibus: alio modo cum muscipulis quae fiunt ex paruo ligno cauato, in quo cadit aliud lignum paruum graue tamen opprimens & occidens mures intrantes ad cutē porci positam, & annexam in ea ad quandam

quandam subtilem particulam ligniq;, cum tangitur facit quod supra est, cadere super murem. Sed hic modus est adco notus omnibus, quod nō expedit plenius explicari. Item capiuntur quoddā asin de eleuato cadente, qui ex quadam columella eleuatus sustentatur & tenetur, quadam spatula cutem habente sic preparata quod columella diuisa non aperitur, nisi cū mus cutem tangit in spatula eleuatam, & tunc cadit & murem occidit. Item est alius modus, cum in uno modo canne grosse sit in capite arculus cum cordula in qua arcus magna consistit, in media canna foraminis foramen habet in medio, & cutim interius cuidam uirgule alligatam, & sic preparatam, quod cum mus per foramen cutim mordet ac mouet arculus & descenditur & acus magna perforat caput eius, eumq; retinet, ne fugere possit. Est etiam alius modus cum uas aliquod quo exire non possint ad medietatem aqua impletur, cuius superficies operiatur spelta que natat, quam mus uidens & non aquam, descendit in eam & aqua necatur. Item est alius modus quod uas aliquod operitur membrana, hæc in crucem scinditur, & in medio annectitur cutis porci, mures & accedentes ad eam caribam, seu membranam flectunt, & intra ruunt & necantur, si aqua in eo fuerit, alioquin breui tempore moriuntur, fame nimia coacti, statimq; cariba sua natura sursum regreditur, ut eodem modo infinitos decipiat mures. Fertur etiam ab expertis, quod si mures in uas sine aqua cadentes diu uiuere permittantur, fame nimia coacti se comedunt, fortior uiliorem, quod si tantum relinquuntur, ut remaneat fortior mus solus, & hic permittatur perire, quoscunq; in aliqua parte inuenerit occidit & comedit assuetus, & facile cum ab eo non fugiunt. Item occiduntur resalgario trito & caseo aut farina mixto, que libenter comedunt, & moriuntur cum sit ipsorum uenenum. Sed à loco remouenda est aqua, qua sepe inuaniuntur si eam bibant. Item capiuntur etiam si super uas unde exire nequeant ponitur quidam baculus per medium scissus, scilicet una medietas

in medio scissa, & sic preparata ut se sustineat, & non nitrem, in eius medio ponatur nucleus nucis ad quem cum accedit, cum baculo fracto cadit, & si aqua sit in eo, statim moritur, aut si non est occidatur. Item mus facile capitur, si sub circumferentia parapspidis murex ab una parte rupta ponitur, ruptura respiciente interius. Modis ceteris melior est ad capiendum mures tam magnos quam paruos hic est, accipe duas aspidiculas lenigatas, uno brachio longas, & latas uno semisse, ipsas coniunge, distantes quatuor in latitudine digitis uel parum minus in parte infima cum duabus parvulis aspidiculis in castris in quolibet capite una, ut eis de subtus sit equalis. sub ipsis affige cartham de pectore grossam massam in medio ex transverso, sed prope medium non affixam & in tantum restrictam quod possit inter asides eleuari, ut si descendens deformaretur, possit ad suam formam reduci. Item dictæ duæ asides desuper in capitibus coniungantur, ac super eas teneatur aspidicula in medio habente clauum retortum, ad quem suspendatur frustulum cutis porci, uel non suspendatur dicta cutis: sed in medio dictarum asidum prope cartham sit, sicut una mastula cum cute facile reuoluatur. Hoc edificium ponatur super quæcumq; uasa fictilia seu lignea, unde mures exire nequeant, & optimum est quod sepeliatur in massa frumenti uel alterius granis, mures intrabunt, & cum appropinquauerint cuti ruent, & cartha cum eis descendens releuabitur, & de quibuslibet accedentibus idem fiet, neq; muscipule per ipsam arturam intrare ualebunt.

De capiendis piscibus, & primo qualiter retibus capiuntur, Caput xxxvii.

IN mari iuxta planum littus capiuntur præcipue multi pisces cum reti, quod multis corticariam uocant, hoc rete est uale longum & satis amplum & spissum, cordam unius lateris plumbatam & alteram libratam, ut in aquis rectum & extensum permaneat. Hoc rete cum nauicula infra mare deferitur, uno capite

capite in terra relicto, ut in aliqua particula eius continuo descendat in aquam cum nauta fuerint intra mare, quantum rete extenditur arcu, aliter cū illo capite reuertuntur ad litus, & quibusdam ex eis cum illo capite in terram descendantibus unus in nauicula reuertitur extra rete ad medium eius, ad hoc ut pisces infra rete comprehensi uidentes se ad terram trahi non profiliant extra rete, duo autem piscatores ab utroq; capite in terra existentes trahunt cum piscibus totum rete ad litus qui saepe multos trahunt paruos & magnos, plerumq; paucos ac etiam nullos, quia in eo loco non erant. Item capiuntur in mari cum quodam rete subtili nō multum magno duabus perticis alligato, quod quidam in nauicula existentes apertum in aquam demergunt & post paululum cum piscibus elcunt. Item capiuntur in fluminibus & ceteris spaciosis locis cū rete, quod transversarium multi uocant, quod est ex tribus compositum, scilicet uno medio spisso, & duobus extrinsecis raris, habens in uno latere plumbum, in alio lenas, & si ualde longum sit quasdam cucurbitas siccas, ut extensum in aqua permaneat. Hoc rete fit longum uel breue, secundū quod loci aquae latitudo requirit, hoc in aquam per magnam oram dimittitur, ut in eum rete natantes incidant pisces qui rara retia transeunt, & inuoluuntur in spisso, ut aniculae in aranea supradicta, cum de capiendis auibus dicebatur. Item capiuntur in riuilibus paruis aquis, est autem riuale rete paruum & spissum, duobus annexū baculis quos piscator manibus tenet apertum, & per aquam ducit, atq; prope ripam cū piscibus claudit. Item capiuntur zacio, est autem subtile spissum, habens temerij formā, in circuitu plumbatum & reuolutū, habens in cacumine longum funem, hoc rete piscator super sinistrū brachiū clausum tenet atq; in aquā apertum eiecit, hoc apertum subito ad fundum descendit, & omnes pisces infra se inuentos concludit, eosq; cum trahitur secum trahit. Item capiuntur cum negossa quae est rete admodum riualis formatum, ad unam perticam cum duobus baculis adminiculantibus a

parte annexū, hoc rete piscator extra aquam existens in eam præcipue ubi quiescit immittit, & cum piscibus eleuat, plerumq; etiam sine piscibus, & quandoq; circa herbas & frutices prope terram immittit, & cum pertica percutiens in herbam pisces occultatos in rete expellit. Item capiuntur plurimi in locis angustis uallumq; cum rete quod gogolasiā uocant, quod est rete magnum sorte ac spissum, & longum habens introitum rotundū & latum, & paulatim angustatur usq; ad caudam, quæ longa est habens multa receptacula in qua facile intrant pisces, & nusquam redire queunt, hoc rete ponitur cū duabus perticis grossis in dicto loco angusto, circa quod est undiq; ligaminum usq; ad ripam fortis clausura. Cui decem perticæ annectuntur, hoc rete semper die noctuq; tenetur ibidē introitum ad partem superiorem uerso, per hunc locum nullus omnino piscis desursum ueniens transire potest, cum nullus sit locus ibi apertus. Descendunt homines in aperto retis ore, deinde in caudam strictam. Piscator uero aliquando diebus interpositis ut ad locum accedens caudam retis in nauiculam trahit & appetit, euenitq; aliquādo tot pisces præcipue anguillas quæ conglobatæ sunt cum amore feruescunt uel scardinias quæ gregatim incedunt, quod nauicula tenere nō potest, cætera etiā genera pisciū in talibus aquis morantur capiuntur in eo, sed nō in simili quantitate. Itē capiuntur in uallibus multi pisces in locis apertis & profundis, in quibus præcipue magni morantur pisces, cum reti quod degagum uocant, quod magnum & latum in profundum eijcitur, & per eum trahitur & cum piscibus eleuatur. Item capiuntur in uallibus non profundis sed latitudinem magnam habentibus multi pisces generum diuersorum, qui cum in talibus aquis morentur hoc modo: Habēt piscatores gradellas serē infinitas de paludosis cannis instructas, maxima uallium non profundarum spacia palorum auxilio relictis paruulis aperturis in pluribus locis, ad quas ponunt retia parua rotunda in capite ampla & cauda, cum receptaculis suis angusta, & quæ possunt intrare,

trare, sed non exire possunt, hæc retia semper die noctuq; ibi relinquunt, & quasi omni die ferè mane eleuant cum piscibus qui per loca spaciosa natantes transire posse per dicta uacua sperabunt. Funt etiam ex his et aticulis aliquæ taliter inuolutæ, quod pisces intrantes exire nesciant, sed inde extrahuntur cum quodam paruulo reti posito in capite unius perticæ bifurcate.

Qualiter pisces capiuntur cistis & ancis ex uiminibus factis, Cap. XXXVII.

Pisces capiuntur cistis ex uiminibus factis, quæ in capite sunt ample mediocriter & in cauda strictæ, quæ à piscatoribus in aqua stantibus in profundum ducuntur ad modum ripalium retiarum, & quandoq; tales ciste sed leuiiores ponuntur in capitibus perticarum, & per aquam turbidam ducuntur à piscatore in terra stante, ut supra de negotiis narratum est. Item ex iuncis fiunt, fasciæ rotundæ & latæ cum introitu interius stricto, & extra amplo, quæ die noctuq; cum pondere unius lapidis dimittuntur in fundo aquæ, habentiq; utem aliquam in cauda ligatam quæ extrahuntur, sed duarum formarum sunt, una forma est, quod sit interius multum ampla rotunda, in cuius fundo ponitur creta mollis & grana ei annexa, atq; intrant quedam genera piscium causa cibi, & ex inde exire nesciunt. Alia forma est tota stricta & longa sed in introitu mediocriter aperta, & in medio ualde stricta, deinde de lata, & in cauda strictissima, in quam intrant non causa cibi, sed ut ibi occulte morètur, nec de ipsa sicut nec de prima exire sciunt.

Qualiter pisces capiuntur hamo, spadernis, calce & fossinis, Cap. XXXIX.

Amo capiuntur pisces tribus modis, uno modo cum in eo ponitur pisciculus uiuus, cum quo pisces capiuntur rapaces deglutientes hamum cum pisciculo uiuo, hic hamus requiritur, ex ære magnus & fortis, cum forti cordula filo inuoluta prope ipsum, ne radi possit cordula cuidam paruo paneriatum fascicu

fasciculo annectitur, & in aquam stantem cum hamo & pisciculo uiuo eijcitur, ibiq; tota nocte relinquitur. Piscis captus lōge fugere uel se occultare fasciculo impeditur, sicq; mane à piscatoribus inuenitur. Secundo modo hamus cuidam funiculo ex pilis albis & quinæ caudæ annectitur, & circa ipsum cibus qui à piscibus magis appetitur inuoluitur, ut non uideatur hamus, deinde in aqua projicitur, ut notum est omnibus, sed in hoc adhibenda est quedā cautela, uide licet quod piscator sciat qualem escam quodlibet genus piscis auideus appetit, quolibet tempore anni, nam idem genus piscium secundum uarietatem temporum anni diuersa cibaria querit, sed hoc scire potest qui captorum uiscera scindit, & inspicit qualem escam cōmuniter assequuntur, uel si diuersas escas modo unam modo alteram in anno ponit. Item ualet contra pisces cautos, qui escam appensam funiculo accipere nolunt, si habet uirgam & funiculum absq; hamo, cū qua plerunq; escam in aquam emittit, ad quam aliqui minus cauti accedunt, eamq; sine periculo exportabunt, quod cum pluries fecerint hamum eijciet, ad quam omnes etiam cauti & secure accedent. Tertius modus seruatur in aquis profundis, nam in eius manu eijcitur hamus alligatus longo funiculo habenti modicam plūbum per unum brachium prope hamum, ut descendat ad fundum, ibiq; teneatur præcipue incurrentibus aquis. Talis funiculus manu teneatur digito indice appodatus ab eo qui sit in navi uel ponte, cum sentiet piscem capere hamum fortiter trahat, primo ut in eam insigatur ore, deinde paulatim trahatur, donec ipsum piscem manu capiat, qui rarissime paruus erit, cum soli magni morentur in fundo, licet aliquando discurrat per partem mediā uel supremam. Cum spadernis capiuntur præcipue tinea. Sunt etiam tres acus ex ære retortæ ac simul ligatæ, quæ quibusdā breuibus funiculis annectuntur, ac ipsi omnes non multū distantes cuidam funiculo longo his apponitur caudarum cancrorū uel lumbricorum grossorū esca, & in aqua sero extenso iactantur, & mane captæ tinea tolluntur.

C dce

Calce uind capiuntur pisces, si ipsa ponatur in sacco, & in aqua maxime stante in paruo loco inclusa, hic saccus à duobus per totam a-
quam fortiter agitur, ex hoc omnes pisces quasi cæci uenient in
superficiem aquæ ac manibus facile capiuntur. Item capiuntur gros-
si pisces fossinis in aquis dyaphanis. Est autem fossina ferreum in-
strumentum habens multas acuitates, quarum quælibet habet bar-
balam ad tenendum, & sunt aliquantulū distantes abinuicem, quod
piscator habet in capite hastæ lanceæ, uaditq; cum eo quiete in nani
per aquas, & cum piscem uidet eū fortiter ferit, & infixum tenet,
idē faceret existens in terra & in aqua turbida, si piscem uideret.

PET. DE CRE-

SCENTIIS DE MATERIA TOTIVS OPE-
ris commodorum tractans,

LIBER XI.

In superioribus libris diffuse dictum est, de omnibus
operationibus ruris sed quia memoria hominum bre-
uis est, & rerum singulariū turbe non sufficit, ideoq;
uisum est utile, materias tractatum quæ possunt ge-
neraliter exprimi, cōpendiosis secundū ordinē libri concludere re-
gulis, ut sola noticia ipsarū pluriū generaliter habeatur memoria.

De cognitione loci habitabilis in cōmuni, Cap. I.

Ruris exercitia fortitudinem habitatorū, operantiū industri-
am & aptitudinē quarunt, ideoq; loci salubritas precipue
querenda est, aer & uenti, terræ situs & aquæ bonitas locū habi-
tabilem fertilē & salubrem demonstrat. Vir prudens prædī emptu-
rus, ante omnia loci salutem cōsideret, ne in eorum emptionē et do-
morū fabricam pecunia collata, uelox postmodū cum personarum
detrimento aut rei familiaris dāno, poenitētia nō sperata sequatur.

Xx De

De cognitione aëris, Caput II.



Er calidus est & humidus, si nulla causa intrinseca cōuertatur, aër bonus est qui putrefactus nō est, neq; caliditatis aut alterius qualitatis excellentiā habet, sed in his omnib. æqualis aut æqualitati proximus inuenitur. Aër temperatus & elævus salutē efficit habitantium & conseruat & plantæ ab eo proportionabiliter cōualescunt & fructificant, inæqualis uero & uaporū, lacuum & stagnorū & immixtione turbatus contrariū operatur et tristificat animam, humores cōmiscet, & plantas corrumpit. Omnis aër qui cito infrigidatur, cum sol occidit & cito calefit eum ipse oriatur, est subtilis, contrarius non exstat, e contrario, aër omnibus deerior est qui cor constringit, & aëris attractionem angustat. Aëris salubritatem declarant loca ab infinis uallibus libera, nebularum noctibus absoluta, & habitatorum sana corpora.

De cognitione uentorum, Cap. III.



Enti meridionales absolute considerati calidi sunt & humidi. Septentrionales frigidi & sicci. Orientales autem & occidentales quasi temperati, sed in quibusdam locis meridionales sunt frigidi, cum à parte meridiei eisdem fuerint montes niuosi & septentrionales calidi, cum transcunt per adusta deserta.

De cognitione aquarum,
Caput IIII.

Qua frigida & humida, si nulla causa extrinseca fuerit immutata. Aquæ fontium terre libere in qua nulla extrinseca malarum dispositionum & qualitatum superat, sunt alijs meliores. Aquæ petrosæ bonæ sunt, nec facile terrestri corruptione putrescunt. Aquæ fluminum currentes sunt alijs meliores, si super terram liberam non foetidam nec lacinosam incedant, & quæ ad orientem tendant & multum à suo elongantur principio, sunt omnes meliores. Et quæ ad septentrionem uadit bona est, quæ

uero a meridie uel occidentem fluunt sunt male, & maxime cum meridionales sufflauerint uenti. Aqua laudabilis est in qua cito res coquitur, si nullus odor in ea superat nec sapor. Aquarum eiusdem dispositionis que leuior est melior indicatur. Sublimatio & distillatio similiter & decoctio aquas rectificans malas. Ex aquis laudabilibus sunt aque pluuie precipue que cum tonitruo in estate proueniunt, licet propter earum subtilitatem facile putrescant. Aque puteorum & aqueductuum comparatione aquarum fontium non sunt bonae, precipue que de plumbo fistulas habent. Aque male sunt lacuales, paludales, sanguifugales, & omnes quibus miscetur aliqua substantia metallina, grossae autem sunt glaciales & niuosa. Aqua temperate frigida sanis melior est aquis omnibus, appetitum enim excitat, & stomachum fortem facit. Calida uero contrarium operatur. Aque salse macrescere faciunt, & exiccant, turbide uero lapideae & oppilationes creant. Si aqua bonitas uel malitia ratione discerni non potest, incolarum salubritate noscatur.

De cognitione loci situs habitabilis,

Caput v.

Loci calliditas & frigiditas humiditatis et siccitatis dispositio, altitudo & profunditas, aquarum multitudo & paucitas, & earum malitia & bonitas, montium, lacuum, paludum & maris uicinitas. Iterum terre ipsius dispositio, que lutosa uel humida, caenosa, minerosa, seu petrosa. Situs indicat qualitatem. In locis calidis habitantes denigrantur facies & capilli, & eorum eorda sunt timida, citoque senescunt, in locis frigidis existentes sunt audacia maioris & melius digerentes, quae si humida fuerit, crassi & carnosius teneri & albi erunt, in locis morantes humidi pulcherrimi sunt facierum, & eis diurnae accidunt febres, & cum excitantur cito aduenit lassitudo, in siccis uero exiccantur complexionibus & corpora obscurantur. In locis habitabilibus alii morantes sunt sani & fortes laboris multum patientes, & uiuunt diu profun-

da uero loca contrarium operantur. Habitantes in locis petrosis, habent aërem in hyeme ualde frigidum, & calidum in æstate, corpora eorum dura fortia & multorum capillorum exsunt, multum uigilantes, inobedientes, & malorum sunt morum: & est in eis belorum fortitudo, & in artibus solertia & acuitas. Civitas ab oriente aperta, & ex opposita parte cooperta est sana, & boni aëris, ea uero est infirma quæ contrarium situm habet. Incolarū habitudo secundum sanitatū uel ægitudinū genera situs indicat qualitatem.

De tumbis & domibus, Caput vi.

Donus & tumbæ seu aræ & curiæ magnitudo fieri debet in rure, secundum domini facultatem & quantitatem animalium nutriendorum, & fructuum portandorum ad eas, tute autem sint & fortes, foveis & muro uel spinis secundum potentiam domini & oportunitatem in locis illis, nec expositæ insidijs furium & latronum. In tumbarū munitionibus fructifera arbores non plantentur, ne fructuū auaritia desiderata munitio dissipetur, in eis etiam arborum aliquarum non procuretur augmentum, sed omnes ad munitionis fortitudinem & decorē domorum fundamenta latiora quam paries esse debent, & usq; ad terrā profundentur solidam, quæ si desit quartam partem fabricæ misisse sufficiat. Arena quæ manu comprehensa ædit stridores, uel quæ manu respersa nihil sordis reliquit in panno lineo candido, egregia est & utilis fabricanti. In duabus aræ partibus calcis una miscenda est, quod si equali mensura misceatur erit fortissimum cœmentum inde commixtum. In flumiali quoq; arena si tertiam partem testæ, cretæ addideris operum soliditas mira præstabitur. Ligna pro edificijs optima sunt quæ mense Nouembri aut Decembri ceduntur, & maxime si ultra medullam incisa super radice quibusdam relinquuntur diebus, & ea sunt præcipue durabilia quæ à parte meridiei montium sunt incisa.

De puteis

De puteis & cisternis, Caput VII.

Puteus si fons defuit mense Augusto uel Septembri, & loco idoneo fiat, ab omni letaminis seu putredinis palude remotus. Cum aqua ducitur aliunde, diligētis erit aquarum receptacula fabricari, ut sufficientem copiam inops uena procuret. Vbi cisternis utimur anguillas piscesq; fluuiales ponamus in eis, qui suo natatu aquam cōtinue moueant, & à corruptione præsuerent. Vbi aquis fluminum utimur tutum est cisternas habere, cum sabulo loque eas à terrestritate liberent, & claritate decorentur.

De præsentiā dominorum, Cap. VIII.

Præsentiā domini profectus est agri, & qui deserit uineam, deseretur ab ea, rusticorum importuna uoracitas, nihil timet, nisi dominorum præsentiā & cautelam.

Regulæ secundi libri, & primo de qualitate terrarum, Caput IX.

Lerra naturaliter frigida & sicca, sed accidentaliter saepe rebus intrinsicis immutatur. In terris fecunditas querenda est, ne alba & nuda gleba sit: ne macer sabulo sine admixtione terreni, ne creta sola & arenosi pulueris lapidosa macies, ne salsa uel amara uel uliginosa, ne uallis nimis opaca: sed sit gleba putris & ferè nigra & ad tegendum se graminis sui crasse sufficiens, quæ protulerit, neq; scabra sint neq; retorta, nec succi naturalis egentia. Frumentis dandis utilis terra est, quæ naturaliter profert ebulum, iuncum, gramen, trifolium, calamum, rubos pingues, pruna syluestria, lappas, farsana, cicutam, maluā, urticam, & ceteras similes herbas, quæ latitudine & pinguedine foliorum letum solum & fecundum demonstrant. Vineis utilis terra est, quæ corporis aliquatenus rari atq; resoluti est, uirgultaq; nitida procera fecunda sunt, neq; intorta neq; debilia, nec macra exilitate languentia. Situs terrarum non adeo sit planus, ut stagnet, nec

præruptus ut defluat, ne arduus, ut tempestates nimis sentiat & calores, sed in his omnibus utilis semper & equata mediocritas requiratur. In frigidis provincijs orienti uel meridiano lateri, in calidis uero septentrioni ager debet esse oppositus. Inferior pars terrarum pinguis, grossa & frigida est, superficies uero macra, subtilis & calida. Quatuor sunt agrorum genera, uidelicet satiuum & consitum, compascuum & nouale, satiuus ager est qui pinguis est, & seritur omni anno. Omnis ager qui calidus est & humidus mollem habens superficiem & porosam, cultui facilis est & ferax. Eligendus est ager pinguis & rarus, qui minimum laborem petit, & fructum maximum reddit. Secundi meriti est pinguis, densus, hic enim si multo labore colatur tamē ad uota respondet. illud autē genus terrarum est pessimum, quod siccum & spissum, macrum & frigidum est. Terra sicca & adustione sterilis effecta & salsa uel amaranthiquam recipit medicinam: quæ uero humore superfluo infœcunda est, fossatis conuenientibus emendatur. Colles montium siccitatem & macredinem patiuntur, ualles autem ipsarū pingues existunt, & humidae propter pinguedinem, quæ ad ima decurrit, ideoq; tales agri per latera sulcandi sunt, ut in sulcis sit et retenta pinguedo, nec oportet comminui glebas, ne pluuijs impetuose superuenientibus mota terra cum omni semine feratur ad uallem. Noualis ager est qui primo ad cultū reducitur, uel qui ad pristinā uirtutē redit per quietem unius anni uel plurium. Conseri non conuenit plantis ager puluerulentus & siccus, quia planta querit locum solidæ continuitatis in quo radiceatur, & floreat, & fructum ferat.

De aratione, fossione & cultu, Cap. x.

Arationis & fossionis quatuor sunt utilitates in genere, uidelicet terre apertio, eiusdem adæquatio, agri commixtio, & eiusdem comminutio. Obseruandum est, ne lutosus ager arctur, neq; si fuerit nimis siccus, nam terra quæ lutosa tractatur toto feratur anno tractari non posse, nimis uero sicca plurimū laboriosa est,

& non


Et non potest comminui, ut oportet. Si ager qui post longas siccitates, fuerit umbre leui perfusus, aretur per triennium fieri, quasi sterilis affirmatur. Ager fortis glutinosus et adulterinis herbis repletus quatuor arationes requirit. Poroso autem et mundam et subtilem terram habenti, sufficit forte una, vel duabus aut tribus ad plures arationibus est contentus, quaelibet trium vel quatuor arationum, fructibus addit proportionabiliter sui numeri quantitatē, quotiens fructus laboris excedit meritum, insistendū est cultui: si uero labor utilitatem fructus excellit, relinquendus est locustalis. In locis siccis agri maturius, in humidis uero serius proscinduntur. Qui arando crudū solū inter sulcos relinquit suis fructibus derogat, terre uberitatem infamat. Facilius est enim culta exiguitas quam magnitudo neglecta. Seruandū est autē ne inter sulcos terra nō moiet elinquatur, et glebe sunt malleis dissipandae. In agro periclitantur interiora, si colantur extrema. Si lapidosus est ager, per multas partes saxorum turba collecta purgari poterit et arari. Iuncus, gramen et salices et caeterae herbae nocuae frequentī aratione mense Iulio, uel lupinorum seminatione uincuntur.

De seminatione, Caput XI.


In terris frigidis maturius autumnalē oportet fieri sationem, ut segetes aliquid roboris ante hyemis aduentū accipiant, in calido uero et pingui agro differatur satio in quamū potest, ne ipsius tempestina satio herbarū inutilium luxuria suffocetur. Si humidus nimis ager non autumnō, sed uere seratur, cui praecipue cōpetit faba et linū, quae radicibus eniuis superfluum humiditatē consumunt, quaecūq; seruntur in uere locis calidis maturius, frigidis uero serius conferantur. Autumnalis aut satio cōtrarium actū querit, exiles campi uel aquosi maturius, pingues uero serius semnētur. Uē aquosi autumnali tempore maturē serātur. Si ager plurimū pinguis et serax nō seratur semel, uel pluries omni anno, luxuriabit in spuria diuersarū herbarū, quod postea sine magno labore non

non poterit emendari. Omne triticum solo uliginoso post tertiam sationem in genus siliginis commutatur. In quolibet semine duo sunt; virtus uidelicet formatiua quam habet e caelo, & substantia formatiua quae figuratiua recipit in planta & plantae organa. Omnis seminatio fieri debet cum semen auxilium maius habet e caelo. Hoc autem est in primo etate lunae, quia tunc inuatur calido humido, & uisifico lumine solis & lunae similis. Omnis satio quae fit cum sol ab arietate in cancrum progreditur est perfecta & autumnalis, tunc radices movebuntur in debitam suae substantiae quantitatem, uernales etiam in matrice terrae iacentes tunc pullulabunt sole temperatio coadiute germinabunt & florebut ante tempus siccitatis aestiuae, caueendum est ne ultra mensuram semina iaceantur in agro, quod si fiat macilentia & non proficientia erunt. Attendendum est ne quae iacentur semina sint corrupta, sed ea optima sunt quae anni non excesserint etatem. Omnium surculorum uel frugum genera praecleara, sed terris tuis experta committe, in nouo enim genere seminum ante experimentum non est spes tota ponenda. Semina locis humidis citius quam siccis degenerant, omnia legumina feri iubentur in sicca terra: faba tantummodo in humida terra iubetur spargi. Licet temperatis agris serendum sit, tamen si siccitas fuerit, semina iacta non minus in agris quam in horreis seruabuntur.

De aqua plantarum, Caput XII.

 Quae melior omnibus ad irrigandos agros & maturandum letamen est paludalis seu fouearum ex pluuijs & roribus congregata. Confert etiam plantis aqua puteorum & fontium, postquam eam calefecerit splendor solis.

De letamine, stercoreatione & immutatione plantarum, Caput XIII.

 In his humido & pingui letamine plantae substantia nascentis & putredine inficitur, sapor fructuum immutatur in peius, & repletur talis planta superfluis folijs & molibus

libus ramusculis infœcundis. Optimum letamen est ferè omnium animæ & quadrupedum, quod in via corruptionis est, & non calore naturali destitutum & incineratum existit. Letamen plantæ naturam immutat magis quàm cibus animal quod nutritur ex eo, natura plantarum melius per letamen quam per modum aliquem immutatur. Frigida & humida terra optime per incensionem cespitum & cineris emendatur. Stercorum congestio suum locum tenere debet, qui abundet humore, & propter odoris horrenda à prætorij cõuertatur aspectu. Cineres loco letaminis optime sparguntur in agris sterus quod uno anno requieverit satis est utile nec herbas ercat, si uero uetustius est, minus proderit. Recetia sterora prosunt prætis ad ubertatem herbarum, maris purgamenta si aquis dulcibus eleuantur reliquis iuxta uicem steroris obtinebunt. Stercorandi sunt agri spissius in collè, in campo rarius, cum luna minuitur, hoc enim herbis si seruetur officiet. Non debent æstiuo tempore plures cuniculi letaminis spargi quam eo die poterunt incitari, non prodest uno tempore nimium stercoreare, sed frequenter & modice. Ager aquosus plus steroris querit, siccus minus. Si letaminis copia defuit optime pro stercore cedit ut sabulosis locis cretam, frigidis uero argillam, cretosis & nimium spissis sabulum spargas, hoc enim segetibus proficit, & uineas pulcherrimas reddit. Vel seminantur lupini, qui cum ad debitum quasi augmentum peruenierint euertentur. Lutum de fundo lacuum & paludum acceptum pingue & fertilem facit agrum. Omnino autem conuenientissimum plantarum nutrimentum est, letamen in palude temperata & humiditate putrefacta nutritum, & conuenienti stercore commixtum. Agri colium in partibus superioribus plurimum & sæpe, in medijs parum & raro simandi sunt, in simis uero simulatione non egent.

De quibusdam principijs plantarum
& operationibus earum, Cap. XI III.

Septem sunt sine quibus nulla omnino nascitur planta, videlicet triplex calor, circuli cœlestis, loci & seminis, & triplex humor, scilicet materiæ seminalis, terræ, & plus minus de super uenientiū, & agri continens. Plantæ opera sunt uti alimento, augere & generare. Vt arborū est terra, in qua omnē impuritatem ita relinquunt. Arbores infigunt radices deorsum in terram, ut ex ea sicut ex stomacho nutrimentū sugant, quod si eas in superficie tantum spargant, cito ardescunt. Certū est arbores nō semper augere quam diu terra radicibus adherent, sed omnīu naturā constantiū esse quantitatem determinatā inter duos terminos maximi in suo genere plantæ. Sugendo per poros habent nutrimentum, & de eo quod extrinsecus à spiritu eleuatur in gēmas formatum omne quod gignunt. Plantæ raras porosas & calidas habentes radices, nutrimentū attrahunt plusquam digerere possunt, & ideo fructus generant putrescentes, nisi superfluum humidum educatur. Multitudo ramorū ex abundantia nutrimenti & calore solis arborem undiq; tangente, qui succum euocat ad exteriora procedit. Caro seu pulpa in fructibus à natura creatur, ut semen in terram decidens ab ea simetur, & facilius conualeseat. Arbores quandoq; fructuum alternis proferunt tantum annis, propter nutrimenti defectū & uirtutem exhaustam, quæ sufficienter nutrire non possunt ramos & fructum, nisi per cōuenientem requiē fuerint renouatæ. Omnis planta quæ ex semine oritur est syluestris, quia semē à syluestri radice proseedit, & per stipitem & ramos transit, ut uirtutē totius arboris acquirat, ut possit sibi simile generare. Cum aliqua radix inciditur ex ea plerūq; nascuntur aliæ quæ plantam nutriunt loco eius. Si arbor uetusta uel nimīū consumpta inciditur, debilitē pullulabit, aut sola gramina uel fungos producet. Syluestriū arborum fructus sunt plures, sed minores & acriores propter nutrimentū siccitatē, domestica

rum utro sunt pauciores sed maiores & magis dulces, propter oppositam rationē. Omnis planta mascula priusquam femina pullulat, propter calidū fortius mouens, & eius folia strictiora sunt propter masculi siccitatem, quædā plantæ alias impediūt à generatione & fructu, sicut corilus & caulis pitē, solum, segetē & nux ferē omnes alias propter pernecabilē amaritudinē eius, adeoq; diuersorū plantationē & sationē simul plerūq; canere oportet. Omnis plantatio indiget seminali humido, terminato loco, cōueniēti aquæ siue humore temperato nutriente, & aëre sibi cōsimile & proportionali, ut nascatur & crescat. Plantæ calido tēpore uegetantur, in umbra noctis & solis feruore liquecūt. Plantæ hyemali tēpore humore in radicib; cōgregant, quē in æstate dispergūt in ramos & augēt illos. Omnia quæ in superficie terræ nascuntur ex uaporib; de subius ad superficiem pertingentibus oriuntur. Fructus mōtium saporosiores existunt quā uallium, quia digestio melius completur in eis.

De poris plantarum, Cap. xv.


Sucus et humor per poros radicis attractus ad similitudinem plantæ ex digestiua calore terminatus ad eā nutriendam. Radices quantū ad nutrimentū tractū sunt ori similes, sed quia in fundo calorem unificum totæ plantæ similitudinē cordis habēt. Medulle in plantis sunt sicut nucha in animalibus. Nodi creati sunt in omnibus plantis multū medullosi & cōcaui, ut retineant nutrimentū & spiritu, ex quib; eas augeri & uiuere oportet, donec succus cōuenienter digestus. Cortices in plātis sunt sicut coriū in animalib; nō ex cōtortione uenarū, sed ex humore terrestri expulso ad superficiē generati. Poliorū materia est humor aquosus nō bene digestus, aliquantū cum fecce terrenitatis cōmixtus, quibus sagax natura fructus à superfluo feruore tuctur. Fructus materia est uapor siccus, unctuosus ad perpetuandas plātarum species, ab anima uegetabili generatus. foliorum substantia ex subiuori generatur humido perfecte digesto, qui primo ebulliens calore ortum fructum antecedit.

De plantatione & generatione plantarum,
Caput XVI.

Arborum & ceterarum plantarū quedam generantur plantate. Quedam ex semine, quedam ex cōiunctione elementorum & uirtute cōlesti. Rami qui sine radicibus plantantur, si solide fuerint substantiæ, scindantur inferius cum panguntur, ut facilius attrahant nutrimentū. Arbor cuius semen debile fuerit, melius ex ramis seu radicibus quā ex semine conualescit. Plantæ humidae aquatice molles quocumq; modo terre infigantur de facili radices emittunt & conualescunt, quæcumq; plantæ calidæ sunt licet duræ ramis in terram infixis conualescunt. Quia earum caliditas fortiter attrahit nutrimentum. Omnes plantæ quæ aromaticos, calidos & siccos habent fructus cōuenientius plantantur in montibus, eas uero quæ solidos & humidos fructus ferunt, magis cōgruit in ualibus plantari uel scri. Arbores paruum & debile semen ferentes ex semine & ramis plantari & cōualescere possunt, ex semine tamen plantatio est periculosior, & in longam nimis speratur ætatem, & syluestris ex eo nascitur planta; ex ramis uero citius conualescit, & inde domestica nascitur nō syluestris, si ex domestica planta fuerit ramus acceptus. Arbores quæ semen magnū & sorte producant ex eo melius quā ex ramis proueniunt. Arbores nullum ferentes fructum ex ramis uel radicatis plantulis cōualescunt. Si cōsacerendus locus ab animalium rodentium accessu nō est tutus, in aliquo loco clauso per biennū rami uel semina nutrirī oportet, inter ra soluta, dulci & aliquantulum stercorata, deinde ad loca dīspōsita transferantur. Omnis nouella planta frequenti fossione & tempore magne caliditatis irrigatione inuetur. Spacia inter arbores uel uites seruanda, secundum arborum magnitudinem, loci pinguedinem & consuetudinem approbatam. Omnis planta in solo arido uel decliui profundius, & in humido & depresso minus profunde plantetur. Si plantatio sit in terra cretosa sabulum miscetur, in sabulo

fabulo creta, in macra uero plus letaminis apponi oportet. Cū plan-
ta transfertur, nisi parua fuerit, eis dē cœli quibus ante steterat car-
dimbus opponatur. Cum plantam in scrobem deponis, quod de ra-
dicibus laesum inneneris amputabis. Cū plantantur ne terra nimis
mollis aut sicca sit cauere oportet, potius tamē sicca quā mollis ex-
istat. In aridis seu mōtuosis locis ante hyemem. In humidis uero seu
ualliculosis in uere plantationes fiant: sed in temperatis utroq; tem-
pore cōuenienter plantatur. Si ponenda sunt arborum semina præ-
cipua eligantur mense Ianuario, non amplius quaternis digitis sub
terra mergantur. Quod si locus calidus & siccus fuerit Octobri uel
Novembri mense ponantur. Rami qui sine radicibus plantantur me-
lius conualescunt, si mense ponantur Martio, cum iam cortice se uir-
ridis succus insuderit, aut etiam mense Octobri, cum nondum uir-
uificus plantę spiritus fugam habuit ad radices. Ramusculus qui
plantatur torquendus non est, nec alio modo uexandus, uerū si du-
re solidęq; substantię sit, proderit si pars scindatur inferior, & in
scissura immittatur lapillus. Rami plantandi sunt lati, succosi, nim-
tidi, gemmis spissis & pluribus oculati, ad unam materiam sint re-
dacti. Ramis plantandis qui nimis longi fuerint cum ponantur am-
putantur congrue summitas, & in conuenienti longitudine relin-
quantur, ut in salice, uite, oliua, & cæteris his similibus.


De insitionibus, Caput xvii.

 Minus insitionum melior est similis in familia secundum
genus, ut piri in pirum, & uitis in uitem. In nimis duro
stipite incongrua est insitio, quia in eam uenas radicales
immittere nequit, sed in eo in quo parua est durities, & multa suc-
cositas optime conualescit. Surculi inferendi sunt steriles succosi de
nouo nati, gemmis spissis & pluribus oculati, & ab orientali potius
quam ab altera parte decisi. Diuersitas in malis & piris & cæ-
teris fructibus ab insitione arborum eiusdem speciei tota proce-
ssit. Insitio in magnis arboribus quibus cortex grossus & pinguis est,

inter lignum & corticem fiat. In subtilibus uero fit conuenientius scisso ligno. Licet insitio multis temporibus fieri possit, ea tamē præcipua est, quæ fit eo tempore quo gemme incipiunt esse suspectæ. Verum arbores refinam producentes antequam ipsa fluere incipiunt, conuenientius inferuntur. Insitio ad buccellum fieri nō potest, nisi cum iam cortex separatur à ligno. Est autem optimum scissum ab una parte buccellum apponi, & uirgule summam relinqui, donec buccellum comprehendisse uidetur. Insita planta nutrimentum à stipite trahit in tantū, quod postquā conualuit raro permittit trunco sub nodo aliquid pullulare. Omnis insitio quanto inferior tanto melior. Nam fructus magis domesticat & melius cōualefcit.

De medicamine arborum & terræ,

Caput XVIII.

 I uetustarum arborum scindantur radices, & in scissuris lapides immittantur, melius attrahunt nutrimentum, & sic aliquando fiunt fertiles, quas sterilitas inuadebat. In ueteratis plantis per abscisionem ramorum redit iuuentus, nisi iam peruenierint ad ultimam senectutē. Omnis planta domestica sub tracto cultu syluescit, præcipue si ad sabulositatē & arcuositatē conuertatur, & omnis syluestris domesticatur adhibito cultu. Cultus in domesticandis arboribus, in conuertendo, fimando, uel adem quando nature arboris terram, & in abscisione spinosorum uel superfluorum, & in insitione, consistit. Quotiens ager mala dispositione consistit, sapiens agricola eum ad laudabilem dispositionem immutat. In agro nouali ad cultum redactio, facienda est extirpatio syluestrium stirpium & radicum, quæ omnem sugunt agri humorem. Noualis ager pluribus annis fertilis est, deinde oportet ad inheretamen si ferax debeat permanere: uel nisi sit pinguis, interponi quietem, præsertim quando cū substantia herbari & paluari plantæ in eo satæ aut metuntur aut radicibus euelluntur. Cum humor uiuificus & spiritus agri per semina & plantas attrahitur, eis dena

eadem terra destituitur, & determinato tempore quiescens, ad agrum iterum reuocatur: uni cuius, alteri tardius, secundum quod ager agro fecundior inuenitur. Quæcumq; cum labore & expensa uirtute perficiantur, n. si quiete interposita restitutum accipiant, dissoluantur & corrumpuntur. Si necessitas cogit de salsa terra sperare aliquid, post autumnum plantanda uel serenda est, ut malitia eius hybernis imbris eluatur, aliquid etiam terræ dulcis uel finni uel arene subijciendum est, si illi uirgulta committimus.

De munitionibus, Caput XIX.

IN cretosis terris que facile ruunt ripæ fossatorum parum pendentes, in rubrica uero uel glareosa terra & similibus que non facile ruunt plus fieri possunt ubi multa necessaria est munitione uinearum, & aliorum locorum. Ex spinis solymmodo plantationes fiant, ubi autem est tanta necessitas, & lignorum habetur penuria propter ignem & edificia, ex arboribus tantum fiunt, cum sit aliqua plantatio spinorum uel arborum propter sepes iuxta terram post biennium rescindantur, ut pullulant & sepes inspissant.


Incipiunt regulæ tertij libri de horreis,

Caput XX.

HORREA frigida uentosa & sicca, & longe ab omni humore & foetore & stabulis esse debent, eisq; aer debet esse aduersus, nihil utilius est diu custodiendis frumētis quam optime exiccata inferantur horreis, & aliquando in uicinum locum transfusa refrigerentur. Locus in quo frumenta ponuntur, non sit nimium excellens in frigore uel calore, quia utrunq; segetes corrumpit. Cum legumina tarde seruntur debent in aqua letaminis madi da seminari, ut citius germinare cogantur. Omne granum quod in pingui solo oritur est pinguius, nutritilius et in pondere grauius, quod autem in macra nascitur est contrarium. Frumentum & cetera grana patentij campo letantur, & eisde uimbre inferunt lesionē. Locis humidis & aquosis

Et aquosis frumentum sepe degenerat, Et in lolium Et auenam quandoq; conuertitur, frumentū collis grano robustius est, sed metusuræ mitius respondet. Omnia grana, præter milium diutius in suis stipulis quam excussa seruantur. Omnia que tempore seruntur æstiuo, solidam terram requirunt, cunctamq; refugunt, quam sola milia casu pinguis fuerit, non formidat.

Regulæ quarti libri de uineis,
Caput XXI.

 Vt inueniantur multæ uinearum uarietates, unusquisque sue patriæ morem obseruet, alioquin laboratorum eos procurantium patietur defectum. Cælū mediocris qualitatis uitis desiderat, tepidum magis quam frigidum, Et siccum potius quàm umbrosum, procellas nimium uentosq; formidat. Aquilæ uites sibi obicectas fecundat, auster nobilitat, in arbitrio itaq; nostro est de uino plus habeamus an melius. Campi largius uinum ferunt, colles nobilius. Locis frigidis à meridie uineta ponantur, calidus à septentrione, temperatis ab occidente uel oriente. Loca naturam sepe uitibus mutant, Et ideo earum genera cōuenienter aptentur, plano loco uitem statuas quæ nebulam sustinet Et pruinas, collibus quæ siccitatem perfert Et uentos, pingui agro graciles et fecundas, macro feraces Et solidas, frigido Et nebuloso eas quæ hyemem celeri maturitate præueniunt, aut quæ duris acinis inter caliginem securius florent, uetoso tenaces, calido genere teneriores Et humiditas, sicco eas quæ pluiam ferre non possunt. Eligenda sunt genera quæ natura uitiorum suorum contraria loca diligunt, his in quibus durare non poterunt. Placida sane regio Et serena tutè genus omne suscipiet. Industrius uir probata diligat, Et locis talibus mandet, quæ mutari possint illa unde sumuntur. Solū ad uineas ponenda nec spissam nimis, nec resolutam, neq; exile, nec letissimū esse debet, nec campestre nec præcept, nec siccum nec uliginosum, nec salsum, nec amarū, sed quod inter omnes nimietates temperamenti tenebit

tenebit, & propius raro quam depresso fuerit. Ad vineas rudes agros & maxime sylvestres eligamus, deterior omnibus est in quo fuerint uineta uetusta. Quo si necessitas coegerit prius multis arationibus radices prioris uince dissipentur. Omnis locus, pastinatus prius impedimentis omnibus, liberetur, ne fossa terra post calatū assiduo solidetur.

De electione plantarum uitis,

Caput XXII.

Plante uitis que mense octobri uel martio abscinduntur meliores sunt quam que alijs temporibus colliguntur. De uinea nimis pingui cum in loco exili desideras plantare non sunt colligenda sarmenta. Eligenda sunt pangenda sarmenta de uite media quinq; uel sex gemmarum spacio & ueteri procedentia. Summa flagella repudiemus precipue cum in arbores uineam plantare uolumus. Sed & pampinus qui de duro nascitur pro frugifero non ponatur. Fertilitatis uitis certum est signum, si de duro aliquo loco fructum citabit, & foetu impleuerit ramulos ex omni parte surgentes, uno solo anno uitis fertilitas explorari non potest, sed in quatuor uera generositas surculorum probatur. Nouellus palmes nihil habens ueteris in quo frequens nodus exuberat debet eligi ad pangendum.

De regulis plantationum uitis,

Caput XXIII.

Si pinguis est terra, maiora inter uites spacia relinquamus, si exilis angusta. Non est uno genere uitum omne pastinum conferendum, ne annus iniquus graui uindemie spem omne concludat. In aquosis locis post hyemem, in siccis uero ante hyemem utilius uinea plantabitur & propago ducetur.

De insitione uitis, Cap. XXIIII.

Iuncus uitis inferendus eligatur solidus, qui humores exuberet alimento, nec ulla uetustate aut iniuria laceratus aurescat, iuxta terram, uel sub ea uitis inferitur. Nam super eam difficilius comprehendit. Inferendi sarculi solidi sint, rotundi, gemmis spissis & pluribus oculati, ex quibus duo uel tres insitiones sufficiunt. Insita uitis optime ligatur, & à sole & uentis opcrimento aliquo defendatur, ne hi quatiant, hic adurat. Cum calor temporis insitam uitem inuadit, ipsi tenuis humor debet circa uesperas frequenter affundi. Cum germen insite uitis accipit nutrimentum, adiutorio alicuius pali debet annexi, ne motus aliquis fragilem sarmenti quasset etatem.

De putatione uinearum,
Caput XXV.

Vinearum putatio locis frigidis post hyemem, calidis uero & temperatis ante & post comode celebratur. Auferenda sunt leta, intorta, debilia, superflua et malis locis nata sarmenta. In locis letis & clementioribus alius licebit uites expandere, in exilibus aut aestuosis uel decliuis humilior est habenda. Multitudo uel paucitas sarmentorum secundum uirtutem uitis relinquatur & soli. Vetera sarmenta quibus primi anni fructus pependit omnia rescindantur, & noua circumcisis capreolis & ramulis inutilibus dimittantur. Vites multum fertiles, in quibus frequens nodus exuberet stricte, quæ uero gemmas per longa internodia distulerint largius sunt putandæ. In uitis putandis tria considerata sunt, fructuum species, successura materies, & locus qui seruet & reuocet. Vitis quæ mature putatur, citius pullulat, maioraq; sarmenta producit, quæ autem tarde putatur serius pullulat, & fructus plurimos profert. Post bonam uindem à stricte putat, post exigua largius, plurimum prodest uitis, et præcipue nouellis, si ab eis ablaqueatis si peruacue rescindantur radices, quas in summo producant.

De fosiõis

De fossione vinearum, Cap. XXVI.

Celebranda est fossio vinearum antequam nimis gemme turgescant, quia si fossorem apertius uis oculus uiderit, cecabitur spes magna uindemae. Quae florent constat non esse tangenda. Fossio vinearum fiat cum terra non nimis mollis nec nimis siccata est, sed cum pulverizabilis mediae dispositionis existit, sit autem studium ut uniuersa terra moueatur equaliter, et maxime iuxta uites, ut in ea nihil crudum soli remaneat, quam rem diligens cultos exploret.

De uuis & uino, Cap. XXVII.

Siluae pingues quasi maturae frondibus per latera densantur et colligantur, rore consumpto et aere sereno, nimium fiat potentius et melius duraturum. Vuae lucide non pingues, nec consumptae potentius, nimis maturae dulcius, acerbae acerbius, aquosae aquosius uinum produciunt. Vuae in augmento lunae minus seruabile faciunt uinum, pluribus ex causis leditur et turbatur, uidelicet calore et frigore, foetore, tonitruis fortibus, terremoto ac motu uasis, et australibus uentis, quandoque parum, et tunc modica contraria medicina curatur, quandoque multum et tunc requiritur fortior, quandoque in tantum quod eius calor naturalis in totum extinguatur, et tunc nullo modo curare potest, quia mortuo nulla potest medicina conferre.

Incipiunt regulae quinti libri: De arboribus, Cap. XXVIII.

Licet quaedam arbores desiderant aërem calidum, quaedam frigidum, et plurimae temperantem, et quaedam terram pinguem, et quaedam macram, in hoc tamen conueniunt, quod omnes terram in superficie siccam et in uisceribus humilem requirunt. Autumali tempore arborum oportet denudari radices, et aliquid pomilatae minis quod per pluuie fluxum cooptis radicibus apponitur, quod si nimis uisibulosa fuerit terra congrue recipiet cretam, et si nimis cretosa sabulum

appondatur, in pingui solo plus, in exili minus. Arborum stipites eleuentur à terra, plantæ arborum à tempore quo posite fuerint usq; ad triennium non putentur. Ab adolescentia plantarum usq; ad debitum complementum earum sollicitè curandum est ut stipes in ramos, & rami in uirgas, & uirga in fragra fructifera diuidantur, succedente autem senectute recidatur ab ea omnis siccitas & ramosum superfluitas, quam cum fructibus nequit commode sustentare. Omnis arborum putatio quandocumq; à tempore casus foliorum fieri potest, præter gelidum acumen, usq; incipiunt pullulare. Attende oportet ne spuria in arbore nata aut iuxta stipitem ex radicibus erumpentia dimittantur sed ea usq; ab initio amputari, herbas quæ suarum radicum magnitudine arboribus obsunt, plurimum circa eas euelli oportet. Si arbor uermiculosos profert fructus, supra radices terebretur truncus, & in foramine quercinus cuneus infingatur. Cum languescunt arbores eis ablaqueatis alterius dispositionis circa eas terra ponatur.

Incipiunt regulæ sexti libri de hortis, & primo de aëre, terra & situ eorum,
Caput XXIX.

Hortus desiderat aërem liberum & temperatum, uel temperato proximum, nam loca nimie caliditatis aut siccitatis formidant, nisi multis pluuijs uel irrigationibus adiuetur. Loca etiam intemperata mortificantis frigiditatis tollerare non potest, & in locis umbrosis nullius uel modice utilitatis existit. Hortus desiderat terram mediocriter solutam & humidā potius quam siccam: creta enim est hortis & eorum cultoribus inimica. Herba in minus soluta terra nate in principio ueris optime cōualescunt, sed in æstate siccantur. Felix horti positio est, ut supra se riuum habeat quo possit per conuenientes sulcos cum opus fuerit irrigari. Nam hortus qui cælo clementi subiacet, & humore fontano percurritur, prope est ut sit liber, & nullam serendi disciplinam requirat.

TERRAM

Terram desiderat hortus pinguiſſimam, ideoq; in altiori parte ſinum ſemper habeat, cuius ſuccus eum ſponte ſecundet, & ex eo ſemel quolibet anno ſingula hortorum ſpacia impinguetur cum ſeri uel plantari debebit, ſit autem domui proximus. Longe tamen ab area ſitus, nam puluere palcatum qui herbarum ſolia perforat & exicat patitur inimicum. Felix horti poſitio eſt cui leniter inclinata planities curſus aquæ fluentis per latera diſcreta deriuat.

De paſtino hortorum, Caput xxx.

PArtes horti ſic diuidendæ ſunt, ut hæc in quibus autumno ſeminabitur uerno tempore paſtinentur. Et quas ſeminibus uere complebimus autumni tempore debemus effodere, ut utraq; paſtinatio decoquatur beneficio alioris & ſolis. Si uero penuria terreni habeatur quocunq; anni tempore terra inter humiditatem & ſiccitatem inuenitur æqualis paſtinari poteſt, & ſtatim ſeri ſi ſimo fuerit impinguata. Faciendum eſt horti ſpaciū primo profundū & groſſum, & ſuper ipſum ſparſo letamine iterum minutatim paſtinetur, & terra cum letamine miſceatur, & quantum poteſt in puluerem dedicatur.

De ſeminatione hortorum, Caput xxxi.

Incis frigidis autumnalis ſatio maturius fiat, uerna tardius. In calidis uero autumnalis ſerius, & uerna maturius fieri poteſt. Herbe poſſunt commodè ſeri ſeparatim & mixtim, ut immixti ſatis euellantur quæ fuerint tranſplantande, cæteræ uero ibidē ſuſcipiant incrementū: herbe quæ tranſplantari non debent ſp̄ſius ſeri debent. Cauendū eſt ne quæ ſpargantur ſemina ſint corrupta, ideoq; eligenda ſunt quæ formam habent interius albam, & quæ magis fuerint ponderoſa & groſſa, & in pluribus eorum ſint talia, quæ non exceſſerint anni ætatem. Sepe prouenit quod ſemina quantumcunq; ſint bona ſi iacta fuerint non naſcantur ex aliqua malitia corporum cœleſtium impedita. Pleniusq; inuenitur utile diuerſa ſemina ſimul ſeri, ne tempus aliqui ſea-

mini quandoq; contrarium ex toto terram denudet. Omnium herbarum optima satio est cum luna fuerit in augmento. Sepeq; evenit, ut non sit utilis satio, quæ sit cum luna processerit in defectu. Omnes ferè herbe commodè transplantantur cum aliquantulum creverint, & terra non fuerit nimis sicca.

De iuvamento hortorum, Cap. xxxii.

Purimū confert hortis, si tam manibus quàm sarculo herbe noxiæ quotiens apparuerint dissipentur, ne melioribus nutrimenta subducant. Ex his quæ plurimum nocent hortis, est ambulare per eos uel terrā mouere cum fuerit nimis molli. Si terra horti nimis cretosa est misceatur eidem sabulum, uel letaminis multitudo, & terra spississime moveatur. Et si adeo sabulosa est quod humor conceptus nimis facile resoluitur, eidem misceatur letamen & creta.

De collectione herbarum, florum, seminum & radicum, Caput xxxiii.

Herbe propter cibum colligende sunt cum earū folia ad debitum peruenierint augmentū. Sed propter medicinam colligere oportet postquā magnitudinis integritatē habent antequam ipsarum alteretur color & cadant. Semina colliguntur postquam eorum figitur terminus, & exiccantur ab eis cruditas & aquositas. Radices sumende sunt, cum adest foliorum casus. Flores colligere oportet post operationem integram, ante exterminationem & casum. Fructus quidem colligendi sunt, postquā finitur complementum eorum antequam sint ad cadendum parati. Quæcunq; colliguntur decrecente luna meliora sunt, & magis seruabilia his quæ colliguntur in eius augmento. Et quæcunq; colliguntur in claro aëre meliora sunt his quæ colliguntur in dispositione humiditatis, & uicinitate temporis pluriatium.

De uirtutibus

De uirtutibus herbarum, Cap. xxxiii.

Herba syluestres domesticis sunt fortiores, & minoris quantitatis, secundum Plinium. Et ex syluestribus montanae sunt fortiores. Et illa quarum loca sunt uentosa, color sit magis tinctus, & sapor magis apparens, & odor fortior, eruntq; potentiores in genere suo. Virtus herbarum debilitatur post duos aut tres annos, secundum Plinium.

De conseruatione herbarum, foliorum, seminum & radicum, Cap. xxxv.

Herbae, flores & semina seruanda sunt in locis siccis & obscuris, & in sacculis uel uasibus constricta seruantur, & praecipue flores ne odor & uirtus exhalet. Radices melius in subtili arena seruantur, ne sint radices quae siccitatem seruent, quae similiter in loco sicco & obscuro melius seruabuntur. Semina porrorum & ceparum & quarundam aliarum herbarum melius quam aliter in suis siliquis seruabuntur.

Incipiunt regulæ libri septimi, de pratis & nemoribus, Caput xxxvi.

Prata desiderant aërem temperatum, aut frigiditati & humiditati proximum. Nam superflua frigiditas impedit generationem herbarum. Et nimia caliditas aut siccitas omnem uigorem consumit, terram desiderant pinguem ad herbarum copiam, sed ad saporositatem requirunt mediocrem, & nimis macram omnino reſutant. Aquam desiderant, praecipue pluuialem & calidam, aut laeualem pinguem, sed à gelida ualde leduntur. Sitim optant depressam, ubi continuo sit humor inclusus. Nimis autem profundus non est aptus ad aliquas bonas herbas, sed ad paludales insipidas.

Qualiter prata procurentur, Cap. xxxviii.

Prata licet naturaliter per se proueniant, sunt etiam opere manuali, extirpatis nemoribus, & agrestibus locis,
uel

nel complanatis agris aratis, & uitia cum foeni semine satis prata optime procurentur. Sed omnia impedimēta quæ in eis nascuntur tollantur & herbæ grosse inutiles post magnas pluuias radicitus euellantur. Prata quæ pluries irrigantur estate, pluries fructificabunt, & secabuntur in anno. Prata uetusta muscosa radantur & sterilia facta pluries arantur, ac de nouo ferantur.

De foeno qualiter procreatur & de utilitate eius, Caput XXXVIII.

Foenum secundū est tempore calido ac sereno, cum aëris siccitas duratura speratur, & herbæ ad debitum peruenierunt augmentum, floresq; compleuerint nec arefcere inchoarunt. Foenum commo de sub tecto seruatur, uel sub dio præparatum, ne aqua in id intrare possit. Foenum magnæ utilitatis existit cum ex eo bestię laborantes ac oues toto tempore anni uincere possint.

De nemoribus qualiter fiunt, Cap. XXXIX.

Nemora uel naturaliter proueniunt diuersarum arborum secundum uarietatem terrarum situs & aëris, aut instituantur ab homine. Qui nemus plantare intendit, consideret primo situm & naturam terre, ac aëris in qua facere nemus cupit easq; solum considerat arbores, quæ illi loco conueniunt, & tandem uotum instituentis adimpleant, propinquas ac distantes arbores plantet, secundum quod amplius uel minus radices & ramos extendunt.

Incipiunt regulæ octauilibrī de uiridarijs & rebus delectabilibus, Cap. XL.

Viridaria quedam fiunt ex herbis, quedam ex arboribus, quedam ex utrisq;. Viridaria herbarum desiderant terram macram & solidam, ut herbas subtiles & capillares producant, quæ præcipue usum delectant, uiridaria circa se habere debent odoriferas herbas diuersorū generū, quæ ad delectationem

tionem conferant ac salutē, nam omnis odor est anima suauissimus cibis. Viridaria requirunt à meridie ac occidente arbores bonas ac raras, ab oppositis loca patula, ut auram delectabilem habeant, nam umbra malarum arborum est nocua. Superflua umbra agritudines generat & aure salubris sanitatē corrumpit. Viridaria debēt fieri magna vel parua respectu habito ad nobilitatem, potentiam & diuitias dominorum. In viridarijs inuicquodq; genus arborum in sua acie sine admixtione alterius poni debet, ut delectationē augeat, ac decorem. Magne arbores in viridarijs distare ab inuicem viginti pedibus in acie debent, parui decem, sed decem acies una ab altera poterit quantum placuerit plus distare, arborū acies in viridarijs fossorem requirit, exceptis malis, ut possint diu durare, sed inter unam & alteram aciem prata conueniunt. In viridarijs non debet quis superflue delectari, sed tunc præcipue cum serijs necessarijsq; satis fecerit rebus. Viridis & decora multarū plantarum satio circa ruris habitacula multam delectationem affert. Plurimū delectat agros habere magnos & fertiles, qui rectos habeant fines ac foveis idoneis tingantur, & sepibus bonatq; arbores circū habeant, ac intrinsecus vijs oportunis, arboribus, fonte ac fluentibus riuulis sint ornati.

De delectationibus vinearum & uini.

Caput XLII.

Multum delectat habere uineta decora diuersorum bonarum generum uvas ferentia. Non omnia quæ de mirabilibus uuarum ab antiquis scripta sunt, per experientiam reperiuntur uera, non ab ociosis peritis omnino spernenda, ne forte uarietas temporum ac locorum, aut imperitia raro probantis experientem decipiat. Plurimum delectat habere uina diuersorum colorum, ac saporum quod non difficile fieri potest, ac uina medicinalia indigentibus satis inueniuntur utilia.

De his quæ circa arbores delectationem
augent, Caput XLII.

Magnæ delectationis est habere in proprijs locis bonarum arborum copiam, & generum diuersorum, ideoq; indigens paterfamilias undecumq; deferre debet, uel curare quod ab alio deferatur, & ea in congruis ordinibus inferere uel plātare. Plurimum delectat insitiones habere mirabiles, & in una arbore generum diuersorum, & ideo paterfamilias diligens hoc procuret, multum delectat arbores bene formatas, & recte stantes habere. Ideoq; curandum est ne tortuose sint, aut ramos nimis deformes habeant, uel depressos. Multæ mirabiles insitiones se ostendunt his qui tentant omnia experiri. Si arboris fructifera scindatur ramusculus & res laxatiua puluerizata, uel cuiuslibet coloris, loco medullæ includatur, in eo fructus acquirere uirtutem uel coloris inclusi.

De delectationibus hortorum & herbarum, Caput XLIII.

Plurimum delectat habere hortum bene dispositum, ac sufficienti industria cultum. Ideoq; paterfamilias diligenter procuret eum habere in loco pingui ac soluto. Cuius uel riuus per discretæ spacia defluat, ut irrigari totus possit tempore magni æstus, omnia genera bonarum herbarum in loco habere delectabile atq; utile est.

Incipiunt regulæ noni libri: De animalibus
nutriendis, Caput XLIIII.

Antiquissimis temporibus uiuebant homines ex his solis ei-
bis quæ naturaliter inculta terra ferebat, deinde consequenter coeperunt uiuere agricultura & pastoricia, nunc uero & ex eisdem uinum, & ex scientijs scripturarum & artibus infinitis: Singulorum generum animalium domesticationem, alia in diuersis regionibus adhuc fera cernuntur.

De equis

De equis & equabus, Caput XLV.

Qui equos aut equas emere uult expedit, ut etatem, genus formam laudabilem san- tatem & aegritudinem, bonitatē & malitiam rectē cognoscat. Equorum & ceterorū ani- malium induratas ungulas habentium, ac cornutorū etas, dentibus plene cognoscitur. Scalliones ita custodiendi sunt, ut parum equiten- tur uel nihil, aut aliter fatigentur, ac bis in die tantum admitti dea- bent, si generosos pullos creare uolueris. Equae praegnantēs teneri debent non multum macrae nec pingues, nec urgeantur, nec famem frigusq; tollerent, nec inter se locis cōprimantur angustis. Equae ge- nerosae quae masculos nutriant alternis tantūmodo submittantur an- nis, ut pullos copiam puri lactis infundant. Admissarius quinq; anno- rum esse debet sed femina bima cōcipiet. Pullus teneri debet praeci- pue in loco montuoso, petroso & sicco, & duobus tantum annis matrem sequatur ad pascua. Cum pulli domandi sunt suauiter tene- guntur in stabulo, & freno teneantur: bis suspensa, ut assuescant tan- gi, & frena uidere. Loca equorum debent in die munda teneri, & nocte lectus usq; ad genua fieri pro quiete, maniq; totū & dorsum tergi ac omnia membra eius, deinde paruo passu ad aquā duci, & in ea usq; ad genua spacio longo teneri, & cū redierit antequā sta- bulū intret crura tergi, & optime siccari. Cōpletus equus in cōuicini- tibus carnib. est tenendus, ut possit securius equitari. Nā pinguedo nimia aegritudines, & nimia macies debilitatē & deformitatē indu- cunt. Equus qui sudauit uel fortiter calefactus est, nō debet aliquid comedere uel potare, donec coopertus & paulisper ductus à sudore atq; calore fuerit liberatus. Equo utilis est tēpore calido coopera- tura linea propter muscas, et tēpore frigido lanea propter frigus.

De doctrina & morigeratione equo-
rum, Caput XLVI.

Equus qui domari ac morigerari debet, primum adhibeatur frenum leuissimum cuius morsus sit melle uel alio dulci liquo

re perunctus, & leuiter ducatur ad manum, deinde sine sella leuiter equitetur, & postea cum sella per loca plana, donec frenum & sellam quiete recipere assuescat. Equus cum freno leui & sella leuiter pergere assuetus, debet cum fortiori freno, si oporteat per duci ad agros aratos horabreni & frigida, & instrui ad trotandum primo, deinde ad galopandum breui saltu. Duci etiam in ciuitate per loca fabrilia debet. Cum equus se habuerit cōuenienter ad frenum, ad cursum assuesci debet summo mane semel qualibet septimana, usq; ad quartam partem miliarij unius primo, ac postea longiori spacio.

De generali cognitione & pulchritudine bonitatis & malitiæ equorum,
Caput XLVII.

Equus pulcher, corpus habet magnū & longum, & eius magnitudini ac longitudini proportionabiliter omnia membra respondent. Pilus pauc & obscurus à pluribus habetur præcipuus. Equus habens nares magnos & inflatos, & grossos oculos, audax naturaliter reperitur: equus habens costas grossas, & uentrem amplum & deorsum pendētem laboriosus ac sufferens indicatur, equus habēs ampla & extensa garetia, & calces turbas, in motu celer & agilis esse debet, equus habens iuncturas crurium naturaliter grossas & pastoralia curta fortis esse censetur, equus habens crura & crurū iuncturas bene pilosas & pilos earum longos, laboriosos existit. Equus habēs maxillas grossas & collum curtiū, non facile affrenatur decenter, equus habens uniuersas ungulas albas, nunquā duros pedes habebit: equus habens auriculas pendentes & magnas, & oculos concauos, lentus ac remissus existit: equus cuius anteriora crura semper moueri uidentur malorum est morum, equus mouens caudam superius & inferius, mali est uitij.

De infir

De infirmitatibus equorum, Caput XLVIII.


Aegritudines accidunt equis in capite, ventre, tergo, cruribus, pedibus ac ungulis, aliquando ex humoribus & sepe ex negligentia uel mala custodia. Dolores accidunt equis aut ex superfluitate humorum malorum in uenis sanguinis contentorum, aut ex uentositate ingrediente in corpus equi calefacti per poros apertos, uel intestinis ex uiscosis humoribus orta, aut ex superflua comestione hordei uel alterius tumefacti in stomacho seu ventre, aut ex superflua retentione urinae uescicae instantis. His omnibus generale remedium est, quod equus per stabulum cum equa libere permittatur abire. Sal in aceto sufficienter infusum plurimum ualet contra omnem tumefactionem incipientem in dorso. In mulis equorum aegritudinibus coctura ultimum est remedium, sed debet diligentissime custodiri ne cocturam possit mordere, uel ad aliquam rem fricare, quia ex nimio pruritu locum dentibus usque ad nervos uel ossa morderet. Multa autem signa, quibus cognoscitur in qua parte corporis patiaturs equus, ex quibus praenosticari potest liberatio & mors equi, quae per regulas scripta sunt omnia in fine tractatus equorum, & ideo hic omitto.

De bobus, Caput XLIX.


Gradus aetatis bouum sunt quatuor, prima uetulorum, secunda iumentorum, tertia bouum nouellorum, quarta uetulorum. Qui armentorum gregem emere uult obseruare debet primum ut sint uaccae ad fructus ferendos aetatis potius integre quam imperfectae, bene compositae, ut omnia membra sint grossa, & inuicem sibi respondeant. Armentis bouum & uaccarum paranda sunt loca hyeme maritima, aestate frigida & opaca montana. Stabulum bouum esse debet arena uel aliquo genere lapidum stratum, aliquatenus deuexum, ut elabi possit humor, & contra partem glaciale, aliquis obistere debet obiectus. Cauendum est etiam

ne angustius stent, aut feriantur, aut concurrant, ac aestate optime sepe clauduntur ne à tabanis & ceteris bestiolis concitentur. Debet etiam his semper stratum multum teneri, quo melius cōquiescant. Aestate bis, hyeme semel ducantur ad aquam boues. Sani, fortes, & agiles cognoscuntur, si facile se movent cum tanguntur, uel pun- guntur, & habent membra grossa, & auriculas eleuatas. Pulchri autem & fortes generaliter cognoscun- tur, si omnia membra grossa sunt, & sibi inuicem bene respondent.

De ouibus, Caput L.

 Vēs bone cognoscūtur ab etate, si neq; uetulae sunt neq; merae agnae. Item à forma, si sunt corpore ample, lanam habeant multam & mollem, uillos altos & densos corpore toto. Sanitas ouium cognoscitur, si aperiantur earum oculi, & uenae sunt rubicundae ac subriles, sunt sane. Si uero albae uel rubicundae & grossae, sunt infirmæ. Item si capite in pelle coll & antetrahæ, uix trahi possunt, sunt sane, si facile sunt infirmæ. Item si audacter uadunt per uiam, sunt sane. Si molestæ capite inclinato, sunt egræ. Oues per totum annum intus & foris sunt recte pascendæ, stabula idonea ouibus ea sunt quæ non sunt in loco uento- so, in quibus sit solum stramentis idoneis stratum atq; proclium ut mundari possit ab humiditate urinae, quæ lanas corrumpit & ungulas scabras fieri cogit. Pascua ouibus utilia sunt, quæ in noualibus uel pratis siccioribus excitantur: palustria uero noxia, syluestria damnosa lanat. Salis uero crebra conspersio debet pecoris leuare fastidium.

De apibus, Caput L I.

 Pes nascuntur partim ex apibus, partim ex bubulo corpore putrefacto. Apes optimæ sunt parua rotundæ ac uaria. Sanitatis signa, si sunt frequentes in examine, & si nitida & si opus quod faciunt equabile est, ac leue, minus ualentium signa, si sunt pilosæ ac horridæ, ut fuluerulente.

Incipiunt

Incipiunt regulæ decimi libri, de artibus quibus
animalia capiuntur, Caput LII.



Minium avium rapacium natura est, ut semper sole & nunquam vel raro sociate incedant, eo quod in præda nolunt habere sodalem, & omnibus quibus insidiantur cognoscuntur, instinctu nature, atque cum inimicum sentiunt, garrunt & fugiunt, vel se quantum possunt occultant. Aves rapaces si bonis et bantur carnibus, & horis congruis, & iniuria non sit eis, neque contra earum voluntatem mittuntur ad aves, à dominis raro dædunt. Si dominus non sequitur voluntatem accipitris vel alterius avis rapacis, sed in aliquo contrarium agit, facile ipsum perdit, cum sit indignantis nature, ac leuiter irascatur. Falcones tenendi sunt in eo statu pinguedinis, in quo inveniuntur magis audaces & melius capere aves. Omnium rapacium avium eadem est fere natura. Aves fere capiuntur cum aubus feris domesticis, videlicet accipitre & astur, falcone, smerlo, girfalco, aquilo, gimo, & gimeffa. Aves capiuntur retibus diversorum modorum, videlicet ad pantheram annates, reti super fluvium extenso capiuntur grues, cygni, starnæ, ac anseres. Item alio reti anseres & anates in agris & prope aquas. Item parietibus, columbi & turtures & fere omnes aucule parvæ. Item arolo parvæ aves & magnæ rapaces. Item quodam reti stretto & longo perdices. Aves varijs capiuntur laqueis in terra constructis ac in arboribus circa nidos. Aves fere omnes capiuntur visco, videlicet virgulis ac viminibus & funiculis ac viminibus inustis. Aves omnes capi & occidi possunt balistis & arcis & alijs quibusdam modis. Pisces capiuntur retibus diversorum generum, videlicet scorticaria in mari transversario, in locis fluminum & lacuum spaciosis rivalibus, in parvis aquis & in magnis cum navibus. Item tacle & negossa. Item in vallibus cum cochlearia & degagna, & cum gradellis & parvis reticulis. Item cum cistis & canis, hamo, spadernis & calce.

PET. DE CRE-

SCIENTIIS, DE HIS QVAE POSS-
sunt singulis mensibus in rure
fieri, Liber XII.



In superioribus libris plenè tractatum est, sed ne-
cessario diffusè de omnibus quæ sunt in rure agen-
da, sed utile uidetur memoriale compendiosum fa-
cere, quo paterfamilias ad rura pergens facile
scire potest, quid utilitatis & delectationis quoli-
bet tempore facere possit. Et cum modum agendi singula uidere
nult, in latioribus & specialibus tractatibus ordine supradicto scri-
ptis congruo facile inuenire ualebit.

De agendis mense Ianuario, Caput I.



Hoc mense, præcipue in locis calidis, loci habitabilis aëris
& uentorum terræ & situs bonitas uel malitia potest con-
gnosci: licet locis temperatis alijs quibusdā mensibus me-
lius discernatur. Item in locis calidis curiæ atq; domus satis conmo-
de poterunt fabricari, & optime possunt arbores pro materia domo-
rum abscindi. Item possunt noua stercora prociuari, & uetusta
ad agros & uineas trahi, & faba, cicercula atq; uitia seri: item si
agri non sint molles primo prosciendi. Item in locis calidis uineæ si-
mari atq; putari possunt. Item sorba, persica, nuces, amygdala &
pruna optime in seminario poni possunt, & arbores gummosæ inse-
ri, & hortus si terra non sit madida fieri. Item in nouis pratis uitia
& herbarum semina spargi possunt, & salicum perticæ ac iunci &
cannæ, pro uincis incidi, ac nemora & omnis materia tam sylue-
strium quàm domesticarum arborum ignis rescindi potest. Item om-
nia uasa utensilia & planstra & quæcunq; in domibus sunt quæ
lecuq;

secundum sit tempus hoc mense congrue sunt. Item animalia cuncta domestica emi, et sylvestria capi possunt, et apes de loco ad locum exportare commodè possunt.

De agendis mense februario, Cap. II.

Hoc mense ac cæteris omnibus bonitas et malitia loci habitabilis potest cognosci et emi, ac domus et quæcumque in ipsa et circa ipsam agenda sunt possunt fieri. Item possunt letamina ad agros, vineas, hortos et prata deferri, et cuncta firmari. Item possunt commodè agri profundi, et in eis faba, cicercula, uicia et quædam alia legumina seri, ac frumenta, siligo, far et spelta runcari, et de ipsis aquæ derivari, et stramenta in eis comburi. Item in locis calidis auena et cicer seri, et in temperatis et frigidis robliæ siue posum. Hoc mense locus humidus fieri debet pastinum, sicut cultura ubi uinea est plantanda. Et in locis calidis atque siccis circa finem utiliter fit plantatio et insitio eius cum incipiunt esse gemmæ suspectæ, ac nondum aquosæ, sed spisso lachrymantur humore. Item fit optime putatio vinearum in locis temperatis et calidis, nisi nix multa uel frigiditas nimis intensa prohibeat, quæ qualiter faciendæ sit plena, docetur in libro quarto de uincis. Item hoc mense comode formantur uites ac utiferae arbores. Item hoc mense amputandæ sunt inutilibus radices inutilis, ac firmandæ. Item palandæ et releuandæ sunt uites, et in locis maritimis et calidis fodiendæ. Item possunt hoc mense circa finem plantibus borealibus uentis non australibus, ære sereno transfusari uina debilia et coqui, ut à corruptione seruentur. Possunt etiam hoc mense cum terra non multum sicca uel mollis ex sit et omnium arborum plantalæ, ac semina seri, transplantari, ac inseri, et maxime si iam corticis uiridis succus insuderit. Item possunt arbores putari, formari, et ab omnibus superfluis ramis, scilicet scabiosis et inutilibus liberari. Item rosaria et cannellæ nouæ in istius tui ac plantari. Item debent hoc mense, si terra non est sicca uel mollis fieri horti, scilicet ligonfar, uel aliter fodi, firmari, et

ex omni genere herbarum quæ uere terra tempore mandantur feri. Vt sunt allium, atriplices, anisum, anethum, appiū, absinthium, artemisia, abrotanum, bliū, basilicon, caules, cepæ, scoriculus, cataputia, liquiritia, lactuca, menta, porrum, papauer, petroselinum, pastinaca, et cæteræ herbæ. Ac etiam medicinales herbæ syluestres possunt feri hoc modo in hortis & alibi. Item hoc mense plantari & curari possunt siccæ de uiminibus uel spinis, & alia materia sepes fieri, curiarum, agrorum, uinearum atq; hortorum. Item hoc mense plantari & feri possunt nemora ac salices tam domesticarum quam syluestrium. Item uiridaria accretæ delectabilia, quæ in octauo libro clare scripta sunt, hoc mense cōmode fiunt. Item hoc mense armenta equorū & asinorum ac boum: item greges ouium, caprarū & porcorum emi ac procurari cōmode possunt & leporaria cōmode fieri ac piscina, ut plene in libro nono tractatum est. Item pauones, anseres, gallinæ atq; columbæ, quia hoc mense calere incipiunt & cubare procurari debent, ut superius scripsi. Item possunt hoc mense apes emi, & debent pluries sumigari, & ab omni pulveredine liberari, & mali reges occidi, & cætera fieri quæ plenissime scripta sunt in tractatu ipsarum. Item hoc mense accipitres, & falcones optime procurari, ac circa finem ipsius in muta poni. Possunt etiā hoc mense capi feræ bestię, aues & pisces uarijs & diuersis ingenijs supra scriptis.

De agendis mense martio,

Caput III.



Hoc mense locis temperatis optimè proscinduntur agri, si in eis superflua humiditas est consumpta & terra iam ad æqualitatem inter humiditatem & siccitatem peruenit. Item scribitur auena & cicer, & canabum circa finem, & faba in locis frigidis, & in temperatis in initio loco pingui, & quæ ianuatio sata fuit nunc runcatur cum quatuor foliorū

foliorum existit. Item runcatur & herbis mandatur frumentum, spelta, hordeum. Item hoc mense seritur milica & miliū, panicum & fascoli feri possunt. Item putantur & inseruntur uites circa initium, & releuantur, deinde ligonsentur, cum terra fuerit temperata. Item colliguntur & plantantur uites hoc mense, atq; propagantur & reuocantur. Item transuasantur uina sereno aëre, & boreaflante. Coquantur etiam debilia, ut seruentur melius, ne uoluantur, & optime implēantur uasa posita in pena frigida, & clauduntur ut parum spirent ne acetosa fiant. Item hoc mense plantari, transplantari, & circumfodi possunt omnes arbores, ac inseri quę gummi carent. Item hoc mense pastinantur borti & fumantur & in eis seruntur omnia semina specificata in februario mense, ac etiam cucurbita, melones, cucumeres, & citrulli circa finem, ac etiam salvia plantatur hoc tempore, ramulis in terram infixis. Item locis frigidis prata purgari debent, & temperatis ac calidis custodiri. Hoc mense præcipue comparandi sunt equi & equę, boves & uaccae, uerres & scropha, ac facienda armenta & greges, & masculi foeminis admittendi. Et domandi sunt aluei à uermiculis & omni inmundicia. Item hoc mense accipitres & astures munte magnis gabijs sunt ponendi, & bouis carnibus nutriendi. Item hoc mense possunt capi bestię aues & pisces, nisi sint tales quę solum temporibus frigidis uel niuium capiuntur.

De agendis mense aprili,

Caput IIII.

Hoc mense prosciuntur pingues agri, humidī, qui diu aquam tenent, & sicci secunda uice arantur. Item seritur comode cicer in locis frigidis, & canabum & milica in locis temperatis circa principium. Item fossio uinearum in locis frigidis & etiam temperatis, & uina non debilia commodē transuasari possunt. Item hoc mense mala punica possunt

seri. Item ipsa possunt inseri, & persicus inoculari, ut Palladius ait. Item hoc mense locis calidis tonduntur oues, & sero tam socius signantur, & arietes admittuntur ad oues, & equi & asini ad equas & asinas. Item debent omnes arborum plantulae hoc mense ab animalium aggressu diligenter tueri. Item hoc mense commode seruntur cucurbitae, citrulli, cucumeres & melones, & caeterae herbae, si rigari possunt, ut Palladius ait. Item columbis locis iam aratis danda est esca, quia parum in agris inueniunt unde uiuant. Item secundum Palladium querende sunt apes, & aluei purgandi, & papilioes necandi, qui nunc abundant, florentibus maluis. Item hoc mense sicut alijs aestiuis mensibus possunt capi bestiae, aues & pisces.

De agendis mense Maio, Cap. v.

Hoc mense pingues agri, & qui diu aquam tenent, proscinduntur, cum omnes herbas protulerint, & eorum semina nondum maturitate firmata: & sicci possunt secunda uice arari. Nunc omnia quae sata sunt prope florent, nec tangi à cultore debent. Item in locis frigidis & humectis nunc seruntur fascoli, milium & panicum. Item hoc mense, ut dicit Palladius, materia caedenda est, cum sylua est omni fronde uestita. Item seminaria sodiuntur assidue, & uince secunda uice, ac etiam pampinantur. Item in locis praegelidis ac pluuiosis putantur oleae, & eius muscus abradatur, ac si quis lupinum stercorandi agri causa seminauit nunc debet euertere. Hoc etiam mense, ut idem scribit, locis calidis empla strari persicus potest, & citri arbor inseri, & similiter ficus. & disponitur planta palmae. Nunc etiam agrorum spacia quae per autumnum seminibus implenda destinant, aut plantis conuenit parari. Item hoc mense seritur coriandrum & appium & melones, citrulli, cucurbitae & cucumeres & cardui & radices & ruta pargetur: porri quoque planta transfertur, ut irrigationibus animetur. Et optime caules & cepe transferuntur hoc mense. Item seritur portulaca, & quocumque tempore seratur, calido tempore tantum, nascitur.

scitur. Hoc mense locis maritimis & calidis recidamus scæna priusquam exarescant. Quod si pluuijs infusa fuerint, non ante cõuer ti debent, quam pars ipsorum summa siccetur. Item hoc mense castrari debent vituli, & ouium celebrari tonsura. Item coagulatur lac, & fit caseus modo predicto. Ut (ut ait Palladius) debet nunc occidi reges apum, qui grecis *νεφέλη* uocantur, qui hoc tempore nascuntur in extremis fauorum partibus. Item papiliones necandi sunt modo predicto.

De agendis mense Iunio, Caput VI.

Mense Iunio preparanda est arca, & omni stramine, fimo & puluere optime liberanda. Nunc feri potest milium & panicum, nunc hordei messis primo recipitur: postea circa finem tritici messis expletur in locis calidis & in temperatis incipitur. Nunc in frigidissimis locis quæ maio prætermissa sunt faciemus: agrosq; proscindimus herbosis locis ac frigidis uineta aptabimus, colligemus uiciam, scenumq; æcum rescabimus ad paululum. Item hoc mense peragenda erit leguminum messis, nunc & faba luna minumente uelletur, & excussa & refrigerata reponetur. Lupinus etiam hoc mense colligitur, nunc pera uel mala ubi ramos multa poma densabunt, interlegenda sunt omnia uitiosa. Hoc mense ramus punici potest intra fictile uasculum claudi, ut ad eius magnitudinem poma reddat. Item hoc mense sicut in Iulio fit insitio, quæ dicitur emplastratio in piris, & malis, & ficibus, & oleis, & ceterorum, quibus in cortice pinguis succus extiterit. Item hoc mense optime scriitur borago & portulaca, & aliæ multe herbe, si possunt irrigationibus adiunari. Hoc etiam mense secantur optime pratensis flore completo & non exiccato; hoc etiam mense vituli recte castrantur, & caseus cõficitur, & oues in frigida regione tunduntur. Item hoc mense alucaria castrabuntur, si multum mellis habuerunt & mel conficitur & cera. Hoc etiam mense noua egrediuntur examina: ideoq; custos debet esse semper attentus ne fugiant, præci-

pue usq; in octauam uel nonam horam, & semper debent esse aluea-
ria preparata & ea colligere debet ac in suo loco collocare, ut in
suo tractatu dictum est plene.

De agendis in mense Iulio, Cap. vii.

Mense Iulij agri profecti secunda uice arandi sunt, nunc lo-
cis temperatis tritici messis & leguminum nondum exple-
ta, completur. Item fuesires agri utilissime extirpantur radicibus
atq; uirgultis. Item gramen & filicem ante caniculares dies opti-
me dissipamus. Item circa finē optime seruntur rapa ac napi. Item
nouellae uites mane ac uespere, calore deposito, debent effodi &
aduerso gramine puluerizari. Item hoc mense arbores quae in mes-
se steterant sectis messibus obruantur, & circa ipsas propter solis
calorem fiat aggregatio terrae. Hoc mense locis humidis inoculari
ficus potest, & inferi citrum, nunc etiam potest emplastratio cele-
brari, & pirus & malus locis frigidis inferi. Itē poma uitiosa quae
nimis ramos onerant, debent legi. Item potest plantari talea citri
si irrigationibus adiunctur. Nunc locus temperatis amygdala sunt
colligenda, hoc tempore uaccae submittendae sunt tauris, & arie-
tes admittendi. Item hoc mense circa principium omnia prata se-
canda sunt in quibus herba non prius ad maturitatem peruenit.

De agendis in mense Augusto,

Caput viii.

Mense Augusto sunt agri tertia uice arandi. Itē in suo prin-
cipio possunt feri post primam pluuiam rapa & radices &
napi & lupini ut uineas & terras impinguent. Item in
principio & ante linum euellatur, & campi cum maturato calore
flauescant, & ex his possunt excuti semina et macerari si placet, &
aliter ut opus fuerit procurari. Item circa finem eius colligitur mi-
lica quae tunc inuenitur matura. Et ficus colligitur & siccantur &
nucēs & ceteri fructus arborum, qui maturi sunt & consumuntur,
& reconduntur seruandi. Item locis frigidis pampinantur uites,

Et in calidis potius obumbrantur vine, ne in sole arescant, nunc etiam agrestium fieri potest. Item dissipare frequenti aratione gramen et silices. Item hoc mense possunt emplastrari arbuta, et pirus inferi, ut Palladius ait. Item hoc mense possunt inuestigari aque ubi desunt et probari, et putei fieri, et similiter aqueductus comode fabricari, ut Palladius scribit. Item post mediū huius mensis optimè feruntur caules, ut cum modicū cōualuerint transferantur.

De agendis in mense Septembri, Caput IX.

Mense Septembri cisternæ, aqueductus, et putei comode fiunt. Item pinguis ager et qui diu consuevit habere humorem, tertia uice arabitur nunc ager humidus, planus, exilis secunda uice aratur et seritur, cili graciles nunc primū arandi sunt, et serendi circa æquinoctium, nunc agri stercoreandi sunt, in colle spissius, et in camporarius, præcipue cum luna minuitur. Hoc mense uliginosis locis atque exilibus aut frigidis aut opacis circa æquinoctium triticum seritur et spelta, dum serenitas constat. Item in locis calidis nunc seritur linum, quod uernum uulgariter dicitur. Item colligitur et reponitur hoc mense milica, quam aliqui saginam uocant, et circa principium in alpibus seritur siligo, et circa finem eiusdem mensis anno sequenti fit messio eius. Item seritur hoc mense circa initium lupinus impinguandi causa, et ubi creuerit eueritatur. Seritur etiam circa finem farrago in stercoreato loco, pabuli causa. Item in locis temperatis circa principium pampinantur uites et frondibus denudantur, et postmodum uindemiæ fiunt, et que tunc ad uindemias spectant, et uinæ seruande possunt siccari et sapa de fructu et careni fieri. Item colliguntur fructus arborum qui tunc maturitatem fatentur: nunc papauer seritur calidis locis et siccis. Item hortorum spacia quæ uere seminibus implenda sunt, nunc alte sodienda sunt, et stercoreanda, decrescēte luna. Item in principio feruntur optime caules, et circa finem allium, anethum, lactuca, et bleta, et radices sciri possunt in locis siccis. Item hoc mense possunt prata noua formari, exdirpatis

extirpatis prius radicibus spinis, & fructibus atq; arboribus & herbis latis & solidis: item uetera à musco purgari & uetustissima corrupta arari, & denuo prata noua formari. Item hoc mense cōquassantur apes uetustæ, & fit mel & cera. Item hoc mense cum accipitribus præcipue capiuntur quales ac perdites.

De agendis in mense Octobri, Cap. x.

Mense Octobri possunt fieri putci & fossata canari. Itē hoc mense letamina portantur ad agros, & seritur optime in temperatis locis frumētum, siligo, bordcum, far & spelta, lupinum & linum. Item fit commodè uindemia, ubi non est facta mense Septembri, & præcipue ab his qui maturum nimum habere desiderant, & condiuntur, & diuersificantur, in sapore & colore uina. Hoc extremo mense ubi calidi & sicci aëris qualitas est, ubi exilis & aridus campus. Vbi collis præruptus aut macer, ponuntur commodè uites, nunc locis siccis, calidis, exilibus, macris, arenosis, apertis quæcunq; de pastinatis, de uitibus ponēdis, putandis, propagandis, reparandis uel arbusco faciendū, antedicta sunt, nunc rectius fiunt, ut contra exilitatem glebæ ac aëris siccitatem hybernis imbribus adiuuentur. Hoc mense præcipue circa finem ablaqueanda est omnis nouella uitis, ut amputentur radices supernacue, & si placida ibi est hyems uites relinquamus apertas, si uiolenta, opcrimus antequam ueniat gelu. Si præfrigida, aliquantulum columbini stercoreis circa uiticulas apponatur. Hoc mense locis calidis & aptis instituantur oliueta, & seminaria fiunt, & omnia quæ ad alias pertinebunt. Item rui ac fosse purgantur. Item plantantur cerusa ac piri ac mali & ceteræ arbores, quæ frigus nō timent cōmode plantari, & de loco ad locum transferri possunt, maxime in locis siccis & calidis; sorba & amygdala in seminario ponuntur, & semina pon sparguntur. Item hoc mense fit pastinum horiorum serendorum: nunc uere ac etiam nunc seruntur in hortis, allū, anethum, spina, ch. a, plantæ cardui, sinapis, malua, cepe, mente, pastinaca, cymis

num, origanum, & caparus. Item boleta in locis siccis. Item dicit Palladius, quod porrum uere satum nunc fertur, ut crescat in capite & assidue circumfodiatur. Item hoc mense tollitur apibus mel superfluum cum fauis, & omnis cera corrupta.

De agendis in mense nouembri,

Caput XI.

Mense nouembri locis calidis seritur optime triticum, circa principium & hordeum & siligo. Et circa finem, faba in stipulis non aratis. Et linum atq; lentacula hoc mense seruntur. Item hoc toto mense calidis locis & siccis uitium est posuio celebranda, et propago recte ducitur. Et locis frigidis nouellas uites & arborum plantas circumfodere atq; operire cōueniet, & macras stercoreare. Nunc ac deinceps usq; donec terra congeletur uinea uetus, quæ est in solo robusto, quæ integro trunco sū ablaqueata fumo facietur, & angustius putata intra tertium uel quartum pedem à terra uiridissima corticis parte mucrone feriatur, ac fossa frequentius incitetur, ut ibi materiam fundat, qua reparetur. Nunc autumnalis putatio celebretur in uitis et arboribus, maxime ubi tēpore incitannur, hoc etiam mense cum oliua cœperit esse matura colligitur, & oliueta putantur & summitates nimis altæ reciduntur, quod etiam in nespulis, si cu & persicis & coctanis est seruandum. Item hoc mense ponuntur commodè oliueta, & seruntur persici ossa, & pira calidis & siccis regionibus, & omnibus ferè locis prunorum ossa. Item hoc mense seritur castanea plantis ac semen. Item calidis locis ac siccis ponimus plantas syluestras inferendas, pirorum & malorum & malipunci & ciuonei & citri & nespuli, fici, sorbi, cerasi & mori taleas & amygdali semina. Item hoc mense magnæ arbores trāsferuntur locis calidis & siccis & apertis, truncatis ramis, illæsis

CC

radi

radicibus, & multo stercore ac irrigationibus adiuentur. Item hoc mense materies ad fabricam cædenda est, cum luna decrescit. Item hoc mense arietes admittuntur ad oues, ut foetum primi ueris fouere possit exortum, & similiter hirci ad capras admitti debent. Item hoc mense diuersimode capiuntur syluestres bestię. Item aues & pisces.

De agendis in mense decembri,
Caput XII.

Mense decembri potest scri faba quę post hyemem tantū nascetur. Item cæditur optimē materia pro domibus, & ceteris ligneis operibus faciendis. Item cæduntur syluę ac rami superflui arborum, & sepes uirides pro igne. Item cæduntur pernice & canne pro uincis & parantur, & fiunt pali, & iunci similiter pro uincis cædi possunt, & ex uinibus fieri possunt corbes, & ciste & caueę, multaq; alia utensilia oportuna, & sepes siccę. Item hoc mense diuersis ingenijs capiuntur bestię ferę, & præcipue canibus tempore niuium. Item aues anibus rapacibus domesticatis, & retibus diuersis ac uiso &c.

Librorum XII. Petri Crescentiensi de agricultura
omnibusq; plantarum, & animalium
generibus, Finis.



POGGIVS

FLORENTINVS DE LAVDE

Rei rusticæ.



SIVNQVAM mihi antea Rei rusticæ cura & uita exercitio dedita iocunda uisa est & suavis, nunc his paucis diebus quibus in solo natali uixi procul à Curia molestijs cōstrinctus, iucundissimā ac suauissimā indicavi, dulcis ocij, honesti negotij, & modestæ uoluptatis plenam. Cognoui enim hoc uiuendi genus, quod multi præclari uiri post habitis rerum ciuiliū fluctibus elegerunt, esse maxime expetendum, cum in eo uitam quietam, liberam, honestam frugalitati coniunctam agere uideamus, ut non mirer Horatij Flacci ruris uiuendi, cum in urbe esset cupiditatem: Qui scribens ad Mæcenatem:

O rus inquit, quando egote aspiciam, uel quando licebit,

Nunc ueterum libris, nunc somno & inertibus horis

Ducere sollicita iocunda obliuia uite?

Et certè si qua uirtuti & literis uacandi uia est, hanc profecto esse constat, remotam à uitijs, & honestati propinquā. Neq; uero eam existimo tantum à doctissimis quidem uiris Rei rusticæ scriptoribus laudatam, quantum dignitas eius & merita erga humanum genus postulare uidentur. Nam ut omittam quas utilitates ex agricultura percipimus, ut non recenseam quæstus uberrimos quos largitur, quanta uoluptas & quies ruris, quanta curarum remissio, quanta naturalis oblectatio, quanta uirtus in eius uite ratione uersatur. Hæc est sola natura hominum usuiq; præcipue accommodata, quæ omnia ad uictum cultumq; nostrum spectantia suppeditat nobis ac subministrat. Hæc est quæ semota à tempestatibus ciuilis insanie,

CC 2 tanquam

tanquam ex quadam specula ceteros ueluti naufragantes despicit
 & contemnit. Hæc procul à malis uitiorum exemplis, relictis fori
 & contentionum iurgijs, sibi soli uacat & bone menti. Hæc stre-
 pitus superuacancis cupiditatibus, contempta omni ambitione, neq;
 superflua cupit, neq; abutitur quesitis. Hæc populari cura & uulgi
 honoribus nihil pensis, honesto fruitur ocio & omni tranquila-
 litate: quæ rarissime assequuntur qui urbana tractant, & uulgi
 plausum querunt. Hæc est uere philosophandi dux, in qua & res-
 rum secreta rariari licet, & bonos mores facile amplecti. Hæc bonis,
 hæc sapientibus, hæc doctis uiris, hæc Regibus atq; Imperato-
 ribus digna exercitatio. Cyrus Persarum rex ille à Xenophonte
 celebratus, gloriari solitus est, hortum suis manibus confectum, &
 arbores in ordinem positas. Diocletianus depositis Imperij insi-
 gnijs, in uilla Salone agriculturæ detinebatur studio, ut hæc so-
 la res ueram quietem, à curis superfluis uacationem largiri ho-
 mi nibus uideatur. Hanc uitam cum multi egregie laudarent: Cice-
 ro noster in oratione pro rostris omnium laudes meo iudicio su-
 perare uidetur. Qui eam parsimonie, diligentie, iusticie esse ma-
 gistratam tradit, maximeq; disunctam à cupiditate, & officio con-
 iunctam. Quæ laus haud scio, an in aliam uitam recte possit con-
 ferri. Plures excellentis doctrine uiri, ut philosophandi studio &
 bonarum artium præuestigationi facilius penitusq; possent uaca-
 re, relictis urbibus se rus in uitam priuatam contulerunt, ubi dies
 suos summa in quiete & honesto ocio transigere. Multos uero ci-
 uitatum gubernaculis inherentes, ciuilis tempestas ad scopulos al-
 listit. M. Tullius ciuilem uitam priuatæ anteponebat: laudatq; eos qui
 ad gubernandam remp. accesserunt. At ipsi Demostheni, multisq;
 alijs eloquentissimis uiris, satius fuisset nullas recip. partes attigisse.
 Quamuis talis eloquentia Ciceronem in tanta Imperij magnitu-
 dine, & in tanta amplitudine honoris facile suamq; sententiam
 tueri

tueri potest, cum ea quenuis egregium ingenio hominem queant incendere & erigere ad laudis & glorie appetitionem. Multum enim pollet in ciuitatibus uis dicendi, & ingenij laus. Sed multisuadores, labores plurimi, uita anxia propofita sunt ciusmodi uiris, & uarij fortune cafus. Ego autem cui fenefcenci quies & ocium cordi eſt, degentem ruri commendo, & cum preſertim qui à cura rei ruſticae ad literas tanquam in arcem animi poſſet confugere. Neq; ego nunc ruſticana aut fodiendi, aut arandi, ac plantandi, proprio ſudore opera ſubeunda nobis cenſeo. Non enim ſum Serranus, aut Cincinatus, qui ab aratro ad ſenatum accerſebantur. Non ſum Scipio ille ſuperior Aphricanus, quem Linterni exulantem agrū ſuis manibus coluiſſe Seneca ſcribit. Manus enim meae aptiores ſunt calamo quam opere ruſticae. Sed commendo uitam quietam qua rure uiuitur, curam laudo rerum ruſticarum, conſerendi plantandiq; ſollertiam, laborem leuem, qui corpus paulum exerceat ac corroboret, probō uictus modēſtiam, integritatem uitae, remiſſionem animi, quae eſt uera ratio philoſophandi. Non enim illic degentem rerum urbanarum ſtrepitus & ſollicitudo anxia premit, non curioſitas ſuperuacua noſcendi mentem ſollicitat, non quicquid dubiq; terrarum agitur indagamus. Non curis ſuperfluis abrumptur ſomnus, non peſtilens inuidia, non liuor edax fraudem proximo machinatur, non ſcelerum officina, quae errant urbibus, ad mala facinora impellunt, non ſexcenta alia, quae ciuilis. & occupata uita nequit effugere. Sed dulcis ac ſecura quies, uita frugi, & ocium officio plenum omnibus honoribus ac dignitatibus praefendum. Hanc uitam ſidentius apud te extollo, quem ſero ſepius ruſt tanquam in portum ex ciuili inundatione confugere, delectariq; admodum cultura uille, ac ſtudio tum plantandarum, tum conſerendarum arborum detineri, digno ſanē docto liberoq; homine exercitio. Hortarer te ad eam uiuendi normam, ſi aut res tua, aut


tempora paterentur, attamen si frequenter hos quibus necessario
 implicaris civiles tumultus linieris iocunditate atq; amoenitate ru-
 ris, & te in libertatem animi, quam etiam legendo octosus acqui-
 res, quandoq; uendicaris, cognosces uiuere aliquando te
 tibi, & tempus id tuum esse, quod aut in remissionem
 curarum ruri colendo impenderis, aut contule-
 ris ad studia literarum, quæ est maxima
 omnium & honesta uoluptas ac
 præ cæteris appetenda,
 Vale Floren-
 tiæ.


FINIS.

BASILEAE EX AEDIBVS HEN-
 RICIPETRI MENSE
 AVGVSTO ANNO
 M. D. XXXVIII.



618911109







30

CRESCENTIUS

AGRICULTURA